



Acta Medica Colombiana

ISSN: 0120-2448

Asociacion Colombiana de Medicina Interna;;

Royer-Gutierrez, Henry Alberto; Ahumada-Rodríguez, Wendy Paola

Esofagitis inducida por tetraciclinas

Acta Medica Colombiana, vol. 43, núm. 4, 2018, Octubre-Diciembre, p. 233

Asociacion Colombiana de Medicina Interna;;

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163159058011>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org
UAEM

Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Esofagitis inducida por tetraciclinas

Tetracycline-induced esophagitis

HENRY ALBERTO ROYERO-GUTIÉRREZ • OCAÑA (COLOMBIA)
WENDY PAOLA AHUMADA-RODRÍGUEZ • BARRANQUILLA (COLOMBIA)



Figura 1. Endoscopia digestiva alta con luz blanca. Pentax i-scan, lesiones ulceradas en tercio medio esofágico, con mucosa adyacente respetada. La misma lesión observada con cromendoscopia digital.

Masculino de 16 años, quien consultó por dolor torácico retroesternal de 72 horas de evolución, exacerbado por ingesta de alimentos. El dolor fue gradual hasta percibirlo con intensidad de 9/10, se irradiaba a espalda y hombro derecho. Ingería doxiciclina para el acné, acostándose la mayoría de las veces después de consumirlas. Se indicó endoscopia de vías digestivas altas (EVDA), observándose lesiones ulceradas en tercio medio esofágico con mucosa adyacente respetada (Figura 1); se inició acetaminofén más tramadol como analgésico. Quince días después cursó asintomático y la EVDA encontró el esófago sano (Figura 2). El diagnóstico de esofagitis inducida por medicamentos puede ser hecho por la historia clínica, la EVDA debe indicarse en pacientes que presentan síntomas severos, signos de alarma o persistencia de éstos una semana después de suspender el medicamento. En la mayoría de casos la esofagitis por tetraciclinas mejora en pocos días sin ninguna intervención (1, 2).



Figura 2. Endoscopia digestiva alta con luz blanca, 15 días después con esófago sano.

Referencias

1. Rottenstreich M, Rottentreich M, Shapira S. Doxycycline induced esophageal ulcers in a navy ships crewmember. *Int Marit Health*. 2015; **66**: 181-183.
2. Dag M, Oz Turk Z, Tutar E, Cikman O, Gulsen M. Drug-Induced esophageal ulcers: Case series and review of the literature. *Turk J Gastroenterol*. 2014; **25**: 180-184.

Dr. Henry Alberto Royero-Gutiérrez: Especialista en Medicina Interna y Gastroenterología, Hospital Emiro Quintero Cañizares. Ocaña (Colombia); Dra. Wendy Paola Ahumada-Rodríguez: Médica Interna, Universidad Metropolitana. Barranquilla (Colombia).

Correspondencia: Dr. Henry Alberto Royero-Gutiérrez, Ocaña (Colombia).

E-mail: royerogastro@hotmail.com

Recibido: 28/X/2017 Aceptado: 23/X/2018