



Surgical & Cosmetic Dermatology

ISSN: 1984-5510

ISSN: 1984-8773

Sociedade Brasileira de Dermatologia

Guimarães, Ludmilla Luiza Libanio; Fernandes, Nurimar Conceição; Cuzzi, Tullia  
Paniculite factícia mimetizando eritema nodoso crônico

Surgical & Cosmetic Dermatology, vol. 10, núm. 2, 2018, Abril-Junho, pp. 157-160

Sociedade Brasileira de Dermatologia

DOI: <https://doi.org/10.5935/scd1984-8773.2018102666>

Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265557850012>

- Como citar este artigo
- Número completo
- Mais informações do artigo
- Site da revista em [redalyc.org](http://redalyc.org)

redalyc.org  
UAEM

Sistema de Informação Científica Redalyc

Rede de Revistas Científicas da América Latina e do Caribe, Espanha e Portugal

Sem fins lucrativos acadêmica projeto, desenvolvido no âmbito da iniciativa  
acesso aberto

# Paniculite factícia mimetizando eritema nodoso crônico

*Factitious panniculitis mimicking chronic erythema nodosum*

DOI: <http://www.dx.doi.org/10.5935/scd1984-8773.2018102666>

## RESUMO

A paniculite factícia pode ser desencadeada por injeções subcutâneas de substâncias com finalidade estética. Caso diagnosticado e tratado como eritema nodoso crônico, cinco anos após, manifestou nódulo, cujo estudo anatomo-patológico sugeriu tumor lipomatoso atípico. Ressecada a lesão, o exame histopatológico mostrou esteatonecrose, compatível com paniculite lobular. Na ressonância magnética, imagens de líquido na região glútea favoreceram a suspeita diagnóstica de paniculite factícia. A paciente admitiu injeção pregressa de silicone nessa região, e os achados adicionais na revisão histopatológica confirmaram essa hipótese. A complicação tardia das injeções do material de preenchimento motivou nossa apresentação.

**Palavras-Chave:** Eritema migrans crônico; Paniculite; Silicones

## ABSTRACT

*Factitious panniculitis can be triggered by subcutaneous injections of substances linked to esthetic procedures. A case diagnosed and treated as chronic erythema nodosum manifested nodule five years later, with the anatomo-pathological study suggesting atypical lipomatous tumor. After resection of the lesion, histology showed steatonecrosis, compatible with lobular panniculitis. Magnetic resonance imaging examination revealed the presence of a liquid substance in the gluteal region, favoring the diagnostic suspicion of factitious panniculitis. The patient admitted to having undergone silicone injection in this region in the past, with additional findings arising from the histological review confirming this hypothesis. The late complication linked to injections of cutaneous filling material motivated the present study.*

**Keywords:** Erythema chronicum migrans; Panniculitis; Silicones

## INTRODUÇÃO

As paniculites, grupo de afecções subcutâneas inflamatórias de predomínio septal ou lobular, com ou sem vasculite, têm etiologia múltipla.<sup>1</sup>

O eritema nodoso (EN) migratório, a paniculite nodular migratória subaguda de Vilanova-Pinol Aguadé (PNMS) e o EN crônico, variantes do EN clássico, são hoje consideradas fases distintas do mesmo processo patológico.<sup>1</sup> Descrita em 1956 por Vilanova e Pinol Aguadé,<sup>2</sup> a PNMS distingue-se por apresentar poucos nódulos, unilaterais e assimétricos que confluem formando placas induradas de até 20cm, com lesões ativas centrífugas e involução central concomitante, adquirindo formas e tonalidades diversas. Há predomínio no sexo feminino e é pouco sintomática, evoluindo de meses a anos em joelhos, nádegas e coxas.<sup>1</sup>

O objetivo deste relato é demonstrar complicação tardia (10 anos) de preenchimento cutâneo expresso por paniculite.

## Relato de Caso

### Autores:

Ludmilla Luiza Libanio Guimarães<sup>1</sup>  
Nurimar Conceição Fernandes<sup>2</sup>  
Tullia Cuzzi<sup>3,4</sup>

<sup>1</sup> Clíndes – Vitória (ES), Brasil.

<sup>2</sup> Universidade Federal do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro (RJ), Brasil.

<sup>3</sup> Departamento de Patologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro (RJ), Brasil.

<sup>4</sup> Instituto Nacional de Infectologia, Fundação Oswaldo Cruz – Rio de Janeiro (RJ), Brasil.

### Correspondência para:

Ludmilla Luiza Libanio Guimarães  
Avenida Nossa Senhora da Penha no 699 – Torre B – sala 913, Santa Lúcia  
29056-250, Vitória, ES  
Brasil.  
e-mail: ludlibanio@gmail.com

**Data de recebimento:** 07/07/2015

**Data de aprovação:** 29/05/2018

Trabalho realizado no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF). Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Rio de Janeiro (RJ), Brasil.

**Suporte Financeiro:** Nenhum

**Conflito de Interesses:** Nenhum



## MÉTODOS

Relata-se o caso de paciente do sexo feminino, 50 anos, parda, pouco assídua, que se apresentou à consulta na Clínica de Dermatologia de serviço universitário no Rio de Janeiro, Brasil, em novembro de 2001, com placa eritemato-infiltrada, indurada, medindo 25cm de comprimento, com aumento de temperatura e localizada na face anterior da coxa direita (Figura 1), tendo surgido há quatro anos. Com a hipótese de paniculite, foi realizada biópsia, cujo estudo anatomo-patológico revelou fase crônica de EN. No seguimento ambulatorial, as condições possivelmente associadas (tricomoníase, onicomicose, paroníquia, hidradenite e escabiose) foram adequadamente tratadas. Os resultados de exames laboratoriais – hemograma, bioquímica, função tireoidiana, sorologias para hepatites B e C, VDRL, anti-HIV, ASLO, alfa-1-antitripsina, sedimento urinário, parasitológico de fezes – e RX de tórax foram normais. Foram utilizados anti-inflamatórios não hormonais, solução saturada de iodeto de potássio oral (atingidas apenas 15 gotas/dia por intolerância gastrointestinal), iodeto de potássio em creme e corticoterapia sistêmica nos períodos de maior inflamação, sem mudança significativa no curso da paniculite.

Em março de 2006, a paciente voltou à consulta, relatando o surgimento de nódulo endurecido e doloroso, de 7cm, na face lateral da coxa esquerda há um ano. Após avaliação ultrassonográfica, que descreveu formações ecogênicas de limites imprecisos no subcutâneo da face externa da coxa esquerda, região inguinal esquerda e face interna da coxa direita, foi colhida biópsia incisional de lesão, cujo estudo anatomo-patológico revelou tumor lipomatoso atípico, com pesquisa negativa para germes comuns, fungos e micobactérias. Em fevereiro de 2012, a exérese dessa lesão (Figura 2) revelou extensa esteatonecrose ao exame histopatológico. A ressonância magnética realizada após a cirurgia evidenciou, além de múltiplos linfonodos de aspecto inespecífico nas cadeias ilíacas e femorais, infiltração líquida no subcutâneo da região glútea (Figura 3).



FIGURA 1: Placa em face anterior da coxa direita



FIGURA 2: Cicatriz cirúrgica em face lateral da coxa esquerda




FIGURA 3: Ressonância magnética mostrando infiltração líquida no subcutâneo da região glútea


## RESULTADOS

Considerando a esteatonecrose, achado presente à histopatologia de algumas paniculites lobulares, a imagem de infiltração líquida na região glútea e a revisão da história clínica (informação da paciente de injeção de silicone em regiões glúteas pelo menos 10 anos antes da admissão), aventou-se a possibilidade de paniculite factícia por substância exógena.


A revisão das amostras histopatológicas acrescentou ao achado de esteatonecrose a presença de espaços microcísticos na hipoderme, alguns delimitados por material anfófilico, e células espumosas, consistentes com a hipótese de paniculite factícia (Figuras 4-7). A ausência de refringência à luz polarizada foi condizente com o tipo de material informado pela paciente (silicone).

## DISCUSSÃO


Paniculites factícias ou artificiais são lesões do tecido subcutâneo provocadas por fatores externos (mecânicos, químicos e físicos), integrando o grupo das paniculites lobulares sem vascu-




**FIGURA 4:** Foco de esteatonecrose em porção superior da imagem, adjacente ao infiltrado inflamatório e microcistos



**FIGURA 7:** Detalhe das células espumosas compõe a maior parte do infiltrado inflamatório



**FIGURA 5:** Espaços císticos de tamanhos variados, revestidos por material amorfó anfóflico, em meio a células inflamatórias



**FIGURA 6:** Espaços císticos revestidos por material amorfo anfóflico, adjacentes às células espumosas

lite.<sup>3,4</sup> Podem ser autoinduzidas, acidentais, propositais, manifestação de distúrbio psiquiátrico ou da injeção iatrogênica de substâncias. Embora o mecanismo etiopatogênico seja desconhecido, têm sido implicados vasoconstricção com isquemia nos sítios de

injeção, resposta inflamatória a drogas precipitadas e trauma por injeções repetidas.<sup>3</sup>

Os preenchedores podem induzir desde reações adversas que desaparecem espontaneamente ou até levar a complicações 30 anos após o procedimento,<sup>3</sup> quando o paciente já não se recorda qual foi o material injetado.<sup>5</sup>

Quando a paciente em questão admitiu a realização de preenchimento em clínica clandestina, anteriormente à década de 1990, aventamos a possibilidade de a injeção iatrogênica de material inabsorvível no passado ser a responsável pelas manifestações atuais. A omissão do procedimento, realizado muitas vezes por profissionais não legalizados,<sup>6</sup> é a explicação provável para o diagnóstico tardio desse tipo de paniculite.

O silicone é composto hidrofóbico polimérico encontrado como óleo, gel ou implante sólido. Em sua forma líquida, foi muito usado para correção cosmética de rugas finas, cicatrizes e volumização tecidual da face de pacientes HIV positivos portadores de lipoatrofia.<sup>5,7</sup>

A migração de preenchedores não biodegradáveis como o silicone, muitas vezes é relatada simulando neoplasias malignas e doenças granulomatosas.<sup>8</sup> É capaz de alcançar sítios distantes da área tratada,<sup>5,7</sup> causando reação inflamatória local. A ausência de cápsula fibrosa ao redor de grandes volumes permite a migração gravitacional do implante em direção a áreas indesejadas.<sup>9</sup> Acredita-se ser precipitada pela injeção de volumes excessivos em bolus.<sup>7</sup> No caso exposto, suspeitou-se do deslocamento do material injetado previamente nas nádegas, pelo subcutâneo, em direção à topografia das coxas.

O padrão histopatológico geralmente observado nas paniculites factícias é o de paniculite lobular aguda associada à esteatonecrose e infiltrado inflamatório com predomínio neutrófilico, evoluindo com aspecto granulomatoso.<sup>3</sup> Lesões crônicas caracterizam-se por histiocitos espumosos e fibrose circunjacente.<sup>3,4</sup> O importante envolvimento dérmico também ajuda a diferenciar a forma causada por substâncias injetadas dos outros tipos de paniculite.<sup>3</sup>

Os achados histológicos vinculados à utilização de silicone são variados e mais frequentemente correspondem a nó-

dulos cutâneos. Em geral, há infiltrado difuso de macrófagos e células gigantes multinucleadas do tipo corpo estranho que delimitam espaços vazios de variados tamanhos, em padrão conhecido como “queijo suíço”. A presença de células com atipias citológicas reacionais e mesmo de lipoblastos pode justificar o diagnóstico diferencial com processos neoplásicos.<sup>5,6,10</sup>

Por se tratar de preenchedor permanente, a resposta inflamatória ao silicone pode ocorrer a qualquer momento e constitui um desafio terapêutico.<sup>9</sup> Citam-se tratamentos com corticoides locais e sistêmicos,<sup>11</sup> minociclina,<sup>5,7,11</sup> imiquimod a 5%,<sup>5,7,11</sup> isotretinoina e doxiciclina.<sup>7</sup>

Morondo e cols.<sup>11</sup> descreveram um caso de paniculite factícia por silicone em regiões glúteas e EN (associado à síndrome de Löfgren) em regiões pré-tibiais concomitantes, com boa resposta ao anti-inflamatório não esteroidal.

Para casos secundários à reação granulomatosa utilizam-se corticoides intralesionais<sup>3,5</sup> e remoção dos implantes nos casos irresponsivos,<sup>3,7</sup> o que pode exigir largas ressecções e reconstruções complicadas.<sup>8</sup>

A perda do seguimento ambulatorial inviabilizou o direcionamento terapêutico após a revisão desse caso.

## CONCLUSÃO

Os dados histopatológicos somados à história prévia do preenchimento, ao potencial de migração do silicone, à evolução crônica e atípica e à documentação de infiltração líquida glútea, embasaram a conclusão de paniculite factícia.

As reações adversas aos preenchedores podem surgir muitos anos após o procedimento e farta documentação sobre migração do silicone para sítios distantes está disponível. Uma história completa incluindo informações do passado e tratamentos estéticos prévios deve ser especialmente realizada frente a casos de paniculite evoluindo cronicamente. ●

## REFERÊNCIAS

1. Krook PO, Halpern I, Passos AP. Afecções da Hipoderme. In: Junior WB, Chiacchio ND, Criado PR, editors. Tratado de Dermatologia. São Paulo: Ed. Atheneu; 2014. p. 747-802.
2. Vilanova X, Pinol Aguadé J. Hypodermite Nodulaire Subaiguë Migratrice. Annales de Dermatologie. 1956;83(4):369-401.
3. Sanmartín O, Requena C, Requena L. Factitial Panniculitis. Dermatol Clin. 2008; 26(4):519-27.
4. Jeong KH, Lee MH. Two cases of factitial panniculitis induced by electroacupuncture. Clin Exp Dermatol. 2008;34(5):e170-3.
5. Requena L, Requena C, Christensen L, Zimmermann US, Kutzner H, Cerrioli L. Adverse reactions to injectable soft tissue fillers. J Am Acad Dermatol. 2011;64(1):1-34.
6. Mercer SF, Kleinerman R, Goldenberg G, Emanuel PO. Histopathological Identification of Dermal Filler Agents. J Drugs Dermatol. 2010;9(9):1072-7.
7. Prather CL, Jones DH. Liquid injectable silicone for soft tissue augmentation. Dermatol Ther. 2006;19(3):159-68.
8. Hirsch RJ, Stier M. Complications of Soft Tissue Augmentation. J Drugs Dermatol. 2008;7(9):841-45.
9. Gilbert E, Hui A, Meehan S, Waldorf HA. The Basic Science of Dermal Fillers: Past and Present Part II: Adverse Effects. J Drugs Dermatol. 2012;11(9):1069-75.
10. Shvartsbeyn M, Rapkiewicz A. Silicon-associated subcutaneous lesion presenting as a mass: a confounding histopathologic correlation. Hum Patol. 2011;42(9):1364-7.
11. Morondo CD, Fontana NP, Gontad JML, RNA, González MF, Silva JG et al. Paniculitis facticia y syndrome de Löfgren inducidos por silicona: a propósito de un caso clínico. Reumatol Clin. 2012;8(6):368-71.

## CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES:

**Ludmilla Luiza Libanio Guimarães** |  ORCID 0000-0002-6543-610X

Suspeição diagnóstica, levantamento bibliográfico e redação do texto.

**Nurimar Conceição Fernandes** |  ORCID 0000 - 0002-1819-9630

Acompanhamento ambulatorial da paciente, orientação na redação do texto e revisões do texto.

**Tullia Cuzzi** |  ORCID 0000-0002-3331-5290

Emissão dos laudos histopatológicos, discussão dos achados histopatológicos, documentação fotográfica histopatológica e revisão crítica do texto.