

Efecto de la fisioterapia en un paciente con neurofibromatosis tipo II. Reporte de un caso

Granados Carrera, Julio César; Espinoza Castillo, Javier; Mego Vásquez, Jimmy Alexander; Guzmán Huamán, Eduardo

Efecto de la fisioterapia en un paciente con neurofibromatosis tipo II. Reporte de un caso

Revista Médica Herediana, vol. 29, núm. 2, 2018

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338058068027>

DOI: <https://doi.org/10.20453/rmh.v29i2.3351>



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

REPORTE DE CASO

Efecto de la fisioterapia en un paciente con neurofibromatosis tipo II. Reporte de un caso

Effect of physiotherapy in a patient with neurofibromatosis type II. A case report

Julio César Granados Carrera

Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana

Rebaza Flores” Convenio amistad Perú Japón, Perú

Universidad Norbert Wiener, Perú

Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú

Universidad Alas Peruanas., Perú

DOI: <https://doi.org/10.20453/rmh.v29i2.3351>

Redalyc: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338058068027>

Javier Espinoza Castillo

Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana

Rebaza Flores” Convenio amistad Perú Japón., Perú

Jimmy Alexander Mego Vásquez

Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana

Rebaza Flores” Convenio amistad Perú Japón., Perú

Eduardo Guzmán Huamán

Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana

Rebaza Flores” Convenio amistad Perú Japón., Perú

Recepción: 12 Febrero 2018

Aprobación: 26 Marzo 2018

RESUMEN:

La fisioterapia en pacientes con lesión neurológica degenerativa puede mejorar la capacidad funcional permitiéndole una participación social activa y una mejor calidad de vida mientras la evolución de la enfermedad lo permita. Se describe los efectos de la fisioterapia en un paciente con lesión medular secundaria a Neurofibromatosis tipo II. La intervención se basó en terapias cardiorrespiratoria, funcional y deportiva. Se obtuvo en el paciente mayor funcionalidad para caminar, mejor autoestima y capacidad física para trabajar.

PALABRAS CLAVE: Fisioterapia, neurofibromatosis, traumatismos de la médula espinal.

ABSTRACT:

Physiotherapy in patients with degenerative neurologic conditions may improve functional capacity allowing a better quality of life and active social participation, as long as the progression of disease allows it. We report the effects of physiotherapy in a patient with medullar involvement due to type II neurofibromatosis. Interventions were based on cardiorespiratory, functional and sport interventions. The intervention attained better functionality to walk, better self-confidence and physical capacity to work.

KEYWORDS: Physical therapy specialty, neurofibromatosis, spinal cord injuries.

INTRODUCCIÓN

La neurofibromatosis (NF), descrita por primera vez en 1882 por Von Recklinghausen, es una enfermedad genética caracterizada por una anormalidad neuro ectodérmica y por manifestaciones clínicas de afectación sistémica y progresiva que afectan principalmente a la piel, el sistema nervioso, los huesos, los ojos y otros órganos (1). Existen varios tipos, los principales son: El tipo I, la neurofibromatosis (NF-1), caracterizada por presentar manchas “café con leche” y crecimiento de dos o más neurofibromas (2); el tipo II (NF-2), se

caracteriza por alta incidencia de tumores en el sistema nervioso (meningioma, ependimoma, neurofibroma espinal y glioma) asociadas a anomalías oculares, vestibulares y dérmicas (3); y el tipo III (NF-3), o schwannomatosis caracterizada por desarrollar schwannomas múltiples, de evolución continua (4).

No hay tratamiento médico disponible para prevenir y revertir las lesiones. La atención se centra en asesoramiento genético, en la detección temprana, en el uso de fármacos y la resección quirúrgica de los tumores (1), y pocas veces fisioterapia y rehabilitación (5).

Se reporta el caso de un paciente con NF-2, de presentación inusual con lesión medular (LM), con múltiples complicaciones y con antecedente familiar de 2 hermanos fallecidos por la misma enfermedad, con el objetivo de describir los efectos de la fisioterapia cardiorrespiratoria, funcional y deportiva.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Varón de 34 años, con diagnóstico clínico de NF-2, de 20 años de evolución. Inició síntomas hace 6 años de forma progresiva. Al examen clínico, se encontró debilidad en extremidades, hipoestesia en extremidades y tronco, dolor neuropático a nivel lumbar, alteraciones vestibulares y pérdida del equilibrio, alteraciones visuales, trastornos de la vejiga, intestino, sexual y psicológico que le provocó limitación para caminar, agarrar objetos, baja autoestima y restricción para trabajar.

Inició rehabilitación en el Departamento de lesiones medulares del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), siendo hospitalizado para tratamiento integral por 4 meses. El diagnóstico médico fue cuadriplejía espástica ASIA C nivel C4 de etiología no traumática, recibiendo tratamiento fisioterapéutico: cardiorrespiratorio, funcional y deportivo; además, evaluaciones médicas, terapia ocupacional, psicología, reeducación de la vejiga, intestino y orientación sexual (6). Cada sesión de fisioterapia tuvo en promedio 60 minutos a tolerancia, de lunes a sábados distribuidos en turnos mañana y tarde.

La fisioterapia cardiorrespiratoria consistió en mejorar la capacidad vital y la condición física mediante técnicas kinésicas de ventilación y el trabajo muscular de los brazos en la bicicleta ergonómica (7,8); la fisioterapia funcional se aplicó para mejorar el alineamiento y la estabilidad del tronco en actividades anti gravitatorias mediante el trabajo muscular excéntrico y de relajación para mitigar el dolor (9); y como actividad deportiva practicó el tenis de mesa de pie para estimular el equilibrio y mejorar la autoestima (10). En cada intervención se evaluó el inicio y final para describir los cambios (tabla 1, tabla 2, tabla 3 y tabla 4).

Tabla 1. Evaluación de la función respiratoria.

Evaluación	Inicial	Final
Saturación de oxígeno	97%	97%
Distensibilidad torácica (cm)	0,8	1,5
Capacidad inspiratoria (ml)	2,500	3,800
Pico flujo espiratorio (lpm)	250	400
Tos	Débil No funcional	Funcional asistida

Tabla 1.

Tabla 2. Evaluación de la función cardiaca al esfuerzo.

	Distancia		Tiempo		Escala de Borg		Tiempo de recuperación	
	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final
Ergómetro de brazos	0,5 millas	3 millas	10 min	15 min	0/2 2/5	0/1 1/3	10 min	5 min
Test de caminata 6 minutos	450 m	560 m	6 min	6 min	0/2 3/5	0/1 1/3	10 min	5 min

Tabla 2.**Tabla 3.** Evaluación del control postural parado.

Función	Evaluación	Inicial	Final
Postural	Cabeza y tronco	Cabeza en extensión y rotación a la derecha. Tronco en flexión y rotación a la izquierda	Cabeza y tronco próximo a la línea media.
	Pelvis, rodillas y tobillos	Pelvis en retroversión Rodillas y tobillos en valgo moderado	Pelvis neutra Rodillas y tobillos en valgo leve
	Dedos del pie y miembro inferior	Dedos flexionados, aducidos (en garra)	Dedos alineados
Actividad	Marcha	Dependiente de andador agazapado	Camina sin andador y erguido
	Subir y bajar escaleras 1 piso	Dependiente	Realiza cogiéndose de los pasamanos
	Incorporarse desde el suelo	Dependiente	Realiza con supervisión

Tabla 3.**Tabla 4.** Evaluación deportiva en tenis de mesa parado.

Función	Evaluación	Inicial	Final
Gesto motor	Para golpear la pelota con la paleta	Inestable, se coge de mesa	Estable sin cogerse de la mesa
	Desplazamientos laterales para golpear la pelota	Perdida del equilibrio	Equilibrio lateral
	Rotación de tronco	Rígido	Rotación Parcial
Coordinación y velocidad	Nº de lanzamientos de la pelota frente a la pared en 1 minuto sin apoyo	2 lanzamientos	10 lanzamientos
	Nº de veces que lanza la pelota al área contraria en 1 minuto sin apoyo	1 lanzamiento	25 lanzamientos
	Nº de veces que golpea la pelota sin perder el equilibrio en 1 minuto sin apoyo	2 veces	18 veces

Tabla 4.

DISCUSIÓN

La fisioterapia busca la recuperación funcional en la disfunción del movimiento y toma importancia en las enfermedades neurodegenerativas (11). Los resultados describen que la fisioterapia provocó cambios al final de la rehabilitación; porque mejoró la capacidad vital y la condición física del paciente lo suficiente como para caminar y agarrar objetos y reforzó la autoeficacia de participar en el trabajo.

No se han encontrado estudios sobre el efecto simultáneo de estas tres modalidades de fisioterapia en la NF-2. Con respecto a la fisioterapia cardiorrespiratoria, Real (7), resalta que el programa de rehabilitación intensiva diaria contribuye a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria en pacientes con enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, por extensión considerando que la NF-2 es una enfermedad

degenerativa, la distensibilidad torácica, la capacidad inspiratoria y el pico flujo espiratorio mejoraron con la fisioterapia en forma progresiva pues tuvimos sesiones diarias y planificadas por el equipo de terapia física, lo que permitió un monitoreo adecuado de sus capacidades.

Con respecto a la terapia funcional, Makles-Kacy (12), reportó que la fisioterapia mejoró de la funcionalidad física de la cara y aspectos psicológicos después de un trasplante quirúrgico facial y en un caso de NF-1, el paciente motivo de este reporte tuvo cambios positivos en el control postural y actividades de parado lo suficiente para caminar sin andador por tramos cortos y medios. Dericioglu (9), publicó que la fisioterapia basada en el concepto Bobath en un niño con NF-1 mejoró la funcionalidad y postura a través del alineamiento y estabilidad, este resultado es similar al de nuestro paciente pues se aplicó el enfoque de este concepto, y el paciente obtuvo una mejor retroalimentación sensorial para mantener la postura.

Muraki (10), propone que el deporte en personas con lesión medular cuadripléjicas y parapléjicas puede mejorar la función física y la condición psicológica. González-Cutre (13), describe que el deporte en un niño con NF-1 disminuyó los efectos negativos funcionales. En el manejo el paciente fue sometido a un entrenamiento deportivo de tenis de mesa en parado para reforzar su estabilidad lo que le permitió mejorar la tolerancia al esfuerzo físico mientras camina y manipula objetos funcionales, percibiendo un mejor balance vertical y mayor independencia.

En conclusión, la intervención paralela de la fisioterapia cardiorrespiratoria, funcional y deportiva tuvo un efecto positivo en la capacidad funcional y participación laboral en un paciente con NF-2 después de un periodo de 4 meses en rehabilitación integral. Sin embargo, somos conscientes que la evolución de esta discapacidad puede variar en cualquier momento y disminuir la funcionalidad obtenida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Antonio JR, Goloni-Bertollo EM, Tríduo LA. Neurofibromatosis: chronological history and current issues. *An Bras Dermatol.* 2013; 88(3):329-43.
2. Duong T, Sbidian E, Valeyrie-Allanore L, et al. Mortality Associated with Neurofibromatosis 1: A Cohort Study of 1895 Patients in 1980-2006 in France. *Orphanet Journal of Rare Diseases.* 2018; 6(1):18-25.
3. Patel C, Ferner R, Grunfeld E. A qualitative study of the impact of living with neurofibromatosis type 2. *Psychology, Health & Medicine.* 2018; 16(1):19-28.
4. Plotkin SR, Blakeley JO, Evans DG, et al. Update From the 2011 International Schwannomatosis Workshop: From Genetics to Diagnostic Criteria. *Am J Med Genet A.* 2013; 161(3):405-16.
5. Blakeley JO, Plotkin SR. Therapeutic advances for the tumors associated with neurofibromatosis type 1, type 2, and schwannomatosis. *Neuro-Oncology.* 2016; 18(5):624–638.
6. Harvey L. Tratamiento de la lesión medular. Guía para fisioterapeutas. Barcelona: Editorial Elsevier; 2010. p. 6-48.
7. Real Y, López M, Hernández, Díaz R, Cabrera J. Efectividad de un programa de rehabilitación respiratoria en pacientes con esclerosis múltiple. *Revista Cubana de Salud Pública.* 2010; 37(1):12-18.
8. Tørhaug T, Brurok B, Hoff J, Helgerud J, Leivseth G. Arm crank and wheelchair ergometry produce similar peak oxygen uptake but different work economy values in individuals with spinal cord injury. *Biomed Res Int.* 2016; 2016: 5481843. doi: 10.1155/2016/5481843
9. Dericioglu B, İlhan H. Effectiveness of physiotherapy and rehabilitation in type 1 neurofibromatosis; 18 months follow up; Pediatric Rehabilitation Congress Abstracts. *Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation.* 2017; 2: S78.
10. Muraki S, Tsunawake N, Hiramatsu S, Yamasaki M. The effect of frequency and mode of sports activity on the psychological status in tetraplegics and paraplegics. *Spinal Cord.* 2000; 38:309-314.
11. Smith R, Jones G, Curtis A, Murphy H, Flint G. Are established methods of physiotherapeutic management for long-term neurological conditions applicable to 'orphan' conditions such as syringomyelia? *Physiotherapy Research International.* 2016; 21(1): 4-21.

12. Makles-Kacy I, Zys-Owczarek E, Polak A, Maciejewski A. Physiotherapy in the first three months after allograft face transplantation - case report. *Physiotherapy*. 2016; 24(1):34-38.
13. González-Cutre D. Aplicación de un programa de actividad física para un niño con neurofibromatosis. *Educación física y deportes*. 2005; 89:0-0.