



Revista Médica Herediana
ISSN: 1018-130X
ISSN: 1729-214X
juan.miyahira@upch.pe
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Perú

Susceptibilidad antimicrobiana de *Streptococcus agalactiae* en un hospital materno-infantil de Lima, Perú. 2015-2020

Pulido-Colina, Angie; Soto Pastrana, Javier

Susceptibilidad antimicrobiana de *Streptococcus agalactiae* en un hospital materno-infantil de Lima, Perú. 2015-2020

Revista Médica Herediana, vol. 33, núm. 3, 2022

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338073337005>

DOI: <https://doi.org/10.20453/rmh.v33i3.4340>



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Susceptibilidad antimicrobiana de *Streptococcus agalactiae* en un hospital materno-infantil de Lima, Perú. 2015-2020

Antimicrobial susceptibility of *Streptococcus agalactiae* in a Maternal and Child Hospital in Lima, Peru. 2015-2020

Angie Pulido-Colina *

Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

angielu8926@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-7619-4353>

DOI: <https://doi.org/10.20453/rmh.v33i3.4340>

Redalyc: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338073337005>

Javier Soto Pastrana

Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé,

Perú

 <https://orcid.org/0000-0001-9534-5746>

Recepción: 14 Diciembre 2021

Aprobación: 19 Junio 2022

RESUMEN:

Objetivo: Determinar la susceptibilidad antimicrobiana de cepas de *Streptococcus agalactiae* (EGB) aisladas entre 2015-2020 en un hospital materno-infantil. **Material y métodos:** Estudio descriptivo realizado entre 2015 y 2020. La identificación y susceptibilidad antimicrobiana se determinaron por el sistema automatizado Vitek® 2. La base de datos obtenida fue transferida al programa WHONET versión 5.6. Se incluyeron 506 aislamientos de EGB. **Resultados:** 500 (98,8%) fueron en mujeres. La edad media fue de $31,9 \pm 11,8$ años. Todos fueron sensibles a penicilina, ampicilina y vancomicina, la resistencia a eritromicina, clindamicina y levofloxacino fue de 38,5%, 37,4% y 28%, respectivamente, mostrando un pico de resistencia en 2018. **Conclusión:** Se observó un incremento en la resistencia de EGB a los antimicrobianos, especialmente el año 2018.

PALABRAS CLAVE: *Streptococcus agalactiae*, pruebas de sensibilidad microbiana, farmacorresistencia bacteriana.

ABSTRACT:

Objective: To determine the antimicrobial susceptibility of *Streptococcus agalactiae* (GBS) strains isolated between 2015-2020 in a mother-child hospital. **Methods:** Descriptive study carried out between 2015 and 2020. Antimicrobial identification and susceptibility were determined by the Vitek® 2 automated system. The database obtained was transferred to the WHONET version 5.6 program. 506 GBS isolates are included. **Results:** 500 (98.8%) were in women. The mean age was 31.9 ± 11.8 years. All were sensitive to penicillin, ampicillin and vancomycin, resistance to erythromycin, clindamycin and levofloxacin was 38.5%, 37.4% and 28%, respectively, showing a resistance peak in 2018. **Conclusion:** An increase in GBS resistance to antimicrobials was observed, especially in 2018.

KEYWORDS: *Streptococcus agalactiae*, microbial sensitivity tests, Drug resistance.

NOTAS DE AUTOR

Correspondencia: Angie Pulido Colina. Correo electrónico: angielu8926@gmail.com

DECLARACIÓN DE INTERESES

* Los autores declaran no tener conflicto de interés.

INTRODUCCIÓN

Streptococcus agalactiae también llamado estreptococo del grupo B de Lancefield (EGB), es considerado un comensal de la microbiota intestinal, suele colonizar el tracto genitourinario y en la actualidad es causa importante de infecciones graves en recién nacidos (RN), embarazadas y adultos mayores. (1,2)

El esquema de tratamiento de primera línea frente a EGB o para la profilaxis antibiótica intraparto es ampicilina (AMP) y penicilina (PE) (3,4). Sin embargo, en el caso de pacientes alérgicos a PE o ante la falta de respuesta clínica, se administra antimicrobianos alternativos como clindamicina (CLI) y eritromicina (ERI) en infecciones leves y vancomicina (VA), antibiótico de último recurso, usado en caso de pacientes alérgicos a PE y en cepas resistentes a CLI (1,3). Además, se ha observado que las tasas de resistencia a ERI y CLI de EGB causantes de infección invasiva en RN y adultos ha aumentado gradualmente (2,4,5). Otro antibiótico de uso menos común frente a EGB es levofloxacino (LEV), una fluoroquinolona (FQ) que no es utilizada en el tratamiento de infecciones por EGB en pediatría, pero es usado en pacientes adultos alérgicos a PE o con aislamientos resistentes a ERI. (4,5)

En 2019, se informó del incremento de los aislamientos de EGB en muestras de orina, colocándolo como el tercer patógeno urinario más frecuentemente reportado en un hospital materno-infantil (6). Es por el aumento de casos y la resistencia a los antimicrobianos que se realizó este estudio con el objetivo de determinar la susceptibilidad antimicrobiana de EGB aislados en un hospital materno-infantil entre 2015-2020.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo, realizado en el laboratorio de microbiología del Hospital Nacional Docente Madre-Niño “San Bartolomé”, entre el 1 de enero de 2015 y 31 de diciembre de 2020.

Se siguieron los protocolos de cultivo estandarizados del laboratorio. Se incluyeron todos los cultivos positivos para EGB únicos y consecutivos, recuperados de 477 muestras de orina, 12 de secreción vaginal, 8 de herida, cuatro de sangre, cuatro de absceso y uno de líquido cefalorraquídeo. La identificación y susceptibilidad antimicrobiana se realizó con el sistema automatizado Vitek® 2 (BioMérieux, Francia). Los datos obtenidos se ingresaron en el programa WHONET (7) versión 5.6, a partir del cual fueron filtrados y unificados los datos para su posterior análisis.

Para evaluar los perfiles de susceptibilidad se determinó la concentración inhibitoria mínima (CIM) para los antibióticos AMP, PE, CLI, ERI, LEV y VA. Se interpretaron siguiendo los lineamientos del *Clinical and Laboratory Standards Institute* (CLSI).(8)

Con la información obtenida se realizó el análisis a través del programa WHONET, el cual fue resumido en un formato de datos de Microsoft Excel. Así se determinaron porcentajes de resistencia y sensibilidad antimicrobiana.

Los microorganismos estudiados fueron recuperados e identificados como parte del diagnóstico microbiológico y analizados a partir de la base de datos de laboratorio de microbiología. Se analizaron las cepas bacterianas, los datos de los pacientes se manejaron de manera anónima, desconociéndose la identidad del paciente del cual fueran recuperados, garantizando de esta forma la confidencialidad. La obtención de datos fue autorizada por el departamento de Patología clínica del hospital “San Bartolomé” y, por las razones expuestas, exonerando de revisión por el comité de ética.

RESULTADOS

Se incluyeron en el estudio en total 506 aislamientos de EGB únicos y consecutivos (uno por paciente), de los cuales 500 (98,8%) fueron de mujeres. La edad media de los pacientes fue $31,9 \pm 11,8$ años. La distribución

de los aislamientos por año y según el tipo de muestra se observa en la tabla 1. El perfil de susceptibilidad a los antimicrobianos de los aislamientos de EGB mostró que todos fueron sensibles a PE, AMP y VA; la tasa general de resistencia a ERI, CLI y LEV fue de 38,5%, 37,4% y 28%, respectivamente, mostrando un pico de resistencia en 2018 (gráfico 1).

TABLA 1
Distribución de los aislamientos de *Streptococcus agalactiae* por año y tipo de muestra

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total	%
Orina	58	93	93	87	93	53	47	94,2
Secreción vaginal	5	1	0	1	2	3	12	2,4
Herida	3	1	2	1	0	1	8	1,6
Sangre	1	0	1	0	1	1	4	0,8
Absceso	2	0	1	0	0	1	4	0,8
LCR	0	0	1	0	0	0	1	0,2
Total	69	95	98	89	96	59	506	100

LCR: Líquido cefalorraquídeo




GRÁFICO 1
Tasa de resistencia a los antimicrobianos en *Streptococcus agalactiae*

DISCUSIÓN

En este estudio encontramos que todos los aislamientos fueron sensibles a PE, AMP y VA. Además, se observó resistencia a ERI, CLI y LEV, con 38,5%, 37,4% y 28%, respectivamente; con un pico de resistencia en el año 2018.

Las infecciones por EGB son causas importantes de morbilidad y mortalidad en RN, gestantes y adultos mayores; además, se ha observado el incremento de las tasas de resistencia frente a ERI y CLI, lo que genera preocupación para el tratamiento de infecciones por este microorganismo. (2,3,4)

Todos los aislamientos fueron sensibles a PE y AMP como es común encontrar en EGB (2,3). Si bien la resistencia a betalactámicos sigue siendo relativamente rara, un estudio destacó el aumento de la incidencia de EGB con susceptibilidad reducida a la PE en Japón, que aumentó de 2,3% en 2005-2006 a 14,7%

en 2012-2013 y el 68,9% de estos aislamientos eran multi resistentes, mostrando resistencia adicional a macrólidos y FQ (9). Además, se ha reportado susceptibilidad reducida a la penicilina en los EE. UU., Canadá y Corea (9). En Colombia, en 2019 reportaron que el 12,5% de aislamientos de EGB colonizando mujeres embarazadas no eran sensibles a PE (10). También, en China en 2020 se reportó un aislamiento clínico con una CIM de PE y cefotaxima de 2,0 mg/l y el análisis de las proteínas fijadora de penicilina (PBP) mostró que la reducción de la sensibilidad se debía a la sustitución de aminoácidos en las PBP. (11)

La resistencia a la ERI y CLI en EBG ha aumentado en los últimos años y varía según cada región, así como del tipo de muestra y la población (9). En nuestro estudio se evidenció aumento de la resistencia a la eritromicina entre 2015 y 2018 de 38,5%, a 53,2%. También se han observado altas tasas en aislamientos de EGB en los EE. UU., con valores de 54,8% y 44,8% (9). Se han reportado tasas más bajas en otros países de Latinoamérica como Chile (17%) (12), Colombia (12,5%) (10), Brasil (variable de acuerdo al tiempo y la región geográfica, de 4% a 14%) (13) y Argentina donde se vio un aumento entre los años 2013 y 2019 de 11,6% a 25% (14,15). En Perú, un estudio de 2004 encontró una resistencia a ERI de 11,5% (16) lo que muestra el aumento de la resistencia a este fármaco a través de los años.

La resistencia a la CLI también está aumentando de manera constante. En nuestro estudio se encontró aumento de la tasa de resistencia a CLI entre 2015 y 2018 de 37,4% a 48,8%. Se han visto altas tasas en Taiwán (65,9%) y Portugal (34%) (9), mientras que en Latinoamérica es más baja, Chile (13%) (12), Colombia (7,5%) (10), Brasil (entre 2% y 16%) (13) y Argentina donde, al igual que con ERI, se vio un aumento entre los años 2013 y 2019 de 1,8% a 13,2%). (14,15)

En el caso de LEV, la resistencia está aumentando en todo el mundo (9). Aquí encontramos una tasa de resistencia general de 28%, y en 2018 esta se elevó hasta 34,8%. Los primeros aislamientos resistentes a FQ documentadas se encontraron en Japón en 2003, y han aumentado desde entonces, con tasas de 43,6% en 2012 (17,18). Un estudio de EE. UU. en 2019, informó una tasa de resistencia del 2,3% (19). En Argentina, en aislamientos de 2014-2015, se observó una resistencia de 14,8% (20). La falta de datos de otros países probablemente se deba a la ausencia de pruebas de sensibilidad frente a este fármaco, más que a una baja incidencia de resistencia a FQ.

Una de las limitaciones de este estudio es que los aislamientos incluidos en el estudio se obtuvieron de un solo establecimiento de salud, por lo tanto, nuestros resultados no pueden extrapolarse a todos los establecimientos de salud. Además, durante el año 2020 disminuyó el número de aislamientos, esto debido seguramente a que los esfuerzos del laboratorio estaban centrados en la pandemia de la Covid-19.

En conclusión, se observó un incremento en la resistencia de EGB a los antimicrobianos, marcando el 2018 como el punto más alto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Raabe VN, Shane AL. Group B Streptococcus (*Streptococcus agalactiae*). Microbiol Spectr. 2019;7(2). Doi: 10.1128/microbiolspec.GPP3-0007-2018
2. Tayebi Z, Saderi H, Gholami M, Hourri H, Samie S, Boroumandi S. Evaluation of Antimicrobial Susceptibility of *Streptococcus agalactiae* Isolates from Patients with Urinary Tract Infection (UTI) Symptoms. Infect Epidemiol Med. 2016; 2 (4): 17-19. doi: 10.18869/acadpub.iem.2.4.17
3. Bolukaoto JY, Monyama CM, Chukwu MO, et al. Antibiotic resistance of *Streptococcus agalactiae* isolated from pregnant women in Garankuwa, South Africa. BMC Res Notes. 2015; 8:364. doi: 10.1186/s13104-015-1328-0.
4. Hays C, Louis M, Plainvert C, et al. Changing Epidemiology of Group B Streptococcus Susceptibility to Fluoroquinolones and Aminoglycosides in France. Antimicrob Agents Chemother. 2016; 60(12): 7424-7430. doi: 10.1128/AAC.01374-16

5. Campelo FA, Pedrosa AC, Antúnez IÁ, Capuz BL. Fenotipos y mecanismos de resistencia a macrólidos y lincosamidas en aislados de *Streptococcus agalactiae* con significación clínica en un período de ocho años (2002-2010). *Rev Esp Quimioter.* 2012;25(1):42-6.
6. Pulido A, Soto J. Incremento de aislamientos de *Streptococcus agalactiae* en cultivos de orina en un hospital materno-infantil de Lima, Perú. *An Fac med.* 2019; 80(2): 266-7. doi: 10.15381/anales.802.16427
7. World Health Organization. WHONET 5: microbiology laboratory database software. Ginebra: World Health Organization; 1999. (Citado el 12 de julio del 2022). Disponible en: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/66299>
8. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. Wayne: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2019. (Citado el 12 de julio del 2022). Disponible en: <https://www.nih.org.pk/wp-content/uploads/2021/02/CLSI-2020.pdf>
9. Hayes K, O'Halloran F, Cotter L. A review of antibiotic resistance in Group B *Streptococcus*: the story so far. *Crit Rev Microbiol.* 2020; 46(3):253-269. doi:10.1080/1040841X.2020.1758626
10. Campo CH, Martínez MF, Otero JC, Rincón G. Prevalencia de colonización vaginorrectal por *Streptococcus agalactiae* y su perfil de sensibilidad en mujeres embarazadas atendidas en un hospital de tercer nivel. *Biomédica.* 2019; 39: 689-98. Doi: 10.7705/biomedica.4514
11. Li C, Sapugahawatte DN, Yang Y, Wong KT, Lo NWS, Ip M. Multidrug-Resistant *Streptococcus agalactiae* Strains Found in Human and Fish with High Penicillin and Cefotaxime Non-Susceptibilities. *Microorganisms.* 2020; 8(7): 1055. doi: 10.3390/microorganisms8071055
12. Abarzúa F, Arias A, García P, et al. Aumento de resistencia de *Streptococcus agalactiae* vaginal-anal en el tercer trimestre de gestación a eritromicina y clindamicina al cabo de una década de tamizaje universal. *Rev chil infectol.* 2011; 28(4): 334–337. doi: 10.4067/S0716-10182011000500005.
13. do Nascimento CS, Dos Santos NFB, Ferreira RCC, Taddei CR. *Streptococcus agalactiae* in pregnant women in Brazil: prevalence, serotypes, and antibiotic resistance. *Braz J Microbiol.* 2019; 50(4): 943-952. doi: 10.1007/s42770-019-00129-8
14. Oviedo P, Pegels E, Laczeski M, Quiroga M, Vergara M. Phenotypic and genotypic characterization of *Streptococcus agalactiae* in pregnant women. First study in a province of Argentina. *Braz J Microbiol.* 2013; 44(1): 253- 258. doi: 10.1590/S1517-83822013005000030
15. Bobadilla FJ, Novosak MG, Cortese IJ, Delgado OD, Laczeski ME. Prevalence, serotypes and virulence genes of *Streptococcus agalactiae* isolated from pregnant women with 35-37 weeks of gestation. *BMC Infect Dis.* 2021; 21(1): 73. doi:10.1186/s12879-020-05603-5
16. Tamariz J, Obregon M, Jara J, Diaz J, Jefferson L, Guerra H. Colonización vaginal y anorectal por *Streptococcus agalactiae* en gestantes de los Hospitales Nacionales Cayetano Heredia y Arzobispo Loayza. *Rev Med Hered.* 2004; 15(3): 144-150.
17. Kawamura Y, Fujiwara H, Mishima N, et al. First *Streptococcus agalactiae* isolates highly resistant to quinolones, with point mutations in *gyrA* and *parC*. *Antimicrob Agents Chemother.* 2003; 47(11):3605–3609. doi: 10.1128/AAC.47.11.3605-3609.2003.
18. Nagano N, Nagano Y, Toyama M, et al. Nosocomial spread of multidrug-resistant group B streptococci with reduced penicillin susceptibility belonging to clonal complex 1. *J Antimicrob Chemother.* 2012; 67(4):849–856. doi: 10.1093/jac/dkr546
19. Francois -Watkins LK, McGee L, et al. Epidemiology of invasive Group B Streptococcal infections among nonpregnant adults in the United States, 2008–2016. *JAMA Intern Med.* 2019; 179(4):479–488. doi: 10.1001/jamainternmed.2018.7269
20. Arias B, Kovacec V, Vigliarolo L, et al. Fluoroquinolone-Resistant *Streptococcus agalactiae* Invasive Isolates Recovered in Argentina. *Microb Drug Resist.* 2019; 25(5):739-743. doi: 10.1089/mdr.2018.0246

NOTAS

Declaración de financiamiento: El estudio fue financiado por los autores.

Contribución de autoría: APC y JSP: Participaron en el diseño del estudio, recolección de los datos, análisis e interpretación de los resultados, revisión crítica del artículo y aprobación de la versión a ser publicada.

ENLACE ALTERNATIVO

<https://revistas.upch.edu.pe/index.php/RMH/article/view/4340/4888> (pdf)