



Revista Colombiana de Cirugía

ISSN: 2011-7582

ISSN: 2619-6107

Asociación Colombiana de Cirugía

Moreno-Alfonso, Julio César; Egularas-Córdoba, Inés; Yáñez-Irazábal, María Concepción; Miranda-Murua, María del Coro
Divertículo esofágico de tercio medio: Una causa infrecuente de disfagia
Revista Colombiana de Cirugía, vol. 35, núm. 3, 2020, Julio-Septiembre, pp. 498-499
Asociación Colombiana de Cirugía

DOI: <https://doi.org/10.30944/20117582.562>

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=355566075021>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org
UAEM

Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto



IMÁGENES EN CIRUGÍA

Divertículo esofágico de tercio medio: Una causa infrecuente de disfagia

Middle third esophageal diverticulum: An infrequent cause of dysphagia

Julio César Moreno-Alfonso¹ , Inés Egularas-Córdoba² , María Concepción Yárnoz-Irazábal³ , María del Coro Miranda-Murua⁴

¹ Médico y Cirujano General, Fundación Universitaria Juan N. Corpas; residente de Cirugía pediátrica, Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.

² MD, especialista en Cirugía general, Universidad de Navarra; residente de Cirugía general y del Aparato digestivo, Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.

³ MD, especialista en Cirugía general y del Aparato digestivo; facultativo, Unidad de Cirugía esofagogastrica y bariátrica, Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España. Profesora asociada de anatomía y embriología humana, Universidad Pública de Navarra. Pamplona, España.

⁴ MD, especialista en Cirugía general y del Aparato digestivo; jefa, Unidad de Cirugía esofagogastrica y bariátrica, Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.

Mujer de 72 años de edad, con cuadro clínico de un año de disfagia y atragantamiento con alimentos sólidos, que había requerido tratamiento endoscópico. Se realiza endoscopia de vías digestivas altas que documenta un divertículo esofágico en tercio medio, y manometría esofágica de alta resolución, sin trastorno motor. El esofagograma (figura 1) y la tomografía computarizada de tórax (figura 2) muestran un divertículo en tercio medio de esófago, lateral derecho, de 7 cm de diámetro y base de 2.5 cm de diámetro. De manera programada se lleva a cabo diverticulec-

tomía esofágica por toracoscopia, en decúbito prono (figura 3), sin complicaciones.

Discusión

Los divertículos esofágicos son una patología infrecuente, con una prevalencia de 0,06 - 4 %¹⁻⁴. Suelen ser asintomáticos, pero en caso contrario, el síntoma más frecuente es la disfagia²⁻⁴. Los divertículos esofágicos del tercio medio se forman por mecanismo de tracción, y se asocian a procesos inflamatorios crónicos del mediastino, fibrosis y trastornos motores del esófago, en un

Palabras clave: esófago; divertículo esofágico; trastornos de la motilidad esofágica; endoscopía del sistema digestivo; diagnóstico por imagen; cirugía torácica asistida por video.

Key words: esophagus; diverticulum, esophageal; esophageal motility disorders; endoscopy, digestive system; diagnostic imaging; thoracic surgery, video-assisted.

Fecha de recibido: 11/02/2020 - Fecha de aceptación: 14/02/2020

Correspondencia: Julio César Moreno A., Carrera 75 # 23B – 34, Bogotá, D.C., Colombia.

Teléfono: +57 3118572978

Correo electrónico: juliomoreno.md@gmail.com

Citar como: Moreno-Alfonso JC, Egularas-Córdoba I, Yárnoz-Irazábal MC, Miranda-Murua MC. Divertículo esofágico de tercio medio: Una causa infrecuente de disfagia. Rev Colomb Cir. 2020;35:498-9. <https://doi.org/10.30944/20117582.562>

Este es un artículo de acceso abierto bajo una Licencia Creative Commons - BY-NC-ND <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>




Figura 1. Divertículo esofágico de tercio medio, lateral derecho (A).



Figura 2. Divertículo esofágico de tercio medio con restos alimentarios en su interior (A).

90 % de los casos; sin embargo, se desconoce si el trastorno motor es primario o secundario a la presencia del divertículo^{1,2,4}. Puesto que suelen ser asintomáticos, el diagnóstico es habitualmente incidental mediante esofagograma u otras pruebas radiológicas o endoscópicas, y no precisan tratamiento¹⁻⁴. No obstante, ante la presencia de síntomas, el tratamiento de elección es la resección quirúrgica por toracoscopia o toracotomía²⁻⁴.




Figura 3. Divertículo (A) y esófago distal (B), en relación anatómica con las venas pulmonares derechas (C), bronquio principal derecho (D) y cayado de la vena ácigos (E).

Cumplimiento de normas éticas

Consentimiento informado: Esta publicación es una revisión de historia clínica retrospectiva, y las imágenes no permiten identificar la paciente, por lo que no hay necesidad de un consentimiento informado.

Declaración de conflicto de intereses: los autores declaran que no tienen conflicto de intereses.

Fuentes de financiación: Recursos propios de los autores.

Referencias

1. Sato H, Takeuchi M, Hashimoto S, Mizuno KI, Furuwaka K, Sato A, et al. Esophageal diverticulum: New perspectives in the era of minimally invasive endoscopic treatment. *World J Gastroenterol.* 2019;25:1457-64.
<https://doi.org/10.3748/wjg.v25.i12.1457>
2. Martínez-Marín JD. Divertículo gigante del esófago torácico. *Rev Col Gastroenterol.* 2008;23:387-89.
3. Whittle C, Schiappacasse G, Leal E, Franz G, Hasson D, Maldonado I, et al. Imágenes en divertículos del tubo digestivo: Localizaciones infrecuentes. Serie de casos. *Rev Chil Radiol.* 2018;24:67-78.
4. Herbell FA, Patti MG. Modern pathophysiology and treatment of esophageal diverticula. *Arch Surg.* 2012;397:29-35.
<https://doi.org/10.1007/s00423-011-0843-2>