



Pediatría Atención Primaria

ISSN: 1139-7632

ISSN: 2174-4106

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria

Variabilidad en el manejo de la bronquiolitis
Pediatría Atención Primaria, vol. XXI, núm. 81, 2019, Enero-Marzo, p. e31
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=366659675024>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

UAEAP
redalyc.org

Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso
abierto



Artículo sin valoraciones

Vol. 21 - Num. 81

Leído. Libros, revistas e Internet

Variabilidad en el manejo de la bronquiolitis

Publicado en Internet: 17-01-2019

Cano Garcinuño A, Praena Crespo M, Mora Gandarillas I, Carvajal Urueña I, Callén Bleuca MT, García Merino A, *et al.*
Heterogeneidad de criterios en el diagnóstico de bronquiolitis aguda en España. An Pediatr (Barc). 2018 [en prensa].
(<https://www.analesdepediatria.org/es-pdf-S169540331830314X>)

Este estudio tiene por objetivo conocer los criterios utilizados para el diagnóstico de bronquiolitis aguda (BA) por los pediatras en España. Para ello se diseñaron encuestas específicas, que fueron respondidas por 40 expertos en el tema y por 1297 pediatras. Entre los expertos, hubo consenso en considerar como BA únicamente el primer episodio de dificultad respiratoria, que puede aparecer en cualquier época del año, aunque discrepan en el límite máximo de edad para su diagnóstico. El resto de los pediatras consultados aplican criterios heterogéneos para diagnosticar BA y no hay mucho acuerdo con el consenso de los expertos.

Esta variabilidad dificulta el seguimiento de lo recomendado por las guías clínicas, aunque los autores se preguntan si es positiva la estandarización y proponen dedicar los esfuerzos a ahondar en el conocimiento de las enfermedades respiratorias en la infancia para poderlas ajustar a endotipos bien diferenciados e individualizar su abordaje.