



Revista argentina de radiología  
ISSN: 1852-9992  
Sociedad Argentina de Radiología

Ross, Juana María; Pérez, Emanuel Allegretti; Climente, Cintia  
Signo de las líneas de cebra  
Revista argentina de radiología, vol. 85, núm. 2, 2021, Abril-Junio, pp. 52-53  
Sociedad Argentina de Radiología

DOI: <https://doi.org/10.1055/s-0040-1721342>

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=382568110006>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org



Sistema de Información Científica Redalyc  
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal  
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso  
abierto

# Signo de las líneas de cebra

## Zebra Lines Sign

Juana María Ross<sup>1</sup> Emanuel Allegretti Pérez<sup>1</sup> Cintia Climente<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Servicio de Diagnóstico por imágenes, Imágenes MDQ, Mar del Plata, Argentina

Address for correspondence Juana María Ross, MD, Lavalle 2348 7°C, Mar del Plata, Argentina (e-mail: juanamross@gmail.com).

Rev Argent Radiol 2021;85:52–54.

El signo radiológico de las líneas de cebra, se refiere a la aparición de bandas lineales de alta densidad ubicadas en la zona metafisaria de los huesos, paralelas al cartílago de crecimiento, que pueden evidenciarse en el estudio radiológico de los miembros (► **Figura 1**). Corresponden al reflejo del efecto de los bifosfonatos en el esqueleto en crecimiento y fue descrito en 2007 por Al Muderis y col.<sup>1</sup>

El tratamiento con bisfosfonatos es utilizado en pediatría para el manejo de entidades patológicas con baja densidad mineral ósea y consecuente aumento de la fragilidad de los huesos. La terapia reduce la frecuencia de fracturas y la deformidad ósea posterior, disminuyendo el dolor y mejorando la movilidad de esos pacientes, en beneficio de su calidad de vida. Tal es el caso de pacientes con osteogénesis imperfecta, síndromes de malabsorción, asma dependiente de corticoides y trastornos neuromusculares.<sup>1,2</sup>

La acción de los bifosfonatos radica en inactivar e inducir la apoptosis de osteoclastos, disminuyendo asimismo su reclutamiento y diferenciación.<sup>1</sup> Cuando se administra el medicamento en el esqueleto inmaduro, se forma hueso denso en las metafisis, que posteriormente con el crecimiento del hueso, se desplazará a la zona diafisaria. El proceso se repite mientras continúen los ciclos de tratamiento, dejando ese aspecto radiológico característico en huesos largos y esqueleto axial.<sup>1,2</sup>

La interpretación radiológica es simple si el antecedente de administración de bifosfonatos está presente. Una entidad diferencial son las líneas de Park-Harris, llamadas líneas de detención del crecimiento. Se observan en estudios radiológicos como líneas radiodensas paralelas al cartílago de crecimiento en huesos inmaduros que luego migran hacia la diáfisis. Se relacionó su aparición con detenciones

temporales del crecimiento en contexto de enfermedad crónica, infección grave o alteración nutricional. A



**Fig. 1** Radiografía de muñeca de un paciente masculino de 14 años. Había recibido tratamiento con bifosfonatos por antecedente de osteogénesis imperfecta. Nótese las bandas radiodensas paralelas al cartílago de crecimiento desplazadas hacia la diáfisis, constituyendo el signo de las líneas de cebra.

received

June 8, 2020

accepted

September 11, 2020

published online

May 24, 2020

DOI <https://doi.org/10.1055/s-0040-1721342>.

ISSN 1852-9992.

© 2020. Asociación Civil Sociedad Argentina de Radiología y Federación Argentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante. All rights reserved.

This is an open access article published by Thieme under the terms of the Creative Commons Attribution-NonDerivative-NonCommercial-License, permitting copying and reproduction so long as the original work is given appropriate credit. Contents may not be used for commercial purposes, or adapted, remixed, transformed or built upon. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

Thieme Revinter Publicações Ltda., Rua do Matoso 170, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20270-135, Brazil

diferencia de las líneas cebra, pueden permanecer en la edad adulta con mayor frecuencia.<sup>2,3</sup>

En conclusión, el signo de las líneas de cebra, es un hallazgo radiológico llamativo que refiere a la aparición de bandas lineales densas ubicadas en la zona metafisaria de los huesos. Si bien carece de significación clínica, su presencia puede causar confusión, por lo que debe ser conocido por el médico radiólogo. Si, en un paciente con el esqueleto en crecimiento, conocemos el antecedente terapéutico con bifosfonatos cíclicos, el diagnóstico de estas líneas sería simple. De otra manera, diagnósticos diferenciales deberán ser tenidos en cuenta.

#### Responsabilidades éticas

**Protección de personas y animales.** Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

**Confidencialidad de los datos.** Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

#### Derecho a la privacidad y consentimiento informado.

Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

#### Conflictos de intereses

Los autores declaran no presentar ningún conflicto de intereses en relación con el manuscrito presentado. Los autores no recibieron financiación para la realización del presente artículo.

#### Bibliografía

- 1 Al Muderis M, Azzopardi T, Cundy P. Zebra lines of pamidronate therapy in children. *J Bone Joint Surg Am.* 2007;89(07):1511–1516
- 2 Etxebarria-Foronda I, Gorostiola-Vidaurrezaga L. Líneas cebra: Repercusión radiológica de la acción de los bifosfonatos en el esqueleto inmaduro. *Rev Osteoporos Metab Miner.* 2013;5(01):39–41
- 3 Vázquez I, Masquijo JJ. Líneas de Park-Harris. *Rev Argent Radiol.* 2014;78(02):120–121

