



SHILAP Revista de lepidopterología

ISSN: 0300-5267

ISSN: 2340-4078

avives@orange.es

Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología
España

Gómez-Fernández, J.

Primer registro de *Strebloste panda* Hübner, [1820] 1816
para Ceuta, España (Lepidoptera: Lasiocampidae)

SHILAP Revista de lepidopterología, vol. 50, núm. 197, 2022, Enero-Marzo, pp. 171-174
Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología
Madrid, España

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45570566026>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica Redalyc

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso
abierto

Primer registro de *Strebote panda* Hübner, [1820] 1816 para Ceuta, España (Lepidoptera: Lasiocampidae)

J. Gómez-Fernández

Resumen

Se presenta el primer registro conocido del Lasiocampidae *Strebote panda* Hübner, [1820] 1816 para Ceuta (España).

PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Lasiocampidae, *Strebote panda*, Ceuta, España.

**First record of *Strebote panda* Hübner, [1820] 1816 from Ceuta, Spain
(Lepidoptera: Lasiocampidae)**

Abstract

The first know record of the Lasiocampidae *Strebote panda* Hübner, [1820] 1816 from Ceuta (Spain) is presented.

KEY WORDS: Lepidoptera, Lasiocampidae, *Strebote panda*, Ceuta, Spain.

Introducción

Dentro de la familia Lasiocampidae Harris, 1841, el género *Strebote* Hübner, [1820] 1816 tiene una gran distribución Afrotropical con un grupo de especies que se encuentran en la región Paleártica e Indo-malaya (ZOLOTUHIN, 2015).

En la región Paleártica, *Strebote panda* Hübner, [1820] 1816 se distribuye por el sur de Europa (España, Italia, Portugal) y en el norte de África, donde está presente desde la franja litoral atlántica de Marruecos, continuando por todo el litoral mediterráneo hasta Libia (LERAUT, 2006; ZOLOTUHIN, 2015). Ya en Egipto la especie *Strebote aegyptiaca* (Bang-Haas, 1906) se considera como válida, antes se la consideraba una subespecie de *S. panda* (ZOLOTUHIN, 2015).

Desde el Algarve, en Portugal (MARABUTO & CARDOSO, 2009), ocupa una ancha franja costera atlántica, a lo largo del estrecho de Gibraltar, continuando ampliamente por todo el litoral mediterráneo, llegando hasta Tarragona (GÓMEZ-BUSTILLO & FERNÁNDEZ-RUBIO, 1978; REDONDO *et al.*, 2015), estando presente en España en las regiones de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña (REDONDO *et al.*, 2015).

Su hábitat es principalmente cercano a la costa, en ambientes halófilos y biotopos arenosos (DEFREINA & WITT, 1987; PÉREZ DE-GREGORIO *et al.*, 2001; REDONDO *et al.*, 2015).

Su biología está estudiada en numerosas publicaciones de forma monotemática con fines agrícolas de manejo y control de plagas (CALVO, 2004; CALVO & MOLINA, 2004, 2005a, 2005b, 2005c), ya que ocasionalmente puede serlo en los cultivos y frutales del sur de la Península Ibérica.

Esta especie presenta unas antenas fuertemente bipectinadas curvadas hacia atrás, desde la base hasta la mitad de su longitud, y en la mitad frontal los dientes del peine se acortan abruptamente, siendo la terminación corta y con forma de muñón. La cabeza y el tórax son de color gris rojizo, el abdomen gris amarillento y, en el extremo abdominal, presenta un mechón más oscuro (DE FREINA & WITT, 1987). Las alas anteriores son de un color marrón rojizo con una fina línea blanca que separa el borde exterior de la mediana, es más oscura desde esta línea hacia la basal, las posteriores son enteramente marrón rojizo (GÓMEZ DE AIZPÚRUA, 2002). Las tégulas de color marrón oscuro, bien marcadas y diferenciadas. *S. panda* tiene un gran dimorfismo sexual en el tamaño de los imágos, los machos poseen una envergadura alar de 30-40 mm, mientras que las hembras de 45-70 mm (DE FREINA & WITT, 1987), presentando además éstas una ornamentación alar menos destacada y con las antenas mucho más finamente pectinadas (PÉREZ DE-GREGORIO *et al.*, 2001).

Las larvas son invernantes, de tamaño grande, con un color gris ocráceo, con líneas blancas y pinaculum dorsales amarillos, con dos trazos negros sobre el tórax (GÓMEZ DE AIZPÚRUA, 2002), donde albergan sus pelos urticantes. Las plantas nutricias de sus larvas son Asteraceae, Cistaceae, Cupressaceae, Cupuliferaceae, Ericaceae, Fabaceae, Geraniaceae, Malvaceae, Myrtaceae, Rosaceae, Rutaceae, Salicaceae, Sapindaceae, Sapotaceae, Tamaricaceae, Terebinthaceae y Pinaceae (ZOLOTUHIN, 2015).

El capullo es fusiforme, de color marrón, apergaminado, abierto por ambos extremos y muy firmemente sujeto a una rama, de modo que es prácticamente imperceptible entre el ramaje (DÍAZ, 1998).

S. panda tiene de dos a cuatro generaciones anuales, en el periodo comprendido entre enero y noviembre (DE FREINA & WITT, 1987; LERAUT, 2006), aunque si el clima es más rudo puede invernarse como pupa (PÉREZ DE-GREGORIO *et al.*, 2001).

Material y métodos

Para la determinación y clasificación, se ha seguido en la nomenclatura a VIVES MORENO (2014).

Para su identificación nos hemos basado en el examen comparativo de los caracteres morfológicos externos, ya que además es una especie fácilmente reconocible por fotografía o de visu, no hay otra similar con la que se pueda confundir (PÉREZ DE-GREGORIO *et al.*, 2001).


Las fotografías fueron realizadas con una cámara Nikon D500 con objetivo Sigma 18-300 mm, tiempo de exposición 1/1600 s, velocidad ISO-3200 y con una resolución de 3088 X 2059 píxeles.

Resultados

El ejemplar, un imago en perfecto estado, fue observado y fotografiado en Ceuta, el 18 de abril de 2021, a las 18:26 h., posado sobre el pie vertical de una farola metálica en el aparcamiento al aire libre del Parque de Santa Catalina, lugar que se corresponde con el extremo nororiental de la Península Tingitana, en una zona cercana al borde del mar y despejada prácticamente de vegetación, registrándose los siguientes datos de observación: Coordenadas GPS 35°54'15.4"N, 5°17'21.0"W. 19 m. altitud. Sistema MGRS y Datum ETRS89 30STE9375 (correspondiente a esa cuadrícula de 1 X 1 km de lado).

El imago es un ejemplar macho de *S. panda* Hübner, [1820] 1816, siendo el único observado en la zona, no fue capturado. Probablemente, después de haber sido atraído lumínicamente (ambos sexos son atraídos por la luz artificial, pero especialmente los machos, como se indica en PÉREZ DE-GREGORIO *et al.*, 2001) y de haber tenido una noche de actividad intensa eligió ese lugar para posarse y descansar durante el día, esperando a que de nuevo llegase el anochecer para emprender vuelo reproductivo. Dado el carácter polífago de las larvas de esta especie, es posible que este ejemplar pertenezca a una población establecida en Ceuta. No hay que olvidar tampoco la abundancia

de *Cupressus sempervirens* L. plantados ornamentalmente en el cercano cementerio de Santa Catalina, así como otras plantas nutricias en el Monte Hacho, que pudieran favorecer la colonización de toda esa zona por esta especie.



Se ha demostrado que hay diferencias de hasta un COI 4,2 % en la línea de polimorfismo genético en las poblaciones de Marruecos de *S. panda* con respecto a poblaciones europeas y que, probablemente, estemos ante una especie diferenciada (ZOLOTUHIN, 2015). Tan sólo, hasta ahora, se han basado en los rasgos y caracteres externos de los ejemplares en todos los trabajos realizados, sería deseable poder analizar las diferentes poblaciones existentes para establecer sus diferencias y poder asignar a cada territorio monotípico correspondiente.

Streblote panda está ampliamente distribuida en Marruecos (RUNGS, 1981) llegando hasta el Sahara Occidental (RUNGS, 1992), donde cohabita con *Streblote acaciae* (Klug, 1829), pero no hay posibilidad de confusión entre ambas, siendo esta última de tonos blancos y grisáceos.

Agradecimiento

A María Isabel Mayorga Navarro y Andrés Martínez Montes, por su gran aportación de las fotos y toda la información detallada facilitada, sin su colaboración y ayuda no hubiera sido posible realizar este trabajo, al Dr. Antonio Vives por su ayuda y colaboración en las consultas realizadas, a María Gómez del Prado por su ayuda en la cartografía y por su apoyo y a María Antonia del Prado Gómez por todo su apoyo y ayuda.

BIBLIOGRAFÍA

- AURIVILLIUS, C., 1905.– Lieutenant A. Schultze's Sammlung von Lepidopteren aus West-Afrika.– *Arkiv för Zoologi*, **2**(12): 1-47, pls 1-5.
- CALVO, D., 2004.– *Streblote panda Hübner, [1820] (Lepidoptera, Lasiocampidae), incidencia sobre plantas ornamentales y frutales en Andalucía Occidental. Bases ecológicas y sugerencias para su control*: 123 pp. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla, Sevilla.
- CALVO, D. & MOLINA, J. M., 2004.– Fitness traits and larval survival of the lappet moth, *Streblote panda* (Hübner, 1820) (Lepidoptera: Lasiocampidae), reared on different host plants.– *African Entomology*, **12**(2): 278-282.
- CALVO, D. & MOLINA, J. M., 2005a.– Developmental rates of the Lappet Moth *Streblote panda* Hübner, [1820] (Lepidoptera: Lasiocampidae) at constant temperatures.– *Spanish Journal of Agricultural Research*, **3**(3): 319-325.
- CALVO, D. & MOLINA, J. M., 2005b.– Effects of Tangerine (*Citrus reticulata*) Foliage Age on *Streblote panda* Larval Development and Performance.– *Phytoparasitica*, **33**(5): 450-459.
- CALVO, D. & MOLINA, J. M., 2005c.– Fecundity-body size relationship and other reproductive aspects of *Streblote panda* (Lepidoptera: Lasiocampidae).– *Annals of the Entomological Society of America*, **98**(2): 191-196.
- DE FREINA, J. J. & WITT, T. J., 1987.– *Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis I. Nolidae, Arctiidae, Syntomidae, Dilobidae, Lymantriidae, Notodontidae, Thaumetopoeidae, Thyretidae, Axiidae, Drepanidae, Thyatiridae, Bombycidae, Brahmaeidae, Endromidae, Lasiocampidae, Lemoniidae, Saturniidae*: 708 pp. Forschung & Wissenschaft Verlag GmbH, München.
- DÍAZ, M., 1998.– *Mariposas diurnas y nocturnas de Andalucía. Guía de campo ilustrada con más de 520 especies de mariposas a tamaño natural y a todo color. Métodos de cría*: 348 pp. Centro Andaluz del Libro, S. A., Sevilla.
- GÓMEZ-BUSTILLO, M. R. & FERNÁNDEZ-RUBIO, F., 1978.– *Mariposas de la Península Ibérica. Heterocerous I*, **3**: 301 pp. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, MAPA, Madrid.
- GÓMEZ DE AIZPÚRUA, C., 2002.– *Orugas y mariposas de Europa*, **4**: 237 pp. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.
- LERAUT, P., 2006.– *Moths of Europe. Saturnids, Lasiocampids, Hawkmoths, Tiger Moths*, **1**: 396 pp. NAP Editions, Verrières le Buisson.
- MARABUTO, E. & CARDOSO, J. P., 2009.– Novos dados sobre *Streblote panda* Hübner, [1820] no Algarve e considerações sobre a espécie em Portugal (Lepidoptera: Lasiocampidae).– *SHILAP Revista de lepidopterología*, **37**(145): 167-177.
- PÉREZ DE-GREGORIO, J. J., MUÑOZ, J. & RONDÓS, M., 2001.– *Atlas fotográfico de los lepidópteros macroheteróceros ibero-baleares*, **2**. *Lasiocampoidea, Bombycoidea, Axioidae y Noctuoidea (1)*: 210 pp. Arganía edición. Barcelona.
- REDONDO, V., GASTÓN, J. & VICENTE, J. C., 2015.– *Las mariposas de España Peninsular. Manual ilustrado de las especies diurnas y nocturnas*: 463 pp. Editorial Prames, Zaragoza.
- RUNGS, CH. E. E., 1981.– Catalogue raisonné des Lépidoptères du Maroc. Inventaire Faunistique et observation écologiques, Tome II.– *Travaux de l'Institut Scientifique Série Zoologique*, **40**: 225-588.
- RUNGS, CH. E. E., 1982.– Premier aperçu sur la faune des Lépidoptères du Sahara occidental.– *Alexanor*, **17**(6): 355-383.
- VIVES MORENO, A., 2014.– *Catálogo sistemático y sinónímico de los Lepidoptera de la Península Ibérica, de Ceuta, de Melilla y de las islas Azores, Baleares, Canarias, Madeira y Salvajes (Insecta: Lepidoptera)*: 1184 pp. Suplemento de SHILAP Revista de lepidopterología, Impróitalia, Madrid.
- ZOLOTUHIN, V. V., 2015.– *Lappet moths (Lepidoptera: Lasiocampidae) of Russia and Adjacent Territories*: 384 pp. Korporaciya Technologiy Prodvizheniya, Ulyanovsk.

J. G. F.

Antonio Marichalar, 7

E-19280 Alovera (Guadalajara)

ESPAÑA / SPAIN

E-mail: jegofe@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2745-0269>

(Recibido para publicación / Received for publication 27-IV-2021)

(Revisado y aceptado / Revised and accepted 30-VI-2021)

(Publicado / Published 30-III-2022)