

Revista Información Científica

ISSN: 1028-9933

ric@guaso.gtm.sld.cu

Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo
Cuba

Rodríguez Rodríguez, Niurka; Cala Bayeux, Ángela; Nápoles Pérez, Jorge Luis; Milán Arenado, Yeiner; Aguilà Tito, Merkis
Factores de riesgo asociados al embarazo en adolescentes
Revista Información Científica, vol. 96, núm. 1, 2017, -Febrero, pp. 29-37
Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo
Cuba

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551764049004>

ARTÍCULO ORIGINAL

Factores de riesgo asociados al embarazo en adolescentes

Risk factors associated with pregnancy in adolescents

Niurka Rodríguez Rodríguez, Ángela Cala Bayeux, Jorge Luis Nápoles Pérez, Yeiner Milán Arenado, Merkis Aguilar Tito

Universidad de Ciencias Médicas. Guantánamo. Cuba

RESUMEN

Se realizó un estudio de casos y controles para identificar factores de riesgo, del embarazo en la adolescencia en la policlínica "Emilio Daudinot en el año 2013. El universo: las embarazadas adolescentes captadas durante ese año (42casos) y el doble de adolescentes que nunca estuvieron embarazadas, seleccionadas dos por cada caso (86 controles). Se analizaron variables de conocimientos. La información obtenida de una encuesta previamente validada. Los resultados son expresados en tablas de doble entrada. Se estimaron odds ratio e Intervalos de Confianza. Resultaron factores de riesgo para el embarazo en la adolescencia el tener sus primeras relaciones sexuales entre 15 y 19 años y no poseer conocimiento sobre complicaciones del embarazo en la adolescencia. En su gran mayoría las adolescentes conocían la edad óptima para embarazarse y no consideran el aborto como método anticonceptivo. Se recomienda diseñar programa de intervención educativa para modificar el conocimiento de las adolescentes.

Palabras clave: factores de riesgo; embarazo en adolescencia; conocimientos

ABSTRACT

A case-control study was carried out to identify risk factors for pregnancy in adolescence in the polyclinic "Emilio Daudinot in 2013. The universe: pregnant teenagers captured during that year (42 cases) and the double of adolescents who never were pregnant, selected for each case (86 controls). Variables were analyzed. The information obtained from a previously validated survey. The results are expressed in double-entry tables. Odds ratios and Confidence Intervals were estimated. Risk factors for pregnancy in adolescence were having their first sexual intercourse between the ages of 15 and 19 not having knowledge about complications of pregnancy in adolescence. Most adolescents knew the optimal age to get pregnant and did not consider abortion as a contraceptive method. It is recommended to design an educational intervention program to modify the knowledge of adolescents.

Keywords: risk factors; pregnancy in adolescence; knowledge

INTRODUCCIÓN

Cada año nacen 14 millones de niños de madres adolescentes, indicó el instituto de investigación sobre los políticos de salud pública en materia de reproducción.¹ Los adolescentes están biológicamente preparados y culturalmente motivados para iniciar una vida sexual activa, pero son incapaces de analizar las consecuencias de su conducta sexual y tomar decisiones de forma responsable.^{2,3}

Las cifras promedio indican que en Cuba⁴, de cada 100 mujeres embarazadas, alrededor de 22 tiene menos de 20 años. En la medida que Cuba se fue registrando en un proceso de crecimiento de la fecundidad, aumentaron las proporciones y tasas de embarazos en la adolescencia.

El embarazo en la adolescencia constituye un resultado no esperado en el proceso de reproducción cuyas causas hay que encontrarlas en factores sociológicos, psicológicos, culturales y otros factores que son analizados en su evolución secular.^{5,6}

En el Municipio Guantánamo ha existido un incremento del embarazo en la adolescencia. El 23 % de partos del 2012 fue por adolescentes, incidiendo el área de salud del policlínico Norte con un total de 48 partos de los 147 del año. Importante es también señalar que de las 343 regulaciones realizadas en el municipio, 128 (37 %) fueron menores de

20 años,⁷ por lo que nos sentimos motivados a llevar a cabo la presente investigación, con el objetivo de identificar factores de riesgos asociados al embarazo en la adolescencia y si podremos distinguir diferencias de conocimiento y conducta sexual entre adolescentes con historia de embarazo y sin historia del mismo, que nos facilite elaborar un programa educativo en aras de modificar este indicador de salud.

MÉTODO

Se realizó un estudio analítico de casos y controles con el propósito de identificar factores de riesgo, que pudieran influir en el embarazo de la adolescencia de la policlínica "Emilio Daudinót Bueno durante el año 2013.

El universo: las embarazadas adolescentes captadas durante ese año (42 casos) y el doble de adolescentes que nunca estuvieron embarazadas, seleccionadas dos por cada caso (86 controles). Con el criterio de estar dispensarizada en consultorios del área de salud. Se les pidió a los padres su consentimiento informado.

Fueron analizadas variables sobre conocimientos: edad óptima del embarazo, aborto como método anticonceptivo, Complicaciones del embarazo, edad de la primera relación sexual.

Para la obtención de la información se realizó una encuesta piloto con el objetivo de validar el cuestionario el cual fue aplicado a las adolescentes. Los datos fueron almacenados en una base de datos confeccionada en Microsoft Excel 2003. Para la presentación del informe final se utilizó el editor de texto Microsoft Word 2003. Los datos se presentaron en tablas de asociación. Se obtuvo la significación de la asociación mediante la prueba X^2 de Mantell – Haenszel, prefijándose un 95% para el Intervalo de Confianza. Para las variables que resultaron significativas se determinó el grado de asociación a través de la razón de disparidad u odds ratio.

DISCUSIÓN

La Tabla 1 refleja que la mayoría de las adolescentes sí tenían un correcto conocimiento acerca de la edad óptima para salir embarazada, 71,4% de los casos y un 70,9% de los controles.

Tabla 1. Distribución de casos y controles de acuerdo al conocimiento de la edad óptima para el embarazo

Conocimiento	Casos		Controles	
	No.	%	No.	%
Incorrecto	12	28.6	21	24.4
Correcto	30	71.4	65	70.9
Total	42	100.0	86	100.0

$\chi^2=0.15$ $P\leq 0.05$ No significativa

Fuente: Entrevista individual.

La Tabla 2 nos muestra que en ambos grupos predominó el no ser el aborto un método anticonceptivo para un 76,2% los casos y 73,2% los controles.

Tabla 2. Distribución de casos y controles de acuerdo al conocimiento del aborto como método anticonceptivo

Aborto ¿Es un método anticonceptivo?	Casos		Controles	
	No.	%	No.	%
Sí	10	23.8	23	26.7
No	32	76.2	63	73.2
Total	42	100.0	86	100.0

$\chi^2=0.62$ $P\leq 0.05$ No significativa

Fuente: Entrevista individual

En la Tabla 3, en cuanto al conocimiento de las complicaciones del embarazo en las adolescentes, el grupo de casos que el 71.4 % respondió si conocerlas. En el grupo control por el contrario predominó el no conocimiento (72.1%).

Tabla 3. Distribución de casos y controles de acuerdo al conocimiento de las complicaciones del embarazo en las adolescentes

Conocimiento de complicaciones	Casos		Controles	
	No.	%	No.	%
No	12	28.6	62	72.1
Sí	30	71.4	24	27.9
Total	42	100.0	86	100.0

$\chi^2=9.91$ $P\leq 0.05$ Significativa OR:3.3 IC:0.14;0.64

Fuente: Entrevista individual.

Se observaron diferencias significativas entre los casos y los controles. Por lo que es 3.3 veces más probable que ocurra un embarazo en una adolescente que no tenga el conocimiento.

En cuanto a la edad de la primera relación sexual (Tabla 4) se observaron diferencias significativas entre grupo de casos (76.2 %) y controles (58.1 %), por lo que es 2.3 veces más probable que ocurra un embarazo en las edades entre 15 a 19 años donde las adolescentes tienen su primera relación sexual.

Tabla 4. Distribución de casos y controles de acuerdo a la edad de la primera relación sexual

Edad	Casos		Controles	
	No.	%	No.	%
Ninguna relación sexual	-	-	10	10.0
10 - 14	10	23.8	36	41.8
15 -19	32	76.2	50	58.1
Total	42	100.0	86	100.0

$\chi^2=7.06$ $P\leq 0.05$ Significativa OR:2.3 IC:0.00;0.6

Fuente: Entrevista individual.

DISCUSIÓN

Consideramos que la variable conocimiento de la edad óptima para el embarazo no representó un factor de riesgo para el embarazo en la adolescencia en el estudio. Esto nos hace reflexionar que a pesar del conocimiento que tienen las adolescentes, siguen incurriendo en embarazos no deseados. El resultado de esta investigación coincide con otros autores.^{8,9,10}

Un estudio sobre impacto del embarazo en adolescentes menores de 19 años, de los autores Auchtler, Balbuena y Galiano¹¹ reportan resultados diferentes al nuestro. Así mismo lo reportan Mariño¹², Gil, Rodríguez y Rivero¹³ en su estudio.

En relación con al conocimiento del aborto como método anticonceptivo, al igual que este estudio lo reportan otros autores^{14,15}, lo que no se corresponde con otros realizados en América Latina donde las muertes a raíz del aborto inducido en las adolescentes entre 15 y 19 años es una de las principales causas de defunción.^{16,17}

En cuanto al conocimiento de las complicaciones del embarazo en las adolescentes no se encontraron autores que abordaran esta variable.

Los resultados en cuanto a la edad de la primera relación sexual coinciden con la de autores como Ravelo¹⁸, no coincide con Barbón POG.¹⁹ En Cuba, los autores Torriente BN, Diago CD, Rizo VAC, Menéndez LLR²⁰, registran que la mayoría de los muchachos manifiestan tener relaciones sexuales, entre los 13 y 14 años.

CONCLUSIONES

Resultaron factores de riesgo para el embarazo en la adolescencia el tener sus primeras relaciones sexuales entre 15 y 19 años y no poseer conocimiento sobre complicaciones del embarazo en la adolescencia. En su gran mayoría las adolescentes conocían la edad óptima para embarazarse y no consideran el aborto como método anticonceptivo. Se recomienda diseñar programa de intervención educativa para modificar el conocimiento de las adolescentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. World Health Organization (WHO). Broadening the horizon: Balancing Protection and risk for adolescents [Internet]. Genova: Departament

- of chil and adolescent health and development family and community Health; 2011 [Internet]. [Citado 16 Jul 2016]. Disponible en: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/fch_cah_01_20/en/index.html
2. Dirección Nacional de Atención Materno Infantil y Planificación Familiar. Programa Nacional de Atención Integral a la Salud de los Adolescentes [Internet]. La Habana: MINSAP; 2013 [citado 16 Jul 2016]. Disponible en: http://www.sld.cu/files.sld.cu/sida/files/2012/01/programa_adolescentes.pdf
 3. Embarazo en la adolescencia. Prog Obs Ginecol [Internet]. 2014 [citado 16 Jul 2016]; 57(8): [Aprox. 12 p]. Disponible en: <http://www.elsevier.es/es-revista-progresos-obstetricia-ginecologia-151>
 4. MINSAP. Anuario Estadístico. Ciudad de La Habana: Dirección Nacional de Estadística [Internet]. 2016. [citado 16 Jul 2016]. Disponible en: <http://www.sld.cu/sitios/dne/>
 5. Gómez PI, Molina R, Zamberlin N. Factores relacionados con el embarazo y la maternidad en menores de 15 años en América Latina y Caribe. Lima, Perú, DE SOCIEDADES DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA (FLASOG) [Internet]. 2011 Ene. [Citado 16 Jul 2016]. Disponible en: http://departamentoeducacion.fecolsoq.org/images/libros/Factores_relacionados_con_el_embarazo_y_la_maternidad.pdf
 6. Simón YT, Aznar TC. Condicionantes de género y embarazo no planificado, en adolescentes y mujeres jóvenes. Anal Psicol [Internet]. 2015 Oct [citado 16 Jul 2016] ;31(3): 972-978. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S021297282015000300023&lng=pt.
 7. Departamento Estadística. Sectorial Provincial de salud. Ciudad de Guantánamo: MINSAP; 2013.
 8. Corona J, Ortega J. Comportamiento sexual y conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual en estudiantes venezolanos de un liceo del municipio de Miranda. MEDISAN [Internet]. 2013 [citado 16 Jul 2016]; 17(1): [Aprox.7p]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102930192013000100011&lng=es
 9. Paredes PP, Castillo RN, Roba LBdelC, Padrón GO, HernandezHMaE. Estrategia de intervención educativa para prevenir el embarazo en la adolescencia. Rev Ciencias Méd [Internet]. 2012 Ene [Citado 16 Jul 2016];16(1):[aprox. 13p]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102930192013000100011&lng=es
 10. Panduro BJJ, Jiménez CPM, Pérez MJJ, Panduro MEG, Peraza MD,

- Quezada FNA. Embarazo en adolescentes y sus repercusiones maternas perinatales. *Ginecol Obstet Mex* [Internet]. 2012 [Citado 16 Jul 2016]; 80(11):[aprox.10p]. Disponible en: <http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=55b83984-1662-4d2f-8f20-300aa6b6f0c2%40sessionmgr4005&vid=0&hid=420>
11. Auchter MC, Balbuena MO, Galeano H. El impacto del embarazo en adolescentes menores de 19 años. Experiencia en la ciudad de Corrientes. *Rev Enferm Hosp* [Internet]. 2002 Ago. [Citado 16 Jul 2016];6(16):[aprox. 4 p.]. Disponible en: <http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/!online/>
12. Mariño Membries ER, Ávalos González MM, Baró Jiménez VG. Comportamiento del embarazo en la adolescencia en el policlínico "Aleida Fernández Chardiet". *Rev Cubana Med Gen Int* [Internet]. 2011 Dic [citado 16 Jul 2016]; 27(4): [aprox. 8 p]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252011000400003&lng=es.
13. Gil HA, Rodríguez GY, Rivero SM. Intervención educativa sobre anticoncepción y adolescencia. *AMC* [Internet]. 2012 Feb. [Citado 16 Jul 2016]; 16(1): [aprox. 7 p]. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=211121511006>
14. U.S. Teenage Pregnancy Statistics: Overall Trends, Trends by Race and Ethnicity and State-by-State Information [Internet]. New York, NY: The Alan Guttmacher Institute; 2005. [Citado 16 Jul 2016]. Disponible en: http://scholar.google.com.cu/scholar?q=14%09U.S.+Teenage+Pregnancy+Statistics%3A+Overall+Trends%2C+Trends+by+Race+and+Ethnicity+and+State-by-State+Information&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5
15. Gómez SRT, Díaz ÁM, Sainz RER, Gómez IK, Machado RR. Acciones educativas sobre aspectos de la sexualidad dirigidas a adolescentes. *Rev Cubana Salud Pública* [Internet]. 2015 Mar [citado 16 Jul 2016]; 41(1): Disponible en: <http://new.medicgraphic.com/cgi-bin/resumen.cgi?IDARTICULO=55512>
16. World Health Organization. Preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents in developing countries. Geneve, Switzerland [Internet]. 2012 [Citado 16 Jul 2016]. Disponible en: <http://www.who.int/>
17. Villalobos H A, Campero L, Suárez L L, Atienzo E E, Estrada F, De la Vara S E. Teen pregnancy and educational gaps: Analysis of a national survey in Mexico. *Salud Pública México* [Internet]. 2015 Abr [citado 16 Jul 2016]; 57(2): [aprox. 9 p]. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342015000200008&lng=es.
18. Ravelo A, González HA. Adolescencia ¿Etapa crítica? [Internet]. 2008

- [Citado 16 Jul 2016]. Disponible en: <<http://www.saludparalavida.sld.cu/>
19. Barbón POG. Algunas consideraciones sobre comunicación, género y prevención del embarazo adolescente Rev Cubana Hig Epidemiol [Internet]. 2011 [Citado 16 Jul 2016]; 50(2): [aprox. 4 p]. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/hie/v50n2/hie13212.pdf>
20. Torriente BN, Caballero DD, Rizo VCA, Menéndez L L R. Conocimientos elementales sobre educación sexual en alumnos de una escuela secundaria básica urbana. Rev Haban Cienc Méd [Internet]. 2010 Nov [citado 16 Jul 2016]; 9(4): [aprox. 11 p]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2010000400018&lng=es

Recibido: 27 de abril de 2106

Aprobado: 15 de septiembre de 2016

Dra. Niurka Rodríguez Rodríguez. Policlínico Universitario "Emilio Daudinot Bueno. Guantánamo. **Email:** daliceli@infosol.gtm.sld.cu