



Archivos Venezolanos de Farmacología y
Terapéutica
ISSN: 0798-0264
revista.avft@gmail.com
Sociedad Venezolana de Farmacología Clínica y
Terapéutica
Venezuela

Relaciones de familia en pacientes con esquizofrenia

Martínez-Cardona, María del Carmen; Estrada González, Catalina; Vélez-Velásquez, Alba Lucía; Muñoz-Avendaño, Nathaly; López Peláez, Jéssica; Bermeo De Rubio, Myriam; Toconas-Morea, Verónica Rocío

Relaciones de familia en pacientes con esquizofrenia

Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, vol. 39, núm. 5, 2020

Sociedad Venezolana de Farmacología Clínica y Terapéutica, Venezuela

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55965386020>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4262890>

Derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de todo el material contenido en la revista sin el consentimiento por escrito del editor en jefe



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-SinDerivar 4.0 Internacional.

Relaciones de familia en pacientes con esquizofrenia

Family relationships in patients with schizophrenia

María del Carmen Martínez-Cardona
Universidad Santiago de Cali. Cali, Colombia., Colombia
maria.martinez11@usc.edu.co

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4262890>

Redalyc: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55965386020>

 <https://orcid.org/0000-0001-9108-4702>

Catalina Estrada González
Universidad Santiago de Cali. Cali, Colombia., Colombia
catalina.estrada00@usc.edu.co

 <https://orcid.org/0000-0002-8323-0973>

Alba Lucía Vélez-Velásquez
Universidad Santiago de Cali. Cali, Colombia., Colombia
alba.velez00@usc.edu.co

 <https://orcid.org/0000-0002-1078-385X>

Nathaly Muñoz-Avedaño
Universidad Santiago de Cali. Cali, Colombia., Colombia
nathaly.munoz00@usc.edu.co

 <https://orcid.org/0000-0001-6439-4203>

Jéssica López Peláez
Universidad Santiago de Cali. Cali, Colombia., Colombia
jessica.lopez02@usc.edu.co

 <https://orcid.org/0000-0002-8323-0973>

Myriam Bermeo De Rubio
Universidad Santiago de Cali. Cali, Colombia., Colombia
bermeo76@usc.edu.co

Verónica Rocío Toconas-Morea
Universidad Santiago de Cali. Cali, Colombia., Colombia
veronica.toconas00@usc.edu.co

Recepción: Junio , 28, 2020

Aprobación: Julio , 15, 2020

Publicación: Septiembre , 07, 2020

RESUMEN:

Se realizó revisión de literatura de manera sistemática y ordenada, teniendo como objetivo exponer las relaciones familiares de pacientes con esquizofrenia, para esto se ejecutó una búsqueda y revisión de artículos de producción científica en español, inglés y portugués, la cual se limitó a bases de datos. Los resultados indican que, al surgir este trastorno, el grupo familiar experimenta cambios que generan conflictos en la dinámica familiar, afectando las relaciones entre sus miembros. Un miembro de la familia principalmente se responsabiliza y asume el cuidado total del paciente, trayendo consecuencias a nivel físico, emocional, psicológico y social, lo cual repercute directamente en la calidad de vida tanto del paciente como de la familia. Se concluye que, ante estos cambios, la familia realiza un proceso de desajuste que, en muchas de ellas, moviliza a reestructurar su funcionalidad intentando establecer bienestar en todo el sistema familiar.

PALABRAS CLAVE: Relaciones familiares, Esquizofrenia, Cuidadores.

ABSTRACT:

The literature was reviewed in a systematic and orderly manner, with the objective of exposing family relationships of patients with schizophrenia. To do this, a search and review of articles of scientific production in Spanish, English and Portuguese was implemented, which was limited to database. The results obtained showed that when the disorder arises, the family group experiences significant changes that generate conflicts in family dynamics, which affects the relationships between its members. A family member takes responsibility and assumes the complete care of the patient. This brings consequences on the physical, emotional, psychological and social level which has an effect directly on the quality of life of both the patient and the family. It is concluded that because of those changes, the family makes a malfunction process, which in many cases it entails to restructure its functionality trying to establish well-being in the whole family system.

KEYWORDS: Family Relations, Schizophrenia, caregivers.

INTRODUCCIÓN

La esquizofrenia como trastorno mental, se puede desarrollar de manera temprana en la adolescencia. A pesar de múltiples investigaciones no se ha podido establecer una etiología clara, sin embargo, se evidencia una relación estrecha en factores genéticos, bioquímicos, psicofisiológicos y psicosociales.

Este trastorno se caracteriza por alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales, con una desorganización severa del funcionamiento social. Se asocia con afecto inapropiado, estado de ánimo disfórico, patrón de sueño alterado, ansiedad, fobias, despersonalización, preocupaciones somáticas, déficit de la cognición social y falta de consciencia de su trastorno (anosognosia), entre otros¹⁻⁴.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)¹, menciona que más de 21 millones de personas en el planeta sufren de esquizofrenia, enfermedad que perturba la mente del individuo.

En Colombia el Ministerio de Salud y Protección Social, expone que la prevalencia del trastorno es del 1% en el país, lo que se considera una población de 471.052 personas con este trastorno⁵. En la ciudad de Cali, la prevalencia del trastorno de esquizofrenia es de 1,5%, por encima del promedio mundial; en el primer trimestre del 2012 existió una demanda más alta de atención en el servicio de psicología del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle⁶.

La familia como colectividad social, constituye el principal grupo de apoyo para el individuo, por lo que pueda convertirse en un factor protector en el afrontamiento del padecimiento de esquizofrenia. Hoy en día existen varios tratamientos para la esquizofrenia, por un lado, los fármacos inhiben los síntomas de la psicosis⁷, los tratamientos psicosociales y la terapia familiar que generan equilibrio al paciente con esquizofrenia y su familia; pues las funcionalidades de este y el soporte social son primordiales en el transcurso de la esquizofrenia⁸⁻¹⁰. Tanto la persona diagnosticada como la familia requieren este apoyo para enfrentar los problemas originados por la enfermedad y subsanar el bienestar del enfermo¹⁰; así la familia podrá ajustarse y adaptarse a la esquizofrenia, puesto que todo el sistema vivencia la enfermedad¹¹.

Según estudios de Murray Bowen, la familia genera bienestar y estabilidad, promoviendo disminución de los síntomas y ayudando a prevenir las crisis psicóticas¹²; creando un ambiente de bienestar y mayor funcionalidad familiar¹³, esta juega un papel constructivo en la cura y recuperación de los pacientes^{14,15}. Minuchin¹⁶, hace referencia a la familia como un conjunto ordenado e interdependiente de individuos en interacción persistente, que se rige por reglas y funciones dinámicas a nivel interno como externo.

En el surgimiento del diagnóstico de trastorno de esquizofrenia, la familia es en primera instancia el cuidador principal, sin embargo, no siempre este grupo es quien asume el cuidado del paciente, lo que conlleva a que otras personas o instituciones fuera del círculo familiar asuman la responsabilidad. Minuchin¹⁶ menciona que la familia debe contestar a variaciones intrínsecas o extrínsecas, teniendo la destreza para

modificarse y enfrentar circunstancias sin afectarse ni perder su constancia; estos cambios alteran todo el sistema familiar, perturbándolo y desencadenando crisis, hasta llegar a la desintegración familiar, ya que afecta los roles, funcionalidad en el hogar, ingresos económicos y el bienestar psicológico de sus miembros. Las rígidas demandas del cuidado permanente del paciente plantean importantes retos en el cuidador principal, quien asume la responsabilidad total del paciente y como perteneciente al grupo familiar intenta o sigue contribuyendo al entorno y exigencias familiares, es decir que el cuidador cubrirá demandas del enfermo, la sociedad y de su grupo familiar.

Las rígidas demandas relacionadas con el cuidado del paciente esquizofrénico y los cambios que origina el diagnóstico dentro de la dinámica familiar, ya sea a nivel individual y social, pueden desencadenar elevados niveles de carga en el cuidador principal del paciente^{17,18}, caracterizado por un estado psíquico alterado consecuente a la aglomeración de trabajo físico, demandas sociales, emocionales y limitaciones económicas, originado del cuidado de los enfermos¹⁹, estos factores tienen un alto poder predictivo en el bienestar personal, destacando especialmente la carga del cuidador, con un alto puntaje e indicador de baja calidad de vida y esta a su vez en el funcionamiento familiar²⁰⁻²².

Las personas cuidadoras del familiar diagnosticado con esquizofrenia muestran malestar psicológico²³, evidencian enfermedades físicas (48%) y trastornos emocionales (74%) por la llegada del trastorno a un miembro de la familia; incluyendo trastornos psiquiátricos (58%) en los cuidadores tales como: trastornos disociativos (7,6%), depresivos (20,6%) y con etanol: abuso y dependencia (9,9%)²⁴, todo esto debido al estrés y sobrecarga que experimenta la familia por el diagnóstico de esquizofrenia.

El cuidador puede mostrar y percibir cambios en su vida social e individual, además de deterioro gradual a nivel personal, tanto físico como mental. De allí que sea necesario contemplar dentro del tratamiento de personas con diagnóstico de esquizofrenia a la familia; pues éstos cumplen la función de cuidadores, siendo necesario la incorporación de atención en salud mental a nivel individual y grupal²³, añadiéndole la efectividad que podría tener la implementación de espacios de educación acerca del trastorno a los cuidadores, reduciría la carga y mejoraría al estado de la salud mental a nivel familiar²⁵⁻²⁷.

Lo anterior evidencia que el trastorno de esquizofrenia modifica la dinámica familiar, en la que la familia se puede convertir tanto en un factor protector como de riesgo para el paciente; por lo anterior se realizó una revisión sistemática con el objetivo de describir las relaciones familiares de personas con esquizofrenia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se llevó a cabo búsqueda y revisión de artículos de investigación, la cual se limitó a bases de datos como: PubMed, Oxford University Press, Taylor & Francis Group, Springer, Nature International Journal of Science, Science Direct, Scopus, Sage, Ebsco Host, Dialnet, Redalyc, Google Scholar, ProQuest, fuentes que recogen un alto porcentaje de la producción científica en el contexto de la salud en español, inglés y portugués. Se utilizaron como palabras claves, teniendo presente los descriptores en la Ciencia de la Salud (DeCS), Relaciones Familiares, esquizofrenia y cuidadores.

Los criterios de inclusión fueron artículos de revistas indexadas publicados entre 2008 hasta 2019, pertenecientes al método cualitativo y cuantitativo, donde se definen y contienen términos relacionados con las palabras clave del estudio.

En esta revisión se tuvieron en cuenta las siguientes unidades de análisis: relaciones familiares, esquizofrenia y cuidadores de pacientes con esquizofrenia. Como técnica de organización de la información se elaboró una matriz donde se registraron los datos del artículo entre ellos nombre de la revista, título, palabras clave, autores, año, objetivo, metodología, resultados y conclusiones.

RESULTADOS

En la búsqueda inicial se seleccionaron 164 artículos en bases de datos, donde 22 fueron hallados en Scielo, 11 en Redalyc, 3 en Pub Med, 15 en Google Scholar, 15 en Taylor & Francis Group, 20 en Science Direct, 2 en Scopus, 5 Oxford University Press, 19 en Ebsco Host, 12 en Dialnet, 21 en Proquest, 8 en Nature International Journal of Science, 2 en Sage Journals y 9 en Springer. Luego de revisar títulos y resúmenes de cada artículo, se eligieron, 78, los cuales se realizó una lectura completa y una vez revisados, cumplieron con los criterios de inclusión 33 artículos. Los hallazgos encontrados se muestran en la siguiente tabla (Tabla 1).

TABLA 1

Estudios analizados en relaciones de familia en pacientes con trastorno de esquizofrenia

[illegible]

La presente revisión permitió evidenciar que las relaciones de la familia de pacientes con esquizofrenia tienden a sufrir desajustes y crisis al enterarse del diagnóstico, y ante la noticia se produce inestabilidad familiar como sistema, generando en los miembros sentimientos y emociones cargados de angustia, miedo, culpa y preocupación puesto que no saben cómo afrontar de manera apropiada la enfermedad. En este proceso de adaptación y ajuste, la familia suele percibir rechazo y discriminación por parte del entorno social, esto ocasiona en ellos aislamiento de sus relaciones sociales y tensión en la dinámica familiar³⁹; sin embargo,

no en todas las familias se presenta desajustes en su dinámica, debido a que cuentan con habilidades para el afrontamiento efectivo del trastorno^{32,35,47}.

Siendo la familia en su mayoría el cuidador principal, estas describen la esquizofrenia como una fuente de perturbación en la dinámica familiar, debido a la búsqueda de bienestar del miembro enfermo, pero no siempre logrando satisfactoriamente encontrar un equilibrio, debido a los comportamientos agresivos del paciente, desconocimiento de la enfermedad, sobrecarga y estrés, todo lo cual genera relaciones conflictivas entre ellos; presentando a su vez incertidumbre por no contar con información frente al proceso de enfermedad lo que causa sentimientos de tristeza, enojo, estrés, culpa y cambios en la rutina⁴⁹.

Algunos estudios recalcan la importancia del ajuste, adaptación y apoyo familiar ante la enfermedad, para lograr en los pacientes adherencia al tratamiento y prevención de agravamiento, ya que si se genera aislamiento familiar o rechazo hacia el paciente, se puede contribuir de manera negativa a la enfermedad; por el contrario, si la familia cuenta con herramientas para sobrellevar esta situación y reajustar adecuadamente la dinámica familiar, podrá brindarle a la persona diagnosticada con esquizofrenia acompañamiento, apoyo y soporte emocional durante el proceso de la enfermedad, lo cual previene recaídas⁴⁸⁻⁵⁰.

Al atravesar por cambios en las diferentes áreas de desarrollo, los pacientes con trastorno de esquizofrenia continuamente se sienten aislados de su entorno social y familiar, en muchas ocasiones inferen que no pueden asumir responsabilidades y no pueden tener autonomía sobre la realización de actividades de su diario vivir.

Es relevante que la persona diagnosticada con esquizofrenia cuente con un cuidador primario, esta persona puede brindar herramientas para que el paciente logre incrementar su bienestar emocional, percibir su entorno de manera positiva, contrarrestar las consecuencias negativas de la enfermedad y mejorar su calidad de vida, convirtiéndose éste en su vínculo principal.

Por otra parte, las investigaciones confirman que la relación establecida entre paciente-cuidador es de interdependencia, el familiar suele dedicarse a tiempo completo a la persona diagnosticada con esquizofrenia, renunciando a su rutina diaria lo que consecuentemente conlleva problemas emocionales, separación de vínculos sociales, deterioro físico, desintegración familiar y profesional⁴¹.

En este sentido, los resultados señalan que el 62,3% de los cuidadores viven con el familiar diagnosticado con esquizofrenia; un alto porcentaje de estos corresponde al género femenino, siendo en su mayoría las madres de los pacientes quienes ejercen la labor de cuidadoras principales^{29,41,45,51,52,59}. Estas se encuentran en edades entre los 40 a los 70 años^{29,41,52}, algunas de ellas se dedican a labores del hogar²⁹. Los estudios destacan que la familia es el primer grupo de apoyo y quien brinda soporte al paciente; al no contar con información y la incomprensión que suele envolver este diagnóstico, algunas familias se desintegran, debido a la falta de tiempo para el autocuidado y la sobrecarga por todo lo pertinente al tratamiento generando una afectación en la calidad de vida del cuidador principal y todo el sistema familiar⁴¹.

Diversos autores coinciden en la importancia de realizar intervención psicosocial en familias de pacientes con esquizofrenia⁵⁷, para reducir sentimientos de culpa y generar mayor adaptabilidad a los cambios que se vivencian en el transcurso de la enfermedad, impactando positivamente el bienestar de la familia y el paciente.

DISCUSIÓN

Los pacientes con esquizofrenia en su mayoría conviven con familiares³²; en general su familia nuclear, conformadas por tres a cuatro integrantes^{61,62}, pero comúnmente el cuidado del paciente esquizofrénico recae en uno de los miembros de este tipo de familias^{29,41,45,51,52,59,60}, siendo principalmente las madres o mujeres del grupo familiar quienes a lo largo del tiempo asumen la responsabilidad del cuidado de las personas con esquizofrenia; estas cuidadoras se encuentran en edades tempranas a la vejez. La dinámica de estas familias tienden a presentar desajustes, debido al diagnóstico; por lo cual, en busca de bienestar para

el paciente y sus miembros, pone en marcha estrategias para el afrontamiento y adaptación a la enfermedad⁶⁶, las cuales pueden afectar positiva o negativamente el bienestar del cuidador y su grupo familiar, todo dependerá del apoyo interno y externo en la familia, además de recursos individuales de quienes la conforman^{28-31,33,36,38-42,44-46,48-60}, esto en concordancia con lo descrito por Biagini y col.⁶⁷; existiendo una fuerte relación entre el desajuste en la dinámica y el diagnóstico de esquizofrenia, sobre la calidad de vida de los cuidadores y relación familiar^{61,68,69}.

Ante el diagnóstico de esquizofrenia, la familia gira en torno al enfermo, cambiando su rutina cotidiana, generando que se minimicen o se pierdan los espacios de interacción, lo cual deteriora la comunicación y vínculos; en muchas ocasiones los demás miembros de la familia no se involucran en el tratamiento del trastorno, lo cual contribuye al mantenimiento o aparición de los síntomas negativos, generándose un entorno disfuncional en la dinámica. Los profesionales implicados en el tratamiento de la esquizofrenia resaltan la importancia incluir a la familia en el proceso de recuperación y brindarle a esta un servicio de atención primaria⁴⁸, y destacando la necesidad de que la familia adquiera herramientas para el afrontamiento efectivo ante la enfermedad^{68,70}.

La familia como grupo primordial en el transcurso de la vida, constituye apoyo y bienestar para sus miembros, mientras que el que asume el papel de cuidador principal dentro de este sistema, además de cubrir con las demandas del cuidado del paciente, debe seguir desempeñando su papel dentro del grupo familiar⁴⁰; lo cual lo lleva a experimentar sobrecarga, estrés, deterioro físico, emocional, social, familiar y psicológico^{28-31,39-42,48-51,56-58,60}, y a sufrir pérdida de oportunidades sociales y laborales^{71,72}. Caqueo y col.⁶⁹, indica que el cuidador puede presentar trastornos depresivos, ansiosos y pérdida de vitalidad. Por otra parte, se atribuye la falta de apoyo y acompañamiento del grupo familiar en el transcurso del trastorno de esquizofrenia, como otro hecho que deteriora el bienestar del cuidador y causante de conflictos que pueden conllevar a la desintegración familiar²⁸⁻⁶⁰. Esta disfunción familiar desde la cohesión y la adaptabilidad puede verse afectada cuando existe miembros de la familia que sufren de una patología o trastorno y se convierten en factor de riesgo para la misma⁷³.

CONCLUSIÓN

La revisión bibliográfica sistemática permite concluir que al surgir el diagnóstico de trastorno de esquizofrenia la dinámica familiar se afecta, a su vez las relaciones familiares, llevando a sus miembros a reestructurar su funcionalidad a nivel individual, social y familiar; acarreando sentimientos negativos. El familiar que asume el papel de cuidador, experimenta sobrecarga, agotamiento físico y psicológico, debido a las demandas del paciente y familiares, lo cual en muchas ocasiones moviliza a la familia en busca de adaptación y aceptación; sin embargo, esto no se logra satisfactoriamente en todas las ocasiones ya que algunas no cuentan con herramientas, estrategias y apoyo (médico y social), para hacerle frente al diagnóstico eficazmente. Es por ello que algunas familias presentan conflictos que pueden deteriorar la calidad de vida y relación de sus integrantes o desintegrarla.

La familia como sistema, se encuentra en un proceso de interacción continua, estableciendo relaciones íntimas, afectivas y recíprocas, que permite estructurarse y brindar apoyo necesario a sus miembros; de ello la importancia de incluir al grupo familiar en el tratamiento de pacientes con esquizofrenia, lo cual brindará mayor funcionalidad dentro del hogar y contribuirá a la disminución de los conflictos provocados por la alteración de la dinámica y sobrecarga; esta inclusión permite a la familia y al paciente con el diagnóstico de esquizofrenia enfrentar la enfermedad, adquirir herramientas y desarrollar habilidades que permitan sobrellevar los retos que plantea el trastorno y así afrontar adecuadamente las situaciones estresantes, promoviendo bienestar tanto individual como familiar.

Declaración sobre conflictos de intereses

Las autoras manifiestan no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Mundial de la salud. Esquizofrenia [Internet]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia>
2. Clasificación internacional de enfermedades CIE10; esquizofrenia [Internet]. 2009. Disponible en: https://eciem.aps.mscbs.gob.es/ecieMaps/browser/index_10_2008.html
3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM V; esquizofrenia [Internet]. Disponible en: https://psychiatryonline.org/pb-assets/dsm/update/DSM5Update_octubre2018_es.pdf
4. Belloch A, Ramos F SB. Manual de psicopatología [Internet]. 2010. 650 p. Disponible en: <https://serproductivo.org/wp-content/uploads/2017/04/Manual-de-psicopatolog%C3%ADa.-Volumen-II.pdf>
5. Colombiana EM de S y PS. en colombia la prevalencia de la esquizofrenia representa el 1% de la población [Internet]. 2013. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/esquizofrenia-representa-el-1-poblacion.aspx>
6. Benavides-Portilla M, Beitia-Cardona PN, Osorio-Ospina C. Características clínico-epidemiológicas de pacientes con esquizofrenia atendidos en el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, Colombia. *Rev Investig en Salud Univ Boyacá*. 2016;3(2):146. Disponible en: <https://doi.org/10.24267/23897325.184>
7. Tajima. K, Fernández H, López-Ibor JJ, Carrasco JL. Schizophrenia treatment. Critical review on the drugs and mechanisms of action of antipsychotics. *Actas Espec Psiquiatr*. 2009;6(37):330–42. Disponible en: <https://eu.ropemc.org/abstract/med/20066585>
8. Mathiesen SG. Family involvement and schizophrenia: A developmental model. *J Fam Soc Work*. 2001;6(1):35–52. Disponible en: https://doi.org/10.1300/J039v06n01_03
9. Morey CM. Impaired agency in schizophrenia: Family therapy with a young adult patient. *J Fam Psychother*. 2008;19(4):345–57. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/08975350802475080>
10. Casanova-Rodas L, Rascón-Gasca ML, Alcántara-Chabelas H, Soriano-Rodríguez A. Apoyo social y funcionalidad familiar en personas con trastorno mental. *Salud Ment*. 2014;37(5):443–8. Disponible en: <https://www.mediagraphics.com/pdfs/salmen/sam-2014/sam145k.pdf>
11. Martín Padilla E, Obando Posada D, Sarmiento Medina P. Family adherence in serious mental disorder. *Aten Primaria* [Internet]. 2018;50(9):519–26. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2017.06.010>
12. Bowen M. La Terapia Familiar en la Practica Clínica [Internet]. 1989. 216 p. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/159896046/La-Terapia-Familiar-en-La-Practica-Clinica-Volumen-II-Bowen-Murray>
13. Zaraza-Morales DR, Hernández-Holguín DM. Envoltio na escuridão: Significado de viver com esquizofrenia para os diagnosticados e seus cuidadores, Medellín, Colômbiab. *Aquichan*. 2017;17(3):305–15. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5294/aqui.2017.17.3.7>
14. Glynn, S. M., Cohen, A. N., & Niv N. NNew challenges in family interventions for schizophrenia. Expert review of neurotherapeuticso Title. 09 jun 2014. 2007;33–43. Disponible en: <https://doi.org/10.1586/14737175.7.1.33>
15. Lefley DTM& HP. Family Interventions for Schizophrenia. 2003;68. Disponible en: https://doi.org/10.1300/J085v14n02_04
16. Minuchin S. Familias y Terapia Familiar. Edisea, editor. Barcelona; 1986. Disponible en: <https://www.cphbidean.net/wp-content/uploads/2017/11/Salvador-Minuchin-Familias-y-terapia-familiar.pdf>
17. Wuerker AK. The family and schizophrenia. *Issues Ment Health Nurs*. 2000;21(1):127–41. Disponible en: <http://doi.org/10.1080/016128400248301>
18. Hansen NF, Vedana KGG, Miasso AI, Donato EC da SG, Zanetti ACG. A sobrecarga de cuidadores de pacientes com esquizofrenia: uma revisão integrativa da literatura. *Rev Eletrônica Enferm*. 2014;16(1):220–7. Disponible en: <https://doi.org/10.5216/ree.v16i1.20965>

19. Dillehay RSM. Caregivers for Alzheimer's Patients: What We Are Learning from Research. 1990 Disponible en: <https://doi.org/10.2190%2F2P3J-A9AH-HHF4-00RG>
20. Ribé JM, Salamero M, Pérez-Testor C, Mercadal J, Aguilera C, Cleris M. Quality of life in family caregivers of schizophrenia patients in Spain: caregiver characteristics, caregiving burden, family functioning, and social and professional support. *Int J Psychiatry Clin Pract* [Internet]. 2018;22(1):25–33. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/13651501.2017.1360500>
21. Quiroga, L. Nivel de sobrecarga emocional. 2015;78(4). Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/rnp/v78n4/a06v78n4.pdf>
22. Castillo-Martell H. Impacto de la Esquizofrenia en la Calidad de Vida y Desarrollo Humano de Pacientes y Familias de una Institución de Atención en Salud Mental de la Ciudad de Lima. *Revista Anales de Salud Mental* [revista en Internet] 2016 [acceso 15 de Noviembre del 2018]; 2014;(2):9–27. Disponible en: <http://www.insm.gob.pe/ojsinsm/index.php/Revista1/article/view/1/1>
23. Magaña, S. M., Ramirez Garcia, J. I., Hernández, M. G., & Cortez R. Psychological distress among Latino family caregivers of adults with schizophrenia: The roles of burden and stigma. *Psychiatr Serv*. 2007. Disponible en: <https://doi.org/10.1176/ps.2007.58.3.378>
24. Rascón Gasca ML, Caraveo J, Valencia M. Trastornos emocionales, físicos y psiquiátricos en los familiares de pacientes con esquizofrenia en México. *Rev Investig Clin*. 2010;62(6):509–15. Disponible en: <https://www.medicigraphic.com/pdfs/revinvcli/nn-2010/nn106c.pdf>
25. González E, Bastida MT, Martín M, Domínguez AI, Iruin Á. Efectividad de una Intervención Psicoeducativa en la Reducción de la Sobrecarga del Cuidador Informal del Paciente con Esquizofrenia (EDUCA-III-OSA). *Psychosoc Interv*. 2018;27(3):113–21. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5093/pi2018a20>
26. Pitschel-Walz, G., Leucht, S., Bäuml, J., Kissling, W., & Engel RR. The effect of family interventions on relapse and rehospitalization in schizophrenia—a meta-analysis. 2001;73–92. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.schbul.a006861>
27. Ramos, E. H., García, S. M., Villegas, M. S. E., Abadal, E. R., Ochoa, S., Bello, E. G., & Collado IC. m-RESIST, una solución m-Health integral para personas con Esquizofrenia Resistente: estudio cualitativo de necesidades y aceptabilidad. *Dialnet*. 2017;277–89. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6205016>
28. Caqueo-Urizar A, Gutiérrez-Maldonado J, Miranda-Castillo C. Quality of life in caregivers of patients with schizophrenia: A literature review. *Health Qual Life Outcomes*. 2009;7:84. Disponible en: <https://hql.o.biomedcentral.com/articles/10.1186/1477-7525-7-84>
29. Santoro MCF, Galera SAF. O cuidado familiar a um ente com esquizofrenia: narrativas sobre o futuro. *SMAD Rev Eletrônica Saúde Ment Álcool e Drog* (Edição em Port. 2013;9(3):122. Disponible en: <https://doi.org/10.11606/issn.1806-6976.v9i3p122-128>
30. Karanci NA, Aras A, Kumpasoglu GB, Can D, Çakır E, Karaaslan C, et al. Living with schizophrenia: Perspectives of Turkish people with schizophrenia from two Patient Associations on how the illness affects their lives. *Int J Soc Psychiatry*. 2019;65(2):98–106. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/0020764018820879>
31. Da Silva, Koch S. Esquizofrenia#: Percepção E Vivências Do Sistema Familiar. 2015;4–18. Disponible en: <http://www.revistas.fw.uri.br/index.php/psicologiaemfoco/article/view/2025/1956>
32. Macêdo TE, Fernandes CA CI. Rede de apoio social de pacientes com diagnóstico de esquizofrenia: Estudo exploratório. 2013;639–47. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/261/26130639012.pdf>
33. Hernandez M, Barrio C. Perceptions of Subjective Burden Among Latino Families Caring for a Loved One with Schizophrenia. *Community Ment Health J*. 2015;51(8):939–48. Disponible en: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10597-015-9881-5.pdf>
34. Ewhrudjakpor C. An assessment of family care for people living with schizophrenia in Delta State of Nigeria. *Aust e-Journal Adv Ment Heal*. 2009;8(1):112–8. Disponible en: <https://doi.org/10.5172/jamh.8.1.112>

35. Sreeja I. Effect of family intervention on functioning among patients with chronic schizophrenia. *Manipal J Nurs Heal Sci* [Internet]. 2017;3(1):10–5. Disponible en: http://ejournal.manipal.edu/mjnhs/docs/Volume%203_Issue%201/Full%20text/2%20Sreeja.pdf
36. Araujo A da S, Kebbe LM. Estudo sobre grupos de terapia ocupacional para cuidadores de familiares de com esquizofrenia. *Cad Ter Ocup da UFSCar*. 2014;22(1):97–108. Disponible en: <https://doi.org/10.4322/cto.2014.011>
37. Carreño-Moreno SP, Chaparro-Díaz L. Qualidade de vida dos cuidadores de pessoas com doença crônica. *Aquichan*. 2016;16(4):447–61. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5294/aqui.2016.16.4.4>
38. Viveros Chavarría EF, Londoño Bernal LV RNL. Comunicación en familias que acompañan a pacientes en la clínica psiquiátrica "Nuestra Señora del Sagrado Corazón" (Medellín-Colombia). 2017. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v34n1/2011-7485-psdc-34-01-00028.pdf>
39. Zaraza Morales, D. R., & Hernández Holguín DM. El valor de los apoyos para el bienestar subjetivo al vivir con esquizofrenia. 2016. :141–5. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5294/aqui.2017.17.3.7>
40. Magalhães J, Evangelista Lopes R, Nobrega-Therrien SM, Bastos Vasconcelos S. Caregiver Women's Coping Strategies Toward Schizophrenia Bearing People / Estratégias de Enfrentamento de Mulheres Cuidadoras de Pessoas com Esquizofrenia. *Rev Pesqui Cuid é Fundam Online*. 2018;10(3):793. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=66923>
41. Lima ICS, De Andrade Lima SB. Experiencing feelings and weaknesses of care in schizophrenia: family caregivers vision Vivenciando sentimentos e fragilidades do cuidar em esquizofrenia: visão de familiares cuidadores. *Rev Pesqui Cuid é Fundam Online*. 2017;9(4):1081. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6179567>
42. Padilla BL. El proceso de comunicación en pacientes con esquizofrenia. *Rev Española Comun en Salud*. 2014;5(2):112–24. Disponible en: <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/view/3338>
43. Shiraishi N, Reilly J. Positive and negative impacts of schizophrenia on family caregivers: a systematic review and qualitative meta-summary. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol* [Internet]. 2019;54(3):277–90. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s00127-018-1617-8>
44. Chen L, Zhao Y, Tang J, Jin G, Liu Y, Zhao X, et al. The burden, support and needs of primary family caregivers of people experiencing schizophrenia in Beijing communities: A qualitative study 11 Medical and Health Sciences 1117 Public Health and Health Services. *BMC Psychiatry*. 2019;19(1):1–10. Disponible en: <https://bmcp psychiatry.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12888-019-2052-4>
45. Yildirim A, Buzlu S, HaCihanoglu Asilar R, CAMCioglu TH, Erdiman S EkM. The effeCt of family-to-family support programs prvided for families of sChizophreniC patients on information about illness, family burden and self-effiCaCy. 2014. Disponible en: <http://turkpsikiyatri.com/Data/UnpublishedArticles/e4c70t.pdf>
46. Giacon BCC, Galera SAF. Ajustamento familiar após o surgimento da esquizofrenia. *Rev Bras Enferm*. 2013;66(3):321–6. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/2670/267028667003.pdf>
47. Soto FL, Cortés CE, Terrazas JV, Terrazas SV. Sobrecargas objetivas y nivel de apoyo familiar a pacientes adultos con esquizofrenia. *Salud Uninorte*. 2012;28(2):218–26. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/817/81724957005.pdf>
48. Beecher B. Mental health practitioners' views of the families of individuals with schizophrenia and barriers to collaboration: A mixed methods study. *J Fam Soc Work*. 2009;12(3):264–82. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/10522150802654260>
49. Von Kardorff E, Soltaninejad A, Kamali M, Eslami Shahrabaki M. Family caregiver burden in mental illnesses: The case of affective disorders and schizophrenia - A qualitative exploratory study. *Nord J Psychiatry*. 2016;70(4):248–54. Disponible en: <https://doi.org/10.3109/08039488.2015.1084372>
50. Hansen NF, Vedana KG, Miasso AI, Donato EC, Zanetti AC. A sobrecarga de cuidadores de pacientes com esquizofrenia: uma revisão integrativa da literatura. *Revista eletrônica de enfermagem*. 2014 Mar 31;16(1):220-7..20965. Disponible en: <https://doi.org/10.5216/rec.v16i1.20965>

51. Fitryasari R, Yusuf A, Nursalam, Tristiana RD, Nihayati HE. Family members' perspective of family Resilience's risk factors in taking care of schizophrenia patients. *Int J Nurs Sci* [Internet]. 2018;5(3):255–61. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2018.06.002>
52. Wan KF, Wong MMC. Stress and burden faced by family caregivers of people with schizophrenia and early psychosis in Hong Kong. *Intern Med J*. 2019;49:9–15. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2018.06.002>
53. Bishop M, Greeff AP. Resilience in families in which a member has been diagnosed with schizophrenia. *J Psychiatr Ment Health Nurs*. 2015;22(7):463–71. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/jpm.12230>
54. Schülhi PAP, Wadman MAP, Sales CA. O cotidiano familiar da pessoa com esquizofrenia: cuidando no domicílio. *Rev Eletrônica Enferm*. 2012;14(1):16–24. Disponible en: <https://doi.org/10.5216/ree.v14i1.13963>
55. Caqueo-Úrizar A, Lemos-Giráldez SS. Calidad de vida y funcionamiento familiar de pacientes con esquizofrenia en una comunidad Latinoamericana. *Psicothema* [Internet]. 2008;20(4):577–82. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/727/72720411.pdf>
56. Navarro Gómez N, Cangas Díaz AJ, García Montes JM, Moriana JA, Nieto Muñoz L, Mateu Mateu JM. Satisfacción y conocimientos de los familiares en Andalucía sobre la intervención en el trastorno mental grave. *Eur J Heal Res*. 2016;2(2):59. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6152067>
57. Girón M, Nova-Fernández F, Mañá-Alvarenga S, Nolasco A, Molina-Habas A, Fernández-Yañez A, et al. How does family intervention improve the outcome of people with schizophrenia? *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*. 2015;50(3):379–87. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-014-0942-9>
58. Shakeel M, Khess CRJ, Sreeraj VS, Uvais NA. Medication Adherence in Schizophrenia: A Hospital Based Cross Sectional Study of Family Related Factors. *J Psychosoc Rehabil Ment Heal*. 2017;4(2):215–9. Disponible en: <https://doi.org/10.1196/annals.1308.005>
59. Herbert HS, Manjula M, Philip M. Resilience and Factors Contributing to Resilience Among the Offsprings of Parents with Schizophrenia. *Psychol Stud (Mysore)*. 2013;58(1):80–8. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12646-012-0168-4>
60. Hsiao CY TY. Factors of caregiver burden and family functioning among Taiwanese family caregivers living with schizophrenia. 2015;1546–56. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/jocn.12745>
61. Saunders JC, Saunders JC. Issues in Mental Health Nursing FAMILY FUNCTIONING IN FAMILIES PROVIDING CARE FOR A FAMILY MEMBER WITH SCHIZOPHRENIA. 2009;2840. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/016128499248691>
62. Rodríguez G, Córdoba-do JA, Escolar-pujolar A, Aguilar-diosdado M. Atención Primaria Familia , economía y servicios sanitarios#: claves de los cuidados en pacientes con diabetes y amputación de miembros inferiores. Estudio cualitativo en Andalucía. 2018;50(10). Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2017.06.011>
63. Barroso DH, Yvel J, Premiot M, Carbonell A. Intervención educativa dirigida a los familiares de adultos mayores con enfermedades psiquiátricas. Artículo original. 2018;(1):38–46. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-99332018000100038
64. Montero I, Masanet MJ, Lacruz M, Bellver F, Asencio A. Intervención familiar en la esquizofrenia#: efecto a largo plazo en los cuidadores principales. *Rev. Actas Españolas de Psiquiatria*. 2006;34(3); 169-174.
65. Koschorke M, Padmavati R, Kumar S, Cohen A, Weiss HA, Chatterjee S, et al. Social Science & Medicine Experiences of stigma and discrimination faced by family caregivers of people with schizophrenia in India. *Soc Sci Med* [Internet]. 2017;178:66–77. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.01.061> Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.01.061>
66. De la Cuesta C, López MV, Arredondo P. Atención Primaria Recuperar y conservar al familiar: estrategias de los familiares cuidadores para hacer frente a las crisis de salud mental. *Atención Primaria* [Internet]. 2018;(xx). Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2018.06.003>
67. Biagini M. Estructura y dinámica familiar y su relación con el paciente esquizofrénico: antecedentes y tendencias actuales. 2013;17(4);12-17. Disponible en: <http://repositorio.inprf.gob.mx/handle/123456789/5615>

68. Avila D, Morales Z. Calidad de vida del cuidador de un paciente diagnosticado con esquizofrenia. Estudio de caso. 2018;1–81. Disponible en: <https://repository.unicatolica.edu.co/handle/20.500.12237/1456>
69. Caqueo-urizar A, Rus-calafell M, Craig TKJ, Irarrazaval M, Urzúa A, Boyer L, et al. Schizophrenia#: Impact on Family Dynamics. 2017; 19(1),2. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11920-017-0756-z>
70. Almeida C, Ribeiro A, Castro P, Braga E, *et al.* O cuidado ao idoso portador de transtorno mental sob a ótica da família. 2013;75–83. Disponible en: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-02832013000100008
71. Martínez, A. *et al.* Sobrecarga de los cuidadores familiares de pacientes con esquizofrenia: factores determinantes. Disponible en: <https://recyt.fecyt.es/index.php/ASSN/article/view/6419/5125>
72. Cruzado Donato TG. Sobrecarga del rol y calidad de vida en cuidadores de pacientes esquizofrénicos. Hospital Regional Docente de Trujillo. 2019. Disponible en: <http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/12929>
73. Padrón Q, Franz R; Peña Cordero,S; Salazar T, Katherine. Funcionalidad Familiar asociado al cuidado del adulto mayor con hipertensión arterial crónica. Rev. Latinoamericana de Hipertensión. 2017; 12(3);79-82. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/1702/170252187001.pdf>