



Acta botánica mexicana

ISSN: 0187-7151

ISSN: 2448-7589

Instituto de Ecología A.C., Centro Regional del Bajío

Soto-Mata, Brianda; Alanís-Rodríguez, Eduardo; Jurado, Enrique; Pando-Moreno, Marisela; Molina-Guerra, Víctor; Alcalá-Rojas, Alejandro; Marroquín-Castillo, Jonathan J.

Caracterización del hábitat de *Amoreuxia wrightii* (Bixaceae), una especie en peligro de extinción en el noreste de México

Acta botánica mexicana, núm. 122, 2018, pp. 21-31  
Instituto de Ecología A.C., Centro Regional del Bajío

DOI: <https://doi.org/10.21829/abm122.2018.1196>

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57454202002>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

UAEH  
redalyc.org

Sistema de Información Científica Redalyc  
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal  
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso  
abierto



# Caracterización del hábitat de *Amoreuxia wrightii* (Bixaceae), una especie en peligro de extinción en el noreste de México

## Habitat characterization of *Amoreuxia wrightii* (Bixaceae), a species of Northeastern Mexico at risk

Brianda Soto-Mata<sup>1,2</sup> , Eduardo Alanís-Rodríguez<sup>1,4</sup> , Enrique Jurado<sup>1</sup> , Marisela Pando-Moreno<sup>1</sup> ,  
Víctor Molina-Guerra<sup>2</sup> , Alejandro Alcalá-Rojas<sup>3</sup> , Jonathan J. Marroquín-Castillo<sup>1</sup>

- 1 Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Forestales, Carretera Linares-Cd. Victoria km 145, Apdo. postal 41, 67700 Linares, Nuevo León, México.
- 2 RENAC, S.A. de C.V., Linares, Nuevo León, México.
- 3 Complejo Siderúrgico TERNIUM, Pesquería, Nuevo León, México.
- 4 Autor para la correspondencia: eduardo.alanisrd@uanl.edu.mx

### Citar como:

Soto-Mata, B., E. Alanís-Rodríguez, E. Jurado, M. Pando-Moreno, V. Molina-Guerra, A. Alcalá-Rojas y J. J. Marroquín-Castillo. 2018. Caracterización del hábitat de *Amoreuxia wrightii* (Bixaceae), una especie en peligro de extinción en el noreste de México. Acta Botanica Mexicana 122: 21-31. DOI: <http://dx.doi.org/10.21829/abml22.2018.1196>

Recibido: 11 de diciembre de 2016.

Revisado: 22 de mayo de 2017.

Aceptado: 23 de agosto de 2017.

Primero en línea: 4 de octubre de 2017.

Publicado: 1 de enero de 2018.

DOI:

<http://dx.doi.org/10.21829/abml22.2018.1196>

## RESUMEN

**Antecedentes y Objetivos:** En México, *Amoreuxia wrightii* se encuentra en estatus de peligro de extinción de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. En este estudio se realizó la caracterización de poblaciones naturales de *A. wrightii*, mediante un análisis de la flora asociada y las propiedades físicas y químicas de los suelos donde se desarrollan en dos comunidades contrastadas desde el punto de vista de la cobertura del dosel en el matorral tamaulipeco en el noreste de México.

**Métodos:** En 2014 se establecieron 10 sitios de muestreo en dos ambientes diferenciados por la estructura de la vegetación: cinco sitios en asociaciones vegetales con cobertura vegetal densa y cinco sitios en áreas perturbadas con suelo desnudo. En cada área se evaluó la estructura vegetal y variables edáficas y se realizó un Análisis de Correspondencia Canónica.

**Resultados clave:** De acuerdo a la relación con otras especies, *A. wrightii* se asoció con especies pioneras, que emergen después de un disturbio, con el dominio de pastos como *Aristida purpurea*, *Cenchrus ciliaris*, *Cynodon dactylon*, *Panicum obtusum*, especies de herbáceas *Gutierrezia sarothrae*, *Gymnosperma glutinosum* y *Parthenium hysterophorus*, así como arbustos de porte bajo como *Acacia amentacea*, *A. berlandieri* y *Eysenhardtia texana*. De acuerdo con las variables edáficas, se observó que *A. wrightii* prefiere suelos arcillosos y limosos, con suelos con pH ligeramente alcalinos y con densidad aparente alta. Ningún individuo de *A. wrightii* fue registrado en sitios que presentaron suelos con altos contenidos de arena y altos contenidos de materia orgánica.

**Conclusiones:** *Amoreuxia wrightii* fue más abundante en áreas con nula cobertura, desprovistas de vegetación, sobre suelos con bajo contenido de materia orgánica y altos contenidos de pH, limo, arcilla y densidad aparente. De acuerdo a la relación con otras especies, se asoció con especies pioneras, que emergen después de un disturbio.

**Palabras clave:** análisis de correspondencia canónica, áreas con disturbio, cobertura aérea, Nuevo León.

## ABSTRACT:

**Background and Aims:** In Mexico, *Amoreuxia wrightii* is endangered according to NOM-059-SEMARNAT-2010. In this study the characterization of natural populations of *A. wrightii*, which grow in two contrasting communities taking into account the canopy cover in the Tamaulipan thornscrub in northeastern Mexico, was performed by analysis of associated flora and physical and chemical properties of soils.

**Methods:** In 2014, 10 sampling sites were established in two environments differentiated by vegetation structure: five sites in plant associations with dense vegetation cover and five sites in disturbed areas with bare soil. In each area the vegetation structure and edaphic variables were evaluated and a Canonical Correspondence Analysis was performed.

**Key results:** According to the relationship with other species, *A. wrightii* was associated with pioneer species that emerge after disturbance, dominated by grasses like *Aristida purpurea*, *Cenchrus ciliaris*, *Cynodon dactylon*, *Panicum obtusum*, herbs such as *Gutierrezia sarothrae*, *Gymnosperma glutinosum* and *Parthenium hysterophorus*, and low shrubs like *Acacia amentacea*, *A. berlandieri* and *Eysenhardtia texana*. According to edaphic variables, it was observed that *A. wrightii* preferred clayey and silty soils, soils with slightly alkaline pH and high bulk density. No individual of *A. wrightii* was recorded at sites that had soils with high sand content and high content of organic matter.

**Conclusions:** *Amoreuxia wrightii* was more abundant in areas with no coverage, devoid of vegetation, soils low in organic matter and high in pH, silt, clay and bulk density. According to the relationship with other species, it was associated with pioneer species, which emerge after a disturbance.

**Key words:** canonical correspondence analysis, disturbed sites, plant cover, Nuevo León.

## INTRODUCCIÓN

La familia Bixaceae agrupa plantas perennes, comprende 25 especies en cuatro géneros: *Amoreuxia* DC., *Bixa* L., *Cochlospermum* Kunth y *Diegodendron* Capuron. El género *Amoreuxia* se compone de cuatro especies: *A. gonzaletzii* Sprague & L. Riley, *A. malvifolia* A. Gray, *A. palmatifida* DC. y *A. wrightii* A. Gray, todas ellas distribuidas en México, pero no limitadas al país (Poppendieck, 1980; 1981; Pío-León et al., 2014).

En Nuevo León ocurren dos especies, *A. palmatifida* y *A. wrightii*, cuya distribución se restringe a la Planicie Costera del Golfo y sus límites con la Sierra Madre Oriental (Velazco, 2009). Se tienen registros de ejemplares (Herbario de la Facultad de Ciencias Forestales, UANL) colectados en Linares; además, Velazco (2009) registró *A. palmatifida* y *A. wrightii* en los municipios Bustamante, Lampazos de Naranjo y Anáhuac, Nuevo León.

*Amoreuxia wrightii* es una especie herbácea que se desarrolla principalmente en las regiones semiáridas (Cedano Maldonado, 2000; Velazco, 2009) y suele crecer en sitios perturbados (Calderón de Rzedowski, 1994). Se distribuye desde Texas, Estados Unidos de América, hasta el estado de Veracruz en áreas con suelos yesosos con altos contenidos de caliche (Henrickson y Johnston, 1997), así como en suelos arcillosos, planicies con suelos limosos (Correll y Johnston, 1970) y aún en pantanos (Sousa Pereira et al., 2013).

En México, *A. wrightii* se encuentra en estatus de peligro de extinción de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010). En esta categoría se encuentran las especies cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural (SEMARNAT, 2010).

Debido al escaso conocimiento que existe sobre el hábitat donde prosperan las poblaciones de *Amoreuxia wrightii*, y que es una especie con estatus dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010), los objetivos de este trabajo fueron caracterizar sus poblaciones naturales determinando las propiedades físicas y

químicas de los suelos donde se desarrollan, así como la diversidad de la flora asociada en dos comunidades contrastadas desde el punto de vista de la cobertura del dosel en el matorral tamaulipeco en el noreste de México.

## MATERIALES Y MÉTODOS

### Descripción del área de estudio


El estudio se desarrolló en el Área de Conservación de Flora y Fauna Silvestre del Complejo Siderúrgico Ternium, en el municipio Pesquería, Nuevo León (Noreste de México), entre las coordenadas 25°44'32.17"N, y 99°57'45.23"W, con una altitud de 304 m (Fig. 1).

El clima corresponde al tipo Cx' semicálido subhúmedo con lluvias escasas todo el año, con una precipitación media anual fluctuante entre 600 y 800 mm y una temperatura promedio anual de 22 °C. La temperatura media más alta se registra en el mes de julio con 30 °C; y la mínima en los meses de enero y diciembre con 14 y 15 °C (INEGI, 2014).

Los tipos de suelos son de origen aluvial, profundos, muy arcillosos, con contenido que oscilan de 40 a 65% en todo el perfil. En la época de sequía presentan grietas anchas y profundas que alcanzan, en ocasiones, más de 6 cm de ancho y 100 cm de profundidad. Destacan los Xerosoles, Feozems, y los Vertisoles (INEGI, 1986). La vegetación dominante pertenece al matorral espinoso tamaulipeco, el cual está dominado por especies como *Acacia amentacea* DC., *Leucophyllum frutescens* (Berland.) I.M. Johnst., *Cordia boissieri* A. DC. y *Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn. (Estrada et al., 2004; Alanís et al., 2013).

### Evaluación de la vegetación

En el verano del año 2014 se establecieron 10 sitios de muestreo en dos ambientes diferenciados por la estructura de la vegetación: cinco sitios en asociaciones vegetales con cobertura vegetal densa y cinco en áreas perturbadas con suelo desnudo. La asociación con cobertura densa presenta árboles y arbustos maduros con una cobertura de copa de 9345 m<sup>2</sup>/ha. El área perturbada tiene un historial



**Figura 1:** En la imagen superior izquierda se aprecia México, en la derecha el estado de Nuevo León y en la imagen inferior el municipio Pesquería señalando con un punto el área de estudio.

de uso agrícola, donde la vegetación nativa fue eliminada con maquinaria en 1977 y se utilizó para la agricultura de temporal durante 34 años; en el 2013 fue abandonada. En el momento de la evaluación tenía una cobertura de copa de 832 m<sup>2</sup>/ha. En cada sitio se establecieron cinco cuadrantes de 1 m<sup>2</sup> (con un total de 25 cuadrantes para cada condición). En los cuadrantes se midió el diámetro de la cobertura del dosel, en sentido norte-sur y este-oeste para cada individuo de todas las especies herbáceas y arbustivas emergentes, y se realizó la identificación de cada una de éstas. La identificación de las especies se realizó por

personal calificado de la Facultad de Ciencias Forestales de la UANL y se revisó la información taxonómica en la Base de Datos Tropicos (TROPICOS, 2017).

### Análisis de la vegetación

De acuerdo con el número de individuos se determinó la densidad (N/ha), con la cobertura se estimó la dominancia (m<sup>2</sup>/ha) y la frecuencia con base en la presencia en los sitios de muestreo. Los resultados se utilizaron para obtener un valor ponderado a nivel de taxon denominado Índice de Valor de Importancia (IVI), que adquiere valores

porcentuales en una escala de 0 a 100 (Magurran, 1988). Para evaluar la diversidad se estimó el Índice de Shannon (Shannon, 1948).

Para evaluar cuáles son las principales variables abióticas que están influenciando la presencia y distribución de *Amoreuxia wrightii* y especies asociadas, se realizó la ordenación de la vegetación (análisis de gradiente directo) mediante el Análisis de Correspondencia Canónica utilizando el programa estadístico CANOCO (ter Braak, 1986).

### Variables ambientales edáficas

En cada una de las dos asociaciones vegetales se establecieron aleatoriamente 25 cuadrantes para evaluar la vegetación. En cada una de estas parcelas se tomaron muestras de suelos de las cuatro esquinas a una profundidad de 20 cm. Se cuantificaron las variables pH, textura, materia orgánica, y densidad aparente, para analizar cuáles variables tienen el mayor impacto sobre la distribución de la vegetación y en especial sobre *Amoreuxia wrightii*.

#### Textura

Se aplicó el método AS-09 NOM-021-RECNAT-2000 (SEMARNAT, 2000), mediante el densímetro de Bouyoucos Gay Lussac (Marca ROBSON, México). El análisis mecánico es la determinación del porcentaje de arena, limo y arcilla. Estos análisis están basados en la proporción diferencial de asentamiento de las partículas del suelo en el agua.

#### Materia orgánica

Se obtuvo a través del método “combustión húmeda y titulación según Walkley/Black modificado”, que consiste en la oxidación del carbono orgánico que contiene el suelo con un exceso de dicromato de potasio en un medio fuertemente ácido, valorando el exceso de dicromato con sulfato ferroso (Walkley y Black, 1934).

#### pH

La medición de la reacción de pH del suelo se basó en la Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000 (SEMARNAT, 2000), por el método AS-23.

### Densidad aparente

Se define como la masa por unidad de volumen (Porta et al., 1999). Indica la compactación del suelo, el grado de facilidad o dificultad que podrían tener las raíces para penetrar el suelo (Castellanos et al., 2000), e inferir las dificultades de emergencia y circulación del agua y el aire (Porta et al., 1999). Se tomaron muestras con cilindro metálico de  $4 \times 5 \times 5$  cm.

## RESULTADOS

### Caracterización del hábitat

De acuerdo a la relación con otras especies, *Amoreuxia wrightii* se asoció con especies pioneras que emergen después de un disturbio, con el dominio de especies de herbáceas y pastos como *Gutierrezia sarothrae* (Pursh) Britton & Rusby, *Gymnosperma glutinosum* (Spreng.) Less., *Parthenium hysterophorus* L., *Aristida purpurea* Nutt., *Panicum obtusum* Kunth y *Cynodon dactylon* (L.) Pers.; así como arbustos de porte bajo como *Acacia amentacea*, *Acacia berlandieri* Benth. y *Eysenhardtia texana* Scheele.

En el área provista de vegetación la especie más abundante resultó ser *Panicum obtusum* (13.07%); con mayor cobertura relativa fueron las arbustivas *Zanthoxylum fagara* (L.) Sarg. (6.02%), *Eysenhardtia texana* (5.87%), *Castela texana* (Torr. & A. Gray) Rose var. *texana* (5.72%), *Karwinskia humboldtiana* (Schult.) Zucc. (5.30%) y *Lantana macropoda* Torr. (5.24%); la de mayor frecuencia relativa (9.09%) e índice de valor de importancia (7.64%) fue *Gutierrezia sarothrae*.

### Diversidad

En los 10 sitios evaluados se registró un total de 26 familias, 44 géneros y 48 especies de plantas vasculares (Apéndice); las cinco familias con mayor número de especies son Leguminosae (9), Asteraceae (5), Poaceae (4), Euphorbiaceae (4) y Verbenaceae (3). Los resultados del Índice de Shannon son de 2.88 para el área no provista de vegetación y de 3.20 para la provista de vegetación.



## Parámetros estructurales

El Apéndice muestra los resultados de los parámetros estructurales estimados. En los sitios desprovistos de vegetación la especie más abundante y con mayor frecuencia relativa fue *Amoreuxia wrightii* (21.07% y 14.14%, respectivamente) y *Gutierrezia sarothrae* tuvo la mayor cobertura relativa (6.66%). De acuerdo al Índice de Valor de Importancia (IVI) calculado, *Amoreuxia wrightii* (12.93%) resultó ser la especie con el valor más alto.

En el área provista de vegetación la especie más abundante fue *Panicum obtusum* (13.07%); con mayor cobertura relativa, *Zanthoxylum fagara* (6.02%) y la de mayor frecuencia relativa (9.09%) e índice de valor de importancia (7.64%), *Gutierrezia sarothrae*.

## Análisis de suelo

Los suelos de los cinco sitios provistos de vegetación presentaron valores promedios de pH 7.44, una clase textural de franco-arenosa, un valor de contenido de materia orgánica (MO) de 3.15, los cuales se consideran valores muy altos de acuerdo a la tabla de valoración de Walkley y Black Modificado (Cuadro 1). Debido a los aportes constantes de MO por la vegetación del lugar, predominan los colores oscuros con un valor de 5 o menos, siendo el más común el pardo oscuro (10YR 4/2) y una densidad aparente de 0.94 g/cm<sup>3</sup> (Cuadro 2).

Los suelos de áreas sin vegetación presentaron valores promedio de pH de 7.76, una clase textural de franco-arcillosa a arcillosa, un contenido de materia orgánica

bajo (1.28), con colores más claros como el pardo 10YR 5/3 y una densidad aparente de 1.33 g/cm<sup>3</sup> (Cuadro 2). Esto equivale a suelos compactos con poca porosidad en su composición y una infiltración lenta.

## Análisis de gradiente directo

Al incluir variables bióticas y abióticas en el análisis, mediante CANOCO (Análisis de Correspondencia Canónica, de gradiente directo) se observó que la inercia total de los datos (total inertia=2.25) es estadísticamente heterogénea y pueden analizarse para obtener resultados referentes a la preferencia de hábitat de las especies analizadas, en especial la especie de estudio *Amoreuxia wrightii* por determinado tipo de hábitat. Los tres primeros ejes engloban 0.38, 0.36 y 0.25 de la varianza total de los datos y las correlaciones fueron bastante altas, 0.97, 0.99 y 0.96, lo que demuestra la relación estrecha entre vegetación y variables ambientales (Cuadro 3).

**Cuadro 2:** Características de los suelos en las áreas desprovistas y provistas de vegetación.

Característica	Desprovisto de vegetación	Provisto de vegetación
pH	7.76	7.44
Materia orgánica (%C)	1.28	3.15
Densidad aparente g/cm <sup>3</sup>	1.33	0.94
Clase textural	Franco-Arcillosa	Franco-Arenosa

**Cuadro 1:** Valoración de contenido de carbono (C) orgánico por tipo de suelo.


Contenido de C orgánico	Arenosos	Francos	Arcillosos
Muy escaso	<0.25	<0.50	<0.75
Escaso	0.25-0.50	0.50-0.75	0.75-1.00
Mediano	0.50-0.75	0.75-1.50	1.00-2.00
Alto	0.75-1.50	1.50-2.50	2.00-4.00
Muy alto	>1.50	>2.50	>4.00

**Cuadro 3:** Resultados del Análisis de Correspondencia Canónica mostrando los valores de los tres primeros ejes, sus correlaciones y la inercia total (varianza total).

Ejes	1	2	3	Inercia total
Eigenvalores	0.38	0.36	0.25	2.25
Correlación Espacio-Ambiental	0.97	0.99	0.96	
% varianza acumulada especies	16.9	33.0	44.4	
% varianza acumulada especies-ambiente	27.7	54.0	72.9	

En la figura 2, *Amoreuxia wrightii* se registró principalmente en los sitios 2, 3 y 4, representando vegetación típica de suelos perturbados, mientras que en los sitios no perturbados 7, 8, 9 y 10 estuvo ausente. En este sentido *Amoreuxia* se asoció principalmente con *Gutierrezia sarothrae*, *Cynodon dactylon*, *Carlowrightia texana* Henrickson & T.F. Daniel, *Aristida purpurea*, *Indigofera miniata* Ortega, *Cenchrus ciliaris* L. y *Cordia boissieri*, especies indicadoras de disturbio (Correll y Johnston, 1970), que habitan en áreas con coberturas aéreas menos densas o sitios con vegetación casi nula.

De acuerdo con las variables evaluadas, se observó que *Amoreuxia wrightii* prefiere suelos arcillosos y limosos, con suelos con pH ligeramente alcalinos y con densidad aparente alta. Ningún individuo de *Amoreuxia wrightii* fue registrado en sitios que presentaron suelos con altos contenidos de arena y altos contenidos de materia orgánica. De igual forma, pero con respecto a la flora asociada en estos sitios, se confirma que *Amoreuxia wrightii* no está asociada dentro de sitios no perturbados con la vegetación nativa y cobertura aérea densa, especialmente aquella constituida por *Jatropha dioica* Sessé, *Karwinskia humboldtiana*, *Acacia schaffneri* (S. Watson)



**Figura 2:** Diagrama (Triplot) de la ordenación entre variables ambientales, sitios y especies de acuerdo con la Ordenación Canónica de Comunidades (CANOCO, por sus siglas en inglés) (ter Braak, 1986).





F.J. Herm., *Acacia amentacea*, *Zanthoxylum fagara*, *Leucophyllum frutescens* y *Forestiera angustifolia* Torr.

## DISCUSIÓN

La mayoría de las especies del género *Amoreuxia* están adaptadas morfológica y fisiológicamente para subsistir en condiciones extremas de sequía en las zonas áridas donde se encuentran (Chávez et al., 2013). Figueroa y Galeano (2007) señalan que una de esas adaptaciones es la presencia de raíces tuberosas que le permiten acumular agua para sobrevivir durante épocas secas. Chávez et al. (2013) menciona que *Amoreuxia wrightii* tiene un sistema subterráneo complejo, formado por un eje engrosado cuya porción proximal corresponde a un xilopodio de origen posiblemente caulinar y el resto a una estructura tuberosa de origen radical. Además, se presentan raíces laterales con función de reserva, sostén y absorción, lo que asegura la propagación de esta especie en condiciones extremas.

Milanez y Moraes-Dallaqua (2003) y Vilhalva y Apezato-da-Glória (2006) hacen referencia al desarrollo de un xilopodio de origen caulinar, radical o mixto en estructuras subterráneas en diferentes especies de *Asteraceae*. Gregory (2006) menciona el desarrollo de reservorios de almidón en las raíces tal como ocurre en *Amoreuxia wrightii*, las cuales proporcionan alimento a la planta durante periodos de sequía.

*Amoreuxia wrightii* se asoció principalmente con *Gutierrezia sarothrae*, *Cynodon dactylon*, *Carlowrightia texana*, *Aristida purpurea*, *Indigofera miniata*, *Cenchrus ciliaris* y *Cordia boissieri*, todas indicadoras de disturbio (Correll y Johnston, 1970) y que habitan en áreas con coberturas aéreas menos densas o sitios sin vegetación. También se asoció a arbustos de porte bajo como *Acacia amentacea*, *Acacia berlandieri* y *Eysenhardtia texana*. Estos arbustos son los primeros en regenerar después de actividades productivas o perturbación (Alanís et al., 2008; Alanís et al., 2013; Jiménez et al., 2013).

El suelo del área con escasa vegetación, que fue donde se encontró *A. wrightii*, muestra valores ligeramente

alcalinos, no salinos y arcillosos. Cutler (1977) y Dickison (2000) reportaron suelos muy similares en donde crece *Amoreuxia wrightii*, señalando que, en ambientes áridos con suelos arcillosos, con escasa precipitación y alta evapotranspiración, es frecuente que presenten estructuras subterráneas capaces de almacenar sustancias de reserva en algunos casos o agua en otros.

Lo anterior se ve reflejado en el índice de valor de importancia, ya que para la zona desprovista de vegetación, en donde los suelos son arcillosos especies como *Amoreuxia wrightii* presentan el valor más altos de densidad. Caso contrario en el área provista de vegetación, la especie mostró valores menores. Además del tipo de suelo, *A. wrightii* se estableció con mayor abundancia en el área no provista de vegetación, condiciones en las que de acuerdo con Raposo et al. (2016) existe una escasa cobertura vegetal y condición para que se desarrollen las especies heliófitas.

Los estudios sistemáticos sobre la distribución, ecología, germinación y propagación de *Amoreuxia* son escasos. Por lo anterior se considera necesario desarrollar más investigaciones sobre estos temas. A nivel especie, se han generado, en Venezuela, estudios de *Amoreuxia wrightii* que evalúan aspectos biológicos y poblacionales (Chávez et al., 2016) y anatomía foliar y del sistema subterráneo (Chávez et al., 2013), pero hace falta generar conocimiento de su germinación y propagación para fines de preservación y producción de especies.

## CONCLUSIONES

*Amoreuxia wrightii* fue más abundante en áreas con nula cobertura, desprovistas de vegetación o bien, áreas abiertas, sobre suelos con bajo contenido de materia orgánica y altos contenidos de pH, limo, arcilla y densidad aparente. De acuerdo a la relación con otras especies, se asoció con especies pioneras, que emergen después de un disturbio, con el dominio de especies de herbáceas y pastos. En las áreas sin perturbación, con suelos donde hay contenidos altos de materia orgánica y que albergan vegetación arbustiva con cobertura aérea densa, se encontró una población menor de *Amoreuxia wrightii*.



## CONTRIBUCIONES DE AUTORES

BSM, EAR, EJ y MPM concibieron y diseñaron el estudio. BSM y EAR realizaron los análisis. BSM, VMG, AAR y JJMC contribuyeron a la adquisición de datos y la interpretación. BSM y EAR escribieron el manuscrito con la ayuda de EJ, MPM, VMG, AAR y JJMC. Todos los autores contribuyeron a la discusión, revisión y aprobación del manuscrito final.

## FINANCIAMIENTO

Se agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por haberle otorgado una beca de manutención a la primera autora. También se agradece el apoyo de la empresa RENAC, S.A. de C.V. por haber apoyado con la logística de las actividades en campo, haber cubierto la adquisición de los reactivos de laboratorio y los gastos de transporte y alimentación de las brigadas de campo.

## LITERATURA CITADA

- Alanís, E., J. Jiménez, O. A. Aguirre, J. E. Treviño, E. Jurado y M. A. González. 2008. Efecto del uso del suelo en la fitodiversidad del matorral espinoso tamaulipeco. *Ciencia UANL* 11(1): 56-62.
- Alanís, E., J. Jiménez, M. A. González, J. I. Yerena, L. G. Cuellar y A. Mora-Olivo. 2013. Análisis de la vegetación secundaria del matorral espinoso tamaulipeco, México. *Phyton, Revista Internacional de Botánica Experimental* 82(2): 185-191.
- Calderón de Rzedowski, G. 1994. *Cochlospermaceae*. *Flora del Bajío y de regiones adyacentes* 95: 1-5.
- Castellanos J. Z., J. X. Uvalle y A. Aguilar. 2000. *Manual de interpretación de análisis de suelos y aguas*. 2a. Ed. Instituto de Capacitación para la Productividad Agrícola. San Miguel de Allende, México. 226 pp.
- Cedano Maldonado, M. 2000. *Revisión de la familia Cochlospermaceae para México*. Tesis de maestría en Ciencias Biológicas. Área de sistemática vegetal, Universidad de Guadalajara. Guadalajara, México. 241 pp.
- Chávez J., D. Jáuregui, M. Lapp y P. Torrecilla. 2013. Anatomía foliar y del sistema subterráneo de *Amoreuxia wrightii* A. Gray (Bixaceae), especie en peligro crítico en Venezuela. *Ernstia* 23(1): 47-65.
- Chávez, J., M. Lapp, P. Torrecilla, R. Wingfield y L. García. 2016. Aspectos biológicos y poblacionales con relación al estado de amenaza local de *Amoreuxia wrightii* A. Gray (Bixaceae), especie de distribución restringida en Venezuela. *Ernstia* 26(1): 39-73.
- Correll, D. S. y M. C. Johnston. 1970. *Manual of the vascular plants of Texas*. Texas research foundation. Renner, USA. Pp. 36-84.
- Cutler, D. F. 1977. *Applied plant anatomy*. Longman. London and New York, UK, USA. 103 pp.
- Dickison, W. C. 2000. *Integrative plant anatomy*. Academic Press. San Diego, USA. 533 pp.
- Estrada, A. E., C. Yen, A. Delgado y J. A. Quintanilla. 2004. Leguminosas del centro del estado de Nuevo León, México. *Universidad Nacional Autónoma de México, Anales del Instituto de Biología, Serie Botánica* 75: 73-85.
- Figueroa, Y. y G. Galeano. 2007. Lista comentada de las plantas vasculares del Enclave Seco Interandino de la Tatacoa (Huila, Colombia). *Caldasia* 29(2): 263-281.
- Gregory, P. J. 2006. *Plant Roots: Growth, activity and interaction with soils*. Blackwell Publishing. Oxford, UK. 318 pp. DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/9780470995563.ch1>
- Henrickson, J. y M. C. Johnston. 1997 (inédito). *A flora of the Chihuahuan Desert region*. Los Angeles, USA. 1687 pp.
- INEGI. 1986. *Síntesis Geográfica de Nuevo León*. Secretaría de Programación y Presupuesto. México, D.F., México. 170 pp.
- INEGI. 2014. *Perspectiva estadística Nuevo León*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México, D.F., México. 95 pp.
- Jiménez, J., E. Alanís, M. A. González, O. A. Aguirre, E. J. Treviño. 2013. Characterizing regeneration of woody species in areas with different land-history tenure in the Tamaulipan thornscrub, Mexico. *The Southwestern Naturalist* 58(3): 299-304. DOI: <http://dx.doi.org/10.1894/0038-4909-58.3.299>
- Magurran, A. E. 1988. *Ecological Diversity and Its Measurements*. Chapman & Hall. London, UK. 179 pp. DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-7358-0>



- Milanez, C. y M. Moraes-Dallaqua. 2003. Ontogênese do sistema subterrâneo de *Pachyrhizus ahipa* (Wedd.) Parodi (Fabaceae). Revista Brasileira de Botânica 26(3): 415-427. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-84042003000300014>.
- Pío-León, J. F., J. L. León-de la Luz y A. Ortega-Rubio 2014. Nuevo registro de *Amoreuxia gonzalezii* (Bixaceae) para la península de Baja California, México. Revista Mexicana de Biodiversidad 85(4): 1269-1272. DOI: <http://dx.doi.org/10.7550/rmb.44212>
- Poppendieck, H. H. 1980. A monograph of the Cochlospermaceae. Botanische Jahrbuecher fuer Systematik Pflanzen-geschichte und Pflanzengeographie 101(2): 191-265.
- Poppendieck, H. H. 1981. Cochlospermaceae. Flora Neotropical Monograph 27: 1-34.
- Porta, J., M. López-Acevedo y C. Roquero. 1999. Edafología para la agricultura y el medio ambiente. 2a. ed. Ed. Mundi-Prensa. Asturias, España. Pp. 155, 256.
- Raposo, M., P. Mendes, A. Cano-Ortiz y C. Pinto-Gomes. 2016. Séries de vegetação prioritárias para a conservação no centro e sul de Portugal continental. Botanique 1: 113-148.
- SEMARNAT. 2000. Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000. Que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. Estudios, muestreo y análisis. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Diario Oficial de la Federación. Cd. Mx., México.
- SEMARNAT. 2010. Norma Oficial Mexicana NOM 059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Diario Oficial de la Federación. Cd. Mx., México. [http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5173091&fecha=30/12/2010](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5173091&fecha=30/12/2010)
- Shannon, C. E. 1948. A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal 27: 379-423, 623-656.
- Sousa Pereira, D., M. Sousa Pereira y A. M. Esmeraldo Bezerra. 2013. Effect of light and temperature on seed germination of *Cochlospermum vitifolium* (Will.) Sprengel. Floresta e Ambiente 20(3): 391-397. DOI: <http://dx.doi.org/10.4322/floram.2013.026>
- ter Braak, C. J. F. 1986. Canonical Correspondence Analysis: A new eigenvector technique for multivariate direct gradient analysis. Ecology 67(5): 1167-1179. DOI: <http://dx.doi.org/10.2307/1938672>
- TROPICOS. 2017. Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. <http://www.tropicos.org>
- Velazco, C. G. 2009. Flora del estado de Nuevo León, México: Diversidad y Análisis Espacio-Temporal. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León. San Nicolás de Los Garza, México. 218 pp.
- Vilhalva, D. y B. Apezado-da-Glória. 2006. Morfo-anatomía do sistema subterrâneo de *Calea verticillata* (Klatt) Pruski e *Isostigma megapotamicum* (Spreng.) Sherff-Asteraceae. Revista Brasileira de Botânica 29(1): 39-47. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-84042006000100005>
- Walkley, A. e I. A. Black. 1934. An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science 37(1): 29-38. DOI: <http://dx.doi.org/10.1097/00010694-193401000-00003>

**Apéndice.** Abundancia, dominancia, frecuencia e índice de valor de importancia de las especies registradas para cada condición.

Familia	Especies	No provistas de vegetación				Provistas de vegetación			
		Abundancia (%)	Dominancia (%)	Frecuencia (%)	IVI	Abundancia (%)	Dominancia (%)	Frecuencia (%)	IVI
ACANTHACEAE	<i>Carlowrightia texana</i> Henrickson & T.F. Daniel	6.13	3.00	1.53	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Ruellia occidentalis</i> (A. Gray) Tharp & F.A. Barkley	0.38	0.26	0.76	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
AGAVACEAE	<i>Yucca filifera</i> Chabaud	0.38	1.76	0.76	0.97	0.65	2.26	1.01	1.31
AMARYLLIDACEAE	<i>Zephyranthes longifolia</i> Hemsl.	2.68	2.12	2.3	2.37	5.88	1.50	2.02	3.14
ASTERACEAE	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	0.38	1.13	0.76	0.76	1.96	2.60	2.02	2.19
	<i>Gutierrezia sarothrae</i> (Pursh) Britton & Rusby	10.73	6.66	10.76	9.38	10.46	3.37	9.09	7.64
	<i>Gymnosperma glutinosum</i> (Spreng.) Less.	3.45	2.01	4.61	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	6.51	1.70	4.61	4.27	1.31	3.31	1.01	1.88
	<i>Tridax coronopifolia</i> (Kunth) Hemsl.	0.77	1.07	0.76	0.87	0.65	1.56	1.01	1.08
BORAGINACEAE	<i>Cordia boissieri</i> A. DC.	0.77	1.05	1.53	1.11	0.65	4.51	1.01	2.06
BIXACEAE	<i>Amoreuxia wrightii</i> A. Gray	21.07	3.57	14.14	12.93	11.11	1.28	6.06	6.15
CACTACEAE	<i>Cylindropuntia leptocaulis</i> (DC.) F.M. Knuth	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	1.70	2.02	1.68
CELASTRACEAE	<i>Schaefferia cuneifolia</i> A. Gray	0.77	1.07	1.53	1.12	1.31	2.14	2.02	1.82
CUCURBITACEAE	<i>Ibervillea tenuisecta</i> (A. Gray) Small	0.38	3.78	0.76	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVOLVULACEAE	<i>Ipomoea costellata</i> Torr.	1.15	4.85	2.3	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
EUPHORBIACEAE	<i>Croton pottsii</i> (Klotzsch) Müll. Arg.	3.83	1.27	3.48	2.86	5.88	0.71	6.06	4.22
	<i>Euphorbia golondrina</i> L.C. Wheeler	0.38	3.13	0.76	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Jatropha cathartica</i> Terán & Berland.	0.38	0.77	0.76	0.64	1.96	3.39	3.03	2.79
	<i>Jatropha dioica</i> Sessé	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	2.32	1.01	2.42
KRAMERIACEAE	<i>Krameria ramosissima</i> (A. Gray) S. Watson	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	4.48	2.02	2.82
LAMIACEAE	<i>Salvia ballotiflora</i> Benth.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	1.05	3.03	2.23
LEGUMINOSAE	<i>Acacia greggii</i> A. Gray	0.38	5.36	0.76	2.17	0.65	2.41	1.01	1.36
	<i>Acacia rigidula</i> Benth.	0.38	0.34	0.76	0.50	2.61	1.63	4.04	2.76
	<i>Acacia schaffneri</i> (S. Watson) F.J. Herm.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.78	3.03	1.92
	<i>Desmanthus virgatus</i> (L.) Willd.	2.30	6.48	3.07	3.95	2.61	3.91	2.02	2.85
	<i>Eysenhardtia texana</i> Scheele	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	5.87	3.03	3.62
	<i>Havardia pallens</i> (Benth.) Britton & Rose	0.38	1.07	0.76	0.74	0.65	3.39	1.01	1.68
	<i>Indigofera miniata</i> Ortega	3.07	5.11	2.3	3.49	1.96	1.24	1.01	1.40
	<i>Parkinsonia texana</i> (A. Gray) S. Watson	0.38	7.30	0.76	2.81	1.31	0.97	2.02	1.43



## Apéndice. Continuación.

Familia	Especies	No provistas de vegetación				Provistas de vegetación			
		Abundancia (%)	Dominancia (%)	Frecuencia (%)	IVI	Abundancia (%)	Dominancia (%)	Frecuencia (%)	IVI
MALVACEAE	<i>Prosopis laevigata</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst.	0.38	0.90	0.76	0.68	0.65	2.63	1.01	1.43
	<i>Hibiscus martianus</i> Zucc.	0.38	3.00	0.76	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Sida physocalyx</i> A. Gray	3.45	1.98	4.61	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
OLEACEAE	<i>Forestiera angustifolia</i> Torr.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	1.50	1.01	1.27
POACEAE	<i>Aristida purpurea</i> Nutt.	4.60	1.47	3.07	3.05	1.31	3.76	1.01	2.03
	<i>Cenchrus ciliaris</i> L.	1.92	6.66	2.3	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	4.60	2.04	6.92	4.52	1.31	3.84	1.01	2.05
	<i>Panicum obtusum</i> Kunth	10.73	3.78	10	8.17	13.07	1.80	6.06	6.98
RANUNCULACEAE	<i>Clematis drummondii</i> Torr. & A. Gray	0.38	2.20	0.76	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
RHAMNACEAE	<i>Karwinskia humboldtiana</i> (Schult.) Zucc.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	5.30	2.02	2.88
RUTACEAE	<i>Zanthoxylum fagara</i> (L.) Sarg.	0.38	0.86	0.76	0.67	1.31	6.02	2.02	3.12
SCROPHULARIACEAE	<i>Leucophyllum frutescens</i> (Berland.) I.M. Johnst.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	2.14	1.01	1.27
SIMAROUBACEAE	<i>Castela texana</i> (Torr. & A. Gray) Rose var. <i>texana</i>	0.38	0.69	0.76	0.61	1.31	5.72	2.02	3.02
TURNERACEAE	<i>Turnera diffusa</i> Willd.	2.30	2.40	2.3	2.33	2.61	1.42	3.03	2.36
ULMACEAE	<i>Celtis pallida</i> Torr.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.91	2.02	1.63
VERBENACEAE	<i>Lantana camara</i> L.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58	1.24	5.05	3.62
	<i>Lantana macropoda</i> Torr.	1.15	1.20	1.53	1.29	0.65	5.24	1.01	2.30
	<i>Verbena canescens</i> Kunth	0.77	4.08	1.53	2.12	0.65	1.20	1.01	0.96
ZYGOPHYLLACEAE	<i>Guaiaacum angustifolium</i> Engelm.	1.53	3.86	1.53	2.31	1.96	0.86	3.03	1.95
Suma		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00