

Riqueza y abundancia de las aves urbanas de nueve áreas verdes de la ciudad de Sangolquí (Ecuador): Estudio preliminar

Jácome-Negrete, Iván Vinicio; Trujillo Regalado, Sofía Isabel; Rocha Cuascota, Diana Lizeth; Hidalgo Cárdenas, Erika Andrea; Flores Vega, Stephanie Carolina
Riqueza y abundancia de las aves urbanas de nueve áreas verdes de la ciudad de Sangolquí (Ecuador): Estudio preliminar
Siembra, vol. 6, núm. 1, 2019
Universidad Central del Ecuador, Ecuador
Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=653868370001>
DOI: <https://doi.org/10.29166/siembra.v6i1.1514>

Riqueza y abundancia de las aves urbanas de nueve áreas verdes de la ciudad de Sangolquí (Ecuador): Estudio preliminar

Richness and abundance of the urban birds of the nine green areas of Sangolquí (Ecuador): Preliminary study

Iván Vinicio Jácome-Negrete

Universidad Central del Ecuador, Ecuador

Sofía Isabel Trujillo Regalado

Universidad Central del Ecuador, Ecuador

Diana Lizeth Rocha Cuascota

Universidad Central del Ecuador, Ecuador

Erika Andrea Hidalgo Cárdenas eahidalgoc@uce.edu.ec

Universidad Central del Ecuador, Ecuador

Stephanie Carolina Flores Vega

Universidad Central del Ecuador, Ecuador

Siembra, vol. 6, núm. 1, 2019

Universidad Central del Ecuador,
Ecuador

Recepción: 15 Enero 2019
Aprobación: 01 Abril 2019

DOI: [https://doi.org/10.29166/
siembra.v6i1.1514](https://doi.org/10.29166/siembra.v6i1.1514)

Redalyc: [https://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=653868370001](https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=653868370001)

Resumen: Este estudio se realizó con el objetivo de documentar la riqueza y la abundancia de las aves silvestres en nueve áreas verdes de Sangolquí. Se registró la avifauna mediante puntos de conteo a partir de las 06h30 hasta las 09h30, en días sin lluvia, desde el 11 de noviembre del 2016 hasta el 18 de febrero del 2017, mediante detección visual y auditiva. Cada uno de los nueve sectores fue muestreado a través de siete puntos de conteo consecutivos. La avifauna registrada incluyó una riqueza de 29 especies con un total de 1.010 individuos registrados. La Tórtola Orejuda Zenaida auriculata fue la más abundante con 292 individuos, mientras que las especies menos abundantes, con un solo registro, fueron el Zorzal de Swainson *Catharus ustulatus*, Carpintero dorsicar mesi *Colaptes rivolii*, Gallinazo Negro *Coragyps atratus*, Pinchaflor Pechicanelo *Diglossa sittonoides* y el Gavilán Alicastaño *Parabuteo unicinctus*. La Paloma Doméstica, el Gorrión, el Mirlo Grande y Tórtola Orejuda se consideran especies sinantrópicas para Sangolquí. Finalmente, se sugiere restaurar la cobertura arbustiva de las áreas verdes para favorecer la conservación de las aves locales.

Palabras clave: diversidad, áreas verdes urbanas, conservación, distribución, aves andinas.

Abstract: This study was done with the purpose of documenting the richness and abundance of wild birds in nine green areas of Sangolquí. Birdlife was recorded by counting points from 06.30 am to 09.30 am, on days without rain from November 11, 2016, until February 18, 2017, through visual and audio detection. Each of the nine sectors was sampled through seven consecutive counting points. The recorded birdlife included a wealth of 29 species with a total of 1.010 birds. The Eared Dove Zenaida auriculata was the most abundant with 292 birds, while the less abundant species, with only one record, were the Swainson's Thrush *Catharus ustulatus*, the Crimson-mantled Woodpecker *Colaptes rivolii*, the Black Vulture *Coragyps atratus*, the Rusty Flowerpiercer *Diglossa sittonoides* and the Harris's Hawk *Parabuteo unicinctus*. The Rock Pigeon, the Rufous collared Sparrow, the Great Thrush, and the Eared Dove are considered synanthropic species for Sangolquí. Finally, it is suggested to restore the shrub cover of green areas to favor the conservation of local birds.

Keywords: diversity, urban areas, conservation, distribution, Andean birds.

1. Introducción

Ecuador es considerado uno de los 17 países más biodiversos del mundo (Herrera & Lasso, 2014) a pesar de su reducida extensión territorial, ocupa el primer lugar en número de especies por kilómetro cuadrado (García, Parra & Mena, 2014). Esta diversidad tiene su origen en un conjunto de factores geográficos, geológicos y climáticos, entre los que destacan la presencia de la corriente fría de Humboldt y cálida del Niño, además de la existencia de la cordillera de los Andes (Mindo Cloudforest Fundation, 2010).

El grupo de vertebrados con mayor diversidad en el país corresponde a las aves que, según la versión actualizada del *Listado de Aves del Ecuador*, con los cambios taxonómicos del Comité de Clasificación de Sudamérica (SACC), comprende 1.684 especies (Freile, Brinkhuizen, Greenfield, Lysinger, Navarrete, Nilsson & Boyla, 2018). De esta cifra, al menos 131 especies de aves de 34 familias y 15 órdenes han sido registradas para la zona urbana y periurbana de Quito, incluyendo los valles vecinos en los conteos navideños organizados con participación de la ciudadanía (Cisneros-Heredia, Amigo, Arias, Arteaga, Bedoya, Espinosa, Montenegro, Nazati & Carrión, 2015).

Una parte de esta cifra se encuentra distribuida en la ciudad de Sangolquí, cabecera cantonal del cantón Rumiñahui, sitio ubicado en la provincia de Pichincha. Las aves del cantón han sido más estudiadas en áreas rurales, alejadas de la urbe. La última actualización publicada en cuanto al número de especies de aves registradas en este cantón fue hecha por Jácome & Guarderas (2010), que indicaba la existencia de 48 especies de aves, agrupadas en 21 familias y 6 órdenes. En el caso específico de la ciudad de Sangolquí, no existe información publicada actualizada, sin embargo, se conoce que el número de especies, según los últimos censos publicados por Ebird en la web, es de 32 especies. Lara (2015) reporta la existencia de 61 especies de aves para todo el cantón Rumiñahui, como dato más actualizado.

En el país existen muchos lugares protegidos en áreas rurales, con el objetivo de promover la conservación de la avifauna, sin embargo, no es práctica cotidiana generar procesos de conservación en áreas urbanas, tales como los parques citadinos, al ser espacios que a pesar de la creciente antropización aún poseen especies nativas de la zona (Caula, Giner, & De Nóbrega, 2010). Las zonas urbanas a pesar de la actividad antropogénica, albergan una alta riqueza de aves residentes y migratorias, usualmente más tolerantes a los disturbios generados por el ser humano que pueden ser objeto de atracción para personas avifisionadas (Jiménez Moreno & Mendoza Cuamatzi, 2010). Las plazas y jardines de los ambientes urbanos favorecen la conservación de la diversidad de algunos grupos de aves, mientras tengan mayor cobertura vegetal natural (Maragliano, Lucas, Ibañez & Montalti, 2009; Díaz & Armesto, 2003).

Las áreas verdes de la ciudad de Sangolquí albergan varias especies de aves (Jácome & Guarderas, 2010) y algunas de ellas pueden considerarse icónicas. Un ejemplo claro de ello es el monumento de ?El Colibrí?,

que hace referencia al quinde *Colibri coruscans*, ave emblemática muy común para la ciudad y el cantón. En los entornos urbanos, los parques y su biodiversidad asociada, además, proporcionan importantes servicios ecosistémicos tales como la regulación del clima, la oferta de paisajes naturales y oportunidades de recreación (Balvanera, 2012). Reyes & Gutiérrez (2010) y World Trade Organization (2010), mencionan que la calidad ambiental en una ciudad va a depender de la cantidad de árboles existentes, que mantengan la humedad del aire, de tal forma que las áreas verdes urbanas son vitales por los beneficios directos e indirectos que brindan a la comunidad, además de albergar especies de flora y fauna.

También, la observación de aves es una actividad económica sostenible en crecimiento para Ecuador. El aviturismo, como una actividad de observación de las aves con fines recreativos, no precisa manipulación o extracción de las aves de sus hábitats (Ben-Dalia, Collins-Kreiner & Churchman, 2013), y su promoción al interior de la ciudad de Sangolquí podría favorecer simultáneamente la recreación familiar y la conservación biológica (Municipio de Rumiñahui, 2016). En Ecuador son varios los ejemplos en los que el aviturismo se ha convertido en una actividad económica importante que une la recreación y la conservación, en zonas del noroccidente de Pichincha, Loja y Zamora y ciertas áreas de la Costa y Amazonía (Abril & Adela, 2011). Últimamente esta actividad inclusive se ha promocionado notablemente a nivel urbano, a través de los conteos navideños que se hacen en varias ciudades andinas cada año.

En este contexto, el presente trabajo se realizó con el objetivo de cuantificar la riqueza y abundancia de las aves de nueve áreas verdes de Sangolquí, para ampliar la escasa información sobre la diversidad de las aves existentes en esta área urbana. Se espera también sugerir acciones que favorezcan su conservación y la incursión futura en actividades más sostenibles como el aviturismo urbano.

2. Materiales y Métodos

2.1 Área de estudio

El muestreo se realizó al interior de nueve áreas verdes, ubicadas desde el redondel de ?El Choclo? hasta el redondel de ?San Luis?, en la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui (Pichincha, Ecuador), correspondiente al Piso Zoogeográfico Templado (Albuja, Alméndariz, Barriga, Montalvo, Cáceres & Román, 2012). Por su composición botánica, según Sierra (1999), la zona pertenece a la formación Matorral húmedo montano del sector norte y centro de los valles interandinos, aunque la mayor parte de la vegetación natural ha sido reemplazada por especies exóticas ornamentales.




Figura 1

Área de estudio (Fuente: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCan, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community)

2.2 *Inventario de las aves*

Para documentar la riqueza y abundancia de las aves asociadas a los sectores de muestreo se utilizó la metodología de puntos de conteo (Ralph, Geupel, Pyle, Martin, De Santé & Milá 1996). Esta metodología ha sido ampliamente usada en ecosistemas naturales y antropizados del neotrópico para estimar la riqueza, abundancia, composición de especies, índices de importancia y elaborar listados ecológicos (Cerezo, Robbins & Dowell, 2008). En las ciudades, este método ha permitido cuantificar la diversidad de aves y correlacionarla con la mayor o menor cobertura, considerando a las áreas verdes como fragmentos de vegetación natural (Malagamba-Rubio, MacGregor-Fors & Pineda-López, 2013).

En cada sector se estableció un punto de conteo circular con una superficie de muestreo de 2.826 m² (radio= 25 m). Dentro de la superficie de muestreo se contabilizaron todas las aves observadas y detectadas auditivamente durante un lapso de diez minutos. Los puntos de conteo se iniciaron a partir de las 06h30 hasta las 09h30, en días sin lluvia, desde el 11 de noviembre del 2016 hasta el 18 de febrero del 2017. Los registros realizados incluyeron los siguientes datos: la identidad taxonómica del ave a nivel de especie, la frecuencia de individuos avistados, el comportamiento observado, el sustrato y el estrato de perchá. Para la observación de las aves se usaron un par de binoculares Carton 8x30 Field 7.5° y un monocular BAK4/FMC 12 x 50. Las aves fueron identificadas por contraste visual con las guías de aves de McMullan & Navarrete (2013), Ridgely & Greenfield (2006) y Jácome & Guarderas (2010).

En total se establecieron 63 puntos de conteo durante el inventario realizado con un total de 10,5 horas de registro. Cada uno de los nueve sectores fue muestreado a través de siete puntos de conteo (70 minutos de registro).

2.3 Análisis estadístico

A partir de las frecuencias de registro de cada especie se organizó una matriz de datos usando como muestras a cada punto de conteo realizado. A partir de esta matriz fue posible proyectar la curva de acumulación de especies cuyo eje de las x corresponde al número de especies y el eje de las y expresa el esfuerzo de muestreo; además se generó una curva de estimadores no paramétricos de la riqueza, como recomienda Villarreal, Álvarez, Córdova, Escobar, Fagua, Gast, Mendoza, Ospina & Umaña (2006). El estimador no paramétrico de especies utilizado fue Chao 1, que fue calculado con el programa estadístico EstimateS versión 7 (Colwell, 2009), con las opciones preestablecidas del mismo.

Para conocer el porcentaje de cada gremio trófico encontrado en el estudio se realizó una regla de tres simple, tomando en cuenta el número total de individuos y el número de individuos de cada uno de los siete gremios tróficos.

El cálculo de la completitud es un análisis sencillo, útil para verificar si ha sido suficiente el esfuerzo de muestreo y se lo realizó mediante regla de tres simple. Según Martella, Trumper, Bellis, Renison, Giordano, Bazzano & Gleiser (2012), para determinar que un muestreo es eficiente se debe alcanzar al menos un 85% de completitud estimada.

Se realizó además una curva de rango-abundancia para determinar la estructura de la comunidad de aves estudiada. Las especies fueron ordenadas de mayor a menor abundancia y, con base en esta disposición, se obtuvo un perfil de abundancias por rango. En estas curvas, las abundancias se representan en escala logarítmica (en este caso base 10) y presentan la enorme ventaja de facilitar el resumen de gran cantidad de información de interés biológico como indica Whittaker (1972).

3. Resultados

Durante el estudio se registraron un total de 1.010 individuos que corresponden a 29 especies de aves en los 9 sitios del sector de Sangolquí, muestreados. La tórtola *Zenaida auriculata* fue la especie más abundante con un total de 292 individuos, seguida por la golondrina azuliblanca *Pygochelidon cyanoleuca* con 221 individuos, el mirlo *Turdus fuscater* con 164 individuos y el quinde herrero *Colibri coruscans* con 108 individuos (Tabla 1, Anexo 1). Mientras que las especies menos abundantes, con un solo registro fueron el zorzal de Swainson *Catharus ustulatus*, carpintero dorsicarmesí *Colaptes rivolii*, gallinazo negro *Coragyps atratus*, pinchaflor pechicanelo *Diglossa sittoides* y gavilán alicastaño *Parabuteo unicinctus* (Anexo 1).

Tabla 1
Familias y especies encontradas con su respectivo gremio trófico y respectivas abundancias

Familia/Nombre científico	Nombre común	Gremio trófico	Abundancia
Ardeidae			
<i>Bubulcus ibis</i>	Garza bueyera	Insectívoro	3
Cathartidae			
<i>Coragyps atratus</i>	Gallinazo negro	Carroñero	1
Accipitridae			
<i>Parabuteo unicinctus</i>	Gavilán alicastaño	Carnívoro	1
Falconidae			
<i>Falco sparverius</i>	Quilico	Carnívoro	10
Columbidae			
<i>Zenaida auriculata</i>	Tórtola	Granívoro	292
<i>Columba livia</i>	Paloma	Granívoro	26
Patagioenas fasciata	Torcaza	Granívoro	7
Trochilidae			
<i>Colibri coruscans</i>	Quinde herrero	Nectarívoro	108
Lesbia victoriae	Colacintillo colinegro	Nectarívoro	2
<i>Chlorostilbon melanorhynchus</i>	Esmeralda occidental	Nectarívoro	2
Apodidae			
<i>Streptoprocne zonaris</i>	Vencejo cóndor	Insectívoro	3
Picidae			
<i>Colaptes rivolii</i>	Carpintero Dorsicarmesí	Insectívoro	1
Furnariidae			
<i>Synallaxis azarae</i>	Colaespina de Azara	Insectívoro	7
Tytonidae			
<i>Sayornis nigricans</i>	Febe guardarríos	Insectívoro	16
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	Pájaro brujo	Insectívoro	5
Anairetes parulus	Cachudito torito	Insectívoro	4
Elaenia albiceps	Elenia crestiblanca	Insectívoro	2
<i>Campstostoma obsoletum</i>	Mosquerito silbador	Insectívoro	2
Turdidae			
<i>Turdus fuscater</i>	Mirlo	Omnívoro	164
Catharus ustulatus	Zorzal de Swainson	Frugívoro	1
Mimidae			
<i>Mimus gilvus</i>	Sinsonte tropical	Omnívoro	6
Hirundinidae			
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Golondrina Azuliblanca	Insectívoro	221
Orochelidon murina	Golondrina ventricafé	Insectívoro	8
Emberizidae			
<i>Zonotrichia capensis</i>	Gorrión	Granívoro	43
Thraupidae			
<i>Thraupis episcopus</i>	Tangara azuleja	Frugívoro	4
<i>Pipraeidea bonariensis</i>	Tangara azuliamarilla	Frugívoro	2
Diglossa sitoides	Pinchaflor Pechicanelo	Nectarívoro	1
Cardinalidae			
<i>Pheucticus chrysogaster</i>	Huiracchuro	Granívoro	35
Fringillidae			
<i>Euphonia cayocephala</i>	Eufonia lomidorada	Frugívoro	33
Total			1.010

El gremio trófico mejor representado fue el gremio granívoro con el 39.9%, y la especie que más aportó a este porcentaje fue *Zenaida auriculata*. A continuación, sigue el gremio insectívoro, luego el gremio omnívoro con sus especies más representativas tales como *Pygochelidon cyanoleuca* y *Turdus fuscater*, respectivamente (Tabla 1). Los grupos menos abundantes fueron los carroñeros y carnívoros con el 0.1% y 1.1% como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2
Porcentaje de los gremios tróficos

Gremios Tróficos	Número de individuos	% Total
Carroñeros	1	0.1
Carnívoros	11	1.1
Frugívoros	40	4.0
Nectarívoros	113	11.2
Omnívorus	170	16.8
Insectívorus	272	26.9
Granívorus	403	39.9
Total	1010	100.0

La figura 2 muestra la curva de acumulación de especies asintóticas con un total de 29 especies mientras que con el estimador estadístico Chao 1 predice una cifra de 31 especies de aves potencialmente existentes en los sitios de muestreo. Se estimó la completitud alcanzada en un 93.54%, por lo que podemos afirmar que el muestreo de las aves fue adecuado.




Figura 2
Riqueza potencial de aves en los sitios de muestreo.

Como se muestra en la figura 3, las familias más abundantes durante el estudio fueron Columbidae, Hirundinidae, Turdidae y Trochilidae, mientras que las menos abundantes fueron Picidae y Accipitridae con un solo individuo para cada familia.




Figura 3
Abundancia de individuos por familias zoológicas.

En cuanto a la riqueza de especies de la figura 4, la familia predominante fue Tyraeniidae con 5 especies, seguida de Columbidae, Thraupidae y Trochilidae con 3 especies para cada familia mientras que las familias restantes únicamente registraron 1 o 2 especies.




Figura 4.
Riqueza de especies por familia.

Las especies más abundantes fueron *Zenaida auriculata*, *Pygochelidon cyanoleuca*, *Turdus fuscater* y *Colibri coruscans*, mismas que son relativamente fáciles de observar en los sectores de muestreo, a diferencia de especies muy raras como *Catharus ustulatus*, *Colaptes rivolii*, *Coragyps atratus* y *Parabuteo unicinctus* como se muestra en la figura 5.




Figura 5.
Curva de rango-abundancia o de Whittaker.

4. Discusión

Los parques de Sangolquí representan áreas importantes para la supervivencia de las aves locales, abarcando entre 8 y 13 especies en cada parque, con un total de 29 especies registradas, cifra relativamente alta si se contrasta con el estudio realizado por Montenegro-Pazmiño (2015) sobre la diversidad de aves en áreas verdes de la ciudad de Quito, en donde se encontraron 59 especies, tomando en cuenta que los parques muestreados en Quito presentan extensiones mucho más grandes como es el caso de los parques La Carolina, Metropolitano y Las Cuadras.

Existen factores que influyen directamente sobre variaciones de diversidad en la avifauna, como la altura a nivel del mar (Blake & Loiselle, 2000), factor ligado a la complejidad estructural vegetal del sitio. Garitano-Zavala & Gismondi (2003) mencionan que la cobertura vegetal evidencia con mayor claridad esta variación faunística, ya que ambos factores señalados determinan una mayor diversidad de recursos alimenticios y hábitats usados por las aves, debido a que la distribución de las especies obedece a cambios en la vegetación y a movimientos temporales de las aves modificados según la disponibilidad del alimento (Ramírez-Albores, 2006). En un estudio realizado por Blake & Loiselle (2001) se concluyó que a medida que las tasas de producción de follaje, flores y frutos en ecosistemas son más altas, la riqueza y abundancia avifaunística también incrementarán. El análisis general de la vegetación a lo largo del estudio ayuda mucho a explicar la presencia o ausencia, aumento o declive de ciertas especies. El área de estudio posee tres estratos vegetales (herbáceo, arbustivo y dosel), cada uno con sus respectivas características, y factores que favorecen la presencia de ciertas especies dentro del área.

Las especies sinantrópicas encontradas en este trabajo fueron *Zenaida auriculata*, *Pygochelidon cyanoleuca*, *Turdus fuscater*, *Colibri coruscans* y *Zonotrichia capensis*, que son generalistas y no requieren de hábitats muy específicos. Estas especies concuerdan con las encontradas por Garitano-Zavala & Gismondi (2003) en su estudio desarrollado en las áreas verdes

urbanas de las ciudades de La Paz y El Alto (Bolivia) y con el de Montenegro-Pazmiño (2015), donde se reporta que las especies poco comunes se encuentran en parques que contienen pequeños parches de matorral o bosque que pueden proporcionar otro tipo de recursos para aquellas aves menos frecuentes. Dentro de las especies raras encontradas en los sectores estudiados se registró a *Catharus ustulatus*, *Colaptes rivolii*, *Coragyps atratus* y *Parabuteo unicinctus*, especies que poseen un extenso rango migratorio o son de amplia dispersión (Ridgely & Greenfield, 2006) y que usualmente son raras de registrar. La falta de datos específicos de la preferencia de hábitat de cada individuo registrado y la variación de la riqueza en cada uno de los sitios de estudio podría ser explicada en términos tróficos.

Los análisis realizados muestran que se alcanzó un 93.54% de todas las especies esperadas en el área, lo que hizo de este trabajo un estudio representativo, dado que el esfuerzo de muestreo ha sido suficiente para registrar el número de especies potencialmente existentes para los parques de Sangolquí; mientras que la curva de rango-abundancia o de Whittaker muestra la existencia de numerosas especies codominantes y pocas especies raras, en concordancia con lo mencionado en el estudio de Trávez & Yáñez (2017), acerca de la diversidad y abundancia de avifauna urbana en el campus de la UIDE y el Parque Metropolitano Guangiúltagua, como áreas verdes igualmente antropizadas.

Los gremios tróficos encontrados responden a los diferentes recursos disponibles en cada uno de los parques. Al parecer, las especies sinantrópicas como *Zenaida auriculata*, *Zonotrichia capensis*, *Pheucticus chrysogaster*, *Columba livia* (granívoras), *Pygochelidon cyanoleuca* (insectívora), *Turdus fuscater* (omnívora), *Colibri coruscans* (nectarívoro) y *Falco sparverius* (carnívoro) son las que más aportan en el porcentaje total encontrado para su respectivo gremio trófico (Montenegro-Pazmiño, 2015). El bajo porcentaje de carnívoros y carroñeros podría estar relacionado a ciertos factores como la antropización del área de los parques, requerimientos de presas más grandes y la biología propia de estas especies (Berget, 2006).

Varias especies como *Euphonia cyanocephala* (frugívora), *Chlorostilbon melanorhynchus* y *Diglossa sitoides* (nectarívoros) están más asociados a un tipo de vegetación arbustiva y aprovechan estos pequeños parches de matorrales para su forrajeo (Arteaga, 2017). Finalmente, la diversidad de gremios tróficos aporta al equilibrio ecosistémico y dicha diversidad puede variar dependiendo de la fenología de las especies vegetales durante el año.

5. Conclusiones

Estudios como el realizado son importantes ya que permiten entender cómo los parques urbanos son espacios importantes que contribuyen a la riqueza y abundancia de las aves en las ciudades. Adicionalmente a ello, es fundamental tomar en cuenta variables tales como el tipo de vegetación y la edad de la misma, que proporcionan sustento a la avifauna local proveyendo sustratos de nidificación y recursos alimenticios (René,

Marti, Ibáñez & Montalti, 2009). Otro factor de análisis a considerar es el reemplazo o eliminación de la vegetación natural que incrementa en las ciudades las poblaciones de aves oportunistas, sean éstas introducidas o nativas sinantrópicas. En el caso de este estudio, las especies sinantrópicas fueron *Columba livia*, *Zonotrichia capensis*, *Turdus fuscater* y *Zenaida auriculata*, que han sido registradas prácticamente en todas las áreas verdes prospectadas y que además son las especies únicas o dominantes en la mayoría de las zonas de registro, al igual que lo encontrado en otras ciudades andinas (Garitano-Zavala & Gismondi, 2003).

En este contexto, se considera fundamental que en el diseño, implementación o readecuación de los parques urbanos de Sangolquí, se considere la conservación o restauración del paisaje natural, manteniendo intacta la vegetación boscosa y arbustiva. Este tipo de desarrollo ayudaría a conservar e incrementar la valiosa biodiversidad avifaunística existente, la que constituye un valor recreativo agregado para los parques urbanos (Caula, Giner & de Nóbrega (2010). La promoción de la conservación a largo plazo de las aves urbanas encontradas permitiría promover el conocimiento de la avifauna autóctona de parte de los habitantes del cantón Rumiñahui y generar inclusive opciones novedosas de aviturismo urbano.

Agradecimientos

Agradecemos a Carlos Andrés Valle por facilitarnos el mapa del área de estudio, a Nelson Monteros por colaborar con la fotografía de *Catharus ustulatus* incluida en el catálogo fotográfico, y a Iván Jácome Guarderas por su participación durante la fase de campo del presente estudio.

Anexos



Anexo 1.

Aves comunes y raras de las áreas verdes de Sangolquí, Ecuador.

Fotos: Iván Jácome Negrete (IJ); Diana Rocha (DR); Nelson Monteros(NM).

1. *Coragyps atratus* (IJ) Gallinazo negro CATHARTIDAE Raro



2. *Parabuteo unicinctus* (IJ)

Gavilán alicastaño ACCIPITRIDAE Raro



**3. *Zenaidura auriculata* (IJ) Tórtola COLUMBIDAE
Común**



**4. *Pygochelidon cyanoleuca* (IJ)
Golondrina azuliblanca HIRUNDINIDAE Común**



5. Colibrí coruscans (IJ)
Quinde herrero TROCHILIDAE Común



6. Turdus fuscater (IJ)
Mirlo TURDIDAE Común



7. *Catharus ustulatus* (NM)
Zorzal de Swainson TURDIDAE Raro



8. *Colaptes rivolii* (DR)
Carpintero dorsicarmesí PICIDAE Raro



9. *Pheucticus chrysogaster* (IJ)
Huiracchuro CARDINALIDAE Común

Referencias

- Abril, A., & Adela, S. (2011). Diseño de un producto de aviturismo y desarrollo de estrategias para su fortalecimiento en el cantón Patate, provincia de Tungurahua. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
- Albuja, L., Almendáriz, A., Barriga, R., Montalvo, D. Cáceres, F., & Román, J. (2012). Fauna de Vertebrados del Ecuador. Ecuador: Escuela Politécnica Nacional.
- Arteaga, W. (2017). Diversidad de aves del campus universitario de la Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. Siembra, 4(1),172-182.
- Balvanera, P. (2012). Los servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques tropicales. Ecosistemas, 21(1-2), 136-147.
- Ben-Dalia, S., Collins-Kreiner, N., & Churchman, A. (2013). Evaluation of an Urban Tourism Destination. *Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment*, 15(2), 233-249.
- Berget, C. (2006). Efecto del tamaño y la cobertura vegetal de parques urbanos en la riqueza y diversidad de la avifauna de Bogotá, Colombia. *Gestión y Ambiente*, 9(2), 45-60
- Blake, J., & Loiselle, B. (2000). Diversity of birds along an Elevational Gradient in the Cordillera Central, Costa Rica. *The Auk: Ornithological Advances*, 117(3), 663-686.
- Blake, J. G., & Loiselle, B. A. (2001). Bird assemblages in second-growth and old-growth forest, Costa Rica: Perspectives from mist nets and point counts. *The Auk: Ornithological Advances*, 118(2), 304-326. <https://doi.org/10.2307/4089793>
- Caula, S., Giner, S., & De Nóbrega, J. (2010). Aves urbanas: un estudio comparativo en dos parques tropicales con diferente grado de intervención humana (Valencia, Venezuela). *FARAUTE de Ciencias y Tecnología*, 5(2), 1-13.
- Cerezo, A., Robbins, Ch. & Dowell, B. (2008). Uso de hábitats modificados por aves dependientes de bosque tropical en la región caribeña de Guatemala. *Revista Biología Tropical*, 57(1-2), 401-419.

- Cisneros-Heredia, D., Amigo, X., Arias, D., Arteaga, J., Bedoya, J., Espinosa, S., Montenegro, E., Nazati, G. & Carrión, J. (2015). Reporte del 1er conteo navideño de aves de Quito, Ecuador. Revista Avances en Ciencias e Ingenierías, 7 (2), B37-B51.
- Colwell, R. K. (2009). Estimates: statistical estimation of species richness and shared species from samples. Version 8.2. Users Guide and Application Published at [Http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates/](http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates/)
- Díaz, I. & Armesto, J. (2003). La conservación de las aves silvestres en ambientes urbanos de Santiago. Revista Ambiente y Desarrollo de CIPMA XIX, (2), 31-38.
- eBird. (2012). eBird: An online database of bird distribution and abundance (web application). Obtenido de: <https://ebird.org/home>
- Freile, J. F., Brinkhuizen, D. M., Greenfield, P. J., Lysinger, M., Navarrete, L., Nilsson, J., & Boyla, K. A. (2018). Lista de las aves del Ecuador. Checklist of the Birds of Ecuador. Comité Ecuatoriano de Registros Ornitológicos. Obtenido de: <https://ceroecuador.wordpress.com/>
- García, M., Parra, D., & Mena, P. (2014). El país de la biodiversidad: Ecuador. Quito: Fundación Botánica de los Andes, Ministerio del Ambiente y Fundación Ecofondo.
- Garitano-Zavala, A., & Gismondi, P. (2003). Variación de la riqueza y diversidad de la ornitofauna en áreas verdes urbanas de las ciudades de La Paz y El Alto (Bolivia). Ecología en Bolivia, 38(1), 65-78.
- Herrera, S., & Lasso, S. (2014). Belleza y colorido de las aves, una experiencia incomparable en Mindo. Kalpana, 12, 6-12.
- Jácome, I., & Guarderas, L. (2010). Lista preliminar de las aves del cantón Rumiñahui, Pichincha, Ecuador. Ecuador: Corporación para la conservación de la biodiversidad SISAMUNA. Sangolquí, 7.
- Jiménez, Moreno, F. & Mendoza Cuamatzi, R. (2010). Aves urbanas en ciudad universitaria de la BUAP. Revista Elementos, 79, 23-27.
- Lara, A. (2015). Diseño de un sistema de conservación para el cantón Rumiñahui. Universidad Técnica Particular de Loja, Loja.
- Malagamba-Rubio, A., MacGregor-Fors, I., & Pineda-López, R. (2013). Comunidades de aves en áreas verdes de la ciudad de Santiago de Querétaro, México. Ornitología Neotropical, 24, 371-386.
- Maragliano, R., Martí, L., Ibáñez, L. & Montalti, D. (2009). Comunidad de aves urbanas de Lavallol, Buenos Aires, Argentina. Acta Zoológica Lilloana, 53(1-2), 108-114.
- Martella, M., Trumper, E., Bellis, L., Renison, D., Giordano, P., Bazzano, G., & Gleiser, R. (2012). Manual de ecología - Evaluación de la biodiversidad. Reduca (Biología). Serie Ecología, 5(1), 71-115.
- McMullan, M., & Navarrete, L. (2013). Fieldbook of the Birds of Ecuador including the Galápagos Islands. Ecuador: Fundación de Conservación Jocotoco.
- Mindo Cloudforest Fundation. (2010). Actualización de la Estrategia Nacional de Aviturismo. Obtenido de: <http://suia.ambiente.gob.ec/documents/783967/890253/Actualización+de+la+Estrategia+Nacional+de+Aviturismo>. PDF/0f436463-c0c7-43c7-b024-395a7515f1f9

- Montenegro-Pazmiño, E. C. (2015). Diversidad de aves en áreas verdes de la ciudad de Quito, Ecuador. Universidad San Francisco de Quito.
- Municipio de Rumiñahui. (2016). Línea de tiempo, Rumiñahui 1938-2016. Obtenido de: http://www.ruminahui.gob.ec/images/d/2016/06/Linea_de_Tiempo.pdf
- Ralph, J. C., Geupel, G. R., Pyle, P., Martin, T. E., De Sante, D. F., & Milá, B. (1996). Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres. General Technical Report PSW-GTR- 159-Web. <https://doi.org/10.2737/PSW-GTR-159>
- Ramírez-Albores, J. E. (2006). Variación en la composición de comunidades de aves en la Reserva de la Biosfera Montes Azules y áreas adyacentes, Chiapas, México. *Biota Neotropica*, 6 (2), 1-19. <https://doi.org/10.1590/S1676-06032006000200019>
- René, E., Martí, L. J., Ibañez, L. M., & Montalti, D. (2009). Comunidades de aves urbanas de Lavallol, Buenos Aires, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana*, 53(1-2), 108-114.
- Reyes, I., & Gutiérrez, J. (2010). Los servicios ambientales de la arborización urbana: retos y aportes para la sustentabilidad de la ciudad de Toluca. *Quivera. Revista de Estudios Territoriales*, 12 (1), 96-102.
- Ridgely, R. S., & Greenfield, P. J. (2006). Aves del Ecuador: guía de campo (Vol. 1). Quito, Ecuador: Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia y Fundación de Conservación Jocotoco.
- Sierra, R. (1999). Propuesta preliminar de un sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador continental. Quito: Proyecto INEFAN/GEF-BIRF y EcoCiencia. <https://doi.org/10.13140/2.1.4520.9287>
- Trávez, J. J., & Yáñez, P. M. (2017). Diversidad y abundancia de avifauna en el campus de la UIDE y el Parque Metropolitano Guangüiltagua, Distrito Metropolitano de Quito, recomendaciones para su conservación. *Boletín Técnico 13, Serie Zoológica*, 12-13, 53-69.
- Villarreal, H., Álvarez, M., Córdova, S., Escobar, F., Fagua, G., Gast, F., Mendoza, H., Ospina, M., & Umaña, A. (2006). Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad. Colombia: Programa de inventarios de biodiversidad. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
- Whittaker, R. H. (1972). Evolution and Measurement of Species Diversity. *Taxon*, 21(2/3), 213- 251. <https://doi.org/10.2307/1218190>.
- World Trade Organization. (2010). World Trade Report 2010 Trade in natural resources. Obtenido de: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr10_e.htm

Notas de autor

eahidalgo@uce.edu.ec