



ORINOQUIA

ISSN: 0121-3709

Instituto de Investigaciones de la Orinoquia Colombiana

López-Macías, Jorge N; Salas-Benavides, Julbrinner
Comparación fisicoquímica y biológica entre efluentes de la producción de trucha
arcoíris y la condición limnológica del Lago Guamuez, departamento de Nariño
ORINOQUIA, vol. 23, núm. 2, 2019, Julio-Diciembre, pp. 87-96
Instituto de Investigaciones de la Orinoquia Colombiana

DOI: 10.22579/20112629.572

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89662922010>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

UAEH  redalyc.org

Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso
abierto

Orinoquia, Julio-Diciembre 2019;23(2):87-96

ISSN electrónico 2011-2629.

ISSN impreso 0121-3709.

<https://doi.org/10.22579/20112629.572>

Comparación fisicoquímica y biológica entre efluentes de la producción de trucha arcoíris y la condición limnológica del Lago Guamuez, departamento de Nariño

Physicochemical and biological comparison between effluents from rainbow trout production and the limnological condition of Lake Guamuez, department of Nariño

Comparação físico-química e biológica entre efluentes da produção de trutas arco-íris e as condições limnológicas do lago Guamuez, departamento de Nariño

Jorge N López-Macías^{1}; Julbrinner Salas-Benavides^{2*}*

¹ MVZ, MSc, PhD;

² Biol, MSc, (c)PhD

* Departamento de Recursos Hidrobiológicos; Facultad de Ciencias Pecuarias, Universidad de Nariño, Pasto, Colombia.
Email: jorgelopezmacias@gmail.com

Recibido: 01 de agosto de 2019

Aceptado: 01 de noviembre de 2019

Resumen

El estudio de lagos como fuentes de recursos naturales de diversa índole constituye una preocupación de entidades que regulan su manejo en conservación y producción sostenible en interacción de factores bióticos y abióticos que afectan el ecosistema. En consecuencia, éste proyecto puede generar información científica permanente para un plan de ordenamiento de la cuenca del lago Guamuez en cumplimiento de compromisos internacionales y nacionales en la conservación del humedal La Cocha. La presente investigación mediante 12 muestreos periódicos en cinco estaciones: 1. Intiyaco (E1), zona superficial (A) y zona profunda (B); las siguientes estaciones se ubicaron a partir de E1; estación 2. 50 metros (C); 3. 100 metros (D); 4. 150 metros (E) y 5. Centro del lago (F), análisis de varianza, prueba de normalidad y correlación, pretendió evaluar el efecto de las explotaciones acuícolas en jaulas flotantes sobre las variables fisicoquímicas y biológicas del lago Guamuez. La condición limnológica, presentó diferencias significativas entre aguas superficiales y profundas (respectivamente NH-N y DB, con P-PO, DQ, Colif_t y Colif_f); el pH y NTU en A y B, difieren de los demás sitios evaluados. Existe mayor concentración ($P < 0,05$) de OD y %O en estación 3. En el año 2008 las estaciones 1 y 5 señalan mayor media en la

Como Citar (Norma Vancouver):

López-Macías JN, Salas-Benavides J. Comparación fisicoquímica y biológica entre efluentes de la producción de trucha arcoíris y la condición limnológica del Lago Guamuez, departamento de Nariño. Orinoquia, 2019; 23(2):87-96. DOI:<https://doi.org/10.22579/20112629.572>

estimación de OD, pH, Dur y DB y para el año 2018, aumentó los parámetros limitantes hacia el centro del lago (NH-N, P-PO, NTU y Colif_t); así, el 70% de los parámetros de evaluación en el proyecto Intiyaco, aumentaron su estimación media entre los años 2008 y 2018 (DB, OD y %O). La concentración de *E. coli* presenta mayor media ($P<0,05$) en B y difiere de A, C, D, E y F; mientras fosfatos y Colif_t difieren ($P<0,05$) entre A y las estaciones B, C, D, E y F.

Palabras clave: productividad primaria; coliformes; calidad de agua; deterioro ambiental

Abstract

The study of lakes as sources of natural resources of various kinds constitutes a concern of entities that regulate their management in conservation and sustainable production in interaction of biotic and abiotic factors that affect the ecosystem. Consequently, this project can generate permanent scientific information for a management plan for the Guamuez Lake basin in compliance with international and national commitments in the conservation of the La Cocha wetland. The present investigation by means of 12 periodic sampling in five stations: 1. Intiyaco (E1), superficial zone (A) and deep zone (B); the following stations were located from E1; station 2. 50 meters (C); 3. 100 meters (D); 4. 150 meters (E) and 5. Center of the lake (F), analysis of variance, normality test and correlation, sought to evaluate the effect of aquaculture farms in floating cages on the physicochemical and biological variables of Lake Guamuez. The limnological condition showed significant differences between surface and deep waters (respectively NH-N and DB, with P-PO, DQ, Colif_t and Colif_f); the pH and NTU in A and B, differ from the other sites evaluated. There is a higher concentration ($P<0,05$) of OD and %O in station 3. In 2008, stations 1 and 5 show a higher average in the estimation of OD, pH, Dur and DB and for 2018, the parameters increased limiting towards the center of the lake (NH-N, P-PO, NTU and Colif_t); Thus, 70% of the evaluation parameters in the Intiyaco project increased their average estimate between 2008 and 2018 (DB, OD and %O). The concentration of *E. coli* has a higher mean ($P<0,05$) in B and differs from A, C, D, E and F; while phosphates and Colif_t differ ($P<0,05$) between A and stations B, C, D, E and F.

Key words: primary productivity; coliforms; water quality; environmental deterioration

Resumo

O estudo de lagos como fontes de recursos naturais de vários tipos constitui uma preocupação de entidades que regulam seu manejo na conservação e produção sustentável na interação de fatores bióticos e abióticos que afetam o ecossistema. Consequentemente, este projeto pode gerar informações científicas permanentes para um plano de manejo da bacia do lago Guamuez, em conformidade com os compromissos internacionais e nacionais na conservação do pantanal de La Cocha. A presente investigação por meio de 12 amostragens periódicas em cinco estações: 1. Intiyaco (E1), zona superficial (A) e zona profunda (B); as seguintes estações foram localizadas a partir da E1; estação 2. 50 metros (C); 3. 100 metros (D); 4. 150 metros (E) e 5. Centro do lago (F), análise de variância, teste de normalidade e correlação, procuraram avaliar o efeito de fazendas de aquicultura em gaiolas flutuantes nas variáveis físico-químicas e biológicas do lago Guamuez. A condição limnológica mostrou diferenças significativas entre águas superficiais e profundas (respectivamente NH-N e DB, com P-PO, DQ, Colif_t e Colif_f); O pH e NTU em A e B diferem dos demais locais avaliados. Há uma maior concentração ($P<0,05$) de DO e %O na estação 3. Em 2008, as estações 1 e 5 apresentam uma média mais alta na estimativa de DO, pH, Dur e DB e, para 2018, os parâmetros aumentaram limitando em direção ao centro do lago (NH-N, P-PO, NTU e Colif_t); Assim, 70% dos parâmetros de avaliação no projeto Intiyaco aumentaram sua estimativa média entre 2008 e 2018 (DB, OD e %O). A concentração de *E. coli* tem uma média mais alta ($P<0,05$) em B e difere de A, C, D, E e F; enquanto os fosfatos e Colif_t diferem ($P<0,05$) entre A e as estações B, C, D, E e F.

Palavras chave: produtividade primária; coliformes; qualidade da água; deterioração ambiental

Introducción

La población mundial, aún en países en desarrollo, está sufriendo un rápido cambio hacia la urbanización, lo que hace que el hombre haya llegado a ser más dependiente del suministro comercial de alimento a través de mercados organizados, que intervengan en la cadena de seguridad alimentaria. Lo anterior, incrementa la presión sobre los recursos naturales, sobretudo en aguas continentales y marinas; los cuales son altamente susceptibles a la contaminación y que han obligado a las pesquerías naturales a disminuir, pese a su gran potencial aún

inexplotado y que han desempeñado un papel importante en la generación, no sólo de alimentos, sino también de divisas. El deterioro del medioambiente y especialmente en el lago Guamuez, es causado principalmente por las descargas de basuras y aguas residuales domésticas, provenientes de la población El Encano. La deforestación intensa de los bosques naturales de la cuenca y la sustitución de estos por actividades agrícolas y ganaderas que erosionan los suelos e incrementan la cantidad de sólidos disueltos en el lago Guamuez, deteriora el hábitat de los peces, dificulta la alimentación de

especies ícticas bentónicas, aumentan la turbidez (NTU) y disminuyen el oxígeno disuelto, lo cual afecta mecánicamente los procesos de respiración, visión y olfato de los peces y por ende, la respuesta inmunológica, haciéndolos más susceptibles a la ruptura de la relación mutual con los parásitos, los cuales causan la enfermedad. (Gilmore *et al.*, (2010); Rábago-Castro (2010); Rubio-Godoy *et al.*, (2012). De esta manera, la truchicultura, frente a formas de producción como la agricultura y agroforestería, incentiva el manejo adecuado de las fuentes de agua, la conservación de los bosques primarios, el manejo adecuado de las cuencas hidrográficas, uso integral y el manejo racional de las materias primas y recursos locales, aumenta la productividad, reduce los costos unitarios de producción e incorpora valor agregado. Así mismo, la acuicultura, adquirió gran importancia dentro del sistema alimentario por la producción de bienes de gran relevancia desde el punto de vista nutricional y alcanzar áreas deprimidas o de mediano desarrollo, donde puede originar una serie de actividades conexas como la pesca deportiva y el turismo ecológico que estimulan el crecimiento económico. Los cultivos piscícolas, aprovechan económicamente el agua para la producción de proteína animal en sistemas de alta densidad en volúmenes pequeños; condiciones que favorecen la propagación de enfermedades por la acumulación de metabolitos y deterioro de condiciones fisicoquímicas (oxígeno, solubilización y/o precipitación de materia orgánica, pH, temperatura) y bacteriológicas del medio acuático, generando grandes pérdidas económicas cuando alteran las variables de incremento de peso, talla, conversión alimenticia y sobrevivencia que justifica tomar medidas para prevenir esos detrimentos. La presencia de agentes patógenos y huéspedes apropiados favorecen la aparición de enfermedades, frente a lo cual el piscicultor utiliza gran cantidad de medicamentos y químicos (representan hasta el 10% de los costos), generando, no sólo resistencia de los microorganismos, sino también la destrucción del fitoplancton y por ende, la alteración total de la productividad primaria del medio acuático (López *et al.*, (2005); López (2014). Acorde a lo anterior, esta investigación realizó un diagnóstico del estado fisicoquímico y biológico de las descargas provenientes de la producción de trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) de la estación piscícola Intiyaco en el lago Guamuez, sobre el mismo sistema, con el fin de establecer la correlación que existe entre estos parámetros y la biota nativa y así definir su papel limitante en la condición limnológica la-

custre y afianzar una política de intervención sobre los sistemas ícticos productivos efluentes. Los resultados contribuirán a establecer las condiciones favorables en la productividad natural del sistema lacustre y a fortalecer el rendimiento somático que requiere las empresas piscícolas de la región cuyo establecimiento ha representado para sus moradores seguridad alimentaria sin detrimento de la relación enteramente dinámica: el hombre, las demás especies y el hábitat que define un sistema ecológico.

Materiales y métodos

Localización

El presente estudio se realizó en el Lago Guamuez, corregimiento El Encano, ubicado a 25 kilómetros al oriente la ciudad de San Juan de Pasto, departamento de Nariño; coordenadas geográficas 1°06'42,53" latitud Norte y 77°08' 29,15" longitud Oeste, altura en cota máxima y mínima 2,850 msnm y 2,745 msnm; temperatura ambiental media 11,6°C (variaciones 6 y 14°C), humedad relativa 86%, brillo solar 898,2 horas anuales y precipitación pluvial 1.371 mm anuales; volumen aproximado 1700 hm³ y tiempo de residencia estimado en 6,22 años. (CORPONARIÑO 2014).

Análisis físico y químico del sistema lenítico

La investigación alcanzó doce muestreos (bimestral), en cinco sitios (tres réplicas); cuatro de ellos, fueron puntos del lago seleccionados de acuerdo a la dirección del viento vía centro del sistema lacustre, ubicados cada 50 m después de la estación Piscícola Intiyaco (E1), hasta 150 (E) y finalmente centro del lago (F) a 450 m, designada como control, merced al deslindamiento de la producción acuícola autorizada por Corpanariño, realizados durante 24 meses abarcando las épocas de máxima y mínima precipitación, seleccionados para la estimación física, química y microbiológica (Colif_t y Colif_f). El disco Secchi (Secchi PA 1865), se utilizó para medir la transparencia Secchi (ZSD), que define la Zona Fótica y Afótica expresada en metros; la Profundidad de la Zona Fótica se consiguió multiplicando ZSD por la constante de Pool y Atkins (2,7).

Los parámetros estimados y analizados en mg/l, correspondieron a Oxígeno disuelto (OD), saturación de oxígeno (%O), DBO₅ (DB), DQO (DQ), CO₂ (CO), Alcalinidad (Alc), NTU, Dureza (Dur), Nitrógeno amoniacal (NH-N) y Fosfatos (P-PO); y con sus pro-

pías unidades la Temperatura (T en °C), pH [H⁺], Zonas Fótica – Afótica (m) y Coliformes fecales (Colif_f) y Coliformes totales (Colif_t) en UFC.

La caracterización fisicoquímica se realizó en las aguas superficiales y profundas (varía de acuerdo al régimen pluviométrico) de los sitios de muestreo; para tal efecto, se tomó 2 L de muestras con botella tipo Van Dorn, un litro se destinó al análisis fisicoquímico y el otro en la caracterización biológica. *In situ* se estimó mediante equipo electrométrico, los parámetros: T, OD, CO, pH, Alc, NTU y Dur; Zonas Fótica y Afótica (Hela y Laveastu, (1961)); los demás parámetros químicos ya descritos, se estimaron por Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater en los Laboratorios Especializados y Laboratorio de Calidad de Aguas para Acuicultura del Programa de Ingeniería Acuicola de la Universidad de Nariño.

Análisis estadístico

La investigación es cuantitativa y por el objetivo es descriptiva, explicativa y longitudinal, aplicación de prueba de hipótesis (Comparativa) y correlaciones para definir o determinar relación causal o de dependencia entre variables abióticas (fisicoquímicas) y bióticas (Colif_f y Colif_t), nivel de significancia $\alpha = 0,05$ (5%), procesadas en el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 20.

Resultados

Condición física y química

El análisis descriptivo de la condición fisicoquímica y biológica del lago Guamuez en correlación con la Estación Piscícola Intiyaco, permite definir que la media de compuestos altamente eutroficantes como P-PO y NH-N, el coeficiente de relación se estableció en 1:54, significando entonces que por cada mg/L de P-PO, la concentración NH-H sería 54 mg/L; este mismo análisis entre DB y DQ señaló un indicador de 1:5,6, y finalmente 1:16,9 para Colif_f y Colif_t. (Tabla 1).

La condición física asociada a los efluentes truchícolas de la Estación Piscícola Intiyaco en relación con la absorción de la energía lumínica en el sistema Lago Guamuez permitieron inferir la existencia de diferencias significativas desde ésta producción que aporta material particulado de origen fecal y alimentos, los cuales se van disipando hasta el centro del lago, mejorando así su penetrabilidad (33,5 m). (Tabla 1).

De otro lado, la caracterización química del sistema Estación Piscícola Intiyaco en comparación con el control (E), definió diferencias significativas ($P < 0,05$); se destaca la mayor media en aguas superficiales sobre aguas profundas en los parámetros NTU, NH-N y mejor media de aguas profundas sobre aguas superficiales y el centro del lago en la condición de Colif_f, Colif_t y

Tabla 1. Anova. Comparaciones múltiples. Condición fisicoquímica y biológica. Lago Guamuez - Estación Piscícola Intiyaco.

Parámetro	A	B	C	D	E	F
pH	7,1 ^a	71 ^a	7,0 ^b	6,7 ^c	6,8 ^d	6,6 ^e
NTU mg/l	198,9 ^a	198,3 ^b	198,0 ^c	197,6 ^d	197,2 ^e	41,7 ^f
Zona Fótica m	4,2 m ^f	7,50 m ^e	16,7 ^d	23,8 m ^c	30,0 m ^b	33,5 ^a
OD mg/l	5,7 ^e	5,65 ^e	5,8 ^d	5,87 ^c	5,93 ^b	6,53 ^a
Dur mg/l	23,3 ^e	23,0 ^e	30,3 ^a	29,3 ^b	28,0 ^c	26,1 ^d
Alc mg/l	15,6 ^e	15,4 ^e	23,4 ^a	20,7 ^b	18,7 ^c	17,6 ^d
NH-N mg/l	3,23 ^a	3,12 ^b	3,10 ^c	3,10 ^c	3,10 ^c	3,00 ^d
Colif _f UFC	55,043 ^b	100 ^a	55,5 ^b	53,3 ^b	51,6 ^b	49,9 ^b
Colif _t UFC	931,043 ^b	1466,7 ^a	900,076 ^b	837,34 ^b	789,89 ^b	750,38 ^b
P-PO mg/l	0,060 ^b	0,2250 ^a	0,0193 ^c	0,0186 ^c	0,0175 ^c	0,0164 ^c

a, b, c, d, e, f. significación estadística.

Tabla 2. Anova. Comparaciones múltiples. Condición fisicoquímica y biológica. Aguas superficiales y profundas Estación Intiyaco.

Parámetro	A (Superficiales)	B (Profundidad)
pH	7,1 ^a	7,1 ^a
NTU mg/l	198,9 ^a	198,7 ^a
Zona Fótica m	4,2 m ^a	7,50 m ^b
OD mg/l	5,7 ^a	5,65 ^a
Dur mg/l	23,3 ^a	23,0 ^a
Alc mg/l	15,6 ^a	15,4 ^a
P-PO mg/l	0,060 ^b	0,2250 ^a
NH-H mg/l	3,23 ^a	3,12 ^b
DB mg/l	4,0 ^a	2,29 ^b
DQ mg/l	22,57 ^b	27,435 ^a
Colif _{UFC/100 mL⁻¹}	931,043 ^b	1466,7 ^a
Colif _{UFC/100 mL⁻¹}	55,043 ^b	100 ^a

a, b. significación estadística.

P-PO, que presento mayor media en la variable OD. (Tabla 1).

La presencia de Colif_r y Colif_t, entre las estaciones permitió determinar diferencias significativas ($P < 0,05$) en esta condición biótica referida al sistema Lago Guamuez y las aguas superficiales y profundas de la

Estación Intiyaco. El estudio develó mayor media de Colif_r y Colif_t en aguas profundas que supera respectivamente en 57,5 y 81,6% en relación a las aguas superficiales. (Tabla 2).

La prueba de significancia estadística, aplicada para la condición limnológica del Lago Guamuez incluido los efluentes de la producción piscícola Intiyaco, presentó diferencias significativas ($P < 0,05$) en pH ($\bar{X} = 7,1$) y NTU ($\bar{X} = 198,9$) en las zonas de muestreo C, D, E y F, y no así en aguas superficiales y profundas del sistema truchícola de evaluación; mientras que los parámetros OD ($\bar{X} = 5,7$), Dur ($\bar{X} = 23,3$) y Alc ($\bar{X} = 15,6$) aparecen con menor media en estas aguas. La concentración de NH-N ($\bar{X} = 0,4462$) presenta mayor media en aguas superficiales y disminuye su concentración por litro en la medida que las aguas se distancian del proyecto de Intiyaco (A, C, D, E y F; por su parte, P-PO ($\bar{X} = 0,2250$) con mayor media en aguas superficiales del sistema de producción de *O. mykiss*, se reducen hacia el fondo de la misma y una vez las aguas se evalúan después de Intiyaco hacia el centro del lago (B, C, D, E y F), como aparece en la Figura 1.

Comunidad microbológica

La comunidad microbiana del Lago Guamuez inferida desde los componentes enterobacteriales coliformes durante el periodo de evaluación, permite definir que Colif_t cronológicamente presentaron diferencias significativas en los puntos distantes a la producción piscícola. La prueba ANOVA ha definido diferencias altamente significativas en las condiciones

Tabla 3. Matriz de correlaciones fisicoquímicas. Lago Guamuez - Estación Piscícola Intiyaco.

Parámetros		P-PO	NH-N	DB	DO	Colif _t	Colif _r
P-PO	Correlación de Pearson	1	0,467	-0,013	-0,138	0,379	-0,540*
	Sig. (bilateral)		0,068	0,961	0,609	0,147	0,031
NH-N	Correlación de Pearson	0,467	1	0,176	-0,113	0,698**	-0,198
	Sig. (bilateral)	0,068		0,514	0,677	0,003	0,463
DB	Correlación de Pearson	-0,013	0,176	1	-0,745**	0,238	-0,135
	Sig. (bilateral)	0,961	0,514		0,001	0,374	0,618
DQ	Correlación de Pearson	-0,138	-0,113	-0,745**	1	-0,266	0,259
	Sig. (bilateral)	0,609	0,677	0,001		0,319	0,333
Colif _t	Correlación de Pearson	0,379	0,698**	0,238	-0,266	1	-0,754**
	Sig. (bilateral)	0,147	0,003	0,374	0,319		0,001
Colif _r	Correlación de Pearson	-0,540*	-0,198	-0,135	0,259	-0,754**	1
	Sig. (bilateral)	0,031	0,463	0,618	0,333	0,001	

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).




Figura 1. SPSS. Comparaciones múltiples. HSD Tukey a, b. Condición fisicoquímica Lago Guamuez - Estación Piscícola Intiyaco, a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 26,000. b. Alfa = 0,05. a, b, c, d, e = significación estadística.




Figura 2. SPSS. Comparaciones múltiples. HSD Tukey a, b. Condición fisicoquímica Lago Guamués - Estación Piscícola Intiyaco. a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 26,000. b. Alfa = 0,05. a, b, c, d, e = significación estadística.

de P-PO ($P < 0,00$), Colif_t ($P < 0,020$) y Colif_f ($P < 0,001$). Existen diferencias en la concentración P-PO entre las aguas superficiales (media 0,2250) del sistema de producción y los demás puntos de muestreo. La mayor media (1.466,7) de Colif_t está presente en aguas superficiales de la producción de *O. mykiss* y difiere significativamente de las profundas (190,0). La prevalencia de *E. coli* en aguas profundas (media 100) difiere en concentración con los demás sitios de análisis. Los demás parámetros se mantuvieron dentro de la distribución normal, en consecuencia, no existe diferencias estadísticas significativas entre sus concentraciones. (Figura 2).

Análisis de correlaciones fisicoquímicas y biológicas

Mediante análisis de correlación de Pearson se identificó asociación lineal significativa entre la concentración de NH-H y la prevalencia de Colif_t ($R = 0,698$; $P < 0,001$); igualmente, asociación lineal negativa significativa entre la DB y DQ ($R = -0,745$; $P < 0,001$). En consecuencia, según el coeficiente de determinación ($R^2 = 0,55$ y $0,48$), se puede inferir que la variabilidad de NH-H se explica en 55% por la variabilidad en la concentración de Colif_t; y en 48% se explica la variabilidad de la demanda biológica y química de las aguas del Lago Guamués. (Tabla 3).

Discusión

El estudio pretendió verificar el efecto de los efluentes de la producción de pescado en la calidad física, química y biológica natural del Lago Guamués, más no su consecuencia en las variables zootécnicas de esa actividad, y fue así como, la estimación de la zona trofogénica, que involucra las capas eufótica y fótica del sistema lenfítico

aumenta en la medida que se aleja de las estaciones de producción acuícola que limita la productividad primaria y la concentración de oxígeno al atenuar la actividad fotosintética por presencia de mayor turbidez relacionada al material disuelto y suspendido resultado de excretas, alimento y fluidos biológicos de la evisceración de animales, que determina mayor albedo (Kormondy (1994)). En correlación con la mayor concentración de oxígeno y saturación de este gas, presente significativamente a 100 metros a después de las jaulas de producción piscícola Intiyaco, refleja ese efecto, el cual se mitiga bajo las nuevas condiciones, la presencia de la comunidad fitoplanctónica, verificada como dominante, abundante y mayor riqueza de las Divisiones Bacillariophytas (44.4%) Clorophytas (37%) y Cianophytas (18.6%), que conllevan relaciones energéticas a partir de la energía del flujo solar que se consume en el proceso de la fotosíntesis para sintetizar compuestos orgánicos carbonados (Carney (1984); Carney et al., (1987) y Kirk (1994)); además, prevalecen para dinamizar los niveles tróficos superiores definidos por las poblaciones *Diaptomus sp* y *Peridinium sp* (100%) y menos frecuentes las especies *Bosmina sp*, *Paramecium sp*, *Metacyclops sp* y *Keratella sp* (33,3%), en términos de transferencia de materia (ciclos biogeoquímicos), energía y biodisponibilidad (Zapata (2001); Granados et al., (2008), Andramunio-Acero y Caraballo (2012) y Andramunio-Acero (2013)); igualmente, estos recursos bióticos son considerados como indicadores de calidad ambiental debido a la sensibilidad o tolerancia a diversos factores abióticos que les asiste (Valdés y Plaza (2011); Roldán (2003)).

La condición NH-N y DB presentan diferencias significativas con mayor media en las aguas superficiales,

auspiciada por la sobresaturación proveniente de los procesos de alimentación-ingestión, egestión, y la utilización del OD por el plancton en la actividad respiratoria y en la descomposición de la materia orgánica acumulada en la superficie, en concomitancia con el fondo de la columna de agua que no supera los 17 metros en los sitios evaluados (Sánchez y Zea (2000); Granados *et al.*, (2008), López y Salas (2013)). Adicionalmente, el aprovisionamiento en nutrientes en un lago quedará afectado por la biogeoquímica de la cuenca de drenaje, por los contaminantes de origen ribereño y atmosférico y por los procesos lacustres (Vincent *et al.*, (1984)).

El comportamiento del P-PO, DQ y Colif_t es significativamente diferencial con mayor media en aguas profundas, como consecuencia de la presencia del fósforo como elemento limitante que facilita la productividad primaria (Smith (1983); Elser *et al.*, (1990); Sánchez y Zea (2000)), sin embargo, en aguas profundas puede causar afloramientos excesivos que causan sofocamiento de todos los organismos vivos por bajas drásticas de oxígeno útil en la mineralización de la materia orgánica (Khalida *et al.*, 2011) de origen autóctona y alóctona, produciendo la muerte cuando facilita los procesos de sedimentación, mineralización y eutrofización litoral (Cabrera *et al.*, (2005); Ding *et al.*, (2010), López y Salas (2013)).

Las diferencias significativas entre zonas de estudio (C, D, E y F), en la condición de pH, NTU (mayor media), OD, Dur y Alc (menor media) del sistema productivo Intiyaco, se correlaciona con la materia inorgánica, material orgánico particulado, dinámica hídrica, densidad del agua y frecuencia de mezcla que afectan la penetración lumínica asociada a NTU (media 198.9) y la condición de pH donde prevalece los bicarbonatos y menor concentración de carbonatos y dióxido de carbono relacionado a los niveles Alc total (\bar{X} = 15,5) y Dur (\bar{X} = 23,2), en concordancia con la insuficiencia de calcio para la coprecipitación del fosfato cálcico con el carbonato de calcio como mecanismo de autopurificación de fosfato más eficiente, así como concentración baja de OD (\bar{X} = 5,7), merced a los procesos de oxidación de la materia disponible (Roldán (1992); Roldán y Posada (2001); López y Salas (2013)).

El NH-N y la concentración de *E. coli* presentaron mayor media en aguas profundas y difiere de las zonas (A, C, D, E y F); si bien, se ha demostrado que en lagos de las regiones tropicales, la densidad fitoplanctónica está más frecuentemente limitada por el nitrógeno que por el fósforo (Vincent *et al.*, (1984)),

sin embargo, éste comportamiento obedece a la decantación de las fuentes de nitrógeno, relacionada con el posafloramiento de productores primarios y su mineralización con presencia de Colif_t y prevalencia de Colif_t por cercanía a los fondos desde los vertimientos superficiales (55 UFC).

Los P-PO y Colif_t de aguas profundas son significativamente diferentes de aguas superficiales de la producción de *O. mykiss* y los demás sitios de evaluación (B, C, D, E y F) en correspondencia a la decantación de alimento no consumido, heces fecales y mineralización planctónica (Sánchez de Prager *et al.*, (2006); Ordoñez *et al.*, (2016) y Varma (2017)), metabolismo de macromoléculas vía procesos de hidrólisis, acetogénesis y metanogénesis entre otros (Corrales *et al.*, 2015).

Según la Corporación autónoma regional de Nariño, de acuerdo al modelo dinámico de capacidad de carga (MDCC), incluido los peces cultivados y los nativos *Eremophilus mutissi* y *Grundulus bogotensis*. (CORPONARIÑO, Resolución 1006 de 2015), la carga de nutrientes, específicamente de nitrógeno y fósforo, prevé una capacidad permanente máxima de sostenimiento del lago igual a 930 ton/año; que representa una capacidad de carga muy limitada debido a la condición de lago de altiplano, oligotrófico con escasa tensión superficial de OD y mayor aporte de M.O por aguas vertidas de diferentes asentamientos, de áreas deforestadas y zonas de explotación ganadera, actividades agrícolas en la microcuenca, las cuales transportan pesticidas y fertilizantes, contaminación atmosférica y los procesos propio lacustres que presumiblemente podrían causar serios problemas de eutrofización.

En conclusión, el análisis de la estación de interés y el sitio control durante el año 2018, los parámetros limitantes en la condición limnológica del lago están en la concentración de NH-H, P-PO, NTU y Colif_t que descienden en dirección hacia el centro del Lago Guamuez, sin embargo, no se evidenció un deterioro negativo, en la caracterización fisicoquímica y biológica, causado por las actividades acuícolas, considerando la capacidad de autopurificación y la condición polimítica temporal del sistema lenítico, sin embargo, se debe continuar con los procesos de mejoramiento de técnicas de elaboración de alimentos de alta digestibilidad y estrategias de alimentación que mitigue las condiciones de mayor concentración de nitrógeno amoniacal, turbidez y pH, que en lo pertinente limitan la productividad primaria con la consecuente declinación de la concentración y saturación de oxígeno en las explotaciones piscícolas.

Agradecimientos

El grupo de investigaciones acuícolas (GIAC), expresan sincera gratitud a las personas e instituciones que hicieron posible el desarrollo de la investigación “Impacto aeróbico y anaeróbico de la especie exótica trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*), en un lago altoandino colombiano”

Personal Administrativo y Profesional de la Vicerrectoría de Investigaciones Postgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nariño.

Personal Administrativo y Profesional del Departamento de Recursos Hidrobiológicos de la Universidad de Nariño.

Personal Administrativo y Profesional de la Sección de Laboratorios de la Universidad de Nariño.

Referencias

- Andramunio-Acero C, Caraballo P. Análisis de las relaciones tróficas en un lago de inundación de la Amazonia colombiana. *Rev Colombiana Cienc Anim.* 2012;4(1):102-120
- Andramunio-Acero C. 2013. Dinámica sucesional y ecología trófica de la comunidad perifítica en dos ambientes del sistema lagunar de Yahuaraca (Amazonas, Colombia). Tesis de grado. Universidad Nacional de Colombia-sede Amazonía. Leticia, Amazonas. 87 p
- Carney HJ. Productivity, population growth and physiological responses to nutrient enrichments by phytoplankton of Lake Titicaca, Peru-Bolivia. *Verh Internat Verein Limnol.* 1984;22:1253-1257
- Carney HJ, Richerson PJ, Eloranta P. Lake Titicaca (Peru/Bolivia) phytoplankton: Species composition and structural comparison with other tropical and temperate lakes. *Arch Hydrobiol.* 1987;110:365-385
- CORPONARIÑO. 2014. Plan de Manejo integral del Humedal Ramsar Laguna de la Cocha. Corporación Autónoma Regional de Nariño. Pasto, Colombia.
- CORPONARIÑO. Resolución 1006 de noviembre 09 de 2015. Corporación Autónoma Regional de Nariño. Pasto, Colombia.
- Corrales LC, Antolinez DM, Bohórquez JA, Corredor AM. 2015. Anaerobic bacteria: processes they perform and their contribution to life sustainability on the planet. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá, Colombia.
- Ding Y, Liu Y, Wu W, Shi D, Yang M, Zhong Z. Evaluation of biochar effects on nitrogen retention and leaching in multi-layered soil columns. *Water Air Soil Poll.* 2010;213:47-55. Doi: 10.1007/s11270-010-0366-4
- Elser JJ, Marzolf ER, Goldman CR. Phosphorus and nitrogen limitation of phytoplankton growth in freshwaters of North America: a review and critique of experimental enrichments. *Can J Fish and Aquat Sci.* 1990;47:1468-1477
- Gilmore SR, Abbott CL, Cone DK. The placement of *Gyrodactylus salmonis* (Yin & Sproston) in the molecular phylogeny of studied members of the *Gyrodactylus wageneri* group parasitizing salmonids. *J Fish Dis.* 2010;33:461-467
- Granados C, Rodríguez C, Mancera JC, López HJ. 2008. Producción primaria fitoplanctónica, respiración, balance metabólico y relación con variables físicoquímicas durante la época lluviosa de 2007 en la Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe colombiano. Resúmenes VIII Seminario Colombiano de Limnología. Santiago de Cali. pp. 102.
- Hakspiel C. 2005. Variación espacial y temporal de la abundancia de nanoplancton heterótrofo y su relación con la abundancia y volumen celular del bacterioplancton en el Embalse del Neusa. Facultad de ciencias naturales. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá. 99p
- Hela I, Laveastu T. The influence of temperature on the behavior of fish. *Arch Soc Zool Bot Fenn Vanamo.* 1952;15:1-2
- Kirk J. 1994. Light and photosynthesis in aquatic ecosystems. Cambridge University Press, London, 509 pp.
- Khalida A, Arshadb M, Anjuma M, Mahmooda T, Dawsonc L. The anaerobic digestion of solid organic waste. Elsevier [revista en internet]* 2011 [acceso 10 Marzo 2014]; 31(8). Disponible en: http://www.researchgate.net/publication/51086548.The_anaerobic_digestion_of_solid_organic_waste.
- Kormondy E. 1994. Conceptos de Ecología Aplicada. Madrid, España: Alianza Editorial
- López J, Mena P, Torres C, Rodríguez J, Imuez M, Burgos A. 2005. Evaluación de inmunoestimulantes en las fases de levante y ceba de trucha arcoíris (*O. mykiss*) cultivada en jaulas flotantes en el Lago Guamuéz. Vicerrectoría de Investigaciones Postgrados y Relaciones Internacionales. Pasto. Colombia: Sistema Investigaciones. p. 6
- López-Macías JN. 2014. Nutrición y Alimentación Piscícola. Colombia: Editorial Universidad de Nariño
- López-Macias JN, Salas-Benavides J. Caracterización Comparativa de la condición limnológica del lago Guamuéz en relación con la producción de trucha arcoíris *Oncorhynchus mykiss* en Jaulas Flotantes. *Entornos.* 2013;26(2): 181-194
- Ordoñez YM, Fernandez BR, Lara LS, Rodríguez A, Uribe D, Sanders IR. Bacteria with phosphate solubilizing capacity alter mycorrhizal fungal growth both inside and outside the root and in the presence of native microbial communities. *PLoS One.* 2016;11(6):e0154438. Doi: 10.1371/journal.pone.0154438
- Rábago-Castro JL. 2010. Monitoreo y distribución de infecciones bacterianas y parasitarias en el cultivo de bagre *Ictalurus punctatus* en Tamaulipas. Tesis de doctorado, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey
- Roldán G. 1992. Fundamentos de Limnología Neotropical. Editorial Universidad de Antioquia, Medellín. pp.529
- Roldan P. 2001. Estudio limnológico de los recursos hídricos del Parque de Piedras Blancas. *Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.* Bogotá. Pp.137

- Roldán-Pérez G. 2003. Bioindicación de la calidad del agua en Colombia. Antioquia: Universidad de Antioquia
- Rubio-Godoy M, Paladini G, Freeman MA, García-Vásquez A, Shinn AP. Morphological and molecular characterisation of *Gyrodactylus salmons* (Platyhelminthes, Monogenea) isolates collected in Mexico from rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum). *Vet Parasitol.* 2012;186:289-300
- Sánchez R, Zea S. "Metabolismo de nitrógeno y fósforo inorgánico disueltos en la columna de agua en una laguna costera tropical (Caribe Colombiano)". *Caribbean Journal of Science.* 2000;36:127-140
- Sánchez de Prager M, Rojas A, Pérez J, Zúñiga O, Gascó JM. Actividad y biomasa microbianas como indicadores de materia orgánica en sistemas de cultivo de maracuyá (*Passiflora edulis*) en Toro, Valle del Cauca, Colombia. *Acta Agron.* 2006;55(4):7-12
- Smith VH. Nutrient dependence of primary productivity in lakes. *Limnol Oceanogr.* 1983;28:1051-1064
- Valdés y Plaza 2011. Organismos indicadores de la calidad del agua y de la contaminación (bioindicadores). (2. ed, Ed.) USA: ProQuest Ebook Central.
- Varma A. 2017. (Ed) Soil biology. Springer. New York, USA.
- Vincent WF, Wurtsbaugh WA, Vincent CL, Richerson PJ. 1984. Seasonal dynamics of nutrient limitation in a tropical high-altitude lake (Lake Titicaca, Peru-Bolivia): application of Physiological bioassays. *Limnol. Oceanogr.* 29: 540-552.

Jorge López: <https://orcid.org/0000-0001-9571-5524>
 Julbrinner Salas: <https://orcid.org/0000-0002-0536-8774>