



ConScientiae Saúde

ISSN: 1677-1028

ISSN: 1983-9324

conscientiaesaude@uninove.br

Universidade Nove de Julho

Brasil

Agnol, Cristiano Dall'; Vecchio, Fabrício Boscolo Del
Treinamento com restrição do fluxo sanguíneo: sobre revisão de literatura
ConScientiae Saúde, vol. 17, núm. 2, 2018, Abril-Junho, pp. 109-112
Universidade Nove de Julho
Brasil

DOI: <https://doi.org/10.5585/ConsSaude.v17n2.5285>

Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92957928001>

- Como citar este artigo
- Número completo
- Mais informações do artigo
- Site da revista em [redalyc.org](https://www.redalyc.org)

redalyc.org
UAEM

Sistema de Informação Científica Redalyc

Rede de Revistas Científicas da América Latina e do Caribe, Espanha e Portugal

Sem fins lucrativos acadêmica projeto, desenvolvido no âmbito da iniciativa
acesso aberto

Treinamento com restrição do fluxo sanguíneo: sobre revisão de literatura

Blood flow restriction training: concerning a literature review

Cristiano Dall' Agnol¹; Fabrício Boscolo Del Vecchio²

¹ Laboratório de Esforço Físico, Centro de Desportos, Departamento de Educação Física, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Florianópolis, SC - Brasil.

² Escola Superior de Educação Física, Departamento de Ginástica e Saúde – Universidade Federal de Pelotas – UFPel. Pelotas, RS - Brasil.

Carta ao
Editor

Artigos

Revisões
de literatura

Treinamento com oclusão vascular: sobre revisão de literatura

Inicialmente, gostaríamos de situar os leitores que os termos Kaatsu *training*, oclusão vascular e restrição do fluxo sanguíneo são empregados para designar a mesma metodologia de treinamento. Nesta carta adotaremos o termo “restrição do fluxo sanguíneo” para nos referir ao treinamento com restrição parcial, não completa, do fluxo sanguíneo para o membro exercitado de modo a nos adequarmos à maioria das publicações internacionais dos últimos anos.

No ano de 2014, tivemos contato com artigo publicado na revista ConScientiae Saúde, v 12, n2, que versa sobre treinamento associado à restrição do fluxo sanguíneo (RFS)¹. O tema é interessante e tem sido bastante estudado nos últimos anos, o que ratifica a necessidade de revisão de literatura sobre o mesmo. No entanto, sugere-se aos autores a adoção de algum mecanismo de orientação para elaboração de revisões sistemáticas, como o PRISMA², o que aprimoraria a qualidade deste tipo de publicação.

Em um primeiro momento, pontua-se equívoco na tradução do termo “hemóstase”, relacionado aos mecanismos envolvidos para cessar uma hemorragia³, ao empregarem “homeostase”. Neste estudo citado, avaliaram-se sujeitos saudáveis nas situações de oclusão sem exercício e exercício com e sem oclusão vascular e analisaram diferentes respostas hemodinâmicas e, ao final, sugeriu-se inclusive, possível efeito cardioprotetor indu-

zido pelo treinamento com oclusão vascular³. Portanto, esclarece-se que em nenhum momento o estudo relacionou a utilização do treinamento com RFS à formação de trombose.

Baseando-se na perspectiva de que há diferenças entre o comportamento de animais e seres humanos, e entre seres humanos com diferentes níveis de atividade física⁴, os autores não detalharam a abordagem feita por estudo de Hueb et al.⁵, o qual teve como foco principal investigar as alterações fisiológicas ocorridas no tecido isquêmico a partir da interrupção do fluxo sanguíneo de artérias saudáveis de coelhos, assim como correlacionar com os dois tempos de isquemia adotados. Portanto, Wolinski et al.¹ se equivocaram ao longo de sua discussão ao compararem o treinamento físico com RFS (objetivo principal da revisão), com a oclusão total das artérias ilíaca comum, ilíaca interna, ilíaca externa e suas ramificações feita através de ligaduras por períodos de 6 e 72 horas em coelhos, na qual houve a intenção de impedir a circulação sanguínea, justamente para avaliar o comportamento do tecido isquêmico⁵. Como salientado no primeiro parágrafo, o treinamento com RFS é compreendido pela oclusão parcial do fluxo sanguíneo^{6,7}, e comumente tende a não ultrapassar 15 minutos em uma sessão de treino. Deste modo, adotando-se os períodos de interrupção do fluxo sanguíneo adotados nos protocolos de Hueb et al.⁵, revela-se discrepância no período de oclusão de, pelo menos, 2400% com os valores recomendados, além do tamanho da redução do fluxo sanguíneo ocasionada entre os procedimentos relatados. Quanto à consideração do estudo de Neto et al.⁸, ratos foram utilizados para avaliar o efeito da isquemia sobre alterações oxidativas. Para isso, foi realizada ligadura da aorta abdominal justa e infra-renal por tempos de 1 e 6 horas. Dentre os efeitos contemplados para terem certeza de que a ligadura havia sido eficaz, registraram-se visualização de palidez ou cianose, esfriamento de membros e ausência de pulsação⁸. Novamente, de forma alguma tal protocolo se assemelha ao treinamento com RFS.

Não obstante, na seção de conclusão Wolinski et al.¹ advertem sobre riscos cardiovasculares e doenças hematológicas decorrentes do método de treinamento com RFS, apesar de não empregarem nenhuma referência ao longo da revisão relacionando tais efeitos quando indivíduos foram submetidos a este modelo de treinamento.

Com propósito de investigar o possível risco de trombose proveniente do treinamento com RFS em indivíduos saudáveis, 10 sujeitos jovens foram submetidos a treino caracterizado por três séries do exercício *leg-press* a 30% 1RM e com pressão de 150-160mmHg⁹. Coletas de sangue foram obtidas nos momentos pré, 10min, 1, 4 e 24 horas após encerramento do exercício e nenhuma alteração em marcadores de formação de trombina ou coágulo intravascular foi evidenciada⁹. Adicionalmente, aumento da expressão gênica de fator angiogênico como crescimento endotelial vascular (VEGF) tem sido encontrado após exercício extensão de joelho a 40% 1RM apenas quando associado à utilização de RFS¹⁰, constituindo-se como resposta frente à hipoxia causada¹⁰. Da mesma forma, incremento significativo na capacidade de filtração microvascular tem sido encontrado após quatro semanas de treinamento apenas para o membro ocluído durante exercício, refletindo melhora do índice de capilarização muscular decorrente do treinamento com RFS¹¹.

Alguns trabalhos têm se atentado a identificar a influência do treinamento com RFS sobre a complacência arterial, comumente associada à sensibilidade barorreflexa e doenças coronárias^{12,13}. Em um deles por exemplo, analisou-se o efeito do treinamento resistido tradicional (75% 1RM) e do treinamento com RFS (35% 1RM) sobre a complacência da artéria carótida no exercício supino pelo período de seis semanas e três treinos semanais. Finalizada a intervenção, os sujeitos que realizaram o treinamento com maiores cargas apresentaram redução da complacência arterial, enquanto o grupo com RFS não manifestou mudanças¹². Por outro lado, idosos exibiram aumento da complacência da arté-

ria carótida após dez semanas de treinamento com caminhadas em conjunto com RFS¹³.

Com relação à segurança do treinamento com RFS, estudos tem demonstrado que o emprego associado da RFS com exercício de baixa intensidade apresenta produção de espécies de oxigênio reativas inferior ao treinamento resistido de alta intensidade sem RFS¹⁴, e não proporciona impacto sobre marcadores sanguíneos para geração de trombina e nem formação de coágulo intravascular imediatamente após sessão de treinamento¹⁵ e após 4 semanas de intervenção com RFS¹⁶ em sujeitos saudáveis e em doentes cardíacos¹⁷. Ainda, em corroboração com estes achados e em oposição ao que foi exposto por Wolinski et al.¹, revisão abrangendo os temas RFS e função vascular indicou a ausência de alteração de marcadores oxidativos e fatores de coagulação após o treinamento¹⁸.

Vale a pena acrescentar que após a publicação de Wolinski et al.¹, as recomendações para os ajustes de pressão dos manguitos para o treinamento com RFS foram aperfeiçoadas, com grande destaque à individualidade da pressão de oclusão arterial total, proporcionando maior segurança aos indivíduos. Seguindo esta lógica, a adoção de pressão fixa em oclusores pneumáticos acaba não sendo recomendado pela possibilidade de gerar oclusão arterial total em alguns indivíduos, gerando maior desconforto e potencialmente induzir alguma resposta cardiovascular adversa⁷. Counts et al¹⁹ verificaram respostas agudas de atividade eletromiográfica semelhantes em protocolo de flexão de cotovelo com pressões de oclusores variando entre os valores de 40% e 90% da oclusão arterial¹⁹. Além disso, os ganhos de massa muscular e dos níveis de força não foram diferentes após 8 semanas de treinamento com RFS entre indivíduos que treinaram com RFS a 40% e a 90% da pressão de oclusão arterial¹⁹. Estes achados reforçam a ideia de que o aumento da pressão aplicada nos manguitos durante o treinamento não resultará em respostas mais eficazes¹⁹. Portanto, o emprego de menores valores de pressão, além de passar mais confiança, é suficientemente eficaz

para gerar os ganhos esperados para este tipo de treinamento¹⁹.

Por fim, deve-se levar em conta que grande parte das amostras pesquisadas envolve sujeitos jovens e saudáveis, e que maior atenção deve ser dada ao se generalizarem os efeitos da RFS.

Referências

- Wolinski PA, Neves EB, Pietrovski EF. Análise das repercussões hemodinâmicas e vasculares do treinamento Kaatsu. ConsSaude 2013; 12(2):305-312.
- Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gøtzsche PC, Ioannidis JP et al. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. BMJ 2009; 21(339):b2700.
- Nakajima T, Takano H, Kurano M, Iida H, Kubota N, Yasuda T et al. Effects of KAATSU training on haemostasis in healthy subjects. Int J Kaatsu Train Res 2007; 3(1):11-20.
- Booth FW, Lees SJ. Physically active subjects should be the control group. Med Sci Sports Exerc 2006; 38(3):405-6.
- Hueb WC, Guedes Neto HJ, Lancelotti CLP, Castelli Júnior V, Caffaro RA. Analysis of the effects of the interruption of the flow in the normal arterial endothelium morphology and the correlation with the ischemia duration in rabbits. Acta Bras Cir. 2007; 22(2):142-6.
- Jessee MB, Buckner SL, Mouser JG, Mattocks KT, Loenneke JP. Letter to the editor : Applying the blood flow restriction pressure : the elephant in the room. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2016; 310:H132-3.
- Spranger MD, Krishnan AC, Levy PD, O'Leary DS, Smith SA. Reply to "Letter to the editor: Applying the blood flow restriction pressure: the elephant in the room". Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2016; 310(1):H134-5.
- Neto AF, Silva JCCB, Fagundes DJ, Percário S, Ferreira N, Novo YJ et al. Estudo das alterações oxidativas, da capacidade antioxidante total e do óxido nítrico, em ratos submetidos à isquemia e reperfusão de membros posteriores. Acta Cir Bras 2005; 20(2):134-9.

9. Madarame H, Kurano M, Takano H, Iida H, Sato Y, Ohshima H. Effects of low-intensity resistance exercise with blood flow restriction on coagulation system in healthy subjects. *Clin Physiol Funct Imaging* 2010; 30(3):210-3.
10. Larkin KA, Macneil RG, Dirain M, Sandesara B, Manini TM, Buford TW. Blood Flow Restriction Enhances Post-Resistance Exercise Angiogenic Gene Expression. *Med Sci Sports Exerc* 2012; 44(11):2077-83.
11. Evans C, Vance S, Brown M. Short-term resistance training with blood flow restriction enhances microvascular filtration capacity of human calf muscles. *J Sport Sci* 2010; 28(9):999-1007.
12. Ozaki H, Yasuda T, Ogasawara R, Sakamaki-Sunaga M, Naito H, Abe T. Effects of high-intensity and blood flow-restricted low-intensity resistance training on carotid arterial compliance: role of blood pressure during training sessions. *Eur J Appl Physiol*. 2013; 113(1):167-74.
13. Ozaki H, Miyachi M, Nakajima T, Abe T. Effects of 10 weeks walk training with leg blood flow reduction on carotid arterial compliance and muscle size in the elderly adults. *Angiology*. 2011; 62(1):81-6.
14. Goldfarb AH, Garten RS, Chee PDM, Cho C, Reeves G V, Hollander DB, et al. Resistance exercise effects on blood glutathione status and plasma protein carbonyls: Influence of partial vascular occlusion. *Eur J Appl Physiol*. 2008; 104(5):813-9.
15. Fujita T, Brechue WF, Kurita K, et al. Increased muscle volume and strength following six days of low-intensity resistance training with restricted muscle blood flow. *Int J Kaatsu Training Res*. 2008;4(1):1-8.
16. Clark BC, Manini TM, Hoffman RL, Williams PS, Guiler MK, Knutson MJ, et al. Relative safety of 4 weeks of blood flow-restricted resistance exercise in young, healthy adults. *Scand J Med Sci Sports*. 2011; 21(5):653-62.
17. Madarame H, Kurano M, Fukumura K, Fukuda T, Nakajima T. Haemostatic and inflammatory responses to blood flow-restricted exercise in patients with ischaemic heart disease: A pilot study. *Clin Physiol Funct Imaging*. 2013; 33(1):11-7.
18. Horiuchi M, Okita K. Blood flow restricted exercise and vascular function. *Int J Vasc Med* 2012; 1:1-17.
19. Counts BR, Dankel SJ, Barnett BE, Kim D, Mouser JG, Allen KM, et al. Influence of relative blood flow restriction pressure on muscle activation and muscle adaptation. *Muscle and Nerve*. 2016; 53(3):438-45.