



Escola Anna Nery Revista de Enfermagem
ISSN: 1414-8145
annaneryrevista@gmail.com
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Brasil

Teixeira Joca, Mirella; Soares Barros, Shirley Katiussy; Lopes de Oliveira, Rafaelle; Alves Monteiro, Maria Adelane; Bezerra Pinheiro, Ana Karina
FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O DESMAME PRECOCE
Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, vol. 9, núm. 3, agosto, 2005, pp. 356-364
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brasil

Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127715301004>

- Como citar este artigo
- Número completo
- Mais artigos
- Home da revista no Redalyc

FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O DESMAME PRECOCE

Factors that contribute to early weaning

Factores que contribuyen para el destete precoz

Mirella Teixeira Joca

Maria Adelane Alves Monteiro

Shirley Katiussy Soares Barros

Ana Karina Bezerra Pinheiro

Rafaelle Lopes de Oliveira

Resumo

A interrupção prematura da amamentação pode acarretar perigos, pois os alimentos a serem utilizados são inadequados do ponto de vista nutricional, além de expor a criança a organismos infecciosos. Torna-se relevante investigar os fatores relacionados ao desmame precoce. Pesquisa exploratória e quantitativa, realizada no Centro de Desenvolvimento da Família (CEDEFAM), no período de maio a junho/2003, com 20 nutrizes, no qual foi aplicado um questionário contendo 12 questões sobre os motivos que as levaram a desmamarem precocemente. Os resultados foram agrupados em três segmentos: fatores de desmame relacionados com o perfil; a assistência pré-natal e o parto; e prática do aleitamento materno, e apresentados em forma de tabelas. Concluímos que os profissionais e a sociedade podem não estar preparados para favorecer a mulher no exercício da amamentação. Enquanto isso, a política de saúde não cria condições para que todos tenham acesso à educação, melhoria de renda e conscientização do planejamento familiar.

Palavras-chave: Aleitamento materno. Desmame. Nutrição Infantil

Abstract

The premature interruption of breast-feeding can cause danger, as the food that is used is inadequate as to the nutritional point of view, besides exposing the child to infectious organisms. It becomes relevant to investigate the factors related to weaning. Exploratory and quantitative research, carried out in the Family

Resumen

La interrupción precoz del destete puede resultar en peligros, pues los alimentos utilizados son considerados por los nutricionistas como inadecuados, además de exponer al niño a organismos infecciosos. Es muy importante investigar los factores relacionados al desmame. Investigación exploratoria y cuantitativa, realizada en una

INTRODUÇÃO

Ao estudarmos a trajetória do aleitamento materno através dos tempos, observamos que sempre houve uma preocupação no modo de o homem alimentar suas crias. O homem utiliza leite de animais e seus derivados há aproximadamente 8 (oito) milênios e, provavelmente, o teria introduzido na alimentação do lactente por volta desse tempo¹. Isso indica, portanto, que o uso de outros alimentos, além do leite materno humano, está presente na alimentação de crianças em quase toda a história da humanidade.

Especificamente em nosso país, a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal contém o que certamente pode ser considerado o primeiro relato sobre a amamentação do Brasil: Com um menino ou menina no colo, atado com um pano (não sei de quê) aos peitos^{2:45}.

O ato de aleitar diretamente ao seio, cultivado pelos integrantes da sociedade indígena, decerto foi percebido pelos portugueses como um comportamento instintivo e natural, impróprio para o “homem civilizado”, cujo padrão de referência comportamental direcionavam-no aos hábitos e costumes da cultura européia. Dessa forma:

Portugal transmitiu ao Brasil o costume das mães ricas de não amamentarem seus filhos e, consequentemente, a necessidade de se instituir a figura da saloia⁴. As índias cunhãs⁵ constituíram a primeira versão de saloias brasileiras; porém, em razão da rejeição cultural que apresentavam, foram substituídas pelas escravas africanas^{2:53}.

Cabe ressaltar ainda que os relatos sobre desnutrição e mortalidade entre lactentes indígenas brasileiros só passaram a existir a partir do momento em que se ampliou a convivência com o branco, o que pode ser considerado um indicador positivo para o regime alimentar praticado³.

No Brasil, o aleitamento materno entre a sociedade indígena era a regra geral até a chegada dos europeus, que trouxeram em sua bagagem cultural o hábito do desmame

marketing dos fabricantes de leites modificados, a alimentação do lactente tem servido a propósitos que não se circunscrevem exclusivamente às questões ligadas à saúde, denotando, em muitas situações, interesses relacionados à modulação de comportamento social e a oportunidade de auferir lucros de toda espécie².

A disseminação progressiva do aleitamento artificial no Brasil decorre do intenso processo de urbanização, do estilo de vida do país, da distribuição dos excedentes de produção do leite em pó no período pós-guerra, através de programas do tipo aliança para a paz, em regiões como o Nordeste, e da produção do leite em pó na região de São Paulo, na década de 40⁶.

Estudos mostram que a ocorrência do desmame precoce restringe-se a três situações: morte materna, doença grave da mãe ou casos interditados pela cultura⁷.

O desmame precoce e a ablactação podem ser considerados violência contra a criança, uma vez que a deixa exposta ao risco de adoecer e morrer por doenças relacionadas à desnutrição, além de prejudicar a vivência da fase parasitária, que se segue à fase simbólica do vínculo mãe-filho, importante para a saúde mental de ambos, o que contribuirá para a harmonia familiar⁸.

Deve-se também levar em conta que a amamentação é o primeiro evento social da vida da criança, no qual merece igual destaque os aspectos psicológicos que resultam da interação mãe-filho: a criança, a mãe, a família, a sociedade e o estado são amplamente beneficiados pela prática da amamentação natural⁹.

Em paralelo a todas as questões que se pode levantar no sentido de fortalecer a prática da amamentação, um aspecto deve ser lembrado, que diz respeito aos fatores envolvidos na decisão materna de amamentar ou não.

Slogans como “amamentar é um ato natural, instintivo, biológico e próprio da espécie”, caracterizam-se pela verticalidade das construções e seguem a ideologia natural, comum a todas as espécies de mamíferos,

desencadear um fazer que possa satisfazer as necessidades da mulher na sua singularidade, estabelecendo relações como o diálogo no sentido de conhecê-la na sua individualidade, seus valores, crenças, dificuldades físicas, emocionais e suas relações com o núcleo familiar e o social.

Os discursos técnicos e acadêmicos, que embasam os programas de incentivo ao aleitamento materno, estão dirigidos ao atendimento das necessidades da criança, não contemplando a mulher em suas especificidades. É necessário um racionamento de tais discursos para que se tenham respostas mais efetivas no resgate da prática do aleitamento materno pelas mulheres¹⁰.

Acreditamos que o sistema de saúde deva estar vinculado a um modelo de saúde que valoriza a vida e não apenas a doença, e que se torna imprescindível que o profissional esteja realmente preparado para compreender os sentimentos e medos da mãe, e assim contribuir para que ela supere as dificuldades que poderá vivenciar.

Considerando que a interrupção prematura da amamentação pode vir acompanhada de grande perigo, especialmente em países em desenvolvimento, pois muitos dos alimentos que passam a serem utilizados a partir do desmame são inadequados do ponto de vista nutricional e somando-se a isto a grande possibilidade de que a criança possa estar exposta a muitos organismos infecciosos, é que se torna relevante investigar os fatores relacionados a esta prática.

Assim, o presente estudo tem como objetivo identificar, do ponto de vista das mães nutrizes, os fatores que contribuem para o desmame precoce.

METODOLOGIA

Este estudo é de natureza exploratória e quantitativa, realizado no Centro de Desenvolvimento Familiar (CEDEFAM), órgão da Faculdade de Farmácia, Centro Universitário da Faculdade de Farmácia.

aguardavam atendimento na unidade de puericultura. Após o aceite, foi aplicado um questionário contendo 12 questões que abordam dados biográficos e de avaliação sobre os motivos que as levaram a desmamarem precocemente seus filhos.

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (COMEPE) e submetido à avaliação, sendo aprovado pelo mesmo. Também foi enviado à Coordenação da Unidade de Cuidados de Enfermagem do CEDEFAM um ofício solicitando permissão para sua execução, procurando atender aos aspectos contidos na Resolução 196/96 sobre pesquisas envolvendo seres humanos, do Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde¹¹.

Foi garantido às participantes sigilo e anonimato, assim como sua retirada da pesquisa a qualquer momento, sem prévio aviso. A sua participação foi documentada por um termo de consentimento livre e esclarecido devidamente assinado.

A análise dos dados foi de acordo com a estatística descritiva, utilizando porcentagens. Os procedimentos estatísticos permitem que o pesquisador resuma, organize, interprete e comunique a informação numérica¹².

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Após a coleta dos resultados, estes foram agrupados em 3 (três) tópicos descritos a seguir e apresentados em forma de tabelas. A discussão se deu com base na literatura pertinente.

Fatores de desmame relacionados com o perfil

Inicialmente, foi realizada a caracterização das mulheres entrevistadas a fim de identificar fatores relacionados às condições socioeconômicas que possam influenciar no desmame precoce. E construímos tabelas para melhor visualização da análise dos dados e discussões do texto.

De acordo com o que podemos observar na tabela 1, a idade das entrevistadas variou de 16 a 35 anos, onde 8 (oito) tinham de 16 a 19 anos, 3 (três) de 20 a 24 anos, 7 (sete) de 25 a 28 anos e apenas 2 (duas) de 29 a 35 anos. Observamos que a faixa etária predominante é de adolescentes, sendo que neste período da vida, a pessoa vivencia ajustamento social e psicológico, com vagas ou inexistentes orientações, levando a uma crise, pois mudanças no autoconceito e na percepção do mundo são provocadas¹³.

Assim, podemos inferir que, nesta faixa etária, as nutrizes podem sofrer maiores influências sociais na decisão de amamentar ou não a sua criança e no período que irá aleitar de forma exclusiva.

Tabela 02:
Número de mulheres, segundo o grau de instrução. Fortaleza, 2003.

GRAU DE INSTRUÇÃO	F	F %
Analfabeta	01	05
Ensino Fundamental incompleto	08	40
Ensino Fundamental Completo	05	25
Ensino Médio incompleto	02	10
Ensino Médio Completo	04	20
TOTAL	20	100

Quanto à escolaridade, destacamos que a maioria não concluiu o Ensino Fundamental e apenas 1 (uma) era analfabeta. Portanto, a maioria tinha um nível baixo de escolaridade, podendo ser este um fator influenciador do desmame precoce.

Sabemos que se a pessoa não tem acesso a fontes diversas de informações e não comprehende noções básicas que fundamentam o cuidado à criança, será mais suscetível à influência de mitos e tabus culturalmente construídos, e assim mais vulnerável ao desmame.

As habilidades de aprendizagem são influenciadas

Em relação ao número de filhos das entrevistadas, este variou entre 1 (um) e 6 (seis) filhos, com predominância entre 1 (um) e 3 (três) filhos. Embora não seja um grande número de filhos, verificamos que este fator, somado aos outros indicadores da qualidade de vida destas mulheres discutidos a seguir, pode influenciar no desmame precoce.

Tabela 04:
Distribuição do número de mulheres, segundo a renda familiar em reais. Fortaleza, 2003.

RENDA FAMILIAR	F	F %
Sem renda	08	40
100 - 300	06	30
300 - 500	06	30
TOTAL	20	100

A renda média das entrevistadas ficou estabelecida entre 0 (zero) e 400 (quatrocentos) reais. No entanto, salientamos que a maioria declarou não possuir renda. Verificamos que as mulheres estudadas vivem em situação de miséria, sendo o aleitamento materno uma prática que poderá garantir a saúde do bebê sem gasto financeiro por parte da família.

É importante frisarmos que ao planejar uma gravidez, a mulher deve se preparar emocional e financeiramente para todas as mudanças que irão ocorrer no seu corpo e na sua vida, antes e principalmente após o parto. Estar preparada psicologicamente para a maternidade inclui estar disposta a encarar todas as dificuldades e responsabilidades de cuidar de uma vida que, às vezes depende unicamente da mãe desde alimento até as necessidades mais básicas. Assim, é válido orientar as mulheres desde o pré-natal que o aleitamento materno exclusivo é a forma mais econômica e saudável de nutrição das crianças nos primeiros

Percebemos que ser mãe solteira é uma condição que pode dificultar que a mulher amamente seu filho de forma exclusiva, visto o acúmulo de tarefas domésticas e de cuidados à criança e também, a falta de apoio psicológico e social para o desempenho do papel de nutriz.

As famílias formadas apenas por mães e lactentes podem trazer considerações de duas ordens paralelas de limitações, ou seja, a ocorrência, de um lado, da maternidade e dos cuidados exigidos pela criança nos primeiros meses de vida e, de outro, das limitações referentes ao mercado de trabalho feminino⁶.

Tabela 05:
Número de mulheres, segundo o estado civil.
Fortaleza, 2003.

ESTADO CIVIL	F	F %
Companheiro fixo ou união estável	09	45
Solteiras	11	55
TOTAL	20	100

Tabela 06:
Número de mulheres, segundo a ocupação. Fortaleza, 2003.

TRABALHAM FORA DE CASA	F	F %
Sim	06	30
Não	14	70
TOTAL	20	100

Tabela 07:
Número de mulheres, segundo o tipo de pessoas que residem no domicílio. Fortaleza, 2003.

PESSOAS RESIDENTES NO DOMICÍLIO	F	F %
Companheiro e filho	09	45
Com a família de origem	10	50
Sozinha	01	05
TOTAL	20	100

Das nutrizes participantes, a maioria (10) vive com a família de origem, podendo ser este um fator que facilita a aprendizagem social da mãe com as pessoas próximas.

Famílias são grupos de pessoas que mantêm entre si relações de aliança (criada pelo casamento), descendência e consangüinidade, organizada internamente pela divisão do trabalho. Destacamos que é na família que são aprendidos os hábitos, os tabus, o estilo de vida, sendo este um grupo social que tem grande influência nos seus membros. Assim, acreditamos que a nutriz que reside com a sua família de origem deve sofrer maiores influências para amamentar ou não a sua criança, sendo esta uma prática culturalmente construída.

A assistência pré-natal e o parto

A assistência pré-natal é de suma importância para a saúde da mulher e seu filho. Não se trata da simples consulta tradicional, na qual são avaliados apenas as condições da vitalidade do feto e o estado físico da mãe. Seus medos, angústias e preocupações devem ser questionados e levados em conta.

Na Tabela 08 verificamos a distribuição do número de mulheres por consultas realizadas durante o pré-natal.

As mulheres em sua totalidade fizeram o acompanhamento do pré-natal, sendo que a maioria (17) realizou de quatro a sete consultas. A assistência pré-natal deve obedecer ao intervalo entre as consultas de quatro semanas. Após a 36^a semana, a gestante deve ser acompanhada a cada 15 dias¹⁴.

Portanto, acreditamos que o número de consultas realizadas pelas mulheres pesquisadas não é suficiente para uma assistência no pré-natal que aborde todas as dúvidas das gestantes, como também prepare as mulheres de forma eficaz para o parto e puerpério. Sugerimos que o incentivo ao aleitamento materno seja um tema abordado em todas as consultas a partir do sexto mês gestacional, sendo englobado o preparo das mamas, as possíveis intercorrências mamárias, as formas de solucionar os pequenos problemas e o que deve ser evitado pelas nutrizas e seus bebês.

Quando interrogadas sobre as orientações referentes ao aleitamento materno recebidas no pré-natal, colemos os dados apresentados a seguir, na Tabela 09.

Tabela 09:
Número de mulheres segundo as orientações
no pré-natal. Fortaleza, 2003.

ORIENTAÇÕES NO PRÉ-NATAL	F	F %
Sim	18	90
Não	02	10
TOTAL	20	100

A maioria, (18) recebeu orientação sobre aleitamento materno durante o pré-natal. Porém, acreditamos que estas orientações podem não ter contemplado todas as dúvidas destas mães, visto o inadequado número de consultas de pré-natal, conforme apresentado anteriormente.

Quando investigamos sobre o tipo de parto das participantes do estudo, observamos que a maioria (15) teve parto normal. Determinamos como parto normal, aquele de início espontâneo, baixo risco durante todo o processo, até o nascimento. O bebê nasce espontaneamente, em posição cefálica de vértice, entre 37 e 42 semanas completas de gestação.

Tabela 10:
Distribuição do número de mulheres segundo
tipo de parto. Fortaleza, 2003.

TIPO DE PARTO	F	F %
Normal	15	75
Cesária	05	25
TOTAL	20	100

A instituição [hospitalar], através de seus agentes de maior poder, inculcou na mulher que gravidez é um risco, que cesariana é um tipo de parto e reforçou a idéia de imperfeição da natureza feminina, para que a mesma entregasse o poder de seu corpo nas mãos do profissional médico. Ao agir assim, a própria mulher veio a legitimar o uso, em seu corpo, de práticas invasivas de assistência^{16:196}.

Vale ressaltar que o parto natural favorece uma melhor integração mãe-filho, pois não há a separação imediata, como ocorre com o cesáreo, e isso vem a aumentar o laço afetivo entre ambos fazendo o bebê sentir-se mais amado e seguro.

Quanto mais rápido a criança for colocada ao peito e maior for a freqüência em um dado intervalo de tempo, maior a intensidade de estímulo do complexo mamilo-areolar, o que garante a manutenção da prolactina em níveis elevados no sangue e acarreta o aumento probabilístico da indução da síntese do leite².

Após um parto normal, não há necessidade de sepa-

Quando interrogadas a respeito do conhecimento sobre os benefícios do leite materno, verificamos que os dados apresentados na Tabela 11 demonstram que a maioria (18) tem conhecimento das vantagens do leite materno.

Tabela 11:
Distribuição do número de mulheres quanto ao conhecimento sobre os benefícios que o leite materno pode proporcionar.
Fortaleza, 2003.

CONHECIMENTO SOBRE OS BENEFÍCIOS DO LEITE MATERNO	Nº DE MULHERES (F)	F %
Sim	18	90
Não	02	10
TOTAL	20	100

Apesar das mulheres terem o conhecimento da grande importância do aleitamento materno, elas não têm a total consciência dos seus benefícios. Assim, não atendem as orientações sobre a amamentação e, consequentemente não conseguem ter fortaleza contra a grande influência de leigos, em relação à dependência que muitos folcloricamente argumentam para levar a nutriz a uma atitude mais cômoda do uso de mamadeira, a partir das primeiras dificuldades vividas para que o seu bebê possa pegar o seio materno e se alimentar¹⁷.

O momento do puerpério e as pressões pessoais e sociais geram tensões na mulher que podem dificultar a sua tomada de decisão para a prática do aleitamento, como inibí-la ou rejeitá-la, buscando formas mais fáceis de alimentar o bebê sem passar pelas adaptações e dificuldades iniciais que possam surgir do ato de amamentar.

A equipe responsável pelo pré-natal deve estar preparada para o trabalho educativo. A maioria das orientações deve emergir em grupos e se relacionar com os seguintes temas: importância do pré-natal, sexualidade, desenvolvimento da gestação, aleitamento materno, cuidados com o

Observamos que a grande maioria das informações (17) acerca do aleitamento materno foi transmitida por profissionais de saúde, 02 receberam informações de suas mães e 01 do profissional e da mãe.

Vale ressaltar que é imprescindível que o profissional veja o aleitamento através dos olhos da nutriz, compreendendo seus sentimentos e medos para que possa verdadeiramente ajudá-la a entender. Apesar da grande maioria ser orientada quanto à importância do aleitamento, nem todas aderem à ação, observando aqui ainda uma grande influência cultural e social.

A expectativa do profissional com relação ao aleitamento materno ser um processo natural e estar diante de uma mulher que nasceu com esse instinto, pode ofuscar intercorrências mamárias. Um sintoma indicativo de alterações nas mamas é sufocado em função do sacrifício esperado para desempenhar o papel de mãe ou, por outro lado, pode distanciar a assistência de saúde da nutriz que, por algum motivo, não consegue amamentar exclusivamente, já que não será aprovada socialmente como mãe¹³.

No que diz respeito ao mês em que iniciaram a alimentação mista para o bebê, verificamos os dados apresentados na Tabela 13.

Tabela 13:
Distribuição do número de mulheres segundo o mês em que iniciou alimentação mista. Fortaleza, 2003.

MÊS DE VIDA DA CRIANÇA	F	F %
Primeiro mês	12	60
Segundo mês	03	15
Terceiro mês	02	10
Quarto mês	03	15
TOTAL	20	100

Muitas são as causas da não amamentação exclusiva, por no mínimo seis meses. Entre elas, podemos citar a necessidade de sair de casa para trabalhar, o relato de não possuir leite suficiente para a criança, o próprio estresse que muitas vezes é exacerbado na hora da amamentação, a preocupação com a estética corporal, entre outros fatores. Quando introduzem outros alimentos na dieta da criança, muitas pessoas têm o costume de oferecer carboidratos, ao invés de frutas, sopinhas, enfim alimentos mais saudáveis para o organismo ainda em maturação.

Quanto ao auxílio no cuidado com o filho, podemos observar na Tabela 14 que 11 (onze) informaram ter recebido ajuda e 09 (nove) não. Isso vem a confirmar os dados anteriores em relação às participantes do estudo, cuja maioria reside com a família de origem.

Tabela 14:
Quantidade de nutrizes que recebem auxílio no cuidado do filho. Fortaleza, 2003.

RECEBEM AUXÍLIO	F	F %
Sim	11	55
Não	09	45
TOTAL	20	100

O nascimento de um filho na vida da mulher pode gerar desequilíbrio no seu cotidiano, alterando a sua rotina diária e gerando sentimentos de preocupação, temor e ansiedade, sendo necessária a colaboração da rede social de apoio, pois em momentos de estresse ocorre uma maior dificuldade relacionada ao aleitamento materno¹⁷.

Sobre o prazer na prática da amamentação, os dados na Tabela 15 demonstram que 18 (dezoito) mães sentem prazer em amamentar, enquanto 02 (duas) não.

Tabela 15:

dos canais que devem levar à boca de seu filho. Como no ato da reprodução, ela tem muitas vezes erotismo, voluptuosidade. Basta somente que lhe estenda os tenros bracinhos para que os seus seios se ingurgitem e que o leite seja ejaculado com força⁵.

Verificamos com a Tabela 16 que, a maioria das mães (15), desconhece as alterações mamárias, e apenas 05 (cinco) referem conhecer problemas relacionados às mamas.

Tabela 16:
Referente a nutrizes que têm conhecimento sobre alteração das mamas. Fortaleza, 2003.

ALTERAÇÕES DAS MAMAS	Nº DE MULHERES (F)	F %
Sim	05	25
Não	15	75
TOTAL	20	100

É importante também enfatizar nas abordagens educativas as possíveis alterações mamárias, que podem acometer as mulheres. E como elas devem proceder, para que isso não ocasione o desmame precoce.

Porém, durante o pré-natal, o profissional de saúde deve informar, orientar, buscar meios para educar a mãe a amamentar. Isso inclui mostrar as possíveis intercorrências que poderão vir a ocorrer, principalmente se ela amamentar de forma incorreta.

Diante desses dados, percebemos que há que se rever o paradigma propugnado pelo discurso oficial, que fundamenta as ações assistenciais em amamentação, particularmente no que se refere aos mecanismos de controle que regem a fisiologia da lactação². Acreditamos que assim podemos ocultar informações básicas que podem ocorrer durante o processo de amamentar, tais como: mastite, ingurgitamento mamário, abscesso, mamilos dolorosos e rachados, fissuras e outras.

concluiu o ensino fundamental. Por outro lado, observamos que todas fizeram pré-natal, a maioria recebeu orientações sobre aleitamento materno e seus benefícios e sentia prazer em amamentar. No entanto, 75% delas desconhecem as alterações que podem ocorrer durante a amamentação, fato relevante, pois 95% referem ter sido orientadas por profissionais de saúde. Percebemos que os discursos técnicos e acadêmicos que embasam os programas de incentivos ao aleitamento materno não contemplam a mulher em sua especificidade.

Este estudo nos alerta que os profissionais e a sociedade podem não estar preparados para favorecer a mulher no exercício da amamentação. Ao contrário,

podem culpabilizá-las por não amamentarem, ao mesmo tempo em que interferem sobre o parto natural, não respeitam a Leis Trabalhistas para amparo à maternidade, isentam a propaganda de companhias produtoras de substitutos do leite materno de compromissos éticos, não capacitam seus profissionais para darem apoio e terem conhecimentos necessários para aconselhar a mãe que amamenta.

Enquanto isso, a política de estado tenta intervir na mortalidade infantil, sem promover alterações na estrutura socioeconômica e de distribuição de renda, o que criaria condições de equidade para que todos tivessem acesso à educação, melhoria de renda e uma conscientização do planejamento familiar.

Referências

1. Silva IA. Reflexões sobre a prática do aleitamento materno. Rev Esc Enferm USP 1996 abr; 30(1): 58-72.
2. Almeida JAG. Amamentação: um híbrido natureza-cultura. Rio de Janeiro (RJ): Ed FIOCRUZ; 1999.
3. Rocha JM. Introdução à história da puericultura e pediatria no Brasil. Rio de Janeiro (RJ): Nestlé; 1996. 147 p.
4. Bandinter E. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Rio de Janeiro (RJ): Nova Fronteira; 1985.
5. Costa JF. Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro (RJ): Nova Fronteira; 1983. 140p.
6. Goldenberg P. Representando a discriminação como questão social. Campinas (RJ): Cortez; 1989. 194p.
7. Silva AAM. Amamentação: fardo ou desejo? Estudo histórico-social dos saberes e prática sobre aleitamento materno na sociedade brasileira. [dissertação de mestrado]. Ribeirão Preto (SP): Faculdade de Medicina /USP; 1990.
8. Bezerra AK, Varela ZM. A mãe que desmama comete crime de negligência? In: Varela ZM, Silva RM, Barroso MGT. Dimensões do cotidiano: violência doméstica, saúde da mulher e desempenho no trabalho. Fortaleza (CE): Pós-Graduação/DENF/UFC; 1998. p.51-62.
14. Ministério da Saúde (BR). Assistência Pré-natal. Manual Técnico. 3^aed. Brasília (DF): Secretaria de Políticas de Saúde/MS; 2000.
15. Ministério da Saúde (BR). Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher. Brasília (DF): Secretaria de Políticas de Saúde/MS; 2001.
16. Progianti JM, Vargens OMC. As enfermeiras obstétricas frente ao uso de tecnologias não invasivas de cuidado como estratégias na desmedicalização do parto. Esc Anna Nery Rev Enferm 2004 ago; 8(2): 194-97.
17. Joca MT. Desempenho do papel de nutriz: interação familiar e suporte de apoio. [trabalho de conclusão de curso] Fortaleza (CE): Universidade Federal do Ceará; 2004.

Notas

- A. Saloia significa camponesa das cercanias de Lisboa (Portugal), de acordo com o Novo Dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e J.E.M.M., EDITORES, LTDA MMVCDW
- B. Índia cunhã significa índia mulher jovem de acordo com o Novo Dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e J.E.M.M., EDITORES, LTDA.

Sobre as Autoras

Mirella Teixeira Joca

Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela UFG.