



Revista Clínica de Medicina de Familia

ISSN: 1699-695X

info@scamfyc.org

Sociedad Castellano-Manchega de Medicina  
de Familia y Comunitaria  
España

Burgo Fernández, José Luis del  
Calambres musculares en los miembros inferiores (Observación preliminar: efecto beneficioso de la  
Trimetazidina)  
Revista Clínica de Medicina de Familia, vol. 2, núm. 5, 2008, pp. 250-253  
Sociedad Castellano-Manchega de Medicina de Familia y Comunitaria  
Albacete, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169614506009>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal  
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

## Calambres musculares en los miembros inferiores (Observación preliminar: efecto beneficioso de la Trimetazidina)

José Luis del Burgo Fernández<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Médico de Familia.  
Centro de Salud de Porzuna  
(Ciudad Real).

Correspondencia:  
José Luis del Burgo  
Fernández. Centro de Salud  
de Porzuna, Av. del Dr. Garrido  
s/n, 13120 – Porzuna  
(Ciudad Real).  
E-mail: jl.delburgo@majada.net

Recibido el 28 de agosto de  
2008.

Aceptado para su publicación  
el 10 de septiembre de 2008.

### RESUMEN

Se expone una serie de observaciones relacionadas con la desaparición o mejoría de los calambres nocturnos en los miembros inferiores durante la utilización de trimetazidina con otros fines terapéuticos.

A partir del efecto beneficioso sobre los calambres musculares nocturnos en una paciente en tratamiento con trimetazidina, se realiza una búsqueda bibliográfica sin obtenerse ningún resultado. Se identifican pacientes en tratamiento con trimetazidina que refieran presentar o haber presentado episodios de calambres. Se localiza un total de 7 pacientes, de los cuales 6 refieren una franca mejoría de los calambres musculares desde el inicio del tratamiento con trimetazidina, sobre todo en lo referente a intensidad y frecuencia de los mismos.

Los efectos observados sugieren un efecto beneficioso de la trimetazidina en los calambres musculares y por tanto un potencial uso terapéutico en los mismos.

**Palabras clave.** Calambre Muscular, Extremidad Inferior, Trimetazidina.

### ABSTRACT

#### **Leg cramps (Preliminary observation: beneficial effect of Trimetazidine)**

Leg cramps are a common condition for which the treatment of reference, quinine, can cause frequent and potentially serious side effects. Here, we describe a series of observations related to the disappearance or improvement of night-time leg cramps during treatment with trimetazidine used for other therapeutic purposes.

Starting from the hypothesis of trimetazidine treatment possibly having a beneficial effect on nocturnal muscle cramps, a literature search was carried out but with no significant results. Patients in treatment with trimetazidine referring to presenting or having presented episodes of cramps were identified. These corresponded to a total of 7 patients in whom 6 referred to a frank improvement of the muscle cramps from the beginning of treatment with trimetazidine, mainly in relation to the intensity and frequency of the cramps.

The observed effects suggest a beneficial effect of trimetazidine on muscle cramps and, therefore, its potential therapeutic use for this indication.

**Key words.** Muscle Cramp, Lower Extremity, Trimetazidine.

### INTRODUCCIÓN

Los calambres en los miembros inferiores son una patología frecuente que, si bien rara vez es grave, puede suponer para los pacientes que los sufren una seria amenaza para el descanso nocturno y su calidad de vida, y en ocasiones también para el desarrollo de actividades laborales y de ocio<sup>1,2</sup>.

Algunos tratamientos han mostrado un modesto efecto en pacientes con calambres asociados a cirrosis<sup>3</sup> o gestación<sup>4</sup>, pero solo la quinina ha mostrado un efecto beneficioso frente a placebo<sup>5,6,7</sup>, aunque un metaanálisis, incluyendo ensayos clínicos no publicados, modera de forma notable el efecto beneficioso de este fármaco<sup>8</sup>, lo que unido a sus efectos secundarios potencialmente serios hace que algunos autores aconsejen reservarla para aquellos pacientes con formas especialmente serias e invalidantes de calambres<sup>2,6</sup>.

La trimetazidina es un derivado piperazínico que se utiliza esencialmente en el tratamiento del vértigo periférico, los acúfenos, la hipoacusia perceptiva, retinopatías isquémicas y en la angina de esfuerzo<sup>9,10</sup>. Generalmente bien tolerada, en un estudio realizado en 149 pacientes con dosis doble de la habitual de trimetazidina se encontró un 29.6%

# UN PACIENTE CON...

Calambres musculares... Del Burgo J.L.

PACIENTE	1	2	3	4	5	6	7
EDAD	62	78	78	81	78	60	60
SEXO	F	M	F	F	M	M	F
PATOLOGIA ASOCIADA	Vértigo HTA Migraña Hiperlipidemia mixta Espondiloartrosis	HTA Diabetes mellitus AIT Artrosis EPOC Insuf venosa	Cardiopatía isquémica Hiperlipidemia mixta Tromboflebitis Valvulopatía mitro-aórtica Gammaptopatía policonal Cataratas Hiperamilasemia	HTA Obesidad Cardiopatía HTA Diabetes mellitus Fibrilación auricular Hipercolesterolemia ACV	HTA Obesidad Hipercolesterolemia Polialtrosis Trast ansioso-depresivo Glucemia basal alterada	Cirrosis hepática no alcohólica Hipertensión portal Hiperuricemia Hernia inguinal Hiperlipidemia mixta	Hernia de hiato Hiperparatiroidismo Enf. de Chon Artrosis Osteopenia Osteoma osteoide Acúfenos Desprendimiento vitreo Disquinesia biliar
TRATAMIENTOS ACTUALES	Valsartan Hidroclorotiazida Rizatriptan Simvastatina	Insulina Valsartan Hidroclorotiazida Atorvastatina Ezetimiba Nabumetona Paracetamol AAS Pregabalina Clopidogrel	AAS Ramipril Dinitrato de isosorbide Bisoprolol Amlodipino Torasemida Simvastatina Omeprazol Paracetamol	Nifedipino Doxazosina Eprosartan Hidroclorotiazida Digoxina Furosemida Metformina Glimepirida Ezetimiba Pantoprazol Acenocumarol	Paracetamol Tramadol Ezetimiba Omeprazol Paroxetina Lorazepam Indapamida	Norfloxacino Torasemida Espironolactona Alopurinol Omeprazol Loracepan Paracetamol	Azathiprina Budesonida Omeprazol Lactitol Ácido fólico Raloxifeno Paracetamol
ANTECEDENTES FAMILIARES	No	No	No	No	No	Sí (Padre)	No
FARMACOS POTENCIALMENTE IMPLICADOS	Simvastatina Hidroclorotiazida	Atorvastatina Hidroclorotiazida	Amlodipino Torasemida Sivastatina Ramipril Bisoprolol	Hidroclorotiazida Furosemida Nifedipino	Indapamida	Torasemida Espironolactona	Raloxifeno
PATOLOGIA POTENCIALMENTE IMPICADA (CLAMBRES 2º)	No	Diabetes mellitus Insuf. Venosa	No	Diabetes mellitus	No	Cirrosis hepática	Hiperparatiroidismo
ANOMALIAS EXPLORATORIAS (pulsos pedios, tibiales, bocio, fasciculaciones, alteraciones musculares, deshidratación... )	No	Pedios y tibiales atenuados ROT atenuados.	No	Tibiales atenuados	No	No	No
ANOMALIAS ANALITICAS (iones, creatinina, transaminasas, ALP, CPK, TSH)	No	Glucemia 203	Creatinina 1.3	Glucemia 179	No	GOT 43 GGT 51	PTH 59.6
ORIENTACION DIAGNOSTICA DE LOS CALAMBRES	Calambres nocturnos idiopáticos.	Calambres nocturnos idiopáticos	Calambres nocturnos idiopáticos	Calambres nocturnos idiopáticos	Calambres nocturnos idiopáticos	Calambres de etiología posiblemente mixta	Calambres de etiología posiblemente mixta

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes en tratamiento con trimetazidina y presencia de calambres musculares.

# UN PACIENTE CON...

Calambres musculares... Del Burgo J.L.

<b>PACIENTE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
AÑOS EVOLUCION	1 - 2	30	6 - 7	2	3 - 4	0,5	Años (¿?)
LOCALIZACION	Pantorri-las	Pantorrilla	Ambas pantorri-las	Ambas pantorri-las	Pantorrilla	DORSO de los pies	Ambas pantorri-las / ambos pies
	Pantorri-las	Pantorrilla	Ambas pantorri-las	No Calam-bres	No calam-bres	No calambres	Ambas pantorri-las / ambos pies
MOMENTO DE APARI-CION	Durante el sueño	Al levan-tarse	Durante el sueño	Previo sueño	Al Levan-tarse	Previo al sueño/ Durante el sueño	Durante el sueño / Con el ejercicio
	Durante el sueño	Al levan-tarse	Durante el sueño	No calam-bres	No calam-bres	No calambres	Con el ejer-cicio
DURACION HABITUAL	5 – 10 min.	5 – 10 min.	< 5 min.	5 – 10 min.	> 10 min.	5 – 10 min.	5 – 10 min.
	Segun-dos	5 – 10 min.	5 – 10 min.	No calam-bres	No calam-bres	No calambres	5 – 10 min.
FRECUENCIA	Diaria	Casi diaria	Ocasional	Casi diaria	Casi diaria	Semanal	Casi diaria
	Ocasional	Ocasional	Semanal	No	No	No	Ocasional
INTENSIDAD (E.V.A.)	6.5	8	1	7	10	4.5	9
	3.5	5	10	0	0	0	8

**Tabla 2.** Evolución de los calambres musculares bajo el tratamiento con trimetazidina. A: antes del inicio del tratamiento con trimetazidina. D: después del inicio del tratamiento con trimetazidina. EVA: Escala visual analógica. Los valores de la EVA con decimales se deben a la valoración realizada por el paciente del tipo “entre 4 y 9”.

de efectos secundarios, destacando entre ellos la fatiga (7%), el mareo (7%), los calambres musculares (7%) y el malestar inducido por el esfuerzo (5.6%)<sup>11</sup>.

A continuación se expone una serie de observaciones relacionadas con la desaparición o mejoría de los calambres nocturnos en los miembros inferiores durante la utilización de trimetazidina con otros fines terapéuticos.

## OBSERVACIONES CLÍNICAS

El caso índice lo constituye una paciente de 62 años de edad con antecedentes personales de herpes zoster, histerectomía a los 25 años de edad y artritis séptica fílica en rodilla izquierda a los 31 años, con anquilosis residual. Está diagnosticada de fascitis plantar, hipertensión arterial, vértigo multifactorial, migraña común, hiperlipidemia mixta y espondiloartrosis. Sigue tratamiento con valsartán e hidroclorotiazida, simvastatina y rizatriptan. Por acúfenos y sensación vertiginosa con inestabilidad se instauró tratamiento con trimetazidina a dosis de 20 mg cada 8 horas. Ante la mala respuesta inicial se remitió a la paciente a la consulta de Otorrinolaringología para revisión, donde sustituyeron la trimetazidina por extracto de ginkgo biloba. Cuando acudió a revisión, la paciente refirió

encontrarse igual de su cuadro vertiginoso, pero había empeorado de los calambres nocturnos que sufre en ambas piernas desde hace 2-3 años y que habían desaparecido con el uso de la trimetazidina. Ante esta afirmación se procedió a descartar causas secundarias de calambres musculares mediante anamnesis, exploración y revisión de los resultados de laboratorio, resultando ser un cuadro de calambres idiopáticos nocturnos.

Se realizó una búsqueda bibliográfica en Medline con los términos “muscle cramps AND trimetazidine” sin limitadores, encontrándose 0 resultados. La búsqueda en IBECS con el término “trimetazidina” produjo 7 entradas, ninguna de las cuales hacía referencia a calambres musculares. En la base de tesis doctorales TES-EO se encontraron dos entradas con “trimetazidina” referentes al efecto citoprotector frente a la isquemia miocárdica en modelos experimentales. Por último, en IME la búsqueda con los parámetros “trimetazidina (título en español) Y calambres (título en español)” tampoco produjo ningún resultado y la sustitución del operador booleano Y por O produjo 22 entradas, ninguna de las cuales relacionaba la patología con el fármaco. Finalmente, una búsqueda libre en Google con los términos trimetazidina y calambres proporciona




Figura 1. Intensidad de los calambres medido con EVA.

114 entradas, no habiéndose encontrado ninguna que relacione la trimetazidina como tratamiento de los calambres musculares.

También se realizó una búsqueda en la base de datos de historias clínicas del cupo médico al que pertenece la paciente de otros pacientes en tratamiento con trimetazidina a fin de localizar a aquéllos que además refieran presentar o haber presentado episodios de calambres. Se identificaron 6 pacientes más en los que, tomando trimetazidina, referían presentar o haber presentado calambres musculares en los miembros inferiores, procediéndose a su entrevista, exploración y revisión de historia clínica. Los resultados se exponen en las tablas 1 y 2

## DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El uso de la trimetazidina en estos pacientes ha supuesto una mejora en su situación general excepto en uno, sobre todo en la frecuencia de la aparición de los mismos, que pasa de ser predominantemente "casi diaria" a "ocasional" o "ausente". En cuanto a la intensidad dolorosa del calambre, también se aprecia una mejoría general, que en tres pacientes supone la ausencia de dolor (figura 1). La valoración de la duración de los mismos se hace más difícil de realizar dada la variabilidad que se aprecia entre los 7 pacientes.

El único paciente que presenta un claro empeoramiento de los calambres se hallaba en tratamiento con trimetazidina desde antes de iniciarse la aparición de los mismos, por lo que tanto en frecuencia como en duración e intensidad los datos son negativos.

A pesar de lo reducido de la serie, estos datos podrían sugerir la hipótesis de un potencial efecto beneficioso de la trimetazidina en el tratamiento de los calambres en general, tanto en el calambre nocturno idiopático (con mucho el más frecuente de todos), como el asociado a algunas alteraciones somáticas (cirrosis, consumo de fármacos, etc.).

La forma de actuar de la trimetazidina como protector celular<sup>9,10,12</sup>, oponiéndose a los efectos nocivos de los radicales libres, evitando la caída del metabolismo energético durante la isquemia tisular, disminuyendo la acidosis intracelular y corrigiendo las alteraciones de los flujos iónicos transmembrana provocados por la isquemia, podrían estar en la base de la corrección de los calambres musculares.

La utilidad de este potencial efecto de la trimetazidina se derivaría de la alta prevalencia del calambre muscular como enfermedad en sí misma (prevalencia que aumenta con la edad, llegando a afectar a un tercio de la población mayor) y en los potencialmente serios secundarismos de la quinina como actual fármaco de referencia.

No obstante y dada la naturaleza del origen de los datos, se hace necesario profundizar en el estudio de la posible aplicación terapéutica de la trimetazidina en los calambres musculares de diferente origen, especialmente a través de ensayos clínicos específicos bien diseñados.

## BIBLIOGRAFÍA

- Millar TM, Layzer RB. Muscle cramps. *Muscle Nerve* 2005; 32(4):431-42.
- Tranche Iparraguirre S. Calambres en las pantorrillas. *AMF* 2007; 3(8):460-64.
- Kugelmas M. Preliminary observation: oral zinc sulfate replacement is effective in treating muscle cramps in cirrhotic patients. *J Am Coll Nutr* 2000; 19(1):13-5.
- Roffe C, Sills S, Crome P, Jones P. Randomised, cross-over, placebo controlled trial of magnesium citrate in the treatment of chronic persistent leg cramps. *Med Sci Monit* 2002; 8(5):326-30.
- Woodfield R, Goodyear F, Arroll B. N-of-1 trials of quinina efficacy in skeletal muscle cramps of the leg. *Br J Gen Pract* 2005; 55(512):181-5.
- Cruz Arnes M, Saá Requejo CM, Moreno Hernández A, Calvo Cebrián A, Hernández Alvares LF, Calderero Castellano G. Calambres nocturnos. *Revista de la SEMG* 2003; 57:553-60.
- Youn G. Calambres en las piernas. *Evid Clin Concisa* 2006; 5:361-2.
- Man Son Hing M, Wells G, Lau A. Quinine for nocturnal leg cramps. A meta-analysis including unpublished data. *J Gen Inter Med* 1998; 13:600-6.
- Anónimo. Trimetazidina. Disponible en: <http://www.iqb.es/cbasicas/farma04/t062.htm>.
- Rodríguez Padial I, Maicas Bellido C, Velázquez Martín M, Gil Polo B. Estudio prospectivo en pacientes diabéticos de la efectividad y la tolerabilidad de la trimetazidina en asociación al tratamiento previo de su enfermedad coronaria. Estudio DIETRIC. *Rev Clin Esp* 2005; 205(2):57-62.
- McClellan KJ, Plosker GL. Trimetazidine. A review of its use in stable angina pectoris and other coronary conditions. *Drugs* 1999; 58:143-57.
- Ruiz Meana M. Trimetazidina, estrés oxidativo y daño celular durante la reperfusión miocárdica. *Rev Esp Cardiol* 2005; 58(8):895-7.