



Revista Clínica de Medicina de Familia

ISSN: 1699-695X

info@scamfyc.org

Sociedad Castellano-Manchega de Medicina
de Familia y Comunitaria

España

Franquelo Morales, Pablo; Alramadam Alramadam, Mubarak; Prada De Medio, Enrique; González Martínez, Félix

Elevación crónica de Creatincinasa

Revista Clínica de Medicina de Familia, vol. 2, núm. 8, 2009, pp. 434-437

Sociedad Castellano-Manchega de Medicina de Familia y Comunitaria
Albacete, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169614511009>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Elevación crónica de Creatincinas

Pablo Franquelo Morales^a, Mubarak Alramadam Alramada
Enrique Prada De Medio^c, Félix González Martínez

^a Servicio de Urgencias.
Hospital Virgen de la Luz,
Cuenca.

^b Servicio de Endocrinología.
Hospital Virgen de la Luz,
Cuenca.

^c Servicio de Análisis Clínicos.
Hospital Virgen de la Luz,
Cuenca.

Correspondencia:
Pablo Franquelo Morales,
Servicio de Urgencias del
Hospital Virgen de la Luz,
C/ Hermandad de Donantes
de Sangre nº 2,
16002 - Cuenca, España.
E-mail: pfranquelo@yahoo.es.

Recibido el 8 mayo de 2009.

Aceptado para su publicación
el 20 de agosto de 2009.

RESUMEN

Las miopatías son entidades en las que se produce afectación musculoesquelética con elevación de creatincinasa en suero. La Enfermedad de Addison y la Hipertermia Maligna constituyen causas poco comunes de miopatía. La Enfermedad de Addison corresponde a una insuficiencia suprarrenal primaria producida por un déficit de glucocorticoides, mineralocorticoïdes y andrógenos por destrucción de la corteza suprarrenal, cuyos síntomas son inespecíficos y el tratamiento es con hidrocortisona. La Hipertermia Maligna se produce por una alteración genética en la que los anestésicos inhalados y los relajantes musculares desencadenan una hipertermia progresiva, con rigidez muscular, taquicardia, hipotensión, rhabdomiolisis, y coagulación intravascular diseminada.

Palabras clave. Enfermedad de Addison. Hipertermia Maligna. Creatincinasa.

ABSTRACT

Chronic creatinine elevation

Myopathy is a disease that affects the musculoskeletal system with elevated serum creatine kinase. Addison's Disease and Malignant Hyperthermia, are rare causes of myopathy. Addison's disease, also known as primary adrenal insufficiency, occurs when the adrenal gland does not produce enough glucocorticoids, mineralocorticoids and androgens because of the destruction of the adrenal cortex. Symptoms are non-specific and it is treated with hydrocortisone. Malignant Hyperthermia is a genetic disorder, in which inhaled anaesthetics and muscle relaxants, trigger progressive hyperthermia with muscle rigidity, tachycardia, hypotension, rhabdomyolysis, and disseminated intravascular coagulation.

Key words. Addison Disease, Malignant Hyperthermia, Creatine Kinase.

INTRODUCCIÓN

Las miopatías son entidades en las que se produce afectación de la fibra muscular esquelética, provocando una elevación de creatincinasa (CK) en suero. Se clasifican según su etiología en congénitas, inflamatorias, metabólicas, de membrana y disfisiopatológicas. Fisiopatológicamente constituyen la expresión de un aumento de la permeabilidad de la membrana celular del músculo como consecuencia de diversas situaciones clínicas. La Enfermedad de Addison (EA) y la Hipertermia maligna (HM) constituyen causas poco comunes de miopatía y, aunque todavía no se ha definido claramente el significado de la persistencia de la elevación de la CK en los pacientes con EA, la afectación musculoesquelética no es un hallazgo frecuente. A continuación presentamos el caso de un varón joven con elevación persistente de la CK sérica, cuyo hermano falleció por una hipertermia maligna.

OBSERVACIONES CLÍNICAS

Varón de 17 años sin alergias medicamentosas conocidas, amigdalectomizado en 2 ocasiones, que consultó por epigastralgia y debilidad muscular generalizada más intensa en los miembros inferiores (MMII) desde hacía 6 meses. Refería una sensación de mareo, cansancio con la deglución y astenia en relación con ejercicios con una duración menor de 10 minutos, que se presentaba con mayor frecuencia en verano y que era vez menos intensos. La clínica mejoraba con el descanso y en los últimos 2 meses había perdido 3 kg de peso. Realizaba ejercicio físico hasta hacía un año sin presentar calambres ni episodios de fatigabilidad marcada. Negaba disfagia, diplopia,

UN PACIENTE CON...

Elevación crónica de Creatincinasa Franquelo P.

sintomatología bulbar. No refería antecedentes de enfermedades neurodegenerativas, miocardiopatías, alteraciones motoras ni de consanguinidad familiares.

En la exploración física presentaba buen estado general con tensión arterial de 140/76 mm/Hg y sin afectación de los pares craneales. Los reflejos osteotendinosos en MMII se encontraban disminuidos y presentaba dificultad para caminar de puntillas e imposibilidad para hacerlo de cucillitas, con la fuerza debilitada y una gran fatigabilidad ante ejercicios repetitivos.

Registró valores de CK superiores a 4.000 U/L, por lo que establecimos un diagnóstico diferencial con las posibles causas de elevación de CK en suero (tabla 1). Tras su ingreso, la CK disminuyó, aunque permaneció elevada (2.345 U/L), con una TSH de 4.19 mU/L, anticuerpos anti-21-hidroxilasa positivos, hormona adenocorticotropa (ACTH) de 1046 pg/mL y cortisol basal <1 mgr/dL. Los anticuerpos anti-TPO fueron negativos, las hormonas de autoinmunidad, incluyendo ANA, complemento, anticuerpo antimúsculo y ANCA, así como la paratohormona, no se vieron alteradas.

Causas cardíacas	Infarto de miocardio Insuficiencia cardiaca Pericarditis Arritmias Insuficiencia coronaria Miocarditis Tromboembolismo pulmonar Cardioversión eléctrica
Causas farmacológicas y tóxicas	Analgésicos Insulina Heparina Meperidina Estatinas Barbitúricos Diuréticos Penicilinas Ampicilina Alcohol Cocaína Clofibratos Clonidina Fenotiazinas Narcóticos
Causas endocrinas	Hiper e hipotiroidismo Enf. De Addison Síndrome de Cushing
Causas musculares	Polimiositis Distrofia muscular de Becker Rabdomiolisis Enf. De Duchenne Miositis Enf. De Kugelburg-Welander
Causas neoplásicas	Cáncer gástrico Cáncer de próstata
Causas psiquiátricas	Eschizofrenia
Otras	Ejercicio físico Sd. de Reye Hipertermia maligna Picadura de abeja Recién nacido Hemólisis Síndrome neuroléptico maligno Cirugías Inyecciones IM y SC Sd. Compartmental Traumatismo muscular Sarcoidosis

Autoinmune (70%)	Aislada o formando parte de un síndrome poliglandular (Enf. de Addison) autoinmune (SPA): SPA tipo I: Adenalitis autoinmune, Candidiasis mucocutánea crónica, Hipoparatiroidismo SPA tipo II: Adenalitis autoinmune, Enfermedad tiroidea autoinmune, Diabetes mellitus tipo 1
Infecciones	TBC, Sífilis, Micosis (Histoplasmosis, Blastomicosis)
Asociadas a VIH/inmunosupresión	CMV, Sífilis, IMAI, criptococo, toxoplasma, linfoma suprarrenal, sarcoma de Kaposi, etc.
Metástasis	Pulmón, Tiroides, Carcinomas o Linfomas gástricos, Melanoma, Riñón, Mama, Vejiga
Enfermedades infiltrativas	Amiloidosis, Sarcoidosis ¹⁰ , Hemocromatosis
Hemorragia o infarto suprarrenal	
Fármacos	ketoconazol, rifampicina, fenitoína, fenobarbital, minoglutetimida, metopirona, mitotano, etomidato
Otras	Hiperplasia suprarrenal congénita, Adrenoleucodistrofia y Adrenomieloneuropatía, Deficiencia familiar y resistencia a los glucocorticoides, Trastornos de la coagulación, Hemorragia adrenal, Síndrome Antifosfolipídico, Sepsis

Tabla 2. Causas de insuficiencia suprarrenal primaria.

Realizamos radiografía de tórax, ecocardiograma y resonancia magnética de MMII y abdomen sin revelar patología. La prueba de Mantoux fue negativa y la espirometría reveló una disfunción ventilatoria restrictiva de grado leve (se cansaba mucho y no podía soplar).

El electromiograma demostró signos de polineuropatía mixta de carácter leve y el paciente desestimó la realización de una biopsia muscular. Ante la sospecha de una miopatía como origen del cuadro, se practicó Test de estimulación de ACTH sintética (Synacthen)¹, objetivándose niveles de cortisol indetectables, lo que diagnosticó una insuficiencia suprarrenal primaria por Addison. Tras administrar hidroaltesona, mejoró notablemente, pudiendo caminar sin incidencias, no obstante, los valores de CK permanecían elevados (654 U/L). El fallecimiento de su hermano, por hipertermia maligna tras una anestesia por cirugía de criptorquidia, sugería una posible susceptibilidad genética como explicación de esos niveles de CK tan elevados, dato que nos orientó hacia una miopatía como explicación del cuadro.

COMENTARIOS

La EA corresponde a una insuficiencia suprarrenal primaria producida por un déficit de glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos como consecuencia de una destrucción de la corteza suprarrenal superior

al 90%, lo cual conlleva un aumento compensado de ACTH. En la actualidad la Adenalitis autoinmune es la causa más frecuente, junto a la Tuberculosis, ha disminuido su incidencia representando un 20% de los casos^{2,3} (tabla 2).

La mayoría de los síntomas de la insuficiencia suprarrenal son inespecíficos y aparecen de forma aislada, por lo es fácil que pasen inadvertidos si no se sospechan. La astenia constituye el síntoma principal, y la pérdida de peso, debilidad y malestar general pueden ser importantes. En ocasiones las alteraciones de la función gastrointestinal son la primera manifestación^{4,5}. La distribución de la hiperpigmentación en codos y areolas son características. El tratamiento se basa en hidrocortisona a dosis de 20 mg/día, duplicando la dosis en situaciones de estrés, cirugía, infecciones, etc.

La HM se produce por una alteración genética incluyente de carácter autosómico dominante en un 50% de los casos, en la que los anestésicos inhalados y los relajantes musculares desencadenan una hipertermia progresiva ($>45^{\circ}\text{C}$), con rigidez muscular, taquicardia, hipotensión, rabdiomiolisis, y coagulación intravascular diseminada con consecuencias fatales. Este caso revela cómo la elevación mantenida de CK en un varón joven puede ser la expresión de entidades diferentes, como son la EA, en este ca-

UN PACIENTE CON...

Elevación crónica de Creatincinasa Franquelo P.,

una miopatía de origen endocrino, y la condición de portador de una HM, como diagnóstico de sospecha tras la muerte por rabdiomiolisis e hipercaliemia aguda en su hermano. No obstante, no existe disponibilidad en nuestro país para la realización de test genéticos de HM, ni test de contractilidad muscular en biopsia para descartar HM.

BIBLIOGRAFÍA

1. Maguire AM, Biesheuvel CJ, Ambler GR, Moore B, McLean M, Cowell CT. Evaluation of adrenal function using the human corticotrophin-releasing hormone test, low dose Synacthen test and 9am cortisol level in children and adolescents with central adrenal insufficiency. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2008; 68:683-91.
2. Kong MF, Lawden M, Howlett T. The Addison's disease dilemma -autoimmune or ALD? *Lancet* 2008; 371:1970.
3. Winqvist O, Rorsman F, Kämpe O. Autoimmune adrenal insufficiency: recognition and management. *Bio Drugs* 2000; 13:107-14.
4. Wiltshire EJ, Wilson R, Pringle KC. Addison's disease presented with an acute abdomen and complicated by cardiomyopathy. *J Diatr Child Health* 2004; 40:644-5.
5. Fernández Serrano F, Collado Sáiz I, Del Cañizo Gómez. Insuficiencia suprarrenal primaria como primera manifestación de un síndrome pluriglandular autoinmune. *Semergen* 2005; 31:31-4.
6. Litman R, Rosenberg H. Malignant hyperthermia update on susceptibility testing. *JAMA* 2005; 293:2918-24.
7. Fernández C, Maves de Paula A, Figarella-Branger D, Giorgi Chabrol B, Monfort M, et al. Diagnostic evaluation of clinically normal subjects chronic hyperCKemia. *Neurology* 2006; 66:1585-7.
8. Capasso M, De Angelis M, Di Muzio A, Scorcioilla O, Paci Stuppia L, et al. Familial idiopathic hyper-CK-emia:an underrecognized condition. *Muscle Nerve* 2006; 33:760-5.
9. Ramírez Espinosa MF, Agulló López JA. A propósito de un caso de elevación no explicada de la creatincinasa en un varón san de 20 años de edad. *Semergen* 2006; 32:243-5.
10. Selva-O'Callaghan A, Labrador-Horillo M, Gallardo E, Hernández A, Grau-Junyent JM, Vilardell-Tarres M. Muscle inflammation in a patient with autoimmune Addison's disease and sarcoidosis in a patient with ferlin deficiency. *Neuromuscul Disord* 2006; 16:208-9.