



Archivos de Medicina Veterinaria
ISSN: 0301-732X
archmv@uach.cl
Universidad Austral de Chile
Chile

González-Acuña, D; Valenzuela, G; Moreno, L; Ardiles, K; Guglielmone, A
Nuevos hospedadores para las garrapatas *Amblyomma tigrinum* y *Rhipicephalus sanguineus* (Acari: Ixodidae) en Chile
Archivos de Medicina Veterinaria, vol. 38, núm. 3, 2006, pp. 273-275
Universidad Austral de Chile
Valdivia, Chile

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173013331012>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

Nuevos hospedadores para las garrapatas *Amblyomma tigrinum* y *Rhipicephalus sanguineus* (Acari: Ixodidae) en Chile

New hosts for the ticks *Amblyomma tigrinum* and *Rhipicephalus sanguineus* (Acari: Ixodidae) in Chile

D González-Acuña^{1*}, G Valenzuela¹, L Moreno¹, K Ardiles¹, A Guglielmone²

¹ Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Concepción, Chillán, Chile.

² Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, CC 22, CP 2300 Rafaela, Santa Fe, Argentina.

SUMMARY

For the first time in Chile, cases of nymphs of the brown dog tick (*Rhipicephalus sanguineus*) being found on two goats (*Capra hircus*), and adult (one male and a gravid female) white striped ticks (*Amblyomma tigrinum*) being found on cattle (*Bos taurus*) have been reported. The aim of this review is to discuss the importance of these findings.

Palabras clave: *Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma tigrinum*, garrapatas, Chile

Key words: *Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma tigrinum*, ticks, Chile.

INTRODUCCION

La garrapata café del perro, *Rhipicephalus sanguineus* (Latreille 1806), tiene su origen en África desde donde se dispersó a través de todo el mundo. Su distribución es probablemente la más amplia a nivel mundial, se encuentra entre los 45° latitud norte y 45° latitud sur (Keirans 1992). En Chile se describió por primera vez en el año 1976 en un perro en Santiago (Región Metropolitana) y desde entonces se ha diseminado rápidamente debido a su alto poder biótico, a las excelentes condiciones ecológicas para su desarrollo y, además, a que no fue controlada oportunamente (Alcaíno 1985).

En las regiones tropicales y subtropicales, esta especie puede ser encontrada durante todo el año (Strickland y col 1976); sin embargo, en países con cuatro estaciones bien definidas son más abundantes en primavera y verano (Alcaíno y col 1990), comenzando a disminuir paulatinamente en verano y otoño (Alcaíno 1985). En el neotrópico es considerada el ectoparásito de mayor importancia en los perros (Guglielmone y col 2003). En Chile se ha registrado en perros y menos comúnmente en gatos en el centro y centro-sur de Chile (Alcaíno 1985, Alcaíno y col 1990, Schenone 1996, Morales y col 2001, Muñoz y Casanueva 2001) como también en hospedadores inusuales como el guarén

(*Rattus norvegicus*), el conejo doméstico (González-Acuña y col 2003^b; González-Acuña 2004) y el hombre (Schenone 1996).

Por otro lado, *Amblyomma tigrinum* Koch, 1844 es una especie sudamericana descrita en Argentina, Bolivia, Brasil, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Chile (Jones y col 1972). Su primera descripción en Chile fue hecha por Tagle y Alvarez en 1957 como *A. maculatum* en zorros (*Pseudalopex spp.*) provenientes de Arauco, pero Tagle y Alvarez (1959) revalidan su diagnóstico como *A. tigrinum*. Más tarde, Tagle (1971) describe ejemplares adultos de *A. tigrinum* en perros y zorros de Nahuelbuta y Valparaíso y recientemente fueron descritos en perros en la ciudad de Concepción (Muñoz y Casanueva 2002) y también en zorros de San Antonio (González-Acuña y col 2003^a). En Ñuble se registraron los estados larvarios y de ninfa de *A. tigrinum* en las aves silvestres codorniz (*Callipepla californica*), tórtola (*Zenaida auriculata*) y perdiz (*Nothoprocta perdicaria*) (González-Acuña y col 2004).

El presente estudio presenta los primeros registros en Chile de *R. sanguineus* y *A. tigrinum* en cabra y bovino respectivamente.

MATERIAL Y METODOS

La recolección de los Ixodidos fue realizada el día 3 y 14 de noviembre de 2004 en forma manual de los hospedadores *Capra hircus* y *Bos taurus* respectivamente. Las especies llegaron como pacientes a la clínica de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Concepción (36°36'S; 73°03'W). Las cabras (madre e

Aceptado: 11.04.2006.

* Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Concepción, Casilla 537, Fax: 42-270212, Chillán, Chile. E-mail: danigon@udec.cl

hija) provenían de San Ignacio (37°13'S; 72°31'W) y fueron traídas debido a debilidad postparto. De ambos ejemplares fueron aislados en total 54 ninfas de garrapatas que se ubicaban ingurgitadas preferencialmente en la zona de la tabla del cuello. El bovino correspondió a un ternero macho proveniente de la localidad de Quirihue (36°17'S; 72°32'W) que fue traído debido a una severa hipovitaminosis A. Desde este ejemplar se aisló un macho y una hembra ingurgitada en el dorso del animal, la cual fue mantenida bajo condiciones controladas de temperatura y humedad (24°C y 80% H₂O) oviponiendo 10 días después de la extracción aproximadamente 4.000 huevos. Los ejemplares de garrapatas colectados fueron conservados en alcohol 70% y determinados de acuerdo con las descripciones de Boero (1957) y Estrada-Peña y col (2005). El material estudiado fue depositado en la colección del laboratorio de Zoología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Concepción.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las 54 ninfas aisladas de cabra fueron identificadas como *R. sanguineus*. A pesar que los principales hospedadores de *R. sanguineus* son carnívoros (Guglielmone y col 2003) existen varios diagnósticos en otros tipos de hospedadores en Chile (mencionados en la introducción) y en otros países neotropicales como coendúes silvestres (Ivancovich y Luciani 1992), marsupiales (Santa Cruz y col 1998), palomas (Diogo y col 2003), bovinos (IICA 1988), tamandua (Floch y Fauran 1958), reptiles como aligator y tortugas (Keirans 1985) entre otros.

En el neotrópico, hasta la fecha existen tres registros de parasitismo por *R. sanguineus* en cabra que corresponden a Van Volkenberg (1939), en Mayaguez (Puerto Rico), Barrera (1956) en la localidad de Torreón en México e Ivancovich y Luciani (1992) en Colonia Benítez (Argentina). La garrapata café del perro se describió en Chile hace menos de 30 años y debido a que la cabra no ha sido un hospedador regular para ixodoideos (González-Acuña y Guglielmone 2005), la adaptación de *R. sanguineus* a la cabra y también otros animales domésticos podría llegar a jugar un importante rol en el mantenimiento de la especie. El presente registro es el primero para Chile de un Ixodoideo en cabra y, además, es el primero en el que *R. sanguineus* parasita a un Artiodactyla en el país, por lo que sería de importancia considerar los perros como posibles fuentes de contagio para los caprinos y otros animales y, a su vez, estos jugar un papel como reservorios de la mencionada garrapata.

Las garrapatas aisladas del bovino fueron identificadas como un macho y una hembra grávida de *A. tigrinum*. Guglielmone y col 2003 describen *A. tigrinum* como una garrapata que parasita principalmente en carnívoros. Además, se ha descrito su hallazgo en el hombre (Floch y Fauran 1958, Ivancovich 1980, Evans y col 2000). En

el neotrópico *A. tigrinum* ha sido registrado parasitando a bovinos en Argentina (Guglielmone y col 2000), en Paraguay (Massi Pallares y Benítez Usher 1982) y Uruguay (Sampaio y Larrosa 1992). La hembra de *A. tigrinum* ovipuso cerca de 4.000 huevos de los cuales 585 no eclosionaron.

En Chile, los registros de garrapatas en bovinos se restringen al trabajo de Descazeaux (1925), el que describió *Ornithodoros megnini* (= *Otobius megnini*) en el norte y centro de Chile. Además, Gervais (1849) reporta *Ixodes ricinus* en bovinos, sin embargo, se asume que *I. ricinus* es una especie paleártica y que el registro hecho por Gervais podría tratarse de *I. pararicinus* (González-Acuña y Guglielmone 2005).

Sería de interés un estudio de abundancia de los ixódidos *R. sanguineus* y *A. tigrinum* en animales domésticos y correlacionar prevalencia con la presencia de perros parasitados en el área de estudio.

RESUMEN

Se registran, por primera vez en Chile, ninfas de garrapata café del perro (*Rhipicephalus sanguineus*) parasitando dos ejemplares de cabras (*Capra hircus*) y adultos (un macho y una hembra grávida) de la garrapata de listas blancas (*Amblyomma tigrinum*) parasitando a un bovino (*Bos taurus*). La importancia de los presentes reportes, hechos en la provincia de Ñuble, son discutidos.

REFERENCIAS

- Alcaíno H. 1985. Antecedentes sobre la garrapata café del perro (*Rhipicephalus sanguineus*). *Monog Méd Vet* 7, 48-55.
- Alcaíno H, T Gorman, F Jiménez. 1990. Ecología del *Rhipicephalus sanguineus* (Ixodidae) en la Región Metropolitana de Chile. *Arch Med Vet* 22, 159-168.
- Barrera A. 1956. Algunas consideraciones biológicas sobre *Rhipicephalus sanguineus* (Latreille), 1806, (sic) transmisor de fiebre manchada en el norte y noroeste de México. *Rev Inst Salub Enf Trop* 16, 51-59.
- Boero JJ. 1957. Las garrapatas de la República Argentina (Acarina: Ixodoidea). Depto Edit Univ Buenos Aires, Buenos Aires, Pp 113.
- Descazeaux MJ. 1925. Sur la présence au Chili de l'*Ornithodoros megnini*. *Bull Soc Path Exot* 18, 408-409.
- Diogo AA, L Guerim, JR Pires, ALG Cuoto, NM Serra Freire. 2003. Parasitismo por *Rhipicephalus sanguineus* Latreille, 1806 em *Columba livia* Linnaeus na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. *Entomol Vectores* 10, 277-280.
- Estrada-Peña A, JM Venzel, AJ Mangold, MM Cafrune, AA Guglielmone. 2005. The *Amblyomma maculatum* Koch, 1844 (Acarí: Ixodidae: Amblyomminae) tick group: diagnostic characters, description of the larva of *A. parvitarsum* Neumann, 1901, 16S rDNA sequences, distribution and hosts. *Syst Parasitol* 60, 99-112.
- Evans DE, JR Martins, AA Guglielmone. 2000. A review of the ticks (Acarí: Ixodidae) of Brazil, their hosts and geographic distribution -1. The state of Rio Grande do Sul, Southern Brazil. *Mem Inst Oswaldo Cruz* 95, 453-470.
- Floch H, P Fauran. 1958. Ixodidés de la Guyane et des Antilles Françaises. *Arch Inst Pasteur Guyane* 446, 1-94.
- Gervais P. 1849. Arácnidos. En: *Historia física y política de Chile*. C Gay, París, Pp 5-52.
- González-Acuña D, JM Venzel, JE Keirans, AA Guglielmone. 2003a. The genus *Amblyomma* Koch, 1844 (Acarí: Ixodidae) in Chile,

- with new records of *A. argentinae* Neumann, 1904 and *A. tigrinum* Koch, 1844. *Syst Appl Acarol* 8, 85-88.
- González-Acuña D, JM Venzal, AA Guglielmone. 2003b. Primer registro de *Rhipicephalus sanguineus* (Acarina: Ixodidae) en *Rattus norvergicus* (Mammalia: Rodentia) en Chile. *Gayana Zool* 67, 121-122.
- González-Acuña D. 2004. El conejo (*Oryctolagus cuniculus*, Mammalia: Lagomorfo) como hospedador de la garrapata café del Perro (*Rhipicephalus sanguineus*, Acari: Ixodidae). *Ciencia Ahora* 7, 100-103.
- González-Acuña D, J Venzal, A Guglielmone, A Daugschies, L Rubilar-Contreras, O Skewes-Ramm. 2004. First record of immature stages of *Amblyomma tigrinum* (Acari: Ixodidae) on wild birds in Chile. *Exp Appl Acarol* 33, 153-156.
- González-Acuña D, AA Guglielmone. 2005. Ticks (Acari: Ixodoidea: Argasidae, Ixodidae) of Chile. *Exp Appl Acarol* 35, 147- 163.
- Guglielmone AA, AJ Mangold, CE Luciani, AE Viñabal. 2000. *Amblyomma tigrinum* (Acari:Ixodidae) in relation to phytogeography of central-northern Argentina with note on hosts and seasonal distribution. *Exp Appl Acarol* 24, 983-900.
- Guglielmone AA, A Estrada-Peña, JE Keirans, RG Robbins. 2003. Ticks (Acari: Ixodidae) of the Neotropical zoogeographic region. Int. Cons. Ticks Tick-Borne Dis., Atalanta, Houten, The Netherlands, Pp 174.
- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 1988. Estudio ecológico y epidemiológico de garrapatas en Guatemala. Inf Coop Técn IICA-MAGA, Pp 43.
- Ivancovich JC. 1980. Reclasificación de algunas especies de garrapatas del género *Amblyomma* (Ixodoidea) en Argentina. *Rev Inv Agropec* 15, 673-682.
- Ivancovich J, C Luciani. 1992. Las garrapatas de Argentina. *Monogr Asoc Arg Parasitol Vet*, Pp 95.
- Jones EK, CM Clifford, JE Keirans, GM Kohls. 1972. The ticks of Venezuela (Acarina: Ixodoidea) with a key to the species of *Amblyomma* in the Western Hemisphere. Brigham Young Univ. *Sci Bull Biol Ser* 17, 1-40.
- Keirans JE. 1985. George Henry Falkiner Nuttall and the Nuttall tick catalogue. U S Dept Agric, *Agric Res Ser Misc Pub* (1438), Pp 1.785.
- Keirans JE. 1992. Systematics of the Ixodida (Argasidae, Ixodidae, Nuttalliellidae): an overview and some problems. En: Fivaz B, Petney T, Horak I (eds.). *Tick vector biology, medical and veterinary aspects*. Springer-Verlag, Berlin, Pp 1-21.
- Massi Pallarés R, CA Benítez Usher. 1982. De la distribución de Ixodina (Vander Hammen, 1968) en el Paraguay. *Rev Paraguaya Microbiol* 17, 49-52.
- Morales MA, L Ibarra, L Cáceres. 2001. Infestación por garrapatas en perros y viviendas del gran Santiago, Chile. *Resúmenes del VII Congreso Nacional de Veterinaria, Montevideo, Uruguay*, Pp 5.
- Muñoz LE, ME Casanueva. 2001. Estado actual del conocimiento de las garrapatas (Acari: Ixodidae) asociadas a *Canis familiaris* L. *Gayana* 65, 193-210.
- Muñoz LE, ME Casanueva. 2002. Garrapatas (Acari: Ixodidae) en perros de la ciudad de Concepción. *Arch Med Vet* 34, 131-134.
- Sampaio I, A Larrosa. 1992. Hallazgo de *Amblyomma tigrinum* (Koch 1884) (sic) (Acari, Ixodidae) en el Uruguay. *Bol Soc Zool Uruguay*, 7, 1-87.
- Santa Cruz AM, O Prieto, OJ Lombardero, L Gómez, N Schleiber. 1998. First finding of *Rhipicephalus sanguineus* Latreille, 1806 (Acari: Ixodidae) infesting *Didelphis albiventris* (Marsupialia: Didelphidae) in the province of Corrientes, Argentina. *Resúmenes XIII Congreso Asociación Mundial Medicina Veterinaria de Pequeños Animales, Buenos Aires* 2, 787.
- Schenone H. 1996. Diagnósticos hechos a 1.384 pacientes que consultaron por probable mordedura de arañas o picaduras de insectos. *Bol Chil Parasitol* 51, 20-27.
- Strickland RK, RR Gerrish, JL Hourigan, GO Schubert. 1976. Ticks of Veterinary Importance. Agriculture Handbook Nº 485. United States Department of Agriculture, Washington DC, Pp 122.
- Tagle I. 1971. Ixodoidea en Chile. *Bol Chil Parasitol* 26, 46-49.
- Tagle I, V Alvarez. 1957. Existencia de *Amblyomma maculatum* Koch 1844 en zorros de Chile. *Bol Chil Parasitol* 12, 66.
- Tagle I, V Alvarez. 1959. Rectificación de diagnóstico: *Amblyomma tigrinum*, Koch en lugar de *Amblyomma maculatum*, Koch. *Bol Chil Parasitol* 14, 56-57.
- Van Volkenberg HL. 1939. An annotated check list of the parasites of animals in Puerto Rico. Un. St. Dept. Agric. Circ. Puerto Rico Exp. Stn., Pp 12.