



Revista Brasileira de Ciência do Solo

ISSN: 0100-0683

revista@sbcs.org.br

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Brasil

Nunes Alcântara, Elifas; Azevedo Nóbrega, Júlio César; Martins Ferreira, Mozart
MÉTODOS DE CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS NA CULTURA DO CAFEEIRO (*Coffea*
arabica L.) E COMPONENTES DA ACIDEZ DO SOLO

Revista Brasileira de Ciência do Solo, vol. 31, núm. 6, 2007, pp. 1525-1533

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo

Viçosa, Brasil

Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180214061029>

- Como citar este artigo
- Número completo
- Mais artigos
- Home da revista no Redalyc

redalyc.org

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

MÉTODOS DE CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS CULTURA DO CAFEEIRO (*Coffea arabica* L.) E COMPONENTES DA ACIDEZ DO SOLO⁽¹⁾

Elifas Nunes Alcântara⁽²⁾, Júlio César Azevedo Nóbrega⁽³⁾ & Mozart
Martins Ferreira⁽⁴⁾

RESUMO

Em lavouras perenes, como na cultura do cafeeiro, o controle de plantas invasoras tem sido feito por meio de métodos manuais, mecanizados, químicos e associações destes. De modo geral, têm-se avaliado os diferentes métodos sob o ponto de vista de eficiência e de custo no controle das plantas invasoras; no entanto, a influência deles sobre as condições químicas do solo, praticamente, não tem sido estudada, principalmente a longo prazo. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes métodos de controle de plantas invasoras na cultura do cafeeiro sobre os componentes da acidez de um Latossolo Vermelho distroférico da região de São Sebastião do Paraíso, MG. Sete tratamentos de controle de plantas invasoras foram avaliados: roçadora (RÇ), grade (GR), enxada rotativa (RT), herbicida de pós-emergência (HC), herbicida de pré-emergência (HR), capina manual (CM) e testemunha sem capina (SC), dispostos em blocos casualizados com três repetições. Amostras de solo, em cada tratamento, foram coletadas a cada dois anos, a partir de 1980, nas camadas de 0-0,15 e 0,15-0,30 m, para avaliação de pH, Al^{3+} , acidez potencial ($\text{H} + \text{Al}$) e saturação por Al^{3+} (m). O sistema HR aumentou o teor e a saturação por Al^{3+} e a acidez potencial e diminuiu o pH, quando comparado com os demais métodos de controle de plantas invasoras, principalmente com a testemunha (SC). O tratamento SC mostrou efeito contrário ao do HR, aumentando

⁽¹⁾ Parte da Tese de Doutorado do primeiro autor apresentada ao Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Lavras – UFLA. Recebido para publicação em outubro de 2005 e aprovado em julho de 2007.

⁽²⁾ Pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG/CTS.M. Campus Universitário da Universidade Federal de Lavras – UFLA, Caixa Postal 176, CEP 37200-000 Lavras (MG). Bolsista do FAPEMIG. E-mail: elifas@epamig.com.br

os valores de pH e diminuindo o teor de Al^{3+} e a saturação por Al^{3+} , em ambas as camadas de solo. O RÇ foi o tratamento que mais se aproximou do SC, e os demais tratamentos, no geral, não apresentaram comportamento diferenciado.

Termos de indexação: manejo de invasoras, qualidade química do solo.

SUMMARY: *WEED CONTROL METHODS AND SOIL ACIDITY COMPONENTS IN COFFEE PLANTATION (Coffea arabica L.)*

In perennial agriculture, such as coffee plantation, weeds are controlled by hand, mechanized, and chemical weeding and their combinations. Methods that differ in terms of efficiency and costs have been evaluated; however, the influence of these methods on the soil chemical conditions has not been studied, particularly in the long term. This study aimed to evaluate the effect of different weed control methods on soil acidity components of a coffee plantation on a dystroferic Red Latosol in an experiment installed at EPAMIG Experimental Station, in São Sebastião do Paraíso, MG, Brazil. Seven weed control treatments were evaluated: mower (MW), coffee tandem disk harrow (TD), rotary tiller (RT), post (CH) and pre-emergence herbicide (RH) application, hand hoe (HH) and no weed control (NC). The treatments were evaluated in a randomized block design with three repetitions. Soil samples were collected every two years, for each treatment, starting in 1980, in the 0–0.15 to 0.15–0.30 m soil layers and assessed for pH, Al^{3+} ($\text{mmol}_c \text{ dm}^{-3}$), effective acidity ($\text{H} + \text{Al}$) ($\text{mmol}_c \text{ dm}^{-3}$), and Al^{3+} saturation (%). The HR system increased Al^{3+} content and saturation and the effective acidity and reduced the pH, compared to the other weed control methods, especially the control (NC). Contrarily to the RH, the NC treatment resulted in higher pH values, Al^{3+} content and Al^{3+} saturation in both soil layers. The MW treatment was closest to the SC treatment, while the other weed control systems did not differ significantly.

Index terms: weed management, chemical soil quality.

INTRODUÇÃO

A conversão de ecossistemas nativos em ecossistemas agrícolas resulta, quase sempre, na perda de matéria orgânica do solo, a qual está intimamente associada à sua qualidade. Isso ocorre devido à estreita relação existente entre o teor de matéria orgânica e a magnitude de várias propriedades químicas, físicas e biológicas do solo (Bayer & Mielniczuk, 1997; Bayer & Bertol, 1999).

A rápida degradação de alguns atributos químicos do solo quando sob cultivo intensivo tem requerido a aplicação contínua de corretivos e de fertilizantes ao solo, fato que contribui para reduzir a sustentabilidade econômica dos ecossistemas agrícolas, principalmente em países de clima tropical em desenvolvimento, devido ao alto custo desses insumos. No geral, os solos de regiões tropicais são ácidos e apresentam elevados teores de Al trocável.

de manejo influenciam o teor de matéria orgânica do solo e, conseqüentemente, os seus atributos químicos. O efeito de técnicas de cultivo que permitem a redução da superfície do solo, pelo retorno dos resíduos de culturas e das plantas invasoras, como o sistema plantio direto, tem-se mostrado positivo em termos de melhoria de propriedades químicas do solo (Reicosky et al., 1995; Silva & Ribeiro, 1996; Iyamuremye & Dick, 1996; Santos & Tomm, 1996; Bayer & Mielniczuk, 1997), devido, principalmente, à melhoria do teor de matéria orgânica (Aas et al., 1995; Santos & Tomm, 1996; Bayer & Mielniczuk, 1997).

A recuperação do potencial produtivo dos solos sob uso de plantas, como gramíneas e leguminosas (Bayer et al., 2001), e a utilização de sistemas de manejo de rotação de culturas (Bayer & Mielniczuk, 1999), também tem sido visto como uma alternativa devido ao aumento que promovem no teor de matéria orgânica e, conseqüentemente, na melhoria das condições químicas do solo. Relação linear entre o aporte de resíduos vegetais durante o ciclo de

Em lavouras perenes, como a cultura do cafeeiro (*Coffea arabica*), o manejo do solo se resume, basicamente, na adição de corretivos/fertilizantes e no controle de plantas invasoras. O controle de plantas invasoras tem sido feito por meio de métodos manuais, mecanizados, químicos e associações destes. De modo geral, tem-se buscado avaliar diferentes métodos sob o ponto de vista de eficiência e de custo no controle dessas plantas invasoras. Todavia, a influência de diferentes métodos sobre as condições químicas do solo, praticamente, não tem sido estudada, sobretudo a longo prazo. O controle de plantas invasoras, quando adequadamente, feito, pode contribuir para melhoria da qualidade do solo, principalmente em decorrência da elevação do teor de matéria orgânica do solo promovida pela diversidade de espécies de plantas invasoras presentes na cultura (Alcântara & Ferreira, 2000).

Diante do exposto, este estudo teve por objetivo avaliar o efeito de diferentes métodos de controle de plantas invasoras na cultura do cafeeiro sobre os componentes da acidez de um Latossolo Vermelho distroférico.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na Fazenda Experimental da EPAMIG, em São Sebastião do Paraíso, MG (46 ° 55 ' W e 20 ° 55 ' S), em um Latossolo Vermelho distroférico textura argilosa (520 g kg⁻¹ de argila, 360 g kg⁻¹ de areia e 120 g kg⁻¹ de silte), com 8 % de declividade. A vegetação original da área de estudo era formada por floresta estacional semidecidual, transicional para Cerrado. A precipitação pluvial média anual da região é de 1.470,4 mm e a temperatura média anual de 20,8 °C, com média máxima e mínima de 27,6 e 14,1 °C, respectivamente.

Condução do experimento, tratamentos e delineamento experimental

O plantio de café foi realizado em 1974, empregando-se o cultivar Catuaí Vermelho LCH 2077-2-5-99, no espaçamento 4 x 1 m, totalizando 2.268 covas ha⁻¹. Em 1977, deu-se a instalação do experimento, que continua sendo conduzido até os dias atuais. No entanto, o período contemplado neste estudo compreende as avaliações feitas entre os anos de 1980 a 1995. A aplicação de fertilizantes no solo foi efetuada, desde a implantação, de acordo com as análises de solo e as recomendações técnicas para a cultura, elaboradas pela Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais (1989). A calagem foi feita desde a implantação da lavoura na área de projeção da copa das plantas.

também denominadas “ruas” (Quadro 1). As linhas das linhas de plantio, correspondendo às pro-copas dos cafeeiros ou “saías”, foram mantidas limpas pelo uso de herbicidas e, ou, capinas.

Todas as operações de controle foram realizadas sempre que se observava 90 % da “rua” coberta por plantas invasoras e, ou, estas apresentavam 0,45 m de altura. Assim, o número médio de operações necessárias para controle das plantas invasoras durante cada ano, variou conforme o ano (Quadro 1).

Para controle de plantas invasoras na cultura do cafeeiro, na pré-emergência (HR), utilizou-se a mistura de dois herbicidas ametryn (2-etilamino-4-isopropil-6-metiltio-s-triazina) + simazine (2-cloro-6-etilamino-S-triazina), nas doses de 2,4 kg ha⁻¹ na formulação pó molhável, e de 2,25 kg ha⁻¹ na formulação líquida, aplicadas com volume de 400 L ha⁻¹. Quando da ocorrência de emergência de algumas plantas invasoras, estas foram controladas pela catação, com enxada manual e aplicação do herbicida de pré-emergência.

Para controle em pós-emergência (HC) foi utilizado, inicialmente, uma mistura de paraquat [1,1-dietil-4,4' bipiridílio ion (dicloreto)] e diquat [1,1-dietil-2,2' dihidrodipirido [1,2-a-2'-1'-e] pyrazine] na proporção de 0,40 kg ha⁻¹ de i.a. Posteriormente, o controle foi efetuado pela aplicação de glyphosate (fosfonometil) glicina, na dose de 1,44 kg ha⁻¹, alternado com a mistura de glyphosate + 2,4-diclorofenoxiacético, na proporção, respectivamente, de 160 + 120 g ha⁻¹ e dose de 640 g + 480 g ha⁻¹.

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com sete tratamentos e três repetições. Cada parcela, constituída por três linhas, era constituída por 108 plantas de café.

Quadro 1. Métodos de controle de plantas invasoras utilizados na cultura do cafeeiro em Latossolo Vermelho distroférico. Respostas e respectivos números de operações realizadas por ano

Tratamento	Operações
Roadadora (RÇ)	
Grade (GR)	
Enxada rotativa (RT)	
Herbicida de pós-emergência (HC)	
Herbicida de pré-emergência (HR)	

Amostragem de solo e análises químicas

As amostras de solo para as análises químicas foram coletadas a cada dois anos, a partir de 1982, coincidindo com os anos de baixa produção, após a “esparrama de cisco” (redistribuição da serapilheira). As amostras foram coletadas na “rua” central de cada tratamento, nas camadas de 0–0,15 e 0,15–0,30 m, em número de seis por camada e por parcela.

Foram avaliados o pH em água (1:2,5), acidez potencial (H + Al), Al trocável e saturação por Al³⁺, segundo Vettori (1969) e Embrapa (1979).

Análises estatísticas

Os resultados foram submetidos à análise de variância e de regressão. As análises de variância foram realizadas segundo o delineamento experimental de blocos ao acaso, em esquema de parcelas (métodos de controle de plantas invasoras) subdivididas no tempo (biênios), sendo as médias comparadas pelo teste de Duncan a 5 %. As equações de regressão foram determinadas para avaliar e descrever as respostas

de todas as variáveis estudadas em função de matéria orgânica, em cada condição de controle de plantas invasoras. Além disso, foram determinados os coeficientes de correlação entre os componentes da acidez do solo, com os teores de matéria orgânica, com o objetivo de avaliar o grau de associação entre as variáveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Acidez do solo e seus componentes (H + Al, Al³⁺ e saturação por Al³⁺)

Os tratamentos de controle de plantas invasoras influenciaram, significativamente, os componentes da acidez do solo: pH, H + Al e saturação por Al³⁺ nas camadas de 0–0,15 m (p < 0,05) e de 0,15–0,30 m (p < 0,01), e Al³⁺ (p < 0,01).

O valor do pH do solo, ao longo do tempo de observação (biênios), nas camadas de 0–0,15 e 0,15–0,30 m (Quadro 2), manteve-se, praticamente, inalterado. Entretanto, diferenças foram observadas

Quadro 2. Valor de pH em água das camadas de 0–0,15 e 0,15–0,30 m de um Latossolo Vermelho distroférrico em função do tratamento de controle de plantas invasoras na cultura do cafeeiro

Tratamento	Ano							
	1980	1982	1984	1986	1988	1991	1993	1995
0–0,15 m								
RÇ	5,5 aA	6,1 abA	6,0 abA	5,9 abA	5,2 aA	6,6 aA	5,8 aA	6,0 bA
GR	5,2 aA	6,0 abA	5,8 abcA	5,6 bA	5,2 aA	6,3 aA	5,7 aA	6,2 bA
RT	5,4 aA	5,8 abA	5,5 bcA	5,9 abA	5,1 aA	6,3 aA	5,5 aA	6,1 bA
HC	5,5 aA	5,5 bA	5,8 abcA	6,0 abA	5,3 aA	6,4 aA	5,7 aA	6,2 bA
HR	5,4 aA	5,8 abA	5,3 cA	5,7 bA	5,1 aA	5,6 bA	5,2 aA	6,2 bA
CM	5,5 aA	6,0 abA	6,1 aA	5,8 abA	5,2 aA	6,3 aA	5,8 aA	6,4 abA
SC	5,6 aA	6,3 aA	5,9 abA	6,3 aA	5,4 aA	6,8 aA	5,8 aA	6,8 aA
CV (%)	4,41	6,63	7,62	5,43	4,33	6,14	5,86	4,56
0,15–0,30 m								
RÇ	5,4 aA	5,3 aA	5,4 abA	5,2 abcA	5,4 aA	6,4 bA	5,9 aA	5,9 aA
GR	4,8 aA	5,4 aA	5,4 abA	5,5 abA	5,4 aA	6,4 bA	5,7 abA	5,8 aA
RT	5,0 aA	5,2 aA	4,9 bA	5,5 abA	5,2 aA	6,2 bA	5,7 abA	6,0 aA
HC	5,3 aA	5,4 aA	5,2 bA	5,3 abcA	5,3 aA	6,1 bA	5,5 abA	5,2 bA
HR	5,2 aA	5,5 aA	5,0 bA	4,9 bcA	4,8 aA	5,2 cA	5,1 bA	5,2 bA
CM	5,3 aA	5,5 aA	5,1 bA	4,8 cA	5,1 aA	6,3 bA	5,7 abA	5,9 aA
SC	5,4 aA	5,7 aA	5,9 aA	5,6 aA	5,4 aA	7,0 aA	6,1 aA	6,4 aA
CV (%)	4,85	9,06	4,65	7,16	4,37	5,45	7,08	5,75

compararam os tratamentos entre si. A tendência geral, representada pela média dos oito biênios, revelou que os maiores valores de pH são encontrados no tratamento mantido sem capina (SC), e os menores, no tratamento com herbicida de pré-emergência (HR). Quanto aos demais tratamentos (RÇ, GR, RT, HC e CM), observaram-se valores intermediários aos tratamentos SC e HR. Entre as camadas, os valores de pH foram mais elevados na camada superficial do solo (0–0,15 m).

Alcântara & Ferreira (2000), ao estudarem o efeito dos tratamentos sobre os teores de matéria orgânica, verificaram que, tanto na camada de 0–0,15 como na de 0,15–0,30 m, o SC foi, entre os métodos de controle de plantas invasoras, o que promoveu, em média, o maior incremento nos teores de matéria orgânica; o HR, menor incremento; e os demais métodos, comportamento intermediário quanto aos teores de matéria orgânica.

O maior incremento no teor de matéria orgânica observado por Alcântara & Ferreira (2000), no tratamento SC, provavelmente contribuiu para elevação do pH em relação aos demais tratamentos (Quadro 2). Aumento de pH devido ao aumento no teor de matéria orgânica tem sido verificado por diferentes pesquisadores (Ismail et al., 1994; Theodoro et al., 2003). Theodoro et al. (2003), ao compararem as mudanças ocorridas nos atributos de um Latossolo Vermelho distrófico (LVd), cultivado com cafeeiro, em sistemas orgânico, em conversão e convencional, em relação ao solo sob mata nativa, verificaram aumento de pH nos sistemas orgânico e em conversão, devido às práticas de calagem, adubação orgânica e cobertura vegetal permanente no solo. Segundo os autores, o sistema de manejo orgânico caracteriza-se, desde o início, em 1995, pela adoção do manejo da lavoura, de acordo com as normas de agricultura orgânica (Brasil, 1999). Assim, foram utilizadas no manejo da lavoura adubações orgânicas (esterco de galinha, húmus de minhoca, composto à base de esterco de gado e cascas do fruto do cafeeiro e dejetos de suínos), calagem, adubação verde (*Crotalaria juncea* e *Cajanus cajan*), adubação fosfatada (termofosfato), adubações foliares com micronutrientes e calda bordalesa. O sistema em conversão caracteriza o período de transição da agricultura convencional para a agricultura orgânica, ou seja, entre 1995 e 1998 a cultura foi conduzida sob sistema de manejo convencional e, a partir de 1998, pelo sistema orgânico, conforme descrito anteriormente. Já o sistema de manejo convencional constou, desde o início de implantação da lavoura, de adubações com uréia, sulfato de amônio, superfosfato simples, cloreto de potássio, utilização de herbicidas (oxyfluorfen, glyphosate e paraquat), fungicida (epoxiconazole), adubação orgânica com casca do fruto

verificados por diferentes pesquisadores (Ismail et al., 1999; Santos et al., 2001; Falleiro et al., 2003). O efeito está relacionado ao poder tamponante da matéria orgânica e, ou, ao aumento da força iônica do solo, devido ao aumento nos teores de nutrientes na camada superficial (Cadavid et al., 1999; Franchini et al., 1999).

Além dos efeitos anteriores, a matéria orgânica também contribui para elevação da concentração de cátions de reação básica (Iyamuremye & Dabiré, 2003) e redução nos demais componentes da acidez (Al^{3+} e saturação por Al^{3+}) (Quadros 4 e 5, respectivamente). De fato, o comportamento observado neste estudo para pH mostrou-se inverso aos demais componentes de acidez. Em todos os tratamentos, o HR apresentou os maiores valores de potencial ($\text{H} + \text{Al}$) (Quadro 3), de Al^{3+} (Quadro 4) e saturação por Al^{3+} (Quadro 5); o SC, por sua vez, apresentou os menores valores para essas propriedades; e os demais tratamentos (RÇ, GR, RT, HC e CM), comportamento intermediário.

Theodoro et al. (2003) constataram ausência de Al^{3+} no solo nos sistemas de café orgânico e em conversão, devido, principalmente, ao aumento da matéria orgânica e à provável complexação do Al^{3+} por compostos orgânicos depositados no solo. O efeito da matéria orgânica na complexação do Al^{3+} e na elevação do pH tem sido observado na literatura (Sidiras et al., 1985; Pavan et al., 1986).

No presente estudo, a complexação da matéria orgânica é, provavelmente, verificada pelos menores teores de Al^{3+} e menor saturação por Al^{3+} na camada de 0–0,15 m (Quadros 4 e 5, respectivamente), onde ocorre maior teor de matéria orgânica, verificado por Alcântara & Ferreira (2000). Por outro lado, o maior teor de Al^{3+} e a maior saturação por Al^{3+} ocorrem, exatamente, na camada onde os teores de matéria orgânica foram menores (0,15–0,30 m), segundo esses mesmos autores. Falleiro et al. (2003), ao compararem o efeito de sistemas de preparo do solo sobre atributos químicos e físicos do solo, encontraram teores menores de Al^{3+} na camada superficial quando sob semeadura direta. Segundo esses autores, a redução nos teores de Al^{3+} e o incremento da força iônica da solução, em decorrência do aumento dos teores de Ca^{2+} , Mg^{2+} e K^+ , diminui a atividade do Al^{3+} na solução; ao aumento da atividade do Al^{3+} afeta a especiação e solubilização do Al^{3+} ; e a diminuição do teor de matéria orgânica, que proporciona a complexação do elemento nesta camada.

Relação entre teor de matéria orgânica e componentes da acidez do solo

Considerando apenas as médias dos atributos avaliados em cada método de controle de plantas invasoras, verificamos que o

Quadro 3. Acidez potencial (H + Al) do solo das camadas de 0–0,15 e 0,15–0,30 m de um Latossolo Vermelho distroférico, em função de métodos de controle de plantas invasoras na cultura do cafeeiro

Tratamento	Ano					
	1986	1988	1991	1993	1995	M
mmolc dm ⁻³						
0–0,15 m						
RÇ	24,3 aA	39,7 aA	19,7 bcA	24,0 abA	22,0 aA	25,0 aA
GR	31,0 aA	43,0 aA	26,0 abA	21,0 abA	20,7 aA	28,0 aA
RT	29,0 aA	43,0 aA	26,3 abA	22,3 abA	21,7 aA	28,0 aA
HC	23,0 aA	41,3 aA	21,3 bcA	22,0 abA	20,7 aA	25,0 aA
HR	25,7 aA	44,7 aA	38,7 aA	35,0 aA	25,0 aA	33,0 aA
CM	30,0 aA	38,0 aA	22,7 bcA	27,7 abA	21,0 aA	27,0 aA
SC	20,3 aA	32,0 aA	14,0 cA	15,7 bA	15,7 aA	19,0 aA
CV (%)	6,97	9,84	9,81	12,67	5,88	2,00
0,15–0,30 m						
RÇ	23,3 aA	36,6 aA	23,4 aA	25,2 aA	26,3 aA	26,0 aA
GR	19,0 aA	36,5 aA	21,0 aA	21,7 aA	28,3 aA	25,0 aA
RT	23,0 aA	42,9 aA	22,3 aA	22,6 aA	23,5 aA	26,0 aA
HC	30,2 aA	42,3 aA	21,9 aA	26,0 aA	29,5 aA	29,0 aA
HR	25,2 aA	47,6 aA	34,9 aA	28,0 aA	39,5 aA	34,0 aA
CM	29,9 aA	41,9 aA	26,6 aA	22,1 aA	29,9 aA	29,0 aA
SC	23,3 aA	30,6 aA	15,7 aA	14,3 aA	17,3 aA	20,0 aA
CV (%)	8,11	6,99	12,67	6,41	5,30	10,00

Médias seguidas pelas mesmas letras, minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5 %. RÇ: roçadora; GR: grade; RT: enxada rotativa; HC: herbicida de pós-emergência; HR: herbicida de pré-emergência; CM: capina manual; SC: testemunha sem capina.

Quadro 4. Teor de Al³⁺ nas camadas de 0,0–0,15 e 0,15–0,30 m de um Latossolo Vermelho distroférico, em função dos métodos de controle de plantas invasoras na cultura do cafeeiro

Tratamento	Ano							
	1980	1982	1984	1986	1988	1991	1993	1995
mmolc dm ⁻³								
0–0,15 m								
RÇ	3,0 aA	1,0 aA	2,0 bA	1,0 aA	1,7 aA	1,0 bA	1,3 aA	1,0 aA
GR	2,0 aA	1,0 aA	2,0 bA	1,3 aA	1,0 aA	1,0 bA	1,0 aA	1,0 aA
RT	2,3 aA	1,0 aA	2,6 bA	1,0 aA	1,9 aA	1,0 bA	1,0 aA	1,0 aA
HC	2,3 aA	1,0 aA	2,6 bA	1,0 aA	1,0 aA	1,0 bA	1,0 aA	1,0 aA
HR	2,0 aA	1,9 aA	5,8 aA	1,0 aA	1,3 aA	3,3 aA	1,0 aA	0,7 aA
CM	2,0 aA	1,0 aA	1,9 bA	1,0 aA	1,3 aA	1,0 bA	1,0 aA	1,0 aA
SC	1,3 aA	1,0 aA	2,2 bA	1,0 aA	1,0 aA	1,0 bA	1,0 aA	1,0 aA
CV (%)	4,21	4,85	11,33	1,74	4,51	10,66	1,79	1,98
0,15–0,30 m								
RÇ	8,0 bB	1,0 aB	6,4 cA	1,0 aB	2,5 aB	1,0 bB	1,3 aB	1,0 aB
GR	8,4 bB	1,3 aB	6,6 cA	1,0 aB	1,0 aB	1,0 bB	1,0 aB	1,0 aB
RT	8,2 bB	1,3 aB	13,0 aA	1,0 aB	2,5 aB	1,0 bB	1,0 aB	1,0 aB
HC	7,7 bB	1,6 aB	10,8 aA	1,3 aB	1,6 aB	1,7 bB	2,0 aB	1,6 aB
HR	8,8 abBC	1,6 aC	12,1 abA	2,0 aC	1,7 aC	5,9 aB	1,3 aC	2,2 aC
CM	10,2 aA	1,0 aB	8,4 bcA	2,0 aB	1,7 aB	1,6 bB	1,0 aB	1,0 aB
SC	7,7 bA	1,3 aB	9,6 abcA	1,0 aB	1,3 aB	1,0 bB	1,0 aB	1,0 aB
CV (%)	16,88	5,14	11,60	4,37	10,51	13,22	3,83	7,25

Quadro 5. Saturação por Al³⁺ do solo das camadas de 0-0,15 e 0,15-0,30 m de um Latossolo V distroférico, em função de métodos de controle de plantas invasoras na cultura do cafeeiro

Tratamento	Ano					CV (%)
	1986	1988	1991	1993	1995	
%						
0-0,15 m						
RÇ	2,00 bB	6,00 bcA	2,00 bB	4,00abB	1,50 bcB	3,01
GR	4,67 aA	4,33 cdA	2,00 bB	2,00 bB	1,33 bcB	2,00
RT	2,67 abAB	4,67 cdA	2,17 bB	2,00 bB	2,00 abB	2,00
HC	2,33 abB	7,00 bA	1,83 bB	1,67 bB	1,33 bcB	2,00
HR	2,67 abC	13,17 bcA	3,00 aBC	6,67 aB	2,50 aC	5,00
CM	2,67 abB	6,00 bcA	2,00 bB	1,33 bB	1,50 bcB	2,00
SC	1,67 bB	4,00 dA	1,00 cB	1,00 bB	1,00 cB	1,00
CV (%)	18,91	4,60	2,70	3,02	3,01	18,91
0,15-0,30 m						
RÇ	6,28 aA	3,16 aA	3,28 aA	6,50 aA	3,41 aA	4,00
GR	5,91 aA	3,70 aA	2,00 aA	4,32 aA	3,00 aA	3,00
RT	5,60 aA	4,12 aA	2,00 aA	3,32 aA	2,64 aA	3,00
HC	7,48 aA	6,17 aA	1,63 aA	4,91 aA	5,22 aA	4,00
HR	12,03 aA	8,16 aA	6,03 aA	7,25 aA	15,34 aA	9,00
CM	15,69 aA	6,01 aA	1,30 aA	3,22 aA	4,00 aA	5,00
SC	4,65 aA	3,34 aA	1,00 aA	1,63 aA	1,83 aA	2,00
CV (%)	27,06	31,28	33,39	30,71	33,29	37,06

Médias seguidas pelas mesmas letras, minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5 %. RÇ: roçadora; GR: grade; RT: enxada rotativa; HC: herbicida de pós-emergência; HR: herbicida de pré-emergência; CM: capina manual; SC: testemunha sem capina.

(p < 0,01) e subsuperficial (Figura 1b) (p < 0,05), enquanto H + Al apresentou comportamento inverso, ou seja, decréscimo com o aumento do nível de matéria orgânica, tanto na camada superficial (Figura 1c) (p < 0,01) como na subsuperficial (Figura 1d) (p < 0,05). O teor de Al³⁺ e a saturação por Al³⁺ nas camadas superficial (Figura 1e,g, respectivamente) e subsuperficial (Figura 1f,h, respectivamente) não apresentaram, em média, resposta significativa ao aumento do teor de matéria orgânica (p > 0,05). Entretanto, o Al³⁺ e a saturação por Al³⁺ tenderam a apresentar comportamento inverso ao dos incrementos do teor de matéria orgânica.

orgânica e pela redução nos teores de H + Al, a saturação por Al³⁺, uma vez que essas apresentam correlação com o pH do solo (Cavaliere, 1985). O efeito da matéria orgânica na diminuição da saturação do solo tem sido observado na literatura (Cavaliere, 1985; Pavan, 1985; Ismail et al., 1994; Theodoro et al., 1994).

CONCLUSÕES

1. Os métodos de controle de plantas invasoras alteraram, de forma diferenciada, os componentes da acidez do solo.




Figura 1. Regressões entre teor de matéria orgânica e pH, H + Al, Al³⁺ trocável e saturação por Al por Al³⁺ nas camadas de 0–0,15 e 0,15–0,30 m de um Latossolo Vermelho distroférrico, considerando os métodos de controle de plantas invasoras (RÇ: roçadora; GR: grade; RT: enxada rotativa; HC: herbicida de pós-emergência; HR: herbicida de pré-emergência, CM: capina manual; SC: testemunha sem tratamento) na cultura do café.

Quadro 6. Correlação entre pH e matéria orgânica, acidez potencial (H + Al), alumínio (Al³⁺) e saturação por Al por Al³⁺ nas camadas de 0–0,15 e de 0,15–0,30 m de um Latossolo Vermelho distroférrico, cultivado com café sob diferentes métodos de controle de plantas invasoras

	Camada de 0–0,15 m				Camada de 0,15–0,30 m		
	MO	H + Al	Al ³⁺	m	MO	H + Al	Al ³⁺
pH	0,88**	- 0,93**	- 0,81**	- 0,87**	0,75*	- 0,97**	- 0,78*

* e **: significativo a 5 e 1 %, respectivamente.

MÉTODOS DE CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS NA CULTURA DO CAFEEIRO (*Coffea arabica* L.)

- ALCÂNTARA, E.N. & FERREIRA, M.M. Efeitos de métodos de controle de plantas daninhas na cultura do cafeeiro (*Coffea arabica* L.) sobre a qualidade física do solo. R. Bras. Ci. Solo, 24:711-721, 2000.
- BAYER, C. & BERTOL, I. Características químicas de um Cambissolo Húmico afetadas por sistemas de preparo, com ênfase à matéria orgânica. R. Bras. Ci. Solo, 23:687-694, 1999.
- BAYER, C. & MIELNICZUK J. Características químicas do solo afetadas por métodos de preparo e sistemas de cultura. R. Bras. Ci. Solo, 21:105-112, 1997.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Instrução normativa, nº 7, de 17 de maio de 1999. Dispõe sobre a produção de produtos orgânicos vegetais e animais; LEX, 63:2465-2476, 1999. (Coletânea de Legislação e Jurisprudência: legislação federal e marginalia).
- BURLE, M.L.; MIELNICZUK, J. & FOCCHI, S. Effect of cropping systems on soil chemical characteristics, with emphasis on soil acidification. Plant Soil, 190:309-316, 1997.
- CADAVID, L.F.; EL-SHARKAWY, M.A.; ACOSTA, A. & SÁNCHEZ, T. Long-term effects of mulch, fertilization and tillage on cassava grown in sandy soils in Northern Colombia. Field Crops Res., 57:45-56, 1998.
- COMISSÃO DE FERTILIZANTES DO SOLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CFSEMG. Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais, 4ª aproximação. Lavras, 1989. 176p.
- DE MARIA, I.C.; NnABUDE, P.C. & CASTRO, O.M. Long-term tillage and crop rotation effects on soil chemical proprieties of a Rholic Ferrasol in Southern Brasil. Soil Till. Res., 51:71-79, 1999.
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. Manual de métodos de análises de solo. Rio de Janeiro, 1979. 240p.
- FALLEIRO, R.M.; SOUZA, C.M.; SILVA, C.S.W.; SEDIYAMA, C.S.; SILVA, A.A. & FAGUNDES, J.L. Influência dos sistemas de preparo nas propriedades químicas e físicas do solo. R. Bras. Ci. Solo, 27:1097-1104, 2003.
- FRANCHINI, J.C.; MALAVOLTA, E.; MIYAZA, PAVAN, M.A. Alterações químicas em solos á aplicação de resíduos vegetais. R. Bras. Ci. S. 542, 1999.
- ISMAIL, I.; BLEVINS, R.L. & FRYE, W.W. Long-term tillage on soil properties and continuous corn. Sci. Soc. Am. J., 58:193-198, 1994.
- IYAMUREMYE, F. & DICK, R.P. Organic amens phosphorus sorption by soils. Adv. Agron., 1996.
- PAVAN, M.A.; CARAMORI, P.H.; ANDROCIOLI F. SCHOLZ, M.F. Manejo da cobertura do solo: formação e produção de uma lavoura cafeeira. na fertilidade do solo. Pesq. Agropec. Bras., 1986.
- REICOSKY, D.C.; KEMPER, W.D.; LANGDA, DOUGLAS Jr., C.L. & RASMUNSEN, P.E. Soil matter changes resulting from tillage and crop production. J. Soil Water Conserv., 50:253-260, 1996.
- SANTOS, A.C.; SILVA, I.F.; LIMA, J.R.S.; ANDRADE, CAVALCANTE, V.R. Gramíneas e leguminosas na recuperação de áreas degradadas: características químicas de solo. R. Bras. Ci. Solo, 25:1071, 2001.
- SANTOS, H.P. & TOMM, G.O. Estudo da fertilidade do solo sob quatro sistemas de rotação de culturas de trigo em plantio direto. R. Bras. Ci. Solo, 20:40-45, 1996.
- SIDIRAS, N. & PAVAN, M.A. Influência do sistema de preparo do solo no seu nível de fertilidade. R. Bras. Ci. Solo, 254, 1985.
- SILVA, M.S.L. & RIBEIRO, M.R. Influência do cultivo da cana-de-açúcar nas propriedades químicas dos solos argilosos. Pesq. Agropec. Bras., 30:389-394, 1995.
- THEODORO, V.C.A.; ALVARENGA, M.I.N.; GUERREIRO, R.J. & SOUZA, C.A.S. Alterações químicas do solo submetido a diferentes formas de manejo do solo. R. Bras. Ci. Solo, 27:1039-1047, 2003.
- VETTORI, L. Métodos de análises de solos. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura, 1969. 24p. (Boletim de Métodos de Análises de Solos, 1969, 24p.)