



Archivos Españoles de Urología

ISSN: 0004-0614

urologia@arch-espanoles-de-urologia.es

Editorial Iniestares S.A.

España

Jalón Monzón, Antonio; Álvarez Múgica, Miguel; Bulnes Vázquez, Verónica; Martín Benito, Jose L.;
González Álvarez, Roberto C.; Regadera Sejas, Francisco J.

Ectopia renal cruzada no fusionada

Archivos Españoles de Urología, vol. 59, núm. 8, octubre, 2006, p. 831

Editorial Iniestares S.A.

Madrid, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181013929016>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

ARCHIVOS ESPAÑOLES DE UROLOGÍA

FUNDADOS POR E. PEREZ CASTRO, A. PUIGVERT GORRO Y L. CIFUENTES DELATTE
Director / Editor: E. Pérez-Castro Ellendt. Editor Asociado: L. Martínez-Piñeiro Lorenzo

UROLOGÍA EN IMÁGENES

Ectopia renal cruzada no fusionada.

Antonio Jalón Monzón, Miguel Álvarez Múgica, Verónica Bulnes Vázquez*, Jose L. Martín Benito, Roberto C. González Álvarez y Francisco J. Regadera Sejas.

Servicio de Urología 1 y Servicio de Radiodiagnóstico 1*. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. Asturias. España.



Figura 1. Urografía intravenosa.
Ureterohidronefrosis del riñón izquierdo y riñón derecho ectópico a nivel pélvico izquierdo.




Figura 3. Tomografía Computerizada.
Litiasis ureteral izquierda a 2-3 cm de unión urétero-vesical izquierda.

Varon de 43 años que consultó por dolor cólico renoureteral izquierdo. En UIV practicada (Figura 1) se visualizó discreta ureterohidronefrosis del riñón izquierdo y un riñón derecho ectópico a nivel pélvico izquierdo. La TC realizada (Figura 2) confirmó una ectopia renal cruzada del riñón derecho a nivel pélvico izquierdo, no fusionada, con drenaje ortotópico, y una litiasis próxima a la unión urétero-vesical del uréter correspondiente al riñón izquierdo (Figura 3).

El riñón ectópico es más susceptible de trauma directo y lesión intraoperatoria. El riñón pélvico es la ectopia renal más común. Son frecuentes la obstrucción de la unión pieloureteral, el reflujo, la infección y la litiasis. La ectopia renal también puede ser cruzada, existiendo dos tipos: fusionada y no fusionada. La no fusionada es más infrecuente.



Figura 2.
Tomografía Computerizada.
Ectopia renal cruzada no fusionada del riñón derecho con drenaje ureteral ortotópico.

Correspondencia | Antonio Jalón Monzón
C/ Electra nº 1, 4º L
33208-Gijón. Asturias. (España).
ajalonm@hotmail.com

Trabajo recibido: 21 de febrero 2006