



Archivos Españoles de Urología

ISSN: 0004-0614

urologia@arch-espanoles-de-urologia.es

Editorial Iniestares S.A.

España

Heredero Zorzo, O.; Palacios Hernández, A.; Eguíluz Lumbreras, P.; García García, M.A.; Cañada de Arriba, F.; Urrutia Avisrror, M.
Litiasis vesical múltiple

Archivos Españoles de Urología, vol. 62, núm. 2, marzo, 2009, pp. 157-158

Editorial Iniestares S.A.

Madrid, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181013954015>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

ARCHIVOS ESPAÑOLES DE UROLOGÍA

FUNDADOS POR E. PÉREZ CASTRO, A. PUIGVERT GORRO Y L. CIFUENTES DELATTE

Director / Editor: E. Pérez-Castro Ellendt

Editor Asociado: L. Martínez-Piñeiro Lorenzo

Editor Asociado Internacional: J. I. Martínez-Salamanca

UROLOGÍA EN IMÁGENES

Arch. Esp. Urol. 2009; 62 (22): 157-158

"LITIASIS VESICAL MÚLTIPLE"

O. Heredero Zorzo, A. Palacios Hernández, P. Eguíluz Lumbreras, M.A. García García,
F. Cañada de Arriba y M. Urrutia Avisror

Servicio y Cátedra de Urología. Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Salamanca. España.

Paciente de 81 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, obeso, con antecedentes personales de *Diabetes Mellitus* tipo 2 e intervenido previamente de prótesis de cadera bilateral, seguido en consulta externa de urología desde el año 2002 por sintomatología obstructiva de tracto urinario inferior con cifras de PSA 0.04 ng/ml.

En los estudios realizados inicialmente se aprecia una próstata de 40 cc, junto con litiasis vesicales múltiples de tamaño aproximado de 2.5 a 3 cm. y una vejiga con imágenes diverticulares en relación con vejiga de esfuerzo, signos que se




FIGURA 1. Divertículos y cálculos radiopacos intravesicales.



CORRESPONDENCIA

Óscar Heredero Zorzo
Obispo Barbado Viejo, 17 3º A
37001. Salamanca. (España).

oscarheredero@hotmail.com

aprecian tanto en la ecografía como en la urografía excretora (Figuras 1 y 2).

Al paciente se le plantea la posibilidad de tratamiento quirúrgico, que rechaza en repetidas ocasiones; acude a revisión en julio 2007, momento en el cual decide optar por la corrección quirúrgica de su patología.

Se le realiza una apertura vesical con extracción de 9 cálculos de tamaños comprendidos entre 2.5 y 4 cm de diámetro aproximado (Figura 3), seguido de adenomectomía prostática.

La anatomía patológica informa de cambios benignos en el parénquima prostático.

El análisis de la litiasis informa de una composición de 70% oxalato cálcico, 20% ácido úrico e indicios de amonio.

El paciente a los dos meses de la intervención se encuentra asintomático.



FIGURA 2. Áreas hiperecoicas con sombras acústicas posteriores compatibles con litiasis vesiculares.



FIGURA 3. Litiasis múltiples vesiculares.