



Archivos Españoles de Urología

ISSN: 0004-0614

urologia@arch-espanoles-de-urologia.es

Editorial Iniestares S.A.

España

Cortés-González, Jeff R.; Arratia-Maqueo, Jorge A.; Martínez-Montelongo, Rafael; Gómez-Guerra, Lauro S.

¿Tiene la circuncisión algún efecto en la percepción de la satisfacción sexual masculina?

Archivos Españoles de Urología, vol. 62, núm. 9, noviembre, 2009, pp. 733-736

Editorial Iniestares S.A.

Madrid, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181018519008>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

¿TIENE LA CIRCUNCISIÓN ALGÚN EFECTO EN LA PERCEPCIÓN DE LA SATISFACCIÓN SEXUAL MASCULINA?

Jeff R. Cortés-González, Jorge A. Arratia-Maqueo, Rafael Martínez-Montelongo y Lauro S. Gómez-Guerra.

Servicio de Urología. Hospital Universitario "Dr. José E. González" UANL. Monterrey NL. México.

Resumen.- **OBJETIVO:** Evaluar el efecto de la percepción de la satisfacción sexual en hombres, con parejas sexuales estables, posterior a la circuncisión.

MÉTODOS: Veintidós hombres heterosexuales, adultos, sexualmente activos con pareja sexual estable que fueron programados para circuncisión en nuestro servicio entre Junio del 2005 y Junio del 2006 por razones médicas o estéticas fueron incluidos en este estudio. Hombres con disfunción eréctil severa fueron excluidos. Los pacientes fueron encuestados para evaluar la función eréctil, la sensibilidad del pene, la apariencia estética, etc. Esta encuesta fue realizada antes del procedimiento y 12 semanas después. Los resultados en cada rubro fueron evaluados con Chi cuadrada.

RESULTADOS: Las indicaciones quirúrgicas fueron: Fimosis 50%, Balanitis 18.2%, Condiloma 13.6 % estética 13.6%. Posterior al procedimiento el 82% de los pacientes refirió aumento en la calidad de sus encuentros sexuales, 4.5% refirió que disminuyó y 13.5% que

no se modificó. Noventa y cinco por ciento refirió sentirse mejor con la apariencia de su pene. Casi todos los rubros de la satisfacción sexual evaluados en las encuestas no presentaron diferencias estadísticamente significativas a excepción de la mejora en la función sexual ($p=0.0007$) y la percepción de eventos sexuales ($p=0.04$). Esta mejora en la función eréctil fue considerada como un cambio en categoría en la clasificación del índice internacional de la función eréctil 5. En 31.8% de los pacientes reportó eyaculación prematura la cual disminuyó a 13.6% (3).

CONCLUSIONES: Debido a nuestras limitaciones estadísticas y las indicaciones quirúrgicas heterogéneas para la realización del procedimiento en este estudio no podemos concluir que la circuncisión traiga consigo un beneficio en la satisfacción sexual por el simple hecho de retirar el prepucio pero definitivamente no provoca efectos deletéreos y cuando la insatisfacción esté asociada a problemas locales, puede esperarse algún beneficio.

Palabras clave: Satisfacción Sexual. Función eréctil. Circuncisión.



CORRESPONDENCIA

Jeff R. Cortés González
Servicio de Urología
Hospital Universitario
"Dr. José E. González" UANL
Av. Madero y Gonzalitos s/n
Col. Mitras Centro
64460 Monterrey. NL. (Méjico)

jrcor77@yahoo.com

Trabajo recibido: 15 de diciembre 2008.

Summary.- **OBJECTIVES:** To evaluate the effect of circumcision on sexual satisfaction perception in male with stable sexual partners.

METHODS: Twenty two heterosexual male adults, sexually active with a stable partner, scheduled for circumcision for medical (MR) or esthetic reasons (ER) at our clinic between June 2005 and June 2006 were included in this study. Men with severe erectile dysfunction (ED) were excluded from the study. These men were surveyed to assess erectile function, penile sensitivity, esthetical penis' appearance, sexual activity and overall satisfaction before the procedure and 12 weeks after. Categorical scores were evaluated with Chi square.

RESULTS: Surgical indications were: Phimosis 50%, balanitis 18.2%, condyloma 13.6% and esthetics 13.6%. After the procedure 82% of patients referred an upgrade on the quality of their sexual intercourse, 4.5% referred it diminished and 13.5% referred no change at all. 95.5% of the patients felt better with the appearance of their penis. Almost all areas of sexual satisfaction weren't statistical significant except for the improvement in erectile function ($p=0.0007$) and perception of sexual events ($p=0.04$). This improvement on erectile function was reported as shifts from mild to normal on International Index of Erectile Function 5 scores. Premature ejaculation was observed in 31.8% (7) before the procedure and diminished to 13.6% (3).

CONCLUSION: Because of our statistic limitations and mix indications for circumcision in the study, we cannot conclude that circumcision might bring certain benefit on sexual satisfaction by itself but certainly does not bring deleterious effects and, when dissatisfaction is associated with local problems, some benefit could be expected.

Keywords: Sexual Satisfaction. Erectile Function. Circumcision.

INTRODUCCIÓN

La circuncisión es un procedimiento muy común en la práctica urológica. En la población general, es más comúnmente realizado en la niñez. Es un procedimiento que se ha realizado por siglos y sus indicaciones son diversas: médicas, religiosas o estéticas (1). El primer caso reportado de circuncisión como tratamiento de la impotencia fue en el siglo XIX (1,2).

Existen aún controversias sobre el rol de la circuncisión en la sensibilidad del pene y en la satisfacción sexual (1,3,4). Masters y Johnson llevaron a cabo pruebas neurológicas en el glande de pacientes circuncidados y no circuncidados (3). Los resultados arrojados no encontraron diferencias en la sensibilidad del glande, a pesar de la conocida queratinización en esta área posterior a la circuncisión (5). Existen pocos artículos que estudien el rol de la circuncisión en la satisfacción sexual masculina y femenina (1,6,7). El hombre sexualmente activo que ha experimentado ambos estados, el circuncidado y el no circuncidado, es el único que está en la posición de expresar su opinión con respecto al efecto del prepucio en el encuentro sexual.

MATERIAL Y MÉTODOS

Veintidós hombres heterosexuales, sexualmente activos con paja sexual estable y promedio de edad de 31 años (21-53 años) que fueron progra-

mados para circuncisión entre Junio del 2005 y Junio del 2006 fueron incluidos en este estudio. El procedimiento fue realizado por razones médicas (RM) o estéticas (RE). Todos los pacientes fueron sometidos a anestesia local para la realización de la circuncisión (técnica de la manga).

Los pacientes con disfunción erétil (definida como la incapacidad de penetrar a su pareja), con actividad poligámica y que utilizaran aparatos con sistema de vacío y/o tratamiento para la disfunción erétil (DE) fueron excluidos de este estudio. Todos firmaron hoja de consentimiento informado y se les realizó un cuestionario antes y 12 semanas después del procedimiento. El cuestionario fue diseñado en base a preguntas de índices, escalas y/o cuestionarios ya existentes (índice internacional para la función erétil, Cambios en el cuestionario de la función sexual, Cuestionario breve de la función sexual, Cuestionario del centro para la salud marital y sexual) (8-11). Las preguntas recabaron información acerca de la libido, sensibilidad peniana, función erétil, eyaculación prematura, dolor durante la relación sexual y en el segundo cuestionario se agrego una sección de percepción estética. La actividad sexual fue permitida 4 semanas posteriores al procedimiento. El análisis estadístico utilizado fue Chi cuadrada.

RESULTADOS

Las indicaciones quirúrgicas fueron: Fimosis 50% (11), balanitis 18.2% (4), condiloma 13.6% (3), estética 13.6% (3) y otras causas 4% (1). Los pacientes casados fueron 82% (4), solteros sin vivir con su pareja pero con actividad sexual regular 9% (2) y soltero pero viviendo con su pareja 18% (4). No hubo ninguna complicación post operatoria. Posterior al procedimiento 82% (18) de los pacientes refirió una mejora en la calidad de sus encuentros sexuales, 4.5% (1) refirió que disminuyó y 13.5% (3) refirió no haber notado cambio alguno. De los pacientes quienes notaron una mejora, 39% (7) refirieron que fue moderada y 61% (11) gran beneficio en su satisfacción durante el encuentro sexual, 94.5% (17) consideró que esta mejoría en su satisfacción sexual fue debido al procedimiento realizado. Noventa y cinco por ciento (21) refirió sentirse mejor con la apariencia de su pene y 72.7% (16) mencionaron que encontraban que su pareja compartía la misma opinión.

Los resultados en las diferentes áreas de la satisfacción sexual se muestran en la Tabla I. No fue posible establecer una tendencia o relevancia estadística en ninguno de los rubros evaluados salvo en relación a la función erétil ($p=0.0007$). Esta mejoría en la función erétil fue considerada como tal cuando existió algún cambio de categoría de DE ($p<0.05$).

TABLA I. RESULTADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SATISFACCIÓN SEXUAL.

Satisfacción coital	% más o menos	% Mucho		p 0.32
Antes	36.6 (8)	63.6 (14)		
Después	22.7 (5)	77.3 (17)		
Frecuencia de eventos sexuales	% Menos de 2 ó 3 / semana	% 2, 3 o más / semana		p 0.35
Antes	45.5 (10)	54.5 (12)		
Después	31.8 (7)	68.2 (15)		
Deseo Sexual	% Menos de 2 ó 3 / semana	% 2, 3 o más / semana		p 0.13
Antes	59.1 (13)	40.9 (9)		
Después	36.4 (8)	63.6 (14)		
Percepción de eventos sexuales	Menos	Igual	Mas	p 0.46
Antes	27.3 (6)	63.6 (14)	9.1 (2)	
Después	22.7 (5)	54.5 (12)	22.7 (5)	
Dolor durante el coito	No	A veces	Siempre	p 0.23
Antes	77.3 (17)	18.2 (4)	4.5 (1)	
Después	72.7 (16)	27.3 (6)	0	
Satisfacción Sexual General	Completa / Moderada	Algún grado de insatisfacción		p 0.15
Antes	81.8 (18)	18.2 (4)		
Después	95.5 (21)	4.5 (1)		
Erección	Algún grado de disfunción	Erección completa		p 0.0007
Antes	50 (11)	50 (11)		
Después	4.5 (1)	95.5 (21)		
¿Quién inicia el acto sexual?	Paciente	Ambos	Pareja	p 0.86
Antes	36.4 (8)	59.1 (13)	4.5 (1)	
Después	31.8 (7)	59.1 (13)	9.1 (2)	
Percepción de la eyaculación	Prematura			
Antes	31.8 (7)			
Después	13.6 (3)			

De leve a normal) en el Índice Internacional de la Función Eréctil 5 (IIFE-5). Ninguno de los pacientes refirió DE moderada, esta DE leve fue registrada en 50% (9) de los pacientes, en el cuestionario previo a ser sometidos al procedimiento, por RM y en 66.6% (2) por RE y su mayor molestia fue mantener la erección (preguntas 4 y 5 del IIFE-5). La evaluación de la eyaculación prematura (EP) fue subjetiva, es decir, no se utilizó el tiempo de latencia de la eyaculación intravaginal. La EP fue referida en 6 y en 1 paciente de ambos grupos. En general la prevalencia de la EP fue de 31.8% (7) en los pacientes en estudio antes y disminuyó 13.6% (3) posterior al procedimiento. No se encontró diferencia en la sensibilidad del glande posterior a la circuncisión en este estudio.

DISCUSIÓN

Existe aún mucho debate sobre el rol que juega el prepucio en la satisfacción sexual. Collins y Fink fueron los primeros que trataron de resolver esta interrogante pero con resultados no significativos (2,3). Aun así, existen pocos artículos publicados que abordan este problema. En nuestro conocimiento este es el primer estudio que incluye solo población hispana para evaluar la libido, la eyaculación prematura, la función eréctil, la apariencia del pene y el dolor durante el acto sexual posterior a la circuncisión. La mayoría de los reportes previos evalúan la satisfacción sexual masculina mediante llamadas telefónicas y/o en pacientes que posterior al procedimiento refieren tener una pareja sexual diferente y los individuos polígamicos no fueron excluidos de esos estudios (1-3). Estas variables pudieron generar algunas diferencias en la satisfacción sexual.

A pesar de que la mayoría de los resultados que fueron comparados en este estudio no fueron estadísticamente significativos, el 82% percibió un incremento en su satisfacción sexual posterior a la circuncisión. Indicar la circuncisión en los adultos por RE es raro, la mayoría son debidas a RM pero a pesar de que la mayoría de los pacientes en nuestro estudio tenía problemas locales en sus prepucios, los resultados fueron similares a los observados por Senkul y cols. (1), quienes evaluaron solo pacientes que fueron circuncidados por cuestiones religiosas y los pacientes con problemas locales fueron excluidos de ese estudio. La función eréctil fue el único rubro que en el que se encontró diferencia estadísticamente significativa contrario a lo reportado en otras publicaciones.

CONCLUSIONES

En nuestro conocimiento, este es el primer estudio evaluando solo población hispana. Debido

a nuestras limitaciones estadísticas y las indicaciones quirúrgicas heterogéneas para la realización del procedimiento en este estudio, no podemos concluir que la circuncisión traiga consigo un beneficio en la satisfacción sexual por el simple hecho de retirar el prepucio pero definitivamente no provoca efectos deletéreos y cuando la insatisfacción está asociada a problemas locales, algún beneficio puede esperarse. Esto puede dar a los urólogos una herramienta más para la indicación de la circuncisión en los adultos para evitar tabús y/o dudas que pudieran existir relacionadas con el miedo a la insatisfacción sexual posterior al procedimiento. Aun así, se requiere de un estudio comparativo entre hombres que vayan a ser circuncidados por RM vs RE, que tengan una misma pareja sexual para corroborar los datos obtenidos en el presente estudio.

BIBLIOGRAFÍA y LECTURAS

RECOMENDADAS (*lectura de interés y ** lectura fundamental)

1. Senkul T, Iseri C, Sen B, Karademir K, Saracoglu F, Erden D. Circumcision in adults: effect on sexual function. *Urology*. 2004; 63(1):155-8.
2. Collins S, Upshaw J, Rutchik S*, Ohannessian C, Ortenberg J, Albertsen P. Effects of circumcision on male sexual function: debunking a myth? *J Urol*. 2002; 167, 2111-2.
3. Fink KS, Carson CC, Devellis RF. Adult circumcision outcomes study: effect on erectile function, penile sensitivity, sexual activity and satisfaction. *J Urol*. 2002; 167, 2113-6.
4. Masood S, Patel HR, Himpson RC, Palmer JH, Mufti GR, Sheriff MK. Penile sensitivity and sexual satisfaction after circumcision: are we informing men correctly? *Urol. Int.* 2005; 75(1):62-6.
5. Cold CJ, Taylor JR. The prepuce. *BJU*. 1999; 83(1):34-44.
6. O'Leary MP, Fowler FJ, Lenderking WR, et al. A brief male sexual function inventory for urology. *Urology*, 1995; 46:697.
- **7. O'Hara K, O'Hara J. The effect of male circumcision on the sexual enjoyment of the female partner. *BJU International*, 1999; 83(1):79-84.
8. Glick HA, McCarron TJ, Althof SE, et al. Construction of scales for the Center for Marital and Sexual Health (CMASH) sexual functioning questionnaire. *J. Sex. Marital Ther.* 1997; 23:103.
9. Clayton AH, McGarvey EL, Clavet GJ. The changes in sexual functioning questionnaire (CSFQ): development, reliability, and validity. *Psychopharmacol Bull*, 1997; 33:731.
10. Reynolds CF, Frank E, Thase ME, et al. Assessment of sexual function in depressed, impotent and healthy men: factor analysis of a brief sexual function questionnaire for men. *Psychiatry Res* 1988; 24:231.
11. Rosen RC, Riley A, Wagner G, et al. An international index of erectile function (IIEF): a multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction. *Urology*, 1997; 49: 822.