



Archivos Españoles de Urología

ISSN: 0004-0614

urologia@arch-espanoles-de-urologia.es

Editorial Iniestares S.A.

España

Ballesteros Diego, R.; Correas Gómez, M. A.; Gutiérrez Baños, J. L.; Portillo Martín, J. A.; Del Valle Schaan, J. I.; Roca Edreira, A.; Villanueva Peña, A.; Aguilera Tubet, C.; Zubillaga Guerrero, S.; Ramos Barseló, E.; Campos Sañudo, J.A.; Hidalgo Zabala, E.

Ureteritis quística asociada a litiasis

Archivos Españoles de Urología, vol. 62, núm. 9, noviembre, 2009, pp. 763-764

Editorial Iniestares S.A.

Madrid, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181018519016>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

ARCHIVOS ESPAÑOLES DE UROLOGÍA

FUNDADOS POR E. PÉREZ CASTRO, A. PUIGVERT GORRO Y L. CIFUENTES

Director / Editor: E. Pérez-Castaño

Editor Asociado: L. Martínez-Piñero

Editor Asociado Internacional: J. I. Martínez-Zarzuelo

UROLOGÍA EN IMÁGENES

Arch. Esp. Urol. 2009; 62 (9)

"URETERITIS QUÍSTICA ASOCIADA A LITIASIS PIÉLICA"

R. Ballesteros Diego, M. A. Correas Gómez, J. L. Gutiérrez Baños, J. A. Portillo Martínez, I. Del Valle Schaan, A. Roca Edreira, A. Villanueva Peña, C. Aguilera Tubet, S. Zuñiga Guerrero, E. Ramos Barseló, J.A. Campos Sañudo y E. Hidalgo Zárate

Servicio de Urología. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. Cantabria.



FIGURA 1. Visión en UIV de ureteritis quística.

Paciente varón de 75 años con antecedentes de interés, remitido a la consulta por dos episodios de dolor en flanco izquierdo con cortejo vegetativo asociado. Los exámenes físicos tanto general como abdominal fueron normales. En el estudio ecográfico se observa una litiasis piélica de 1,5 cm en el riñón izquierdo, que se confirmó en el estudio urográfico.

Se realiza litotricia extracorpórea con ondas de choque, con fragmentación completa de la litiasis piélica. En estudio urográ



CORRESPONDENCIA

R. Ballesteros Diego
Servicio de Urología
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Avda. Valdecilla s/n
39008 Santander. Cantabria. (España)
rbdballesteros@yahoo.es

Trabajo recibido: 10 de noviembre 2008.



FIGURA 2. Visión en UIV de ureteritis quística.



FIGURA 3. Visión en UIV de ureteritis quística.

de control a los 6 meses, se visualiza formación litiasica en caliz inferior del izquierdo con una moderada estenosis céntrica del uréter a nivel de la unión ureteral. Junto a esto se ponen de manifiesto numerosos defectos de repleción por trastornos del uréter, sobre todo a nivel lumbar, sugiriendo ureteritis quística (Figuras 1, 2 y 3).

La pieloureteritis quística es una enfermedad benigna caracterizada por la presencia de quistes de localización submucosa en algún nivel del urótelio. Se asocia a procesos infecciosos e inflamatorios crónicos con irritación de la mucosa urótelial, todo por infección del tracto urinario y suisis.

Su diagnóstico se realiza mediante radiología de contraste, tanto urografía intravenosa como pielografía retrógrada. El tratamiento es conservador, dirigido fundamentalmente a suprimir la causa subyacente, generalmente tratando las infecciones urinarias y litiasis asociadas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Navas Pastor J, Morga Egea J P, García Ligeró J et al. Pieloureteritis quística: presentación de una infección. Formas de presentación y revisión de la literatura. Arch Esp Urol 2000; 53 (1):15-20.
2. Mariño del Real J, Sevilla Zabaleta Cabello Padial J. et al. Ureteritis quística: Importancia de la infección-inflamación crónica como factor etiológico. Aportación de un caso. Actas Urol Esp 2000; 24 (6):496-498.