



Archivos Españoles de Urología

ISSN: 0004-0614

urologia@arch-espanoles-de-urologia.es

Editorial Iniestares S.A.

España

Álvarez-Múgica, Miguel; Jalón Monzón, Antonio; Bulnes Vázquez, Verónica; Anes González, Gonzalo; González Álvarez, Roberto C.; Martín Benito, José L.

Fibrosis retroperitoneal en relación a la toma de analgésicos, tramadol y paracetamol

Archivos Españoles de Urología, vol. 59, núm. 9, noviembre, 2006, p. 923

Editorial Iniestares S.A.

Madrid, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181018783016>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

UROLOGÍA EN IMÁGENES

Fibrosis retroperitoneal en relación a la toma de analgésicos, tramadol y paracetamol

Miguel Álvarez-Múgica¹, Antonio Jalón Monzón¹, Verónica Bulnes Vázquez², Gonzalo Anes González², Roberto C. González Álvarez¹ y José L. Martín Benito¹.

¹Servicio de Urología 1 Hospital Universitario Central de Asturias. ²Servicio de Radiodiagnóstico 1 Hospital Universitario Central de Asturias. España.




Figura 1. TAC: Masa fibrótica retroperitoneal con dilatación de la pelvis renal derecha.



Figura 3. TAC: Magma fibrótico retroperitoneal en el que se engloba ambos uréteres.

Se trata de un varón de 55 años que acude por dolor tipo cólico en ambos flancos de 15 días de evolución y oligoanuria en los tres días previos al ingreso. Como único antecedente destacaba la toma de analgésicos (tramadol y paracetamol) por una lumbalgia durante los 2 meses y medio previos. El TAC demostró la presencia de una masa fibrótica en el retroperitoneo que englobaba ambos uréteres. Como único posible agente etiológico de este proceso destacaba el tratamiento analgésico durante los meses previos, tratándose por tanto de una fibrosis retroperitoneal asociada a fármacos.



Figura 2. TAC: Masa retroperitoneal en el que se introduce el uréter derecho. El uréter izquierdo no se visualiza.

Correspondencia

Miguel Álvarez Múgica
Servicio de Urología 1
Hospital Universitario Central de Asturias
C/ Celestino Villamil s/n
33006 Oviedo. Asturias. (España).
malvarez79@mixmail.com