

**REVISTA  
PERUANA DE  
BIOLOGÍA**

Revista Peruana de Biología

ISSN: 1561-0837

lromeroc@unmsm.edu.pe

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Perú

Correa, Ericka; Ortega, Hernán  
Diversidad y variación estacional de peces en la cuenca baja del río Nanay, Perú  
Revista Peruana de Biología, vol. 17, núm. 1, abril, 2010, pp. 37-42  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
Lima, Perú

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195014936004>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en [redalyc.org](http://redalyc.org)

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal  
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

## Diversidad y variación estacional de peces en la cuenca baja del río Nanay, Perú

### Fishes species diversity and seasonal variation in the lower basin of Nanay River, Peru

Ericka Correa<sup>1</sup> y Hernán Ortega<sup>1</sup>

#### Resumen

El presente trabajo informa sobre la diversidad de peces en la cuenca baja del río Nanay, tributario del río Amazonas. Esta zona está sometida a la extracción indiscriminada de peces con usos ornamentales y de consumo directo. Utilizando redes de arrastre (10 x 2,5 m, 5 mm de luz de malla), se realizaron capturas en época de vacante (agosto y setiembre de 2007) y creciente (febrero de 2008), en tres lugares del río Nanay. Se colectaron 1626 individuos, correspondientes a 86 especies, de 23 familias y cinco órdenes. El número de especies vario entre 13 y 21 en época de vacante y entre 18 y 26 especies en época de creciente. Predominaron los Characiformes, Siluriformes y Perciformes. El 76% de los individuos con tamaños menores de 10 cm. El 65% de las especies registradas tienen uso ornamental.

**Palabras clave:** Peces ornamentales, Amazonía, estacionalidad, pesca, Loreto.

#### Abstract

This paper reports on the diversity of fish in the lower basin of the Nanay River, a tributary of the Amazon River. This area is subjected to indiscriminate harvesting of fish for ornamental purposes and for direct consumption. Using trawl nets (10 x 2.5 m, 5 mm mesh), we fished in the dry season (August and September 2007) and wet season (February 2008) in three places in the Nanay River. 1626 individuals were collected, corresponding to 86 species of 23 families and five orders. The number of species varied between 13 and 21 in the dry season and between 18 and 26 species during the growing season. Characiformes, Siluriformes and Perciformes were the dominant orders. 76% of individuals had small sizes. 65% of the recorded species have ornamental use.

**Keywords:** Ornamental fish, Amazon, seasonality, fishing, Loreto.

#### Introducción

Uno de los principales tributarios del río Amazonas en territorio peruano es el río Nanay, ubicado en el departamento de Loreto, caracterizado por ser un río de agua negra (Roldán 1992, Sioli 1984, Ortega & Castro 1998), y comprende muchos tipos de microhábitats que albergan gran diversidad de peces importantes para el consumo humano y de uso ornamental, además de presentar en las áreas cercanas (riberas y planicies inundables) con un alto nivel de endemismo (Hidalgo & Willink 2007).

Entre los problemas que se han observado en relación al río Nanay, se encuentra la extracción indiscriminada de peces ornamentales, alentado por el comercio acuarista existente en la zona y que satisface las grandes demandas provenientes de países de Europa, Norteamérica y Asia. Así, el centro de exportación de peces de acuario en el Perú es Iquitos, donde el comercio ha estado activo desde la década de 1950 (Gerstner et al. 2006). La presión en cuanto a la extracción de peces ornamentales en el río Nanay es elevada, sobre todo en la parte baja (Tello & Cánepa 1991, Souza et al. 2004, Gerstner et al. 2006).

En el presente trabajo se informa de la composición taxonómica y la estructura comunitaria de peces de la cuenca baja del río Nanay, en épocas de creciente y vacante; y se actualiza la información de la diversidad de peces del río Nanay, conocimiento que permitirá reforzar las medidas de conservación.

#### Materiales y métodos

El área de estudio se localiza en el Departamento de Loreto, provincia de Maynas, cerca a la ciudad de Iquitos. Se colectaron las muestras en la cuenca baja del río Nanay, que comprende desde el caserío de Salvador de Pava hasta su desembocadura en la margen izquierda del Río Amazonas (IIAP, 2002). Se eligieron las localidades Las Camelias, Pampachica, Nina Rumi

73°14'W, entre 84 y 92 m altitud), ubicadas en el distrito de San Juan Bautista, las dos últimas con acceso desde la carretera Iquitos-Nauta, a la altura del kilómetro siete, al suroeste de la ciudad de Iquitos.

Las colectas fueron realizadas en los lugares frecuentados por los pescadores de peces ornamentales, como son las orillas, palizadas (formada por ramas); árboles sumergidos y vegetación flotante, que se entrelazan en las curvas de los meandros, de los canales de los ríos o en las "tahuampas" (Souza et al., 2004); "gramalotales", comunidades de gramíneas herbáceas robustas compuestas por varias especies que ocupan los bordes de las playas y bancos de arena planos o de suave declive (Kahn et al. 1993). Estos lugares presentan diferentes niveles de presión de extracción de peces ornamentales, según Souza et al. (2004). También se colectó en el hábitat de sustrato arenoso.

En cada localidad se realizaron cinco lances por estación, en época de vacante, agosto y setiembre de 2007 y creciente, febrero de 2008. Se utilizó una red de arrastre a la orilla de 10 x 2,5 m y 5 mm de apertura de malla. Los peces fueron fijados en formol al 10% y preservados en etanol al 70% en el campo. Fueron identificados, catalogados y depositados en la colección científica del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM).

Se realizó la descripción de los hábitats, con información de temperatura del aire, temperatura del agua, pH, transparencia, conductividad y oxígeno disuelto.

Se determinó la composición taxonómica y abundancia relativa de la comunidad de peces. Los valores de abundancia relativa, se obtuvieron en base a la presencia y frecuencia de

**Tabla 1.** Descripción de hábitat y parámetros fisicoquímicos de los cuerpos de agua evaluados en la cuenca baja del Río Nanay.

Características	Vaciante				Creciente			
	Pampachica	Las Camelias	Puerto Almendras	Ninarumi	Pampachica	Las Camelias	Puerto Almendras	Ninarumi
Cuerpo de agua	Lotico	Lentic	Lotico	Lotico	Lotico	Lotico	Lotico	Lotico
Hábitat	Playa arenosa	Laguna	Playa arenosa	Playa arenosa	Gramalotal	Laguna con macrofitas	Palizada	Gramalotal
Velocidad de Corriente	Moderada	Nula	Lenta	Lenta	Lenta	Nula	Nula	Nula
Tipo de agua	Negra	Negra	Negra	Negra	Negra	Negra	Negra	Negra
Color de agua	Té oscuro	Té oscuro	Té oscuro	Té oscuro	Té oscuro	Té oscuro	Té oscuro	Té oscuro
Amplitud de cauce	80	40	70	60	115	20	110	100
Área de muestreo (m <sup>2</sup> )	400	200	400	400	300	200	200	300
Profundidad (m)	1,1	0,8	1,5	1,5	1,5	1,55	1,55	1,35
Substrato	Arenoso	Areno-fangoso	Arenoso	Arenoso	Arenoso	Areno-fangoso	Areno-fangoso	Areno-fangoso
Vegetación	Arbustiva	Herbácea-arbustiva	Herbácea-arbustiva	Herbácea	Herbácea	Herbácea	Herbácea-arbustiva	Herbácea
T. del aire (°C)	29	31	32	31	34,5	34	32	32
T. del agua (°C)	27,5	28,5	29,4	28,5	28,75	30,5	26,8	28
pH	6,98	7,06	6,53	6,74	6,4	6,54	7,03	8,27
Conductividad (μS/cm)	7,65	8	7,03	8,2	9,1	8,16	8,03	11,3
Transparencia (cm)	15	14	16	16	15	15	15	15
Oxígeno disuelto (ppm)	4	3,82	3,8	3,86	3,7	3,58	3,63	3,5

Se realizó un análisis de similaridad comparando los lugares de estudio y las épocas de muestreo (Manly, 1985). Se uso las la Distancia Euclidiana entre los casos, y se elaboró un dendrograma.

El índice de abundancia fue estimado de acuerdo al esfuerzo realizado, es decir por lances y estaciones, teniendo en cuenta que fueron 5 lances por estación (nº de individuos/lance) y 4 estaciones por épocas (nº de individuos/estación) (Ortega 2007). Se compararon también las abundancias relativas entre estaciones, hábitat, épocas y zona de estudio, considerando las proporciones obtenidas en cada orden y familia.

## Resultados

Los parámetros fisicoquímicos muestran cuerpos de agua con características propias de ambientes acuáticos de agua negra, de ligera acidez –a excepción de una de las estaciones-, baja conductividad, temperatura de 28,5 °C en promedio, transparencia de 0,5 m y bajo oxígeno disuelto. En la descripción de los hábitats, observamos que las estaciones estuvieron caracterizadas por distintos microhábitat: ambientes lóticos con orillas arenosas, gramalotales y palizadas, así como el ambiente de ‘cocha’ con sustrato arenoso-fangoso; con diferencias entre épocas (Tabla 1).

Fueron colectados 1626 individuos, correspondientes a 86 especies, pertenecientes a 60 géneros, 21 familias y cinco órdenes, de los cuales los órdenes Characiformes y Siluriformes conforman más del 75% tanto en número de individuos como en número de especies, géneros y familias (Tabla 2).

Del total de especies identificadas, se registran tres nuevos géneros para la cuenca del río Nanay, *Dysichthys*, *Pseudoloricaria* (Siluriformes) y *Lactozena* (Perciformes), en total fueron 17

especies registradas por primera vez para la zona. En el Tabla 3 se presenta la lista de especies para la cuenca baja del río Nanay, tanto para época de vacante como para época de creciente; las familias fueron ordenadas según Reis et al. (2003) y los géneros y especies en orden alfabético dentro de las familias.

*Moenkhausia aff. ceros*, *Curimatella* sp. y *Hemiodus* sp. del orden Characiformes (52,5%) y *Amblydoras nauticus* del orden Siluriformes (9%) conforman el 61,5% de la abundancia total encontrada. En época de vacante predomina *Amblydoras nauticus*, constituyendo el 28,5% de los individuos en dicha época, mientras que las especies *Moenkhausia aff. ceros* y *Curimatella* sp. destacan en época de creciente, con un 65,8%.

El orden con mayor riqueza específica fue Characiformes, con el 66% del número de especies, siguiendo Siluriformes, con 18%. La familia con el mayor número de especies fue Characidae, representando el 36%, seguida por Cichlidae (14%), Curimatidae (10%), Loricariidae (6%), para luego dar paso a las otras 18 familias que juntas conforman aproximadamente el 34%.

En cuanto a la abundancia, el orden con el mayor número de individuos fue Characiformes, que obtuvo un 80% del total

**Tabla 2.** Número de familias, especies e individuos por órdenes registrados en la cuenca baja del río Nanay.

Orden	Familias	Géneros	Especies	Individuos
Characiformes	12	34	56	1297
Siluriformes	6	13	16	205
Perciformes	1	11	12	108
Beloniformes	1	1	1	3
Clupeiformes	1	1	1	13

**Tabla 3.** Lista Sistemática y abundancia total de las especies de peces de la cuenca baja del río Nanay por estaciones y épocas (V: Vacante, Cr: Creciente; C: Consumo, O: Ornamental, OP: Con Potencial Ornamental, NR: Nuevos Registros).

Orden	Familia	Especies	Pampachica		Las Camelias		Pto. Almendras		Nina Rumi		Total	Usos	NR
			V	Cr	V	Cr	V	Cr	V	Cr			
<b>Characiformes</b>													
Curimatidae	<i>Curimata vittata</i>						6		3		9	O-C	
	<i>Curimatta meyeri</i>			21							21	OP	X
	<i>Curimatella sp.</i>	5	9	2	2	192			120	330	O		
	<i>Curimatopsis macrolepis</i>								1	1	O-C		
	<i>Cyphocharax spilurus</i>			6			14			16	36	OP	
	<i>Psectrogaster sp.</i>			5							5	C	
	<i>Psectrogaster essequibensis</i>			4			6			5	15	C	
	<i>Steindachnerina aff. guentheri</i>								5	5	OP		X
	<i>Steindachnerina sp.</i>									15	15	C	
Prochilodontidae	<i>Prochilodus nigricans</i>	3			12						3	O-C	
	<i>Semaprochilodus theraponura</i>										12	O-C	
Anostomidae	<i>Anostomus sp.</i>					6					6	O	
	<i>Leporinus agassizii</i>	4									4	O-C	
	<i>Leporinus friderici</i>				1			1		1	3	O-C	
Chilodontidae	<i>Chilodus punctatus</i>		5								5	O	
	<i>Chilodus sp.</i>	5									6	OP	
Crenuchidae	<i>Characidium ethostoma</i>							9		2	11	O	
Hemiodontidae	<i>Hemiodus sp.</i>	42	13	4	32	7					100	C	
Gasteropelecidae	<i>Carnegiella myersi</i>			2							2	O	
Characidae	<i>Astyanax bimaculatus</i>		2								2	O	
	<i>Brycon pesu</i>	1									1	O	
	<i>Bryconops melanurus</i>						4				4	C	
	<i>Bryconops sp.</i>							2		2	2	O-C	
	<i>Chalceus sp.</i>	1					1	2		2	6	O	
	<i>Cheirodon ortegai</i>							3			3	OP	X
	<i>Ctenobrycon sp.</i>		1		10						11	O	
	<i>Hemigrammus hyanuari</i>							8			8	O	
	<i>Hemigrammus levis</i>							30			30	O	
	<i>Hemigrammus pulcher</i>			1			7			2	10	O	
	<i>Iguanodectes spilurus</i>						1				1	O-C	
	<i>Knodus sp.</i>	9									9	O	
	<i>Moenkhausia aff. ceros</i>	70	10	2			212			130	424	O	
	<i>Moenkhausia aff. collectii</i>	7									7	O	
	<i>Moenkhausia aff. comma</i>		3			4			7		14	O	
	<i>Moenkhausia aff. cotinho</i>	1		1				6		5	13	O	
	<i>Moenkhausia aff. dichroura</i>						34				34	O	
	<i>Moenkhausia aff. intermedia</i>		1	1							2	O	
	<i>Moenkhausia chrysargyreia</i>	3									3	O	
	<i>Moenkhausia colletti</i>				2						2	O	
	<i>Moenkhausia dichroura</i>		2					2			2	O	
	<i>Moenkhausia intermedia</i>	2						1			4	O	
	<i>Moenkhausia jamesi</i>	3	3	14				1			29	O	
	<i>Moenkhausia lepidura</i>							6		3	1	O	
	<i>Moenkhausia oligolepis</i>							3		1	4	O	
	<i>Moenkhausia sp.</i>	39					4				39	O	
	<i>Myleus rubripinnis</i>										4	O-C	
	<i>Serrasalmus aff. rhombeus</i>										3	O-C	
	<i>Serrasalmus aff. nattereri</i>			1							1	O-C	
	<i>Tetragonopterus argenteus</i>	1									1	O	
	<i>Triportheus elongatus</i>						1				1	O	
Aestrorhynchidae	<i>Aestrorhynchus falcirostris</i>	2	1								3	O-C	
Erythrinidae	<i>Hoploxyrhynchus unitaeniatus</i>	1									1	O-C	
Lebiasinidae	<i>Hoplias malabaricus</i>	9	8		1	1			1		20	C	
Ctenolucidae	<i>Pyrrhulina brevis</i>				1						1	O	
	<i>Boulengerella cuvieri</i>	1			1			1			1	O	
	<i>Boulengerella maculata</i>						1	1		1	4	O	
									1		3	OP	X
<b>Siluriformes</b>													
Aspredinidae	<i>Dysichthys sp.</i>	1									1	OP	X
Trichomycteridae	<i>Ochmacanthus sp.</i>										1	OP	
Callichthyidae	<i>Megalechis thoracata</i>				1						1	OP	X
Loricariidae	<i>Limatulichthys punctatus</i>	11									11	OP	X
	<i>Limatulichthys sp.</i>							13			13	OP	X
	<i>Oxyropsis sp.</i>							2		2	4	OP	X
	<i>Pseudoloricaria sp.</i>							2			2	OP	X
Heptapteridae	<i>Rineloricaria morrowi</i>	2						2			4	OP	
	<i>Pimelodella cristata</i>							6			6	OP	
Pimelodidae	<i>Goeldiella aff. eques</i>	1									1	O	
	<i>Pimelodus maculatus</i>							1			1	O	X
	<i>Pimelodus tetramerus</i>							1		3	4	O-C	X
Doradidae	<i>Amblydoras nauticus</i>	4		142							146	O	
	<i>Nemadoras trimaculatus</i>	1									1	OP	
	<i>Physopixys lyra</i>			4					4		8	O	
<b>Perciformes</b>													
Cichlidae	<i>Acaronia nassa</i>		7		1			6	5	16	17	O	X
	<i>Aequidens sp.</i>								1		17	O-C	

Tabla 3.

<i>Aequidens tetramerus</i>	6	6						13	O-C
<i>Apistogramma luelingi</i>		6						6	OP X
<i>Biotodomus cupido</i>	3							3	O
<i>Cichla monoculus</i>			1	1				2	O-C
<i>Cichlasoma amazonarum</i>	2	2						4	O
<i>Crenicichla anthurus</i>	2	2						4	O
<i>Heros apicalis</i>	1							1	O
<i>Laetacara thayeri</i>					2			2	OP
<i>Mesonauta mirificus</i>					3	7	1	11	O
<i>Satanopercajurupari</i>	3		7	8	1	7	26		O-C
<b>Beloniformes</b>									
Belonidae		<i>Potamorrhaphis sp.</i>	3					3	O
<b>Clupeiformes</b>									
Engraulidae		<i>Anchoviella sp.</i>			1	7	1	4	C
5	21		86	138	147	248	73	72	1626
									17




Figura 1. Riqueza (S) y abundancia (N) de peces en la cuenca baja del río Nanay.

de individuos colectados; seguido de Siluriformes con un 13%, Perciformes con el 7%, Clupeiformes con el 1% y finalmente Beloniformes. Characidae fue también la familia con el mayor porcentaje en el número de individuos (42% del total).

En época de vaciante se capturaron 512 individuos pertenecientes a 58 especies, 45 géneros, 19 familias y cinco órdenes, mientras que en época de creciente fueron colectados 1114

ejemplares, identificándose 48 especies, 34 géneros, 13 familias y cuatro órdenes. En época de vaciante, los órdenes Characiformes, y Siluriformes fueron los predominantes en cuanto a riqueza de especies, mientras que en creciente los Characiformes y Perciformes fueron los órdenes resaltantes, con 31 y 11 especies. En relación al número de individuos, los Characiformes también fueron los que tuvieron los mayores valores, con 256 individuos en época de vaciante y 1041 en época de creciente. Las familias Characidae y Cichlidae fueron las mejor representadas en época de vaciante; mientras que Characidae y Cichlidae presentaron los mayores valores en número de especies. Doradidae presentó más individuos en época de vaciante, y Characidae en época de creciente. Variantes con respecto a riqueza y abundancia entre épocas y estaciones las podemos observar en la Figura 1.

El dendrograma en la Figura 2 reúne a todas las estaciones en todas las épocas, en el que podemos dar cuenta de la formación de un grupo claro de las estaciones en Pampachica, Puerto Almendras y Nina Rumi en época de vaciante y Las Camelias en época de creciente. La estación en la localidad de Pampachica en época de creciente tendría similitud con el grupo formado anteriormente. Se observó similitud entre las estaciones de Nina Rumi y Puerto Almendras en época de creciente, y hallamos que la más diferente entre todas las localidades fue la estación en Las Camelias, en época de creciente.

## Discusión

En general se confirma la predominancia de Characiformes y Siluriformes (Super Orden Ostariophysi en la cuenca baja del río Nanay), la cual sigue el patrón perteneciente a las aguas con-




Figura 2. Dendrograma de los grupos formados por todas las estaciones de muestreo en ambas épocas (Distancia Euclidiana). Cuenca baja

tinentales de la Región Neotropical (Lowe-McConnell, 1987). Las familias Characidae y Cichlidae son las predominantes en riqueza y conforman el 50% de las especies. Estos resultados coinciden con aquellos publicados por el IIAP (2002). La predominancia de carácidos puede ser explicada por la variedad de microhábitat encontrados en el río Nanay; los hábitos alimenticios y los diferentes tipos de dientes entre las especies y sus diversos hábitos reproductivos estarían adecuados a dicha variedad de microhábitat. La presencia de varias especies de cíclidos se debería a sus hábitos reproductivos, su territorialismo y cripticismo -importante en agua negra.

La lista de especies (Tabla 3) actualiza la información sobre los peces de la cuenca baja del río Nanay. Así, el 27,9% de las especies identificadas fueron nuevos registros y el 8,14% del total de las especies fueron reportadas por primera vez, es decir el 19,8% de las especies identificadas en el presente trabajo fueron nuevos registros.

La estructura comunitaria está basada en especies de porte pequeño (<10cm), representando el 61,5% de los individuos, en su mayoría Characiformes; esto puede deberse a que dichas especies tienen una relación más estrecha con las orillas, remansos de los ríos y los ambientes de baja velocidad creados en época de creciente, en los que también se forman diversos microhábitat. Resultados parecidos obtuvo el IIAP (2002).

La representatividad de familias Characiformes en abundancia, se explicaría por la variedad y disponibilidad de alimento, como al material en semidescomposición, propio de ríos de agua negra, encontrado en el fondo del río sobre el material arenoso; además de los hábitos de formación de asociaciones entre las especies de dichas familias (Géry 1977).

El mayor número de individuos en época de creciente (1114), podría responder a la formación de ambientes léticos temporales y a las planicies inundables donde se albergan juveniles de muchas especies (Géry 1977).

El dendrograma muestra que la estación de Las Camelias, en época de creciente, es similar a las otras tres estaciones en época de vacante, esto podría ser explicado por el aporte y al intercambio de especies existente entre el río y el cuerpo lético existente en época de creciente; la composición, estructura, y abundancia relativa de especies fundamentan dicho agrupamiento. Por otro lado durante la época de creciente las diferencias en composición y estructura se hacen más notables entre los lugares estudiados.

El índice de abundancia (41 individuos/lance en promedio), obedece tanto a características etológicas de los peces tales como el gregarismo (Géry 1977), así como a factores ambientales tales como el ciclo hidrológico. Así, podemos ver que en las estaciones con un mayor número de especies Characiformes, especialmente de las familias Characidae, Curimatidae y Hemiodontidae, son aquellas en las que la abundancia fue mayor, lo que se debería a sus hábitos gregarios. Se encontraron diferencias entre épocas, siendo la época de creciente la que muestra una mayor abundancia relativa tanto en sumatoria como en promedio.

La estación de Las Camelias presentó la diversidad más baja en la época de creciente, lo que podría atribuirse principalmente a la intensa pesca de peces de uso ornamental, en especial de *Sympodus aequifasciatus*, actividad que se realiza tanto en época de creciente como en época de vacante.

La captura de peces de uso ornamental se realiza en toda la cuenca baja y media del río Nanay, especialmente desde aquellos lugares cercanos a la ciudad de Iquitos, con acceso desde la carretera Iquitos-Nauta. La captura se realiza con malla mosquitera, de 1 a 3 mm de abertura; capturando indiscriminadamente peces ornamentales y juveniles de peces de consumo. Esta captura es realizada de pequeña a mediana escala por las empresas acuaristas e informalmente por pobladores de caseríos asentados a orillas del río. El proceso de comercialización fue descrito en su totalidad por Tello y Cánepa (1991). En la Tabla 3 podemos observar que la mayoría de las especies tienen uso ornamental (56 especies solo ornamentales, indicados con O en la lista, y 19 especies tanto ornamentales como de consumo, representadas por O-C). También se identificaron peces con potencial ornamental (OP), que reúnen características tales como el porte pequeño, colores brillantes o vistosos, comportamiento o hábitos especiales y fáciles de criar en espacios pequeños. Gran parte de las familias, en este estudio, incluyen a peces ornamentales, siendo solo tres aquellas que no incluyen a este tipo de peces (Tabla 3).

#### Agradecimientos

A los Doctores Mark Sabaj (Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia) y Flavio Lima (Museo de Zoología de la Universidad de Sao Paulo) por su ayuda en la identificación de especies de las familias Doradidae y Characidae, respectivamente. Al Departamento de Ictiología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por el ambiente y equipos prestados.

#### Literatura citada

- Castello L. 2007. Lateral migration of Arapaima gigas in floodplains of the Amazon. Ecology of freshwater fish. Singapur. 1-9 pp.
- Chang F. & H. Ortega. 1995. Additions and Corrections to the List of Freshwater Fishes of Peru. Publ. Mus. Hist. Nat. UNMSM (A) 50:1-12.
- Gerstner C., H. Ortega, W. Graham & H. Sánchez. 2006. Effects of the freshwater aquarium trade on wild fish populations in differentially-fished areas of the Peruvian Amazon. Journal of Fish Biology. U.S.A. 68 (3): p. 862-875.
- Géry J. 1977. Characoids of the World. TFH Publications. Neptune City, New Jersey. U.S.A. 672 pp.
- Hidalgo M. & P. Willink. 2007. Peces/Fishes. In: Vriesendorp et. al. eds. Perú: Nanay-Mazan-Arabela. Rapid Biological Inventories Report 18. The Field Museum. Chicago, U.S.A. 56-62 pp.
- IIAP (Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana). 2002. Propuesta de Zonificación Ecológica Económica de la Cuenca del Río Nanay. Programa de Ordenamiento Ambiental. IIAP. Iquitos, Perú. Vol. I-IV.
- Kahn F.; B. León & K.R. Young (Compiladores). 1993. Las plantas vasculares en las aguas continentales del Perú. IFEA. Lima-Perú. 357 pp.
- Lowe-Mcconnell R.S. 1987. Ecological Studies in Tropical Fish Communities. New York. Cambridge University Press. 381pp.
- Manly B. F.J. 1985. Multivariate Statistical Methods, A primer. Chapman and Hall. U.S.A. pp. 1-159.
- Ortega H. 2007. Composición, Distribución y Conservación de la Comunidad de Peces en la Zona Reservada del Parque Nacional Manu. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tesis para obtener el Grado Académico de Magíster en Zoología. Lima, Perú. 1-99 pp.

- Ortega H., & R.P. Vari. 1986. Annotated Checklist of the Freshwater Fishes of Peru. Smithsonian Contributions to Zoology 437. Washington, D.C. USA. 1-25 pp.
- Ortega H. & E. Castro. 1998. Hidrobiología de la Cuenca del Río Nanay. Evaluación de la Ictiofauna, Diagnóstico de la Pesquería y Propuesta de Manejo de los Recursos Hidrobiológicos. CEDIA. Lima, Perú. 60pp.
- Roldán G. 1992. Fundamentos de Limnología Neotropical. Editorial Universidad de Antioquia. Colombia. 529 pp.
- Reis R.E., S.O. Kullander & C.J. Ferrari Jr. 2003. Check list of the freshwater fishes of South and Central America. EDPU-CRS, Porto Alegre, Brasil. 729 pp.
- Rico-G.A., J. Beltrán, A. Álvarez & E. Flores. 2005. Diversidad de arañas (Arachnida: Araneae) en el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, Pacífico Colombiano. Biota Neotrop. [online]. 5(1a): 99-110 . Disponible en: <[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1676-06032005000200009&lng=es&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-06032005000200009&lng=es&nrm=iso)>. (acceso: 02/11/2009)
- Sioli H. 1984. The Amazon, Limnology and landscape ecology of a mighty river and its basin. Dr. W. Junk Publishers. Dordrecht Netherlands and Boston and Hingham, MA, USA. 763 pp.
- Souza J., A. Frias, U. Vela & L. Verdi. 2004. Principales hábitats para la captura de peces ornamentales en los ríos Nanay y Ucayali. Memorias: VI Congreso Internacional de Manejo de Fauna silvestre en Amazonía y Latinoamérica. Iquitos. Perú. 296-299pp.
- Tello S. & J. Cánepe. 1991. Estado actual de la explotación de los principales peces ornamentales de la Amazonía Peruana. Folia Amazónica IIAP. Perú. Vol. N°3. 107-128pp.