



Revista Peruana de Biología

ISSN: 1561-0837

lromeroc@unmsm.edu.pe

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Perú

Tantaleán, Manuel; Michaud, Carmen

Huéspedes definitivos de *Spirometra mansonioides* (Cestoda, Diphyllobothriidae) en el Perú

Revista Peruana de Biología, vol. 12, núm. 1, 2005, pp. 153-157

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Lima, Perú

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195018466015>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Huéspedes definitivos de *Spirometra mansonioides* (Cestoda, Diphyllobothriidae) en el Perú

Definitive hosts of *Spirometra mansonioides* (Cestoda, Diphyllobothriidae) in Peru

Manuel Tantaleán* y Carmen Michaud**

Presentado: 19/05/2005

Aceptado: 22/06/2005

Resumen

Se realizó un estudio parasitológico en el zoológico Parque de Las Leyendas, Lima, Perú en el año de 1993. Se recolectaron 49 muestras de heces de carnívoros pertenecientes a cinco familias: Canidae, Ursidae, Procyonidae, Mustelidae y Felidae, éstas fueron procesadas usando métodos rutinarios para la búsqueda de huevos de helmintos. En las heces de tres especies de la familia Felidae, *Puma concolor* (puma andino y puma de la selva), *Panthera onca* (otorongo) y *Leopardus pardalis* (tigrillo) se identificaron huevos de *Spirometra mansonioides*.

Palabras claves: *Spirometra mansonioides*, céstode, felino, huésped definitivo, Perú.

Abstract

A parasitology survey was conducted at the Parque de Las Leyendas Zoo in Lima, Peru at 1993. Forty nine stool samples of animals comprehended among five families of carnivores (Canidae, Ursidae, Procyonidae, Mustelidae, and Felidae) were collected and processed using routine methods for helminth ova detection. Three species of Felidae, *Puma concolor*, (puma andino and puma de la selva), *Panthera onca* (jaguar) and *Leopardus pardalis* (ocelot) had been infected with *Spirometra mansonioides*.

Keywords: *Spirometra mansonioides*, cestoda, feline, definitive host. Peru.

Introducción

En nuestro medio se tiene escaso conocimiento sobre las especies parasitarias que se encuentran habitualmente en la fauna silvestre. El presente estudio se realizó en un grupo de animales salvajes en cautiverio en el zoológico Parque Las Leyendas en Lima, Perú, con el fin de determinar la presencia de parásitos gastrointestinales y establecer un plan de tratamiento apropiado. Algunos de los parásitos que se encuentran en animales de vida silvestre pueden permanecer en sus huéspedes cuando se encuentran en cautiverio debido a la autoreinfección o la infección cuando las condiciones sanitarias, el alimento o la presencia de huéspedes intermediarios o vectores lo per-

miten; por ejemplo, los primates no humanos se infectan con oxyuroideos porque estos parásitos tienen ciclo de vida directo, los pinnípedos lo hacen con las larvas de ascáridos presentes en los peces marinos que ingieren como alimento (Soulsby, 1987). Los carnívoros son reservorios de protozoos, nemátodos, céstodes y trematodes, algunos de los cuales pueden infectar al hombre (por ejemplo: *Toxoplasma gondii*, *Lagochilascaris minor*, *Spirometra mansonioides*, *Paragonimus* spp.) (Soulsby, 1987). Sin embargo, poco se conoce sobre los huéspedes intermediarios o definitivos de estos parásitos en el Perú tanto en la fauna que proviene de su ambiente natural como en la que se encuentra en cautiverio; por este motivo, iniciamos este estudio en las especies de mamíferos carnívoros alojadas en el zoológico Parque Las Leyendas.

(*) Unidad de Post Grado. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
E-mail: Manuel Tantaleán mtantalean@hotmail.com

(**) Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.

Material y métodos

Se colectaron 49 muestras de heces de carnívoros. Las muestras fueron recogidas en las primeras horas de la mañana, tres veces para cada ambiente en días alternos, preservadas en formalina tamponada al 5% y procesadas aplicando métodos rutinarios para la búsqueda de huevos de helmintos (Ash & Orihel, 1991). En algunos casos se tomaron muestras representativas y aleatorias de un grupo de animales pues estos no se encontraban alojados individualmente. Se prestó especial atención a las muestras de felinos, debido a que podían revelar la existencia de parásitos zoonóticos como *Paragonimus* y *Lagochilascaris*.

Los animales investigados y número de muestras se presentan en la Tabla 1. El material se encuentra depositado en el Laboratorio de Parasitología de Fauna Silvestre de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el número de registro 70.

Resultados

De las 18 especies de mamíferos carnívoros estudiados, en sólo tres de la familia Felidae se identificaron huevos de *Spirometra mansonioides*: *Puma concolor*, puma andino (dos positivas de tres muestras, 66,67 %) y puma de la selva (una positiva de dos, 50%);

Tabla 1. Especies de carnívoros del zoológico Parque de Las Leyendas investigados en el presente trabajo, se indica el número de individuos, sexo y muestras de heces colectadas.

Familia Canidae		
<i>Lycalopex culpaeus</i> (zorro colorado, atoj),	2 hembras, 3 machos,	2 muestras.
<i>Lycalopex sechurae</i> (zorro de sechura),	10 hembras, 9 machos,	2 muestras.
Familia Ursidae		
<i>Tremarctos ornatus</i> (oso de anteojos),	3 hembras,	1 muestra.
Familia Procyonidae		
<i>Procyon cancrivorus</i> (osito lavador),	1 hembras, 1 machos,	2 muestras.
<i>Nasua nasua</i> (coatí de cola anillada),	21 hembras, 14 machos, 1snd*,	7 muestras
<i>Potos flavus</i> (chosna),	12 hembras, 5 machos, 2snd*,	4 muestras
<i>Bassaricyon alleni</i> (olingo),	1 machos,	1 muestra.
Familia Mustelidae		
<i>Mustela frenata</i> (comadreja),	1 machos,	1 muestra.
<i>Eira barbara</i> (tayra),	4 hembras, 3 machos,	1 muestra.
<i>Galictis vittata</i> (hurón grande),	4 hembras 1 machos,	1 muestra.
Familia Felidae		
<i>Puma concolor</i> (puma andino),	5 hembras, 3 machos,	3 muestras.
<i>Puma concolor</i> (puma de la selva),	1 hembras, 1 machos,	2 muestras.
<i>Herpailurus yaguarondi</i> (yaguarundi),	1 machos, 1snd*,	2 muestras.
<i>Leopardus pardalis</i> (tigrillo),	9 hembras 5 machos,	8 muestras.
<i>Leopardus wiedii</i> (margay),	7 hembras 5 machos,	3 muestras.
<i>Leopardus tigrinus</i> (oncilla),	1 machos,	1 muestra.
<i>Panthera onca</i> (otorongo),	2 hembras, 4 machos,	5 muestras
<i>Oncifelis colocolo</i> (gato montés),	3 machos,	3 muestras.

*snd = sexo no determinado

Panthera onca (1 de 5 muestras, 20%) y *Leopardus pardalis* (1 de ocho muestras, 12,5 %). Se desconoce el tiempo que estuvieron los animales en cautiverio. Dos *Panthera onca* nacidos en cautiverio, resultaron negativos.

Discusión

Spirometra mansonioides es un céstodo cuya larva plerocercoide (espargano) producen la esparganosis humana y animal. La infección en el hombre se adquiere por la ingestión del primer (copépodo del género *Cyclops*) o segundo huésped intermediario (anfibios o reptiles) infectados con procercoideos o plerocercoideos respectivamente (Mueller, 1974), o por el uso de la carne cruda infectada con el espargano a manera de emplasto en heridas expuestas o en los ojos. La larva migra al ponerse en contacto con la piel del huésped y en el caso del ojo puede producir exoftalmo, inflamación en los párpados y úlceras en la córnea (Kron et al., 1991; Raether & Hänel, 2003). El espargano usualmente migra en el subcutis y se aloja en el tejido conectivo de los músculos, abdomen, piernas o debajo del peritoneo o pleura, pero también puede ser encontrado en otros lugares del cuerpo, causando reacciones inflamatorias severas y fibrosis en diferentes tejidos (Raether & Hänel, 2003).

En varios países latinoamericanos se han descrito casos de esparganosis humana de localización subcutánea y ocular, (Botero & Gómez, 1958; León et al., 1972; Guderian et al., 1990; de Roodt et al., 1993). Asimismo existen dos reportes de esparganosis cerebral que es considerada poco frecuente (Boero et al., 1991; Landero et al., 1991) y uno de localización testicular (Sakamoto et al., 2003). Del mismo modo, se reconocieron larvas plerocercoideas de *Spirometra* en 4 especies de ofidios de Uruguay, *Leimadophis poecilogirrus*, *Listrophis d'Orbigny*, *Phylodrias patagoniense* y *Bothrops neuwiedii* y en el anuro *Leptodactylus ocellatus* (Dei-Cas et al., 1976).

En el Perú, se ha informado de 2 casos de

infección humana (Tantaleán, 1994) y una en un mono *Saguinus mystax* (pichico barba blanca), procedentes del departamento de Loreto (Michaud et al., 2003); pero aun no se han determinado las especies de animales que actúan como huéspedes intermediarios, tampoco la prevalencia y los mecanismos de infección de este céstodo. En algunos lugares de la región andina del país existe la costumbre de ingerir anfibios de los géneros *Batrachophryalus*, *Lynchophrys* y *Telmatobius* como parte de la alimentación. También se engullen especímenes de *Bufo* vivos como actos de valor durante los ritos previos a determinados actos danésticos («danza de tijeras») en algunos departamentos altoandinos como Huancavelica, lo que importaría un riesgo de infección si se comprueba que tales vertebrados actúan como segundo huésped intermediario. También se conoce el uso de carne de estos vertebrados como cataplasmas para curar heridas, principalmente en la selva.

En fauna salvaje norteamericana se ha descrito como huéspedes definitivos de *S. mansonioides* a *Felis rufus* (bobcats) (Watson et al., 1981; Heidt et al., 1988) y a *Ursus americanus* (oso negro) (Crum et al., 1978) y al *Procyon lotor* (mapache) que además puede albergar formas larvarias (Harkema, 1964). Además se tiene un reporte de un estudio realizado en las islas de las Antillas Holandesas, Curaçao, Bonaire y Aruba en donde como parte de la fauna parasitológica normal en gatos domésticos se identificó a *S. mansonioides* (Rep, 1975).

En relación a los huéspedes definitivos en Perú, sólo conocíamos de *Atelocynus microtis* (perro de monte) y de un zorro (probablemente *Lycalopex* spp.) de la región selvática y Cajamarca respectivamente (Tantaleán y Gue rrero, 1982-88) por lo que el presente trabajo nos permite señalar tres huéspedes naturales de la región amazónica. Este resultado tiene importancia porque, precisamente, los casos de esparganosis humana hasta hoy conocidos provienen de esta región. *Spirometra*

erinacei, causante de la esparganosis en el viejo mundo ha sido descrito como fauna parasitológica habitual en *Panthera leo* (león africano) en Tanzania (Muller-Graf, 1995; Muller-Graf et al., 1999), a pesar de tratarse de una especie diferente lo consideramos relevante porque establece la presencia del género *Spirometra* en felinos salvajes.

Es muy poco probable de que los felinos que resultaron positivos a *Spirometra* en este reporte se hayan infectado en cautiverio debido a que el ciclo biológico del parásito requiere de la presencia de dos hospederos intermedios, un crustáceo y un anfibio o reptil, los cuales no forman parte de la biota donde el zoológico se encuentra ubicado. Los felinos fueron alimentados con carne de res y tomaban agua potable. La autoinfección o re-infección no ocurre con esta especie de parásito.

Tratamiento

Con respecto al tratamiento se tiene un reporte de haber usado Ivermectina (vías subcutánea y oral) en gatos parasitados naturalmente con *S. mansonioides* sin resultados positivos (Blagburn et al., 1987). En un paciente con esparganosis proliferativa no se obtuvo ningún efecto con mebendazol ni praziquantel (Moulinier et al., 1982), pero sí en un perro también con esparganosis proliferativa (Beveridge et al., 1998). En el caso de larvas, el único tratamiento disponible consiste en la extirpación quirúrgica (Valerio et al., 2004). Miyazaki (1991) recomienda para *S. erinacei* adultos tratamiento igual a *Diphyllobothrium latum*, el cual consiste en la administración de bithionol, paromomycin y niclosamida.

S. mansonioides es un céstode de gran importancia, no sólo porque el plerocercoide puede infectar al hombre y animales, sino también porque sus metabolitos ejercen una acción beneficiosa en el huésped. El plerocercoide de *S. mansonioides* produce un factor que se asemeja en su actividad a la hormona de crecimiento humana (HCH), ya que estimula el crecimiento en el huésped, se une a los receptores de la HCH, da reacción

cruzada contra anticuerpos anti-HCH y tiene actividad semejante a la insulina y es lactogénica (Salem & Pares, 1989).

Se recomienda seguir muestreando carnívoros silvestres en cautiverio y/o en su habitat natural, para continuar identificando huéspedes definitivos de *S. mansonioides* en nuestro medio. Asimismo, educar a la población local con respecto al riesgo que implica las costumbres de ingerir y usar en medicina tradicional los huéspedes intermediarios de este parásito.

Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento a los directivos del Patronato Parque Las Leyendas (PATPAL) por el apoyo brindado durante la realización del presente estudio, al Dr. Eduardo Núñez y a los técnicos Srs. Santiago Dimas, Sergio Montes y Francisco Tito, por la ayuda invaluable durante la recolección de muestras y a Dr. Alfonso Gozalo por las sugerencias.

Literatura citada

- Ash, L. R. and T.C. Orihel. 1991. Parasites: A guide to laboratory procedures and identification. Am. Soc. Of Clin. Path. Chicago, 328 pp.
- Beveridge, I., S. C. Friend, N. Jegannathan, and J. Charles. 1998. Proliferative sparganosis in Australian dogs. Aust. Vet. J. 76: 757-759
- Blagburn, B. L., C. M. Hendrix, D. S. Lindsay, and J.L. Vaughan. 1987. Antihelminthic efficacy of ivermectin in naturally parasitized cats. Am. J. Vet. Res. 48: 670-672.
- Boero, A.M., P. Garaguso, and J. Navarre. 1991. A case of cerebral sparganosis in South America. Arq. Neuropsiquiatr. 49: 111-113
- Botero, D. and J. J. Gómez. 1958. The first case of sparganosis in Colombia. Amer. J. Trop. Med. & Hyg. 7: 597-599.
- Crum, J.M., V.F. Nettles, and W.R. Davidson. 1978. Studies on endoparasites of the black bear (*Ursus americanus*) in the southeastern United States. J. Wildl. Dis. 14: 178-186.
- Dei-Cas, E., N. Rodríguez, C. Botto, J. y J. Osimani. 1976. Larvas plerocercoideas de *Spirometra* (Dibothrioccephalidae) en el hombre y en animales silvestres de Uruguay. Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo 18: 165-172.
- de Roodt, A.R., G. Suárez, A. Ruzic, E. Bellegarde, M. Braun, and C.M. Blanco. 1993. A case of human sparganosis en Argentina. Medicina (B. Aires). 53: 325-328.

- Guderian, R., J. Roldan, A. Guevara, and J. Chico. 1990. Human sparganosis in Ecuador: report of a case in the province of Esmeraldas. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 23: 115-116.
- Harkema, R., and G.C. Miller. 1964. Helminth parasites of the raccoon, *Procyon lotor*, in the southeastern United States. *J. Parasit.* 50: 60-66.
- Heidt, G.A., R.A. Rucker, M.L. Kennedy, and M.E. Baeyens. 1988. Hematology, intestinal parasites, and selected disease antibodies from a population of bobcats (*Felis rufus*) in central Arkansas. *J. Wildlife Dis.* 24: 180-183.
- Kron, M. A., R. Guderian, A. Guevara, and A. Hidalgo. 1991. Abdominal sparganosis in Ecuador; A case report. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 44: 146-150.
- Landero, A., F. Hernández, M.A. Abasolo, D.A. Rechy, and D. Nuñez. 1991. Cerebral sparganosis caused by *Spirometra mansonioides*. *J. Neurosurg.* 75: 472-474.
- León, L.A., R. Almeida, and J.F. Mueller. 1972. A case of ocular sparganosis in Ecuador. *J. Parasit.* 58: 184-185.
- Michaud, C., M. Tantaleán, C. Ique, E. Montoya, and A. Gozalo. 2003. A survey for helminth parasites in feral New World non-human primate populations and its comparison with parasitological data from man in the region. *J. Med. Primatol.* 32: 341-345.
- Miyazaki, I. 1991. Helminthic zoonosis. *Int. Med. Found. Japan.* Tokyo.
- Moulinier, R., E. Martínez, J. Torres, O. Noya, B.A. de Noya, and O. Reyes. 1982. Human proliferative sparganosis in Venezuela: report of a case. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 31: 358-363.
- Muller-Graf, C.D., M. E. Woolhouse, and C. Packer. 1999. Epidemiology of an intestinal parasite (*Spirometra* spp.) in two populations of African lions *Panthera leo*. *Parasitology.* 118: 407-415.
- Mueller, J.F. 1974. The biology of *Spirometra*. *J. Parasit.* 60: 3-14.
- Mueller, J.F. 1975. On the occurrence of *Spirometra mansonioides* in South America. *J. Parasit.* 61: 774-775.
- Rep B. H. 1975. Intestinal helminthes in dogs and cats on the Antillian Islands, Aruba, Curaçao, and Bonaire. *Trop. Geogr. Med.* 27: 317-323.
- Sakamoto, T., C. Gutiérrez, A. Rodríguez, and S. Sauto. 2003. Testicular sparganosis in a child from Uruguay. *Acta Trop.* 88: 83-86.
- Soulsby, E.J.L. 1987. *Parasitología y enfermedades parásitarias de los animales domésticos*. 7^a. Edición. Nueva editorial Interamericana, S. A. de C. V. México D.F., México
- Tantaleán, M. 1994. Nuevos helmintos de importancia médica en el Perú. *Rev. Per. Med. Trop.* UNMSM. 8: 87-91.
- Tantaleán, M. y C. Guerrero. 1982-88. Presencia de *Spirometra mansonioides* en el Perú. *Bol. Peruano Parasit.* 4-10: 46.
- Torres, P. and L. Figueiroa. 1982. Infection by *Spirometra mansoni* (Cestoda, Pseudophyllidea) in the south of Chile. *Bol. Chile. Parasit.* 37: 72-73.
- Valerio, I., B. Rodríguez, y M. Chinchilla. 2004. Primer hallazgo de *Spirometra mansoni* en *Felis domesticus* de Costa Rica. *Parasitol. Latinoam.* 59: 162-166.
- Watson, T. G., V. F. Nettles, and W. R. Davidson. 1981. Endoparasites and selected infectious agents in bobcats (*Felis rufus*) from West Virginia and Georgia. *J. Wildl. Dis.* 17: 547-554.