

**REVISTA  
PERUANA DE  
BIOLOGÍA**

Revista Peruana de Biología

ISSN: 1561-0837

lromeroc@unmsm.edu.pe

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Perú

Aquino, Rolando; Bodmer, R. E.

Distribución y abundancia de Ateles belzebuth E. Geoffroy y Ateles chamek Humboldt (Cebidae: Primates) en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, Perú

Revista Peruana de Biología, vol. 13, núm. 1, octubre, 2006, pp. 103-106

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Lima, Perú

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195018520006>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal  
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

## Distribución y abundancia de *Ateles belzebuth* E. Geoffroy y *Ateles chamek* Humboldt (Cebidae: Primates) en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, Perú

**Distribution and abundance of *Ateles belzebuth* E. Geoffroy and *Ateles chamek* Humboldt (Cebidae: Primates) in the Pacaya Samiria National Reserve, Peru**

Rolando Aquino<sup>1</sup> y R. E. Bodmer<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Instituto de Ciencias Biológicas Antonio Raimondi, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. P. O. Box 575, Iquitos, Perú. Telefax 65-265510.

Email: Rolando Aquino: [raquinoy2005@yahoo.es](mailto:raquinoy2005@yahoo.es)

<sup>2</sup> Durrell Institute of Conservation and Ecology, University of Kent, Canterbury, England.

Presentado: 01/01/2006  
Aceptado: 11/03/2006

### Resumen

En el presente trabajo se dan a conocer las observaciones sobre el hábitat, las asociaciones inter-específicas, tamaño de grupo y densidad poblacional de las dos especies de *Ateles* que habitan en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Los datos fueron colectados mediante inventarios y censos por transecto en los períodos de enero de 1997 a febrero de 1999, setiembre — octubre 2000, agosto — setiembre, 2002 y enero 2003. En la margen izquierda del Río Samiria, *Ateles belzebuth* E. Geoffroy y *Ateles chamek* Humboldt comparten el hábitat formando grupos mixtos. El tamaño promedio de grupo para *A. belzebuth* fue 5,1 individuos/grupo y para *Ateles chamek* 7,3 individuos/grupo. La densidad poblacional estimada para *A. belzebuth* fue 1,02 individuos/km<sup>2</sup> y para *A. chamek* 0,51 individuos/km<sup>2</sup>. Se discuten y analizan los factores que habrían influido para la drástica reducción de ambas poblaciones.

**Palabras claves:** Reserva Nacional Pacaya Samiria, *Ateles*, distribución, asociaciones inter-específicas, densidad poblacional.

### Abstract

The study deals with the habitat, inter-specific associations, group size and population density of two *Ateles* species that inhabit the Pacaya Samiria National Reserve. Data were collected during inventories and transect censuses between January 1997 and February 1999, September — October 2000, August — September 2002 and January 2003. On the left bank of the Río Samiria, *Ateles balzebuth* E. Geoffroy and *Ateles chamek* Humboldt share the habitat forming mixed groups. Average group size for *A. belzebuth* was 5,1 individuals/group and for *A. chamek* 7,3 individuals/group. Estimated population density for *A. belzebuth* was 1,02 individuals/km<sup>2</sup> and for *A. chamek* 0,51 individuals/km<sup>2</sup>. We discuss and analyze the factors that may have influenced the drastic reduction of both populations.

**Keywords:** Pacaya Samiria National Reserve, *Ateles*, distribution, inter-specific associations, population density.

### Introducción


La Reserva Nacional Pacaya Samiria con 2'080,000 ha de extensión y enclavada entre los ríos Ucayali, Marañón y Huallaga es una de las áreas naturales protegidas más importantes del bosque inundable en la Amazonía peruana. En esta reserva constituida principalmente por hábitats de várzea de agua dulce (COREPASA, 1986; INRENA, 2000), habitan 12 especies de primates, entre los que se encuentran *Ateles belzebuth* E. Geoffroy y *Ateles chamek* Humboldt. Estos primates al igual que otros están sujetos a la caza para el consumo de subsistencia (Bodmer, et al., 1997, 1999, Aquino et al., 2000a). No obstante, es muy poco lo que conocemos en referencia a su eco-ecología y dinámica poblacional. La relativa escasez y el difícil contacto incluso no han permitido una clara definición del área de distribución para ambas especies. Los reportes de Neville et al. (1976); Freese et al. (1982) y Soini et al. (1996), mayormente basados en informaciones de guarda parques y otros dan cuenta de la existencia de ambas especies en la reserva. Por su parte, Bodmer et al. (1997) y Aquino et al. (2000a) lograron visualizar algunos grupos de *A. belzebuth* y *A. chamek* y proporcionan densidades para el área de

caza de Maipuco, Esperanza y San Antonio y cuenca del río Samiria, respectivamente.

La escasa información sobre estos primates nos motivó a la conducción del presente estudio con el fin de: 1) definir el área de distribución para una y otra especie, 2) determinar el hábitat y 3) estimar la densidad poblacional. Para cumplir con los objetivos propuestos se realizaron exploraciones con fines de inventario y censos por transecto, de enero 1997 a febrero 1999, setiembre — octubre 2000, agosto — septiembre 2002 y enero de 2003. En este trabajo presentamos los resultados obtenidos.

### Métodos

Para los fines de inventario y censos, la cuenca del río Samiria y áreas afines de la Reserva Nacional Pacaya Samiria fue dividida en: 1) área con persistente caza, 2) área con moderada caza y 3) área con ligera caza. En ellas, consideramos 10 estaciones de muestreo distribuidas de la siguiente manera: tres en el área de persistente caza (quebradas de Pinche, Chiric y Parinari), dos en el área de moderada caza (quebradas de Wishto Yanayacu y Tacsha cocha) y cinco en el área de ligera caza (quebradas de Armania,



**Figura 1.** Mapa de la Reserva Nacional Pacaya Samiria mostrando las áreas censadas en la cuenca del río Samiria: 1) quebrada Pinche, 2) quebrada Chiric, 3) quebrada Armana, 4) Tacsha Cocha, 5) quebrada Wishto Yanayacu, 6) quebrada Ungurahui, 7) quebrada Zapote, 8) quebrada Maquizapa, 9) quebrada Guanaico y 10) quebrada Parinari.

Guanaico, Ungurahui, Maquizapa y Zapote) (Fig. 1). Las estaciones de muestreo fueron definidas considerando los antecedentes de la existencia de los *Ateles* a través de reportes, informaciones verbales de guarda parques y cazadores y observaciones directas realizadas en años anteriores por uno de los autores (RA) y otros investigadores.

Para los censos, en cada una de las estaciones de muestreo fueron abiertas de tres a cuatro trochas, cuyas longitudes variaron de 3 a 5 km, dependiendo del tipo de bosque. Por cada una de las trochas, dos observadores provistos de libreta de campo, brújula, binocular, cinta métrica, cintas plásticas y lápiz, se desplazaron a una velocidad de 1,5 km/hora en las restingas y llanuras y a 0,5 km/hora en los agujales. Las actividades censales se realizaron desde las 0700 a 1100 h y desde las 1500 a 1800 h (hora local). Cada vez que hubo contacto con estos primates procedimos al registro de la especie, número de individuos por grupo y distancia perpendicular del primer animal avistado al transecto. Adicionalmente, anotamos el tipo de bosque y la vegetación dominante. El escaso número de grupos contactados durante los censos no fue suficiente para el estimado de densidades mediante el programa *DISTANCE*, por lo que fue usada la fórmula:  $D = N/2LW$ , donde  $W$  es el promedio de la distancia visualizada,  $L$  es la longitud total censada y  $N$  es el número de grupos visualizados (Whitesides et al. 1988). La densidad de individuos/km<sup>2</sup> fue obtenida multiplicando el promedio del tamaño de grupo por la densidad de grupos. Un total de 1,287 km de longitud fue censada para *A. belzebuth* y 1,552 km para *A. chamek*.

## Resultados

### Distribución

Las numerosas exploraciones con fines de inventario y de censos en ambas márgenes del río Samiria nos permite afirmar que *A. belzebuth* tiene como área de distribución la margen izquierda del río Samiria y comprende desde el río Marañón al Norte, hasta el límite de la reserva al Sur, incluyendo la quebrada Cauch Grande. Al respecto, Kellogg y Goldman (1944) ya habían considerado al río Samiria (= río Chamicuro) como parte de la distribución geográfica de esta especie en el Perú.

Por su parte, *A. chamek* se encuentra habitando en ambas márgenes del río Samiria, por lo tanto tiene por distribución toda la reserva, aún cuando la mayor concentración de su población podría encontrarse en la cuenca del río alto Pacaya (Aquino, obs pers.).

### Hábitat

En la Reserva Nacional Pacaya Samiria, ambas especies parecen tener mayor predisposición por habitar los agujales. En efecto, de los 13 grupos de *A. belzebuth* y 6 de *A. chamek* contactados durante los censos (Tabla 1), solamente tres grupos de *A. belzebuth* fueron avistados en restingas al borde de agujales, dos de ellos en la quebrada Wishto Yanayacu comiendo frutos de zapote (*Achras zapota*) y el tercero en la quebrada Pinche comiendo frutos de granadilla silvestre (*Passiflora* sp.). Los demás, fueron avistados en agujales de origen reciente y agujales semi-eutrofizados, ambos caracterizados por presentar el piso fango-

**Tabla 1.** Grupos de *Ateles belzebuth* y *Ateles chamek* observados durante los censos en la cuenca del río Samiria y áreas afines, Reserva Nacional Pacaya Samiria.

Áreas censadas	<i>Ateles belzebuth</i>		<i>Ateles chamek</i>	
	Long. censada (km)	# Grupos observados	Long. censada (km)	# de grupos observados
Área persistente caza:	488	9	488	1
Área moderada caza:	264	3	357	0
Área ligera caza:	535	1	707	5
Total:	1,287	13	1,552	6
Rango variación				
Tamaño de grupo	2 -- 11		3 -- 13	
Promedio tamaño grupo	5,1		7,3	

so y cubierto de agua; el primero durante todo el año y el segundo entre seis a ocho meses del año, lo cual probablemente es un limitante para el acceso de cazadores en época de «vacante» (junio — enero).

### Asociaciones inter-específicas

*A. belzebuth* y *A. chamek*, además de compartir el hábitat, también co-existen formando grupos mixtos. Al respecto, en la cuenca del río Samiria se observó en dos oportunidades grupos mixtos, uno en la quebrada Pinche al Norte de la quebrada Yanayacu Grande y otro en la quebrada Guanaico, al Sur de la quebrada Yanayacu Grande. En el primer caso, el grupo mixto de cuatro ejemplares estuvo conformado por dos de *A. belzebuth* y dos de *A. chamek*; mientras que en el segundo, el grupo de 12 individuos estuvo integrado por 4 de *A. belzebuth* y 8 de *A. chamek*. En este último, entre los integrantes de *A. belzebuth* había una hembra adulta sin la banda frontal amarillenta cargando un pequeño infante cuyo pelaje era totalmente negro, lo cual indicaría que entre ambas especies existen cruzamientos.

### Tamaño de grupo

Los grupos contactados de *A. belzebuth* fluctuaron desde 2 a 11 individuos, cuyo promedio fue estimado en 5,1 y en *A. chamek* desde 3 a 13 individuos, con un promedio de 7,3 (Tabla 1).

### Abundancia y densidad poblacional

Los resultados nos indican mayor abundancia de *A. belzebuth* en el área de persistente caza y de *A. chamek* en el área de ligera caza (Tabla 1), por lo que en lo que concierne a la cuenca del río Samiria y áreas afines, gran parte de la población de *A. belzebuth* estarían concentradas al Norte de la quebrada Yanayacu Grande y de *A. chamek* al Sur de la mencionada quebrada; ambas habitando los agujales de difícil acceso.

La densidad poblacional en la cuenca del río Samiria fue estimada en 0,2 grupos/km<sup>2</sup> y/o 1,02 individuos/km<sup>2</sup> para *A. belzebuth* y 0,06 grupos/km<sup>2</sup> y/o 0,51 individuos/km<sup>2</sup> para *A. chamek* (Tabla 2).

**Tabla 2.** Densidad poblacional estimada para *Ateles* en la cuenca del río Samiria y áreas afines, Reserva Nacional Pacaya Samiria.

Especies	Grupos/ km <sup>2</sup>	Indiv./ km <sup>2</sup>
<i>Ateles belzebuth</i>	0,2	1,02
<i>Ateles chamek</i>	0,06	0,51

### Discusión

En la Reserva Nacional Pacaya Samiria, la mayor predisposición de los *Ateles* por habitar los agujales podría explicar el escaso o nulo contacto que se tuvo en anteriores censos (con excepción de Aquino et al., 2000a) en los cuales limitaron sus actividades censales a restings y bosques de galería. Al respecto, es muy probable que desde mucho antes de la década de 1970 estos primates ya se hubiesen encontrado refugiados en los agujales como respuesta a una excesiva caza, causada en primer lugar por el uso como cebo para la captura de felinos (*Panthera onca* Linnaeus y *Leopardus pardalis* Linnaeus) cuyas pieles en ese entonces eran cotizadas en el mercado internacional a precios exorbitantes, y en segundo lugar para el consumo de subsistencia debido a su tamaño relativamente grande en comparación a otros primates que habitan en esta reserva y por lo agradable de su carne como muchos lo han sostenido.

En referencia a las asociaciones inter-específicas, además de los dos únicos casos registrados entre *A. belzebuth* y *A. chamek*, también fue reportado la asociación de *A. chamek* con *Cacajao calvus ucayalii* Thomas en la Reserva Comunal Tamshiyacu Tahuayo (Aquino, 1998). Estos escasos registros indicarían que los *Ateles* usualmente no acostumbran realizar sus actividades en grupos mixtos como ocurre con otras especies (Leonard y Bennet, 1996; Aquino, 1998; Heymann et al. 2002).

El mayor tamaño promedio de grupo de *A. chamek* respecto al de *A. belzebuth* podría más bien estar relacionado con la pequeña muestra obtenida para *A. chamek*, aún cuando grupos de hasta 15 individuos fueron registrados para esta especie en la Reserva Comunal Tamshiyacu Tahuayo (Aquino, obs pers.). De otro lado, el tamaño promedio de grupo de ambas especies fue mayor a los reportados por White (1986) para *A. chamek* en el Parque Nacional Manú y Klein y Klein (1977) para *A. belzebuth* en Colombia (3,15 y 3,5 respectivamente). Esta diferencia probablemente se debe a los infantes sin locomoción propia que fueron incluidos para los estimados en este estudio.

En este estudio, la densidad estimada para *A. belzebuth* fue mayor al de *A. chamek*; también fue mayor a las reportadas para *A. chamek* en el área de caza de Maipuco, Esperanza y San Antonio (Bodmer et al., 1997), a las de *A. belzebuth* y *A. chamek* en las zonas de persistente caza y ligera caza de la cuenca del río Samiria (Aquino et al., 2000a) y a las de *A. belzebuth* en la cuenca del río Pucacuro (Aquino et al., 2000b). Estas diferencias podrían estar relacionadas con la realización de censos en agujales de difícil

acceso para los cazadores y por ende de mayor concentración de *Ateles* como en los agujales de Parinari y Wishto Yanayacu. De otro lado, ambas densidades fueron menores al estimado para *A. chamek* en el Parque Nacional Manú (White, 1986) y cuenca del río Yavarí (Bodmer et al., 1997); diferencia que podría estar relacionado con la baja presión de caza existente en éstas, en la primera por encontrarse fuertemente resguardado por guarda parques, mientras que en la segunda por su lejanía con respecto a Iquitos, la ciudad más grande en la Amazonía peruana, y por la existencia aún de otros mamíferos de caza relativamente abundantes.

Sorprende quizá el registro del mayor número de grupos de *A. belzebuth* en el área de persistente caza, es decir, hacia el norte y muy próximo al río Marañón. Lo cual podría explicarse por una relación con la presencia de los agujales de difícil acceso, que estarían actuando como una barrera casi infranqueable para el ingreso de cazadores furtivos, de otro modo no encontramos explicación para que ambas poblaciones se encuentren habitando casi exclusivamente en este tipo de bosques. También es oportuno precisar que el área que ambas especies comparten el hábitat correspondería a un enclave que se habría originado por el cambio de curso del río Huallaga, quedando parte de la población de *A. belzebuth* entre los ríos Huallaga y Samiria, muy cerca de la confluencia con el río Marañón, de donde se habrían dispersado hacia el sur.

### Agradecimientos

Nuestra gratitud al desaparecido Dr. José López Parodi, quien en vida fue Director del Programa Integral de Desarrollo y Conservación Pacaya Samiria, AIF-WWF/ DK, al M.S. Pablo Puertas, Director Interino del Programa Integral de Desarrollo y Conservación Pacaya Samiria, AIF-WWF/ DK y al Consejo Superior de Investigaciones (CSI) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por habernos facilitado el financiamiento, sin los cuales no hubiera sido posible la ejecución del presente estudio. Nuestro reconocimiento al Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) por el permiso otorgado para el ingreso a la citada reserva. Hacemos extensivo nuestra gratitud al personal de la Jefatura Pacaya Samiria por brindarnos el apoyo logístico y a los moradores de la comunidad de Parinari, por su activa participación durante los censos en agujales.

### Literatura citada

- Aquino, R. 1998. Some observations on the ecology of *Cacajao calvus ucayalii* in the Peruvian Amazon. Primate Conservation 18: 21 – 24.
- Aquino, R.; R. E. Bodmer y G. Gil. 2000a. Impacto de la caza en poblaciones de primates de la cuenca del río Samiria, Reserva Nacional Pacaya Samiria. En: F. San Martín y M. García (ed.): La Primatología en el Perú. Lima, Perú, Vol. II, 81 – 91.
- Aquino, R.; R. E. Bodmer y E. Pezo. 2000b. Evaluación de primates en la cuenca del río Pucacuro, Amazonía Peruana. En: F. San Martín y M. García (ed.): La Primatología en el Perú. Lima, Perú, Vol. II, 92 – 100.
- Bodmer, R. E.; R. Aquino y P. Puertas. 1997. Alternativas de manejo para la Reserva Nacional Pacaya Samiria: Un análisis sobre el uso sostenible de la caza. En: T. Fang, R. E. Bodmer, R. Aquino y M. Valqui (ed.): Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía. La Paz, Bolivia, 65 - 74.
- Bodmer, R.E.; C. Allen; J. Penn; R. Aquino y C. Reyes. 1999. Evaluación del uso sostenible de la fauna silvestre en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Documento de Trabajo América Verde 4b, The Nature Conservancy, Arlington, USA.
- COREPASA, 1986. Plan Maestro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Editorial e Imprenta DESA, Iquitos, Perú.
- INRENA, 2000. Plan Maestro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Loreto, Perú.
- Freese, C.; P. Heltne; N. Castro & G. Whitesides. 1982. Patterns and determinants of monkey densities in Peru and Bolivia, with notes on distribution. Int. J. Primatol. 3(1): 53 - 90.
- Heymann, E.W.; F. Encarnación; y J. E. Canaquiri. 2002. Primates of the río Curaray, northern Peruvian Amazon. Int. J. Primatol. 23(1):191 – 201.
- Kellogg, R. & E. Goldman. 1944. Review of spider monkeys. Proc. U.S. National Museum 96: 1 - 45.
- Klein, L.L. & L. J. Klein. 1977. Feeding behavior of the Colombian spider monkey, *Ateles belzebuth*. En: T.H. Clutton-Brock (ed.): Primate Ecology: Studies of feeding and ranging behavior in lemurs, monkeys and apes. New York, Academic Press, 153 – 181.
- Leonard, Z. & C. Bennet. 1996. Associative behavior of *Cacajao calvus ucayalii* with other primate species in Amazonia Peru. Primates 37(2): 227 – 230.
- Neville, M.; N. Castro; A. Mármol & J. Revilla. 1976. Censusing primate population in the reserved area of the Pacaya and Samiria rivers, Department Loreto, Peru. Primates 17 (2): 151 - 181.
- Soini, P.; L. Sicchard; A. Fachín; R. Pezo y M. Chumbe. 1996. Una evaluación de la fauna silvestre y su aprovechamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, Perú. IIAP. Documento Técnico No. 24.
- White, F. 1986. Census and preliminary observation on the ecology of black-faced black spider monkey (*Ateles paniscus chamek*) in Manu National Park, Peru. Am. J. Primatol. 11: 125 - 132.
- Whitesides, G. H.; J. F. Oates; S. M. Green y R. P. Kluberdanz. 1988. Estimating primate densities from transects in African rain forest: A comparison of techniques. J. Anim. Ecol. 57: 345 -367.