

**REVISTA
PERUANA DE
BIOLOGÍA**

Revista Peruana de Biología

ISSN: 1561-0837

lromeroc@unmsm.edu.pe

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Perú

León, Blanca

Chrysobalanaceae endémicas del Perú

Revista Peruana de Biología, vol. 13, núm. 2, diciembre, 2006, pp. 258s-259s

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Lima, Perú

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195018608037>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Chrysobalanaceae endémicas del Perú

Blanca León^{1,2}

¹Museo de Historia Natural,
Av. Arenales 1256, Aptdo.
14-0434, Lima 14, Perú

² Plant Resources Center,
University of Texas at
Austin, Austin TX 78712
EEUU.

blanca.leon@mail.utexas.edu

Resumen

La familia Chrysobalanaceae es reconocida en el Perú por presentar cuatro géneros y 98 especies (Brako & Zarucchi, 1993; Ulloa Ulloa et al., 2004), todas ellas árboles y arbustos. En este trabajo reconocemos nueve especies y una variedad como endemismos peruanos en dos géneros. El género *Licania* es el más rico en especies endémicas. Estos taxones endémicos ocupan la región Bosques Húmedos Amazónicos, entre los 100 y 500 m de altitud. Dos especies endémicas están representadas dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

Palabras claves: Chrysobalanaceae, *Licania*, Perú, endemismo, plantas endémicas.

Abstract

The Chrysobalanaceae are represented in Peru by four genera and 98 species (Brako & Zarucchi, 1993; Ulloa Ulloa et al., 2004), all of them trees and shrubs. Here we recognize as endemics nine species and one variety in two genera. *Licania* is the genus with the largest number of endemic species. Endemic Chrysobalanaceae are found in the Humid Lowland Amazonian Forests region between 100 and 500 m elevation. Two endemic species have been found within Peru's protected area system.

Keywords: Chrysobalanaceae, *Licania*, Peru, endemism, endemic plants.

1. *Hirtella aramangensis* Prance

DD



Publicación: Fl. Neotrop. 9: 315—316, f. 50 D-F. 1972.
Colección tipo: F. Woytkowski 5625
Herbarios: GH, NY, S, US.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AM.
Regiones Ecológicas: BHA; 500 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Árbol conocido, aparentemente, de la colección tipo, una planta recolectada en la cuenca del Marañón, en la década de 1960.

2. *Hirtella revillae* Prance

VU, B1ab(iii)



Publicación: Acta Amazon. 8(4): 587, 589, f. 6. 1978.
Colección tipo: A.H. Gentry et al. 15807
Herbarios: MO, NY; AMAZ.
Nombre común: Pucacuro caspi.
Registro departamental: LO.
Regiones Ecológicas: BHA; 120—200 m.
SINANPE: RNAM
Herbarios peruanos: AMAZ (isotipo+5).

Observaciones: Árbol conocido de varias poblaciones en la cuenca amazónica. Esta especie está representada en un área protegida (Vásquez, 1997), así como en un arboreto localizado en la cuenca del Ucayali.

3. *Hirtella standleyi* Baehni & J.F. Macbr.

DD



Publicación: Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 1078. 1938.
Colección tipo: G. Klug 3022
Herbarios: A, F, K, NY, S, US.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: LO.
Regiones Ecológicas: BHA; 220 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Árbol conocido aparentemente de una localidad, en el occidente del Departamento de Loreto, de la cuenca del Huallaga. Al parecer, no ha vuelto a ser recolectada desde 1938.

4. *Hirtella subglanduligera* Pilg.

DD



Publicación: Notizbl. Konigl. Bot. Gart. Berlin 6: 140—141. 1914.
Colección tipo: E.H.G. Ule 9414
Herbarios: MG, US.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: MD.
Regiones Ecológicas: BHA; altitud desconocida.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Esta especie arbórea es conocida sólo de la citación en la descripción original, la cual menciona 'Alto Acre, Seringal Auristella', probablemente una localidad cerca de la frontera con Brasil. Fue recolectada en 1911 y no se conoce de registros adicionales.

5. *Licania cecidiophora* Prance**EN, B1a**

Publicación: Biotropica 10: 85—86, f. 2 A-E. 1978.
Colección tipo: E. Ancuash A. 752
Herbarios: F, MO, NY.
Nombre común: Dúship.
Registro departamental: AM.
Regiones Ecológicas: BHA; 180—490 m.
SINANPE: ZRSC
Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Árbol conocido de pocas colecciones botánicas, todas provenientes de la cuenca del río Cenepa, en el área de la Zona Reservada Santiago-Comaina. Al parecer, no se conoce de nuevos registros desde 1978.

6. *Licania filomenoi* Prance**DD**

Publicación: Fl. Neotrop. 9S: 20—22, f. 2, 38. 1989.
Colección tipo: A.H. Gentry et al. 25665
Herbarios: MO, NY; USM!
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: PA, SM.
Regiones Ecológicas: BHA; 500 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (isotipo).

Observaciones: Esta especie arbórea es conocida de bosques de terraza, de dos localidades aisladas en las cuencas del Huallaga y del Palcazú respectivamente. Al parecer, no ha vuelto a ser recolectada desde 1986.

7. *Licania intrapetiolaris* Spruce ex Hook.f. var. *brevis***J.F. Macbr.****DD**

Publicación: Candollea 5: 369. 1934.
Colección tipo: G. Klug 612
Herbarios: NY.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: LO.
Regiones Ecológicas: BHA; 100—140 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (1).

Observaciones: Especie arbórea conocida de poblaciones fragmentadas, en la Provincia de Maynas. Ha sido recolectada de bosques estacionalmente inundables, los cuales han sido escasamente herborizados.

8. *Licania klugii* Prance**LC**

Publicación: Fl. Neotrop. 9: 47—48, f. 6 A-D. 1972.
Colección tipo: G. Klug 2221
Herbarios: F, GH, K, MO, NY, US.
Nombre común: Egomana.
Registro departamental: AM, LO, SM.
Regiones Ecológicas: BHA; 180 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: AMAZ (1), USM (1).

Observaciones: Especie arbórea conocida de varias localidades en la Amazonía peruana. El ejemplar tipo proviene de la cuenca del Putumayo, muy cerca al límite con Colombia. Ha sido recolectada de las cuencas del Imaza, Huallaga, Napo, entre otros. Vásquez (1997) menciona que crece en bosques con protección privada (Explornapo y Exploramapa Camp).

9. *Licania trigonoides* J.F. Macbr.**DD**

Publicación: Candollea 5: 368. 1934.
Colección tipo: G. Klug 449
Herbarios: F, NY, US.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: LO.
Regiones Ecológicas: BHA; 100 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Arbusto conocido aparentemente sólo de la colección tipo, una planta recolectada en 1929, de los alrededores de Iquitos.

10. *Licania vasquezii* Prance**DD**

Publicación: Kew Bull. 47(2): 251—254, f. 4. 1992.
Colección tipo: R. Vásquez & N. Jaramillo 12726
Herbarios: K, MO; USM!
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: LO.
Regiones Ecológicas: BHA; 106 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (isotipo).

Observaciones: Especie arbórea conocida solamente de la colección tipo, recolectada en 1989, en la cuenca del Amazonas, de un bosque parcialmente intervenido, cerca a los límites con Brasil y Colombia.