



Revista Peruana de Biología

ISSN: 1561-0837

lromeroc@unmsm.edu.pe

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Perú

León, Blanca
Hydrophyllaceae endémicas del Perú
Revista Peruana de Biología, vol. 13, núm. 2, diciembre, 2006, p. 370s
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lima, Perú

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195018608062>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Hydrophyllaceae endémicas del Perú

Blanca León ^{1,2}

¹ Museo de Historia Natural,
Av. Arenales 1256, Aptdo.
14-0434, Lima 14, Perú

² Plant Resources Center,
University of Texas at
Austin, Austin TX 78712
EE.UU.

blanca.leon@mail.utexas.edu

Resumen

La familia Hydrophyllaceae es reconocida en el Perú por presentar cuatro géneros y siete especies (Brako & Zarucchi, 1993), todas hierbas o subarbustos. Una sola especie, del género *Wigandia*, es reconocida como endémica, la cual ocupa la región Bosques Secos, entre los 1600 y 1800 m de altitud. No se encuentra representado en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

Palabras claves: Hydrophyllaceae, *Wigandia*, Perú, endemismo, plantas endémicas.

Abstract

The Hydrophyllaceae are represented in Peru by four genera and seven species (Brako & Zarucchi, 1993), all herbs and subshrubs. One species, in the genus *Wigandia*, is recognized here as endemic, which grows in Dry Forests region, between 1600 and 1800 m elevation, and has not yet been collected in Peru's protected areas system.

Keywords: Hydrophyllaceae, *Wigandia*, Peru, endemism, endemic plants.

1. *Wigandia wurdackiana* Ferreyra

EN, B1a



Publicación: Biollania, Ed. Esp. No. 6:
328—329. 1997.

Colección tipo: R. Ferreyra 15338

Herbarios: ; USM.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: AM.

Regiones Ecológicas: BS; 1600—1800 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: USM (holotipo
citado).

Observaciones: Arbusto conocido solamente de la cuenca del Marañón, de dos localidades cercanas. El ejemplar tipo, recolectado en la década de 1960, proviene de un lugar dominado por vegetación xérica. El otro ejemplar conocido proviene de los Cerros Calla Calla, en ambientes más mésicos; esta última localidad es conocida por los varios endemismos que alberga. Ferreyra (1997) comenta que el ejemplar de Calla Calla fue reconocido como *Wigandia crispata* en Brako & Zarucchi (1993).