



Biota Neotropica

ISSN: 1676-0611

cjoly@unicamp.br

Instituto Virtual da Biodiversidade

Brasil

Silva Carvalho Filho, Fernando da; Esposito, Maria Cristina; Cássia Oliveira dos Santos, Rita de
Primeiro registro de *Kroeberia fuliginosa* Lindner, 1930 (Diptera:Ropalomeridae) para o Estado do
Pará, Brasil

Biota Neotropica, vol. 7, núm. 3, septiembre-diciembre, 2007, pp. 379-380
Instituto Virtual da Biodiversidade
Campinas, Brasil

Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199114292040>

- Como citar este artigo
- Número completo
- Mais artigos
- Home da revista no Redalyc

redalyc.org

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal
Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

Primeiro registro de *Kroeberia fuliginosa* Lindner, 1930 (Diptera:Ropalomeridae) para o Estado do Pará, Brasil

Fernando da Silva Carvalho Filho^{1,3}, Maria Cristina Esposito¹ & Rita de Cássia Oliveira dos Santos²

Biota Neotropica v7 (n3)

<http://www.biota-neotropica.org.br/v7n3/pt/abstract?short-communication+bn04107032007>

Recebido em 27/08/07

Versão Reformulada recebida em 31/10/07

Publicado em 12/11/07

¹Laboratório de Ecologia de Invertebrados, Departamento de Biologia, Universidade Federal do Pará,
Rua Augusto Corrêa, 01, CEP 66040-170, Guamá, Belém, PA, Brasil

²Campus Universitário de Bragança, Universidade Federal do Pará
Av. Leandro Ribeiro, s/n, Aldeia, CEP 68600-000, Bragança, PA, Brasil

³Autor para correspondência: Fernando da Silva Carvalho Filho,
e-mail: fernanbio@yahoo.com.br

Abstract

Carvalho Filho, F.S., Esposito M.C. & Santos, R.C.O. **First record of *Kroeberia fuliginosa* Lindner, 1930 (Diptera:Ropalomeridae) from Pará State, Brazil.** Biota Neotrop. Sep/Dez 2007 vol. 7, no. 3 <http://www.biota-neotropica.org.br/v7n3/pt/abstract?short-communication+bn04107032007>. ISSN 1676-0603.

Kroeberia fuliginosa Lindner, 1930, was collected in the Pará state, Brazil, for the first time, extending the geographical distribution of this species.

Keywords: *Kroeberia*, *Ropalomeridae*, *Diptera*, *Pará*, *new record*.

Resumo

Carvalho Filho, F.S., Esposito M.C. & Santos, R.C.O. **Primeiro registro de *Kroeberia fuliginosa* Lindner, 1930 (Diptera:Ropalomeridae) para o Estado do Pará, Brasil.** Biota Neotrop. Sep/Dez 2007 vol. 7, no. 3 <http://www.biota-neotropica.org.br/v7n3/pt/abstract?short-communication+bn04107032007>. ISSN 1676-0603.

Kroeberia fuliginosa Lindner, 1930 foi coletada no estado do Pará pela primeira vez, ampliando assim a distribuição geográfica dessa espécie.

Palavras-chave: *Kroeberia*, *Ropalomeridae*, *Diptera*, *Pará*, *novo registro*.

Introdução

Ropalomeridae são moscas robustas com 6-12 mm, olhos salientes, face com carena mediana ou tubérculo central, palpos alargados, fêmures alargados com cerdas ventrais fortes, tibia posterior geralmente achatada lateralmente e encurvada (Alves & Ale-Rocha 2006). A família inclui oito gêneros e 35 espécies (Alves & Ale-Rocha 2006). É principalmente neotropical, ocorrendo desde o Sul dos Estados Unidos da América até o Norte da Argentina. Uma única espécie é conhecida da Região Neártica, *Rhytidops floridensis* (Aldrich, 1932). Para o estado do Pará foram registrados até o presente, três gêneros e sete espécies (Prado & Papavero 2002, Marques & Ale-Rocha 2004, Marques & Ale-Rocha 2005).

Kroeberia Lindner, 1930 é um gênero de moscas castanhas, de tamanho médio, com fronte pouco côncava, face com tubérculo central arredondado, arista nua ou com pêlos microscópicos, escutelo cerdoso e pernas com os fêmures bastante engrossados (Marques & Ale-Rocha 2004). O gênero foi revisto por Marques & Ale-Rocha (2004) e compreende duas espécies *Kroeberia fuliginosa* Lindner, 1930 e *Kroeberia minor* Marques & Ale-Rocha, 2004. *K. fuliginosa* apresenta ampla distribuição podendo ser encontrada do México ao sul do Brasil (Steykskal 1967, Marques & Ale-Rocha 2004) e *K. minor* ocorre somente no Brasil. Nesse artigo, a distribuição geográfica de *Kroeberia fuliginosa* é ampliada.

Material e Métodos

O espécime analisado foi coletado na Mata do Lobão, Município de Bragança, Pará, Brasil, em junho de 2007, por R. C. Santos utilizando-se armadilha para a captura de borboletas, como descrita por Rydon (1964), com banana fermentada como isca. A Mata do Lobão é uma floresta secundária com 1 km² localizada próxima ao rio Caeté (1° 02' 04" S e 46° 45' 48" W). O material foi preservado em álcool 70% e posteriormente montado em alfinetes.

O espécime analisado foi depositado na Coleção Entomológica do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e identificado utilizando-se a chave de Alves & Ale-Rocha (2006).

Resultados e Discussão

A ocorrência de *Kroeberia fuliginosa* Lindner, 1930 é assinalada, pela primeira vez, para o estado do Pará.

1. *Kroeberia fuliginosa* Lindner, 1930

Kroeberia fuliginosa Lindner, 1930:127; Steyskal, 1967:1 (catálogo); Prado & Papavero, 2002: 1 (catálogo); Marques & Ale-Rocha, 2004: 316 (redescrição, distribuição geográfica).

Diagnose: face com tubérculo central arredondado; cerdas orbitais ausentes; ocelares, pós-ocelares, vertical interna e externa presentes; arista nua; escutelo revestido por cerdas espiniformes com 1 cerda apical e 2 discrais.

Material examinado: 1 macho: BRASIL, Pará, Bragança, 11.VI.2007, Santos, R. C. col.

Lista de Espécies para o Estado do Pará

Segue abaixo a lista, em ordem alfabética, das espécies de Ropalomeridae que ocorrem no estado do Pará, Brasil, mencionando a distribuição das espécies (Steykskal 1967, Prado & Papavero 2002, Marques & Ale-Rocha 2004, Marques & Ale-Rocha 2005).

1. *Kroeberia fuliginosa* Lindner, 1930

Distribuição: México, Panamá, Venezuela, Brasil (Acre, Amapá, Roraima, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul).

2. *Kroeberia minor* Marques & Ale-Rocha, 2004

Distribuição: Brasil (Pará e Amazonas).

3. *Ropalomera tessellata* Prado, 1966

Distribuição: Brasil (Pará, Amapá, Amazonas).

4. *Ropalomera tibialis* Walker, 1852

Distribuição: Brasil (Pará, Amapá, Amazonas).

5. *Ropalomera titillator* Steyskal, 1967

Distribuição: Brasil (Pará)

6. *Willistoniella pleuropunctata* (Wiedemann, 1824)

Distribuição: México, Belize, Guatemala, Honduras, Curaçao, Costa Rica, Panamá, Trindade, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Brasil (Roraima, Pará, Amazonas, Tocantins, Rondônia, Sergipe, Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina), Bolívia, Paraguai e Argentina.

7. *Willistoniella spatulata* Marques & Ale-Rocha, 2005

Distribuição: Honduras, Panamá, Venezuela, Colômbia, Equador e Brasil (Pará e Amazonas).

8. *Willistoniella ulyssesi* Marques & Ale-Rocha, 2005

Distribuição: México, Guatemala, Belize, Honduras, Costa Rica, Panamá, Trindade, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Brasil (Acre, Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná).

Conclusão

Kroeberia fuliginosa é acrescida à lista de espécies que ocorrem no Pará, aumentando assim o conhecimento sobre a diversidade dos Ropalomeridae nesse estado.

O registro de *Kroeberia fuliginosa* no Pará amplia distribuição geográfica da espécie.

Agradecimentos

Os autores agradecem a Ivanei Araújo por ceder as armadilhas para borboletas utilizadas na captura das moscas e Marielda Góis, Ana Cristina Monteiro e o Sr. Porisso pelo auxílio no trabalho de campo. Aos dois revisores anônimos pelas sugestões propostas.

Referências Bibliográficas

- ALVES, V.R. & ALE-ROCHA, R. 2006. Novos registros e espécies de Ropalomeridae (Insecta, Diptera) do Mato Grosso, Brasil. In XXI Congresso Brasileiro de Entomologia (R. Barros, coord.). Recife, ID:1045-2.
- ALDRICH, J. M. 1932. New Diptera, or two-winged flies from America, Asia, and Java, with additional notes. Proc. U. S. Natl. Mus. 81:1-28.
- LINDNER, E. 1930. Revision der amerikanischen Dipteren-Familie der Ropalomeridae. Dtsche. Entomol. Z. 2:122-137.
- MARQUES, A.P.C. & ALE-ROCHA, R. 2004. Revisão do gênero *Kroeberia* Lindner (Diptera, Ropalomeridae) da Região Neotropical. Rev. Bras. Entomol. 48:315-322.
- MARQUES, A.P.C. & ALE-ROCHA, R. 2005. Revisão do gênero *Willistoniella* Mik, 1985 (Díptera, Ropalomeridae) da Região Neotropical. Rev. Bras. Entomol. 49:210-227.
- PRADO, A. P. & PAPAVERO, N. 2002. Insecta - Diptera - Ropalomeridae. In: Fauna da Amazônia Brasileira (N. PAPAVERO, ed.). Belém, Museu Paraense Emílio Goeldi, v. 5, p. 1-3.
- RYDON, A. 1964. Notes on the use of butterfly traps in East Africa. Journal of the Lepidopterists' Society, 18:51-58.
- STEYSKAL, G.C. 1967. Family Ropalomeridae. In: A catalogue of the Diptera of the Americas South of the United States (N. Papavero ed.). São Paulo, Departamento de Zoologia, Secretaria da Agricultura, v. 60, p. 1-7.