



Biota Neotropica

ISSN: 1676-0611

cjoly@unicamp.br

Instituto Virtual da Biodiversidade

Brasil

Lopes, Sonia Maria; Khouri, Andréa

Espécies novas de Chromatonotus Hebard, 1920 da região da Amazônia (Blattellidae, Blattellinae)

Biota Neotropica, vol. 8, núm. 2, abril-junio, 2008, pp. 121-124

Instituto Virtual da Biodiversidade

Campinas, Brasil

Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199114296014>

- ▶ Como citar este artigo
- ▶ Número completo
- ▶ Mais artigos
- ▶ Home da revista no Redalyc

redalyc.org

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal  
Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

## Espécies novas de *Chromatonotus* Hebard, 1920 da região da Amazônia (Blattellidae, Blattellinae)

Sonia Maria Lopes<sup>1,2</sup> & Andréa Khouri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departamento de Entomologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro,  
Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, CEP 20940-040, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

<sup>2</sup>Autor para correspondencia: Sonia Maria Lopes, e-mail: sonialf@acd.ufrj.br

LOPES, S.M. & KHOURI, A. 2008. New species of *Chromatonotus* Hebard, 1920 from the Amazon region (Blattellidae, Blattellinae). *Biota Neotrop.* 8:(2): <http://www.biotaneotropica.org.br/v8n2/en/abstract?article+bn02308022008>.

**Abstract:** Two new species of *Chromatonotus* Hebard, 1920 from Mato Grosso State, Brazil, are described: *Chromatonotus chirostylatus* sp. nov and *Chromatonotus sinopensis* sp. nov. Illustrations of the shape and coloration, tergal modification in the abdomen, genital plates and the male genitalia are presented.

**Keywords:** description, new species, *Blattaria*, taxonomy, Amazon.

Lopes, S.M. & Khouri, A. 2008. Espécies novas de *Chromatonotus* Hebard, 1920 da região da Amazônia (Blattellidae, Blattellinae). *Biota Neotrop.* 8:(2): <http://www.biotaneotropica.org.br/v8n2/pt/abstract?article+bn02308022008>.

**Resumo:** Duas espécies novas de *Chromatonotus* Hebard, 1920 do estado de Mato Grosso, Brasil, são descritas: *Chromatonotus chirostylatus* sp. nov e *Chromatonotus sinopensis* sp. nov. Ilustrações sobre a forma e coloração, modificação tergal no abdome, placas genitais e peças da genitalia do macho são apresentadas.

**Palavras-chave:** descrição, nova espécie, *Blattaria*, taxonomia, Amazônia.

## Introdução

*Chromatonotus* foi descrito por Hebard (1920) que designou *C. lamprus*, coletado no Panamá, como espécie-tipo. O gênero apresenta, até o momento, onze espécies descritas que se distribuem desde a Guatemala até o Brasil na região amazônica brasileira. O gênero *Chromatonotus* caracteriza-se por apresentar tamanho pequeno, entre 9-15 mm e coloração castanha-amarelada. Na cabeça, o espaço interocular é amplo, pouco menor que o espaço entre as bases das antenas; ocelos são distintos e o vértice é pouco exposto. O pronoto tem a forma subtrapezoidal com as abas laterais arredondadas e defletidas. Em ambos os sexos as tégminas e asas membranosas são longas e ultrapassam o ápice dos cercos; essas com campo anal dobrado em leque e triângulo apical desenvolvido. As pernas são espinhosas. Na face ântero-ventral, no fêmur anterior, há de quatro a seis espinhos fortes, da base até a região mediana e uma série de pequenos espinhos até o ápice e três espinhos apicais robustos. Os pulvilos estão presentes em todos os artículos tarsais e as unhas são simétricas e simples com arólios presentes. No abdome há ausência de modificação tergal nos sétimo e oitavo segmentos (Hebard 1920).

Neste trabalho é apresentado um novo registro no Brasil para o gênero, no Estado do Mato Grosso, é assinalado mais um caráter morfológico para melhor identificação entre os demais gêneros e são descritas duas espécies novas de *Chromatonotus*: *C. chirostylatus* sp. nov. e *C. sinopensis* sp. nov.

## Material e Métodos


O material foi coletado no município de Sinop, ao longo da BR-163, que atravessa uma série de paisagens características do estado de Mato Grosso. O estado do Mato Grosso pode ser subdividido em duas bacias hidrográficas (Prata e Amazônica) com diferentes biomas, no caso Cerrado, Mata Amazônica e Pantanal. Porém, todo o norte desse estado está no domínio amazônico. Desde 1953, o município de Sinop pertence à região denominada Amazônia Legal, juntamente com os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, e parte do Maranhão (a oeste do meridiano de 44° WGr.). Tal região perfaz aproximadamente 5.217.423 km<sup>2</sup>, o que corresponde a cerca de 60% do território brasileiro (AmbienteBrasil 2000-2008).

Em laboratório, a observação das placas genitais foi feita através da retirada da parte final do abdome, utilizando-se as técnicas tradicionais de dissecção, descritas em Lopes & Oliveira (2000). Após análise, as placas e peças genitais foram guardadas em microtubos contendo glicerina, acondicionados junto ao exemplar respectivo, técnica desenvolvida por Gurney et al. (1964). A terminologia da genitália e a classificação taxonômica foram baseadas nos conceitos propostos por Roth (2003). Para identificação precisa, o material foi comparado com os exemplares de *Chromatonotus* da coleção de Blattaria do Museu Nacional (MNRJ) e com as descrições em literatura. Os exemplares descritos neste trabalho encontram-se depositados na coleção do Departamento de Entomologia do Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ).

## Resultados

### 1. *Chromatonotus chirostylatus* sp. nov.

Coloração geral: Castanha hialina e brilhante (Figura 1a); cabeça na base das antenas com pequenas manchas triangulares voltadas para a frente (Figura 2a), primeiros e segundos artículos dos palpos maxilares castanho-claros, quarto e quinto com tomento ruivo, o sexto com mancha triangular amarela, o sétimo com mancha triangular amarela e o oitavo com mancha triangular amarela.



**Figura 1.** Habitus. a) *Chromatonotus chirostylatus* sp. nov. Holótipo ♂ (13 mm); e b) *Chromatonotus sinopensis* sp. nov. Holotipo ♂ (10 mm).

**Figure 1.** Habitus. a. *Chromatonotus chirostylatus* sp. nov. Holotype ♂ (13 mm); and b) *Chromatonotus sinopensis* sp. nov. Holotype ♂ (10 mm).

escura na base com manchas delgadas e encurvadas, de mesma coloração em cada uma das regiões látero-apicais (Figura 2b).

Dimensões (mm): Holótipo ♂. Comprimento total 13; comprimento do pronoto 2; largura do pronoto 3,5; comprimento da tégmina 11; largura da tégmina 3.

**Abdome:** Primeiro tergito com dois conjuntos simétricos de cerdas próximos à região mediana. Placa supra-anal ciliada transversa, com bordo apical ciliado e levemente projetado com suave reentrância (Figura 2c). Cercos com 11 artículos. Placa subgenital assimétrica, ciliada no terço apical, alargada com invaginação acentuada médio-apicalmente onde se inserem os estilos, assimétricos, o esquerdo apicalmente em forma de uma mão e o direito simples e ciliado (Figura 2d). Genitália com esclerito mediano afilado (Figura 2g), falômero esquerdo em forma de gancho simples (Figura 2f); falômero direito em forma de "Y" invertido, com os braços desenvolvidos diferenciados e estrutura mediana laminar esclerotizada (Figura 2e).


Material examinado: Holótipo ♂. Brasil, Mato Grosso, Sinop, BR-163, km 500-600, 350 m, 12° 31' S and 55° 27' W, Alvarenga & Roppa cols., IX/1974; Parátipo ♂, dados de coleta, data e coletor iguais ao Holótipo (MNRJ).

Etimologia: Do grego "cheiros", significando mão, devendo-se à configuração do estílo esquerdo em forma de uma mão.

Comentário: A espécie é similar a *C. infuscatus* (Brunner, 1906) pelo posicionamento dos estílos na região médio-apical da placa subgenital, no entanto, diferindo dessa e das demais espécies do gênero pela configuração da referida placa e das estruturas genitais.


### 2. *Chromatonotus sinopensis* sp. nov.

Coloração geral: Castanho-clara e brilhante (Figura 1b); cabeça com manchas entre as antenas, na base dos olhos, no clípeo e na base da cabeça (Figura 2b), disposta de forma triangular.



**Figura 2.** *Chromatonotus chirostylatus* sp. nov. Holótipo ♂ a) cabeça; b) pronoto; c) placa supra-anal; d) placa subgenital; e) falômero direito; f) falômero esquerdo; g) esclerito mediano.

**Figure 2.** *Chromatonotus chirostylatus* sp. nov. Holotype ♂ a) head; b) pronotum; c) supra-anal plate; d) subgenital plate; e) right phallomere; f) left phallomere; g) median sclerite.



**Figura 3.** *Chromatonotus sinopensis* sp. nov. Holótipo ♂ a) cabeça; b) pronoto; c) placa supra-anal; d) placa subgenital; e) esclerito mediano; and f) falômero direito.

**Figure 3.** *Chromatonotus sinopensis* sp. nov. Holotype ♂ a) head; b) pronotum; c) supra-anal plate; d) subgenital plate; e) median sclerite; and f) right phallomere.

mancha castanho-escura semelhante a um "C" em cada lateral e uma faixa basal irregular de mesma coloração (Figura 3b); quarto e quinto artículos dos palpos maxilares tomentosos castanho-escuros.

Dimensões (mm): Holótipo ♂. Comprimento total 10; comprimento do pronoto 2,5; largura do pronoto 3; comprimento da téglmina 8,5; largura da téglmina 2.

Abdome: Primeiro tergito com dois conjuntos simétricos de cerdas, pouco visíveis, próximo à região mediana do segmento. Placa supra-anal modificada látero-apicalmente, fracamente transversa, margens livres, retas, arredondadas com emarginação mediana no bordo apical e leve reentrância mediana apical. Cercos curtos com cerca de oito a dez artículos ciliados e bem demarcados (Figura 3c). Placa subgenital levemente assimétrica ciliada na metade apical, estilos assimétricos e com uma proeminência entre eles, o direito um pouco mais visível que o esquerdo (Figura 3d). Genitália com esclerito mediano estiliforme e afiado apicalmente (Figura 3e). Falômero direito em forma de "X" invertido com o lado direito mais afiado (Figura 3f).

espinhos apicais e o outro um pouco menor e alargado e estrutura mediana laminar (Figura 3f).

Material examinado: Holótipo ♂. Brasil, Mato Grosso, Sinop, BR-163, km 500-600, 350 m, 12° 31' S and 55° 27' W, Alvarenga & Roppa cols., IX/1974 (MNRJ).

Etimologia: O nome da espécie refere-se à localidade onde foi coletado o holótipo.

Comentário: A espécie é similar à *C. lamprus* Hebard, 1920 pela configuração da placa subgenital e dos estilos, diferindo dela e das demais espécies de *Chromatonotus*, pela configuração, no macho, das placas supra-anal, subgenital e estruturas genitais.

## Discussão

As espécies de *Chromatonotus* assemelham-se externamente às de *Ischnoptera* Burmeister, 1838, contudo podem ser facilmente separadas pela ausência de modificação tergal, em forma de pente, nos fêmeas, e a ausência de cerdas no terceiro artigo da antena, na espécie tipo.

Lopes, S. M. &amp; Khouri, A.

semelhança citada anteriormente levou Rocha e Silva Albuquerque & Lopes (1977) a sinonimizar *C. petropolitanus* Rocha e Silva Albuquerque, 1971 e *C. inusitatus* Rocha e Silva Albuquerque, 1971, ambas as espécies do estado do Rio de Janeiro, à *I. inclusa* Rocha e Silva Albuquerque, 1968 e *I. inusitata*, respectivamente, restringindo a distribuição do gênero, no Brasil, às regiões norte e nordeste.

É assinalado em *Chromatonotus*, pela primeira vez, o caráter da modificação tergal evidenciada, um conjunto de cerdas simétricas no primeiro segmento abdominal que pode estar pouco nítido. Tal modificação vem corroborar o estudo desses dois gêneros.

### Agradecimentos

À Faperj projeto E-26/171-281/2006, Rede de Insetos - Diversidade biológica da Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro pelo apoio técnico para digitalização.

### Referências Bibliográficas

AMBIENTEBRASIL S/S LTDA. 2000-2008. Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal <http://www.ambientebrasil.com.br/composer>.

php3?base=../gestao/index.html&conteudo=../gestao/artigos/amazonia.html (acessado em 20/05/2008).

GURNEY, A.B., KRAMER, J. P. & STEYSKAL, G.C. 1964. Some techniques for the preparation, study and storage in microvials of insect genitalia. Ann. Entomol. Soc. Am. 57(2): 240-242.

EBARD, M. 1920. The Blattidae of Panamá. Mem. Am. Entomol. Soc. 4: 1-148.

LOPES, S.M. & OLIVEIRA, E.H. 2000. Espécie nova de Eublaberus Hebard, 1919 do Estado de Goiás, Brasil e notas sobre *E. marajoara* Rocha e Silva-Albuquerque, 1972 (Blaberidae, Blaberinae). Bol. Mus. Nac. N.S. Zool. 433: 1-5.

ROCHA E SILVA ALBUQUERQUE, I. & LOPES, S.M. 1977. Blattaria (Dictyoptera) do Alto da Mosela, Petrópolis, RJ. Rev. Bras. Biol. 37(3): 499-520.

ROTH, L. M. 2003. Systematics and phylogeny of cockroaches (Dictyoptera: Blattaria). Orient. Insects 37: 1-186.

Recebido em 20/11/07

Versão Reformulada recebida 22/05/08

Publicado em 13/06/08