



Revista Brasileira de Enfermagem

ISSN: 0034-7167

reben@abennacional.org.br

Associação Brasileira de Enfermagem

Brasil

Batista Mascarenhas, Nildo; Pereira, Álvaro; Souza da Silva, Rudval; Gomes da Silva, Mary  
Sistematização da Assistência de Enfermagem ao portador de Diabetes Mellitus e Insuficiência Renal  
Crônica

Revista Brasileira de Enfermagem, vol. 64, núm. 1, enero-febrero, 2011, pp. 203-208

Associação Brasileira de Enfermagem  
Brasília, Brasil

Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=267019462031>

- Como citar este artigo
- Número completo
- Mais artigos
- Home da revista no Redalyc

redalyc.org

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal  
Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

## Sistematização da Assistência de Enfermagem ao portador de Diabetes Mellitus e Insuficiência Renal Crônica

*Systematization of Nursing Assistance to patients with Diabetes Mellitus and Chronic Renal Insufficiency*  
*Sistematización de la Asistencia de Enfermería al portador de Diabetes Mellitus y Insuficiencia Renal Crónica*

**Nildo Batista Mascarenhas, Álvaro Pereira, Rudval Souza da Silva, Mary Gomes da Silva<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem. Salvador, BA

**Submissão:** 11/01/2009

**Aprovação:** 26/09/2010

### RESUMO

Tratou-se de um estudo de caso clínico desenvolvido durante as atividades práticas da disciplina Enfermagem Clínico-Cirúrgica I, do curso de Graduação em Enfermagem de uma universidade pública do Estado da Bahia, que objetivou relatar a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem na assistência a um paciente portador de Diabetes Mellitus e Insuficiência Renal Crônica. Com o desenvolvimento do estudo, em especial após a melhora positiva da paciente face às condutas planejadas e implementadas e, considerando as reflexões que emergiram, foi possível constatar a necessidade da interface entre a Sistematização da Assistência de Enfermagem, equipe de enfermagem e paciente no processo do cuidar, frente à excelência e singularidade dos cuidados de enfermagem.

**Descriptores:** Diabetes mellitus; Insuficiência renal; Processos de enfermagem; Cuidados de enfermagem.

### ABSTRACT

This is a clinical case study developed during the practical activities of the discipline Surgical Clinical Nursing I, of course of Graduation in Nursing of a public university of Bahia State, that aimed to report the application of the Systematization of Nursing Assistance in the assistance to a client with Diabetes Mellitus and Chronic Renal Insufficiency. With the development of the study, especially after the positive improvement of the client, face to assistance planned and implemented and considering the reflections that emerged, it was possible to evidence the need for interface between Systematization of Nursing Assistance, the nursing staff and client in the care process, at the excellence and uniqueness of nursing care.

**Key words:** Diabetes mellitus; Renal insufficiency; Nursing process; Nursing care.

### RESUMEN

Este es un estudio de caso desarrollado durante las actividades prácticas de la disciplina de Enfermería Clínica Quirúrgica I, del curso de Grado en Enfermería en una universidad pública del Estado de Bahía, que tuvo por objetivo relatar la aplicación de la Sistematización de la Asistencia de Enfermería (SAE) en asistencia a un paciente con Diabetes Mellitus y la Insuficiencia Renal Crónica. Con el desarrollo del estudio, sobre todo después de la mejora positiva del paciente, se enfrentan para llevar a cabo y planifiquen y ejecuten teniendo en cuenta las ideas que surgieron, es posible ver la necesidad de interfaz entre la Sistematización de la Asistencia de Enfermería y el personal de enfermería y el paciente en el proceso de atención, en la excelencia y la singularidad de los cuidados de enfermería.

**Descriptores:** Diabetes mellitus, Insuficiencia renal; Procesos de enfermería; Atención de enfermería.

## INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus (DM) é um grupo de doenças metabólicas caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue (hiperglicemia), decorrentes de defeitos na secreção e/ou na ação da insulina. A insulina, hormônio produzido pelo pâncreas, tem o papel de controlar o nível de glicose no sangue, ajustando a produção e armazenamento de glicose<sup>(1)</sup>. A prevalência mundial do DM apresentou um aumento significante nas últimas duas décadas e, como consequência, o aumento no número de indivíduos diabéticos, devido a fatores como: envelhecimento populacional, níveis crescentes de obesidade e sedentarismo<sup>(2)</sup>.

Existem tipos distintos de diabetes, causados por uma complexa interação de fatores genéticos, ambientais e de estilo de vida. Neste contexto, "a desregulação metabólica associada ao diabetes pode gerar alterações fisiopatológicas secundárias em múltiplos sistemas orgânicos, impondo um enorme 'fardo' sobre o indivíduo com diabetes e o sistema de saúde"<sup>(3)</sup>.

Em pessoas portadoras deste distúrbio, por um período de tempo consideravelmente longo - em média dez anos, o DM pode causar inúmeras doenças crônicas como a insuficiência renal crônica, uma enfermidade que se caracteriza por lesão renal e perda progressiva e irreversível da função dos rins. Em sua fase mais avançada ela é denominada de Insuficiência Renal Crônica (IRC), visto que os rins não conseguem manter a homeostase do indivíduo<sup>(4)</sup>.

Considerando que o DM e a IRC são importantes problemas de saúde pública, o enfermeiro ao prestar cuidados à pessoas portadoras destas afecções, tanto na atenção básica quanto no âmbito hospitalar, vê-se frente a um grande desafio – sistematizar o cuidado. Assim sendo, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), neste contexto, emerge como instrumento essencial que pode subsidiar e/ou guiar a assistência de enfermagem, com foco na integralidade das dimensões do ser cuidado e garantindo ao enfermeiro, autonomia e segurança, além de atendimento humanizado e individual. Sendo assim, este estudo objetiva relatar a aplicação da SAE no cuidado a um paciente portador de DM e IRC.

O DM não representa uma única patologia, mas um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em comum a hiperglicemia<sup>(2)</sup>. Os fatores que contribuem para a hiperglicemia dependem da etiologia do DM e incluem redução da secreção de insulina, diminuição da utilização e/ou aumento da produção de glicose<sup>(1)</sup>. Desta forma, pode-se inferir que o diabetes é classificado segundo o processo patogênico que acarreta a hiperglicemia<sup>(3)</sup> e as duas categorias gerais de classificação do diabetes são designadas como tipos 1 e 2.

O DM tipo 1 (DM1), forma presente em 5-10% dos casos, caracteriza-se pela destruição das células beta pancreáticas com a consequente deficiência relativa ou absoluta de insulina. Na maior parte dos casos, a destruição destas células é mediada por autoimunidade, existindo, porém, casos em que não há evidências de processo autoimune, sendo referida, portanto, como forma idiopática do DM1. Além dos fatores imunológicos, os fatores ambientais (como vírus e toxinas) e genéticos, têm sido considerados como desencadeadores do DM 1<sup>(2)</sup>.

O DM tipo 2 (DM2), forma presente em 90-95% dos casos diagnosticados, caracteriza-se por defeitos na ação da insulina

(resistência à insulina) e na sua secreção. A maior parte das pessoas com essa forma de diabetes apresenta sobrepeso ou obesidade. O DM2 geralmente é diagnosticado após os 40 anos, porém pode ocorrer em qualquer idade<sup>(2)</sup>.

As manifestações clínicas mais frequentes e comuns a ambos são: poliúria, polidipisia, polifagia, fadiga, irritabilidade, feridas cutâneas que demoram de cicatrizar, turvação visual, formigamento nas mãos e nos pés e alterações visuais súbitas.

Com relação ao tratamento deste distúrbio, pode-se dizer que a sua meta principal consiste em normalizar a atividade da insulina e os níveis sanguíneos de glicose, a fim de prevenir o desenvolvimento de complicações cardiovasculares e neuropáticas e os cinco componentes essenciais da terapêutica são: tratamento nutricional, exercícios físicos, monitorização, terapia farmacológica e educação<sup>(1)</sup>.

O enfermeiro tem papel essencial na prestação de cuidados a indivíduos com DM, principalmente por desenvolver atividades educativas, com o objetivo de aumentar o nível de conhecimento dos pacientes e comunidade, além de contribuir para a adesão destes ao tratamento. Assim, o enfermeiro, estando mais próximo e capacitado para o desenvolvimento das atividades educativas efetivas, muito poderá fazer para o controle desta doença e para a promoção da saúde deste grupo<sup>(5)</sup>. Nesta perspectiva, é correto inferir que as ações educativas, desenvolvidas juntamente com o paciente, família e comunidade, têm um papel fundamental no controle dessa enfermidade, já que as complicações oriundas do diabetes estão diretamente relacionadas ao conhecimento para o autocuidado diário e ao estilo de vida saudável<sup>(6)</sup>.

Para os pacientes diagnosticados com o DM1 o uso regular da insulina, associado a exercícios físicos e uma dieta adequada, equilibrada e rigorosa, torna-se essencial para o controle da glicemia, já aqueles recém diagnosticados com o DM2, em geral, adota-se inicialmente a prática regular de exercícios físicos, redução de peso (para pacientes obesos) e uma reeducação alimentar. Caso essas medidas não obtenham êxito, o uso de hipoglicemiantes orais é indicado e a insulinoterapia é iniciada quando os tratamentos anteriores não produzem resultados satisfatórios e o controle da glicemia não é efetivo. Além dessas medidas, nos casos de pacientes com obesidade, a cirurgia bariátrica tem sido discutida como alternativa futura de solução para o DM2.

Com base no exposto, pode-se afirmar que o diagnóstico tardio do diabetes mellitus pode acarretar consequências agudas e crônicas, devido à exposição do indivíduo à hiperglicemia por um longo período de tempo (cerca de 10 a 15 anos).

Dentre as complicações agudas, destacamos a cetoacidose diabética. Esta é uma complicação típica do DM1, causada por uma quantidade inadequada de insulina, constituindo-se em uma afecção grave em que a hiperglicemia e a hipertermia predominam, com alterações no sensório (sensação de consciência), ocorrendo frequentemente em pessoas idosas. Esse déficit de insulina resulta em distúrbios no metabolismo dos carboidratos, proteínas e lipídios. Os três principais aspectos clínicos nesta complicação são a hiperglicemia, desidratação com perda de eletrólitos e acidose metabólica<sup>(1)</sup>.

As complicações crônicas do DM estão se tornando cada vez mais comuns e evidentes na medida em que, cada vez mais as pessoas desenvolvem este distúrbio. No mundo, a estimativa de

óbitos atribuída ao DM encontra-se em torno de 800 mil. Contudo, salienta-se que esse número é consideravelmente subestimado, pois frequentemente, na declaração de óbito, não é mencionado o DM como causa da morte e sim as suas complicações, particularmente as cardiocerebrovasculares<sup>(2)</sup>.

Dentre as complicações crônicas do DM, vale destacar a nefropatia, atualmente considerada como a principal causa de IRC<sup>(7)</sup>, condição esta tida como irreversível. A IRC é uma síndrome clínica causada pela perda progressiva e irreversível das funções renais, resultando em uremia<sup>(8)</sup>, cujo tratamento é bastante invasivo e incômodo.

A IRC é uma doença com vários efeitos na vida do pacientes e de difícil tratamento, com sérias implicações físicas, psicológicas e sócioeconômicas, não apenas para o indivíduo, mas também para a família e a comunidade<sup>(9)</sup>. Além disso, a IRC é uma enfermidade que altera o cotidiano do indivíduo que a vivencia, sendo caracterizada também como um problema social, que interfere no papel que esse indivíduo desempenha na sociedade. Então, estabelece-se um longo processo de adaptação a essa nova condição, no qual o indivíduo precisa identificar meios para lidar com o problema renal e com todas as mudanças e limitações que o acompanham<sup>(10)</sup>.

Mediante estes fatos, podemos inferir que o estresse da doença renal afeta a autoestima, as relações familiares e conjugais, além de quase todos os aspectos da vida diária do indivíduo acometido por esta complicação crônica consequência do diabetes mellitus. À medida que a função renal diminui e o paciente evolui para a IRC, ele apresenta em geral falência de múltiplos órgãos levando a sequelas como, por exemplo, deficiência da acuidade visual, impotência e insuficiência cardíaca<sup>(1)</sup>.

Sendo assim, é necessário e fundamental julgar as respostas dessa clientela aos cuidados de enfermagem. O enfermeiro tem um papel essencial no cuidado aos indivíduos portadores de IRC e DM, principalmente no que tange ao estímulo ao autocuidado à saúde, de modo a facilitar a cooperação e adesão do paciente ao tratamento, além de estimulá-lo a enfrentar as mudanças cotidianas e a alcançar o seu bem-estar<sup>(11)</sup>. Esta situação nos reporta a Sistematização da Assistência de Enfermagem, a qual contribui para a organização do trabalho do enfermeiro e para um melhor relacionamento deste com o paciente, proporcionando assim melhor norteador do cuidado prestado pelo enfermeiro a essa clientela<sup>(9)</sup>.

A consulta de enfermagem representa o primeiro momento para a aplicação da SAE, sendo uma atividade privativa do enfermeiro, que através de um método e estratégia de trabalho científico, realiza a identificação das situações de saúde/doença, subsidiando a prescrição e implementação das ações de Enfermagem. Dessa forma, vem contribuir para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade<sup>(12)</sup>. Neste contexto, a SAE fornece um método organizado e sistemático para uma análise do estado de saúde do indivíduo, identificando suas necessidades e padrões de resposta aos problemas, possibilitando a determinação de soluções apropriadas no atendimento dessas necessidades<sup>(13)</sup>.

Ressalta-se que na aplicação da SAE se faz necessário entender o paciente como uma pessoa que age, reage e interage diferentemente, à medida que sua situação particular de vida muda, ao longo do ciclo vital. Ao interagir com seres humanos, nenhuma ação instrumental, por mais aperfeiçoada que seja, pode estar desvinculada dos aspectos humanísticos e de suas necessidades

espirituais que lhes são intrínsecas<sup>(14)</sup>.

Diante do exposto, é possível depreender que o papel da enfermagem na assistência ao paciente portador de DM e IRC é essencial, principalmente através de um cuidado de enfermagem sistematizado e coerente, com enfoque no ser humano e na sua família, de modo a tornar menos estressante e doloroso o tratamento desta complicação secundária a este distúrbio plurimetabólico denominado diabetes mellitus.

## METODOLOGIA

Tratou-se de um estudo de caso clínico, que se constitui em uma modalidade de pesquisa bastante utilizada nas ciências biomédicas e sociais, comumente realizado no intuito de se reconhecer situações específicas. O objetivo do estudo clínico é contribuir para a compreensão de determinadas situações e a consequente aplicação de condutas compatíveis, vindo a constituir-se de um importante instrumento de investigação das questões enfrentadas por profissionais em sua prática<sup>(15)</sup>.

O presente estudo foi realizado em maio de 2008, em uma unidade de internação de Clínica Médica de um hospital público da cidade de Salvador, BA, durante as atividades práticas da disciplina Enfermagem Clínico-Cirúrgica I. O sujeito escolhido para o estudo foi uma idosa de 81 anos, portadora de DM e IRC que foi acompanhada durante o período de admissão até sua alta hospitalar.

A paciente aceitou participar espontaneamente do estudo, tendo assinado o termo de autorização no ato da internação, orientada sobre a realização do mesmo e sobre a confidencialidade das informações, conforme o preconizado pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que se refere aos aspectos éticos para pesquisas que envolvem seres humanos.

Para a coleta dos dados foi utilizado um impresso do histórico de enfermagem composto de anamnese e exame físico, baseado na Teoria das Necessidades Humanas Básicas proposta por Wanda Horta, utilizado durante as atividades práticas da disciplina onde se desenvolveu esse estudo. Este histórico estava dividido em duas partes: a primeira, composta por dados sobre as principais características sócio-demográficas da paciente e a segunda por questões semi-estruturadas sobre as necessidades humanas básicas.

A aplicação do histórico de enfermagem possibilitou o levantamento de informações de ordem subjetiva e individual sobre os aspectos socioculturais e das necessidades humanas básicas da paciente. O exame físico possibilitou complementar a coleta de dados, fornecendo deste modo, os dados objetivos que subsidiaram a definição dos problemas, estabelecimentos dos diagnósticos, das intervenções e evolução de enfermagem.

Após a análise dos dados coletados, levantaram-se os problemas de enfermagem que subsidiaram a definição dos Diagnósticos de Enfermagem, segundo a Taxonomia II da *North American Nursing Diagnosis Association (NANDA)*<sup>(16)</sup>. Posteriormente, planejaram-se as intervenções de acordo com os problemas identificados na paciente em estudo, centrando nossa atenção na integralidade da assistência durante o processo do cuidar e dos cuidados de enfermagem. A utilização de um modelo de coleta voltado para os grandes domínios e classes do referencial da NANDA poderia ter facilitado o trabalho de definição dos diagnósticos, o que se constituiu numa das limitações do estudo, considerando a utilização

do formulário padrão do Hospital, o qual não esta adequado a estrutura de domínios e classes da Taxonomia II da NANDA.

## RESULTADOS E DISCUSSÃO

### Apresentação do Caso

I.R.G, 81 anos, sexo feminino, negra, brasileira, natural de Salvador, BA, viúva, aposentada, primeiro grau incompleto, recorreu ao hospital por conta de dor intensa em flanco esquerdo à esclarecer. DM 2, hipertensa, dislipidêmica, portadora de IRC. Mobilidade no leito prejudicada por conta de dor em flanco esquerdo, vigil, padrões de sono e repouso alterados, com queixa de nictúria e da rotina da unidade. Ao exame apresentou couro cabeludo íntegro, mucosas oculares normocrônicas, escleróticas anictéricas, acuidade visual e auditiva diminuídas, narinas sem lesões. Tórax simétrico, murmurio vesicular fisiológico em ambos hemitórax; bulhas normofonéticas em 2 tempos; abdome distendido, doloroso à palpação, principalmente no flanco esquerdo; RHA presentes; extremidades perfundidas e sem edemas. Definiu-se como uma pessoa tranquila e “sem grandes preocupações com a sua doença”. Descobriu que era diabética há 26 anos após a realização de uma cirurgia de hérnia. Sua última hospitalização foi no dia 23/06/07, para a realização de uma cirurgia de catarata, a qual ocorreu sem intercorrências. Apresentou bom conhecimento acerca do diabetes e dos mecanismos de controle da mesma. Consulta-se com o nefrologista a cada dois meses. Não pratica atividades físicas. Conforme a prescrição médica, estava em uso das seguintes medicações: insulina NPH SC pela manhã; AAS 100 mg após o almoço; Atensina 0,150 pele a manhã e pela noite; Sinvastatina 20mg à noite, Carbonato de Cálcio pela manhã e 1 ampola de furosemida EV pela manhã e soroterapia em acesso periférico no MSD. Negou tabagismo, alcoolismo e alergias. Apetite e paladar preservados, deglutição e mastigação realizada à custa de prótese dentária total. Diurese presente com relato de poliúria assim como evacuações ausentes há  $\pm$  4 dias. Referiu ainda não ingerir muito líquido ao dia “para evitar ficar urinando toda hora”. Cansaço ao vestir-se, e enjoô ao andar por conta da labirinite, o que a deixou restrita quanto à deambulação, permanecendo por muito tempo deitada no leito. Segundo a filha que a acompanhava no momento da realização do histórico de enfermagem, a paciente alimenta-se fora do horário e por conta disso ficava sem apetite e sem almoçar. Além disso, a filha relatou também que a paciente passava a maior parte do tempo deitada no sofá de sua casa e tinha “preguiça” de deambular e praticar atividades físicas. Dados vitais e antropométricos: PA: 150x80 mmHg; FC: 80 bpm; FR: 16 inc/min; T: 36,5° C; Peso: 65,7 kg; Altura: 1,59m; IMC: 25,99.

### Problemas identificados e Diagnósticos de Enfermagem tendo por base a Taxonomia II da NANDA

A partir do levantamento de problemas e demandas de cuidados, identificamos e estabelecemos nove Diagnósticos de Enfermagem relacionados às dimensões biopsicossociais da paciente. A seguir (Apêndice 1) descrevemos os problemas identificados e os respectivos Diagnósticos de Enfermagem.

### Planejamento da Assistência de Enfermagem

Com base nos problemas identificados e na formulação dos

diagnósticos apropriados à situação da paciente, fez-se necessário planejar uma assistência de enfermagem adequada à sua individualidade, de modo a garantir que não somente a situação clínica seja superestimada, mas que os aspectos biopsicossociais assumam posição privilegiada nas intervenções de enfermagem implementadas. Deste modo, propomos (Apêndice 2) as seguintes intervenções, com as suas respectivas justificativas:

Após o planejamento e implementação das condutas apresentadas na prescrição de enfermagem é possível afirmar que as respostas da paciente face às intervenções adotadas foram positivas. Na primeira semana, percebeu-se uma evolução pouco significativa do seu quadro clínico, considerando-se que ainda queixava-se de dor intensa em flanco esquerdo e constipação.

Na segunda semana, a evolução da paciente foi um pouco mais significativa, porém a dor e constipação persistiram apesar de menos intensas e a mobilidade física ainda continuava reduzida. Com isso, optou-se por aumentar os estímulos à deambulação, auxiliando a mesma a sentar-se no leito e em seguida deambular por 15 minutos, pelo menos duas vezes ao dia, de modo compatível com as suas limitações.

Na terceira semana, observou-se que a paciente evoluiu com uma resposta positiva e a dor, apesar de ainda não ter sido completamente eliminada, houve uma redução significativa. A deambulação, bastante estimulada na semana anterior, tornou-se mais constante, superando o diagnóstico de mobilidade física reduzida, identificado no início da hospitalização. Não se registraram episódios de hipoglicemias e as evacuações tornaram-se mais frequentes.

Vale ressaltar que apesar da evolução satisfatória da paciente, observada diariamente pelos autores deste estudo, e da eficácia das intervenções implementadas, era notório que a equipe de enfermagem da unidade não considerava devidamente o que havia sido planejado para a paciente. A ênfase nos procedimentos técnicos e na prescrição médica impossibilitou que as condutas planejadas fossem por completo adotadas. Prova disso, foi que a inspeção diária da pele, a hidratação da mesma e o auxílio e estímulo à deambulação não foram observados e/ou efetivados por outros membros da equipe de enfermagem da clínica onde esse estudo foi desenvolvido. A cooperação da equipe, apesar de fundamental, não foi suficiente para que a paciente tivesse um resultado ainda mais satisfatório, como era esperado pelos autores durante a formulação das prescrições de enfermagem.

Apesar dos problemas identificados na implementação total da prescrição de enfermagem, obteve-se êxito na assistência prestada à paciente, em especial na redução da constipação, na melhora da mobilidade física e no seu estado geral.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final dessa experiência pudemos perceber que a paciente hospitalizada, portadora de diabetes mellitus e de insuficiência renal crônica, necessitou de condutas eficazes que visaram não somente o controle dos desequilíbrios na dimensão fisiopatológica, mas também com enfoque nos aspectos psicossocioespírituais. A SAE, considerada como um método científico orienta a prática do enfermeiro e de toda sua equipe, sendo de extrema importância para que o cuidado profissional de enfermagem prestado ao paciente hospitalizado seja eficiente e individualizado, de modo a garantir a integralidade e a qualidade da assistência.

Com isso, a realização do histórico de enfermagem que priorizou a totalidade da atenção ao paciente, possibilitando a identificação dos problemas, formulação de diagnósticos de enfermagem precisos, o planejamento adequado e avaliação diária das intervenções realizadas, foi essencial para a recuperação e reabilitação do sujeito do estudo.

As respostas da paciente face às condutas implementadas e conforme o planejado foram positivas, corroborando a eficiência da assistência prestada e o alcance dos objetivos propostos. Porém, evidenciaram-se como necessárias, durante a realização do estudo, uma maior integração da equipe de Enfermagem e a superação do tecnicismo vinculado ao modelo biomédico reducionista, que acaba afastando a enfermagem da essência de sua prática: o cuidado.

A implementação da SAE exige da profissão uma integração efetiva com a equipe multidisciplinar, ao considerá-la um instrumento

essencial ao bom desenvolvimento das ações do enfermeiro e, principalmente, na adoção de ações individualizadas e humanizadas. Como alternativas para promover a adoção efetiva da SAE, propomos uma maior aproximação da equipe de enfermagem com a SAE, através do conhecimento e o fomento a discussões sobre sua implementação; superação do tecnicismo que ainda é hegemonic na assistência que a enfermagem presta aos indivíduos e, por fim a integração e prática do cuidado humanizado e sistematizado por toda a equipe multidisciplinar.

Esperamos com este relato fomentar a pesquisa e o debate acerca da temática e demonstre a importância da SAE para a prática profissional do enfermeiro e de toda a equipe de saúde, em especial para os pacientes que apresentam enfermidades como a IRC e DM, muito incidentes nas unidades de internação dos serviços públicos, e que exigem da enfermagem condutas rigorosas e efetivas.

## REFERÊNCIAS

1. Smeltzer SC, Bare BG. Brunner & Suddarth. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 10<sup>a</sup> ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005.
2. Sociedade Brasileira de Diabetes. Tratamento e Acompanhamento do Diabetes Mellitus- Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Rio de Janeiro: Diaphragm Editora; 2007.
3. Powers AC. Diabetes Melito. In: Harrison TR. Medicina Interna. 16<sup>a</sup> ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill; 2006.
4. Romão Júnior JE. Doença renal crônica: definição, epidemiologia e classificação. *J Bras Nefrol* [periódico online] 2004 Ago [citado em: 02 mai 2009]; 26(3). Disponível em: <http://www.jbn.org.br/26-3/v26e3s1p001.pdf>
5. Tavares DMS, Rodrigues RAP. Educação conscientizadora do idoso diabético: uma proposta de intervenção do enfermeiro. *Rev Esc Enferm USP* 2002; 36(1): 88-96.
6. Faeda A, Leon CGRMP. Assistência de enfermagem a um paciente portador de Diabetes Mellitus. *Rev Bras Enferm* 2006; 59(6): 818-21.
7. Lenhardt MH, Hammerschmidt KSA, Borghi ACS, Vaccari E, Seima MD. O idoso portador de nefropatia diabética e o cuidado de si. *Texto Contexto Enferm* 2008; 17(2): 313-20.
8. Cendoroglo M, Sardenberg C, Suassuna P. Insuficiência renal crônica: etiologia, diagnóstico e tratamento. In: Schor N, Srougi M. Nefrologia, urologia clínica. São Paulo: Sarvier; 1998. p. 29-41.
9. Lata AGB, Albuquerque JG, Carvalho LASBP, Lira ALBC. Nursing diagnosis in adults on hemodialysis. *Acta Paul Enferm* 2008; 21(supl): 160-3.
10. Reis CK, Guirardello EB, Campos CJGL. O indivíduo renal crônico e as demandas de atenção. *Rev Bras Enferm* 2008; 61(3): 336-41.
11. Pacheco GS, Santos I, Bregman R. Características de clientes com doença renal crônica: evidências para o ensino do autocuidado. *Rev enferm UERJ* 2006; 14(3): 434-9.
12. Conselho Federal de Enfermagem (BR). Resolução nº 358/2009. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. [citado em: 25 nov 2009]. Rio de Janeiro; 2009. Disponível em: <http://www.portalcofen.com.br>
13. Sampaio LABN, Pellizzetti N. Método Científico - Instrumento Básico da Enfermeira. In: Cianciarullo TI, organizadora. Instrumentos Básicos para o Cuidar - um desafio para a qualidade de assistência. São Paulo (SP): Atheneu; 2007. p. 25-38
14. Silva RS, Santos MHER. Sistematização da Assistência de Enfermagem como uma estratégia para a autonomia do enfermeiro. *Nursing* 2009; 36(12): 435-42.
15. Gil AC. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4<sup>a</sup> ed. São Paulo (SP): Atlas; 2006.
16. North American Nursing Diagnosis Association. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: definições e classificação 2007-2008. Porto Alegre: Artmed; 2007.

Problemas identificados	Diagnósticos de enfermagem	Fatores relacionados	Características definidoras
Sono e repouso alterados	Padrão de sono perturbado	Despertar frequente durante a noite, secundário à nictúria	Dificuldade para adormecer e sonolência matinal
Enjôo ao deambular	Náusea	Irritação gástrica secundária à labirintite	Relato de náusea e mal estar no estômago
Poliúria e nictúria	Eliminação urinária prejudicada	Diminuição da capacidade da bexiga secundária à glicosúria	Queixa de poliúria e nictúria
Perda excessiva de líquidos	Risco de volume de líquidos deficiente	Perdas excessivas por vias normais relacionado ao uso de medicações (diuréticos)	
Ausências de evacuações há ± 4 dias	Constipação	Atividade física insuficiente, hábitos de evacuações irregulares, terapia farmacológica (carbonato de cálcio e diuréticos), hábitos alimentares deficientes, motilidade do trato gastrintestinal diminuída	Abdome distendido, dor abdominal, esforço para evacuar, frequência diminuída, fezes duras e secas, ruídos intestinais hipovoláticos
Dor no flanco esquerdo	Dor crônica	Capacidade física crônica	Relato verbal de dor
Cansaço	Intolerância à atividade	Aumento das demandas metabólicas, secundário ao DM e inatividade secundária a estilo de vida sedentário	Relato verbal de astenia muscular e desconforto aos esforços
Mobilidade no leito	Risco para mobilidade física prejudicada	Dor e intolerância à atividade, dor, desconforto, estilo de vida sedentário, medicamentos	
Permanece muito tempo deitada no leito e “preguiça” de deambular e praticar atividades físicas	Estilo de vida sedentário	Conhecimento inadequados dos benefícios da atividade física à saúde, falta de interesse, falta de motivação	Escolha de uma vida diária sem exercícios físicos, verbaliza preferência por atividades com pouco exercício físico

**Apêndice 1. Problemas identificados a partir dos achados do Histórico de Enfermagem e os Diagnósticos de Enfermagem levantados.**

Prescrições propostas	Justificativas
Monitorar o horário das refeições	Para o paciente diabético e em uso de hipoglicemiantes orais e/ou insulina, uma refeição adequada e no horário correto, minimiza os riscos de se desenvolver uma hipoglicemia. A fim de evitar que haja o desenvolvimento de uma hipoglicemia, por alimentação inadequada e horários irregulares, foi necessário monitorar e certificar-se que a paciente estava se alimentando no horário previsto e adequadamente
Estimular a ingestão hídrica adequada	Conforme exposto no histórico de enfermagem, a paciente não ingeria muito líquido durante o dia, o que é tido como um fator de risco considerando as necessidades diárias de ingestão hídrica, além do uso de diuréticos. Caso a ingestão de líquidos continuasse menor do que a eliminação, poder-se-ia desenvolver um desequilíbrio hidroeletrolítico, com a consequente desidratação e piora do seu quadro clínico
Monitorar as eliminações urinárias e intestinais diariamente	Esta intervenção visou avaliar a resposta da paciente face à terapêutica adotada
Inspecionar diariamente a integridade da pele	Por ser a paciente diabética e com mobilidade no leito e física prejudicada, a probabilidade de se desenvolverem úlceras, a partir de pequenos ferimentos, é aumentada e esta conduta teve por objetivo minimizar estes riscos
Estimular a hidratação da pele, principalmente nas extremidades dos membros inferiores	Conforme evidenciado no exame físico, a pele da paciente encontrava-se desidratada, o que facilita o aparecimento de lesões na pele e com isso, a hidratação da pele, através do uso de óleos e hidratantes, visa minimizar estes riscos
Orientar quanto aos benefícios da realização de atividades físicas diárias	Devido ao seu estilo de vida notadamente sedentário, fez-se necessário informá-la quanto aos benefícios dos exercícios físicos, até mesmo para amenizar a sua constipação
Estimular a deambulação por 15 minutos	deambulação auxilia a motilidade gastrintestinal, principalmente na liberação de flatus, além de ser um importante meio para reduzir prejuízos na mobilidade física do indivíduo hospitalizado
Auxiliar na deambulação	Por ser uma paciente idosa, sem vontade expressa de deambular e da certa dificuldade para realização desta atividade, foi importante auxiliar a mesma a deambular
Monitorar a glicemia capilar sanguínea	O paciente diabético necessita de um controle glicêmico rigoroso, a fim de monitorar e tomar as medidas cabíveis em caso de hiper ou hipoglicemia. Desta forma, esta conduta foi essencial para a paciente, pelo fato da mesma utilizar insulina para obter um controle glicêmico
Monitorar os sinais vitais, principalmente a pressão arterial e o pulso	A monitorização frequente e rigorosa da pressão arterial são de fundamental importância, pois conforme identificado durante a realização do histórico de enfermagem, a paciente é portadora de hipertensão arterial sistêmica (HAS). A HAS, juntamente com a dislipidemia, também apresentada pela mesma, é fator de risco muito importantes, o que aumenta a propensão para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como o IAM, e de doença cerebrovascular, como o AVE

**Apêndice 2. Prescrições propostas com as respectivas justificativas.**