



Mercator - Revista de Geografia da UFC
E-ISSN: 1984-2201
edantas@ufc.br
Universidade Federal do Ceará
Brasil

Bergoeing, Jean Pierre
TECTÓNICA DE PLACAS Y VULCANISMO EN EL ÁREA DE DEL GRAN RIFT
Mercator - Revista de Geografia da UFC, vol. 11, núm. 26, septiembre-diciembre, 2012, pp. 183-216
Universidade Federal do Ceará
Fortaleza, Brasil

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273625981009>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

TECTÓNICA DE PLACAS Y VULCANISMO EN EL ÁREA DE DEL GRAN RIFT

plate tectonics and volcanism in the Great Rift zone

Jean Pierre Bergoeing*

Resumen

El autor, a través de documentos científicos diversos, imágenes satelitales y algunas fotos ilustra el vulcanismo de uno de los sectores tectónicos más activos del planeta, dando una explicación de este sector particular del África oriental.

Palavras-chave: Acreción, Placas tectónicas, dorsales, basaltos, traquitas.



Abstraer

The author, across various scientific documents, satellite images and some photos illustrates the volcanism of one of the most active tectonic sectors of the planet, giving an explanation of this specific area of Eastern Africa.

Keywords: Accrénan, Plaques tectomiques, dorsales, basaltes, trachytes.



Résumé

L'auteur à travers divers documents scientifiques, messages satellitaires et quelques photos, illustre le volcanisme d'une des régions les plus actives de la planète, donnant une explication de ce secteur particulier de l'Afrique orientale.

Mots-Clés: Accrénan, Plaques tectomiques, dorsales, basaltes, trachytes.



(*) Prof Dr. Catedrático da Universidad de Costa Rica- San Pedro Montes de Oca, San José, Costa Rica, Tel: (+00) 506.86.29.07.12 -jegadanasa@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El sector del África oriental es el resultado del accidente tectónico del Gran Rift, fractura mayor que corta el continente de norte a sur. En esta zona es donde el continente se separa en sentidos opuestos: el magma ha hecho extrusión, formando poderosos conos **volcánicos** y mesetas dejando profundas depresiones lacustres que caracterizan el paisaje actual donde las poblaciones se han asentado y en donde subsiste aún una gran variedad de fauna salvaje. (Figura 1).

El Gran Rift africano es la expresión morfológica de un Rift magmático cuya actividad comenzó hace unos 30 millones de años en el Afar, evolucionando hacia el Sur donde muchos centros de emisión nacieron hasta alcanzar la extremidad Sur del Rift Keniano hace unos 8 millones de años en donde el Rift se divide en tres ramas divergentes (Eyasi, Natrón-Manyara y Pangani).

En el sistema Pangani las deformaciones son menos evidentes y dominadas por un sistema de bloques basculados donde se ha creado una cordillera volcánica neogena cuya orientación es Este-Oeste que cubre unos 200 km y donde emergen los conos del Ngorongoro, Meru y Kilimanjaro.

El valle tectónico del Gran Rift es el elemento geológico mayor del África Oriental. Se extiende desde el sur del mar Rojo hasta el río Zambeze recorriendo más de 9.500 km de longitud. Tiene un ancho promedio de 40 a 60 km Y su profundidad varía de los cientos a los miles de metros. Es un sector tectónico constituido por fallas normales que se producen a partir del Mioceno. La subsidencia está rellenada por sedimentación lacustre e inmensos lagos (Kivu, Tanganyika, Malawi). La expansión del Rift es del orden de 10 milímetros a 12 centímetros por año, disminuyendo hacia el sur. Los montes Kilimanjaro y Kenia se sitúan en la intersección oriental del alineamiento tectónico. Según Tom Wright, geofísico inglés, el análisis de imágenes tomadas por el satélite Envisat de la Agencia Espacial Europea (ESA) permite confirmar cómo esta porción de tierra africana se ha ido separando gradualmente, al ritmo de 12 centímetros por año.

El Gran Rift se inicia en Asia, en el río **Jordán**. Desde ahí forma una dorsal a través del mar Rojo separando las costas de **Egipto** y Sudán de las costas de la península Árabe. El mar Rojo recorre unos 1977 km desde el golfo de Akaba hasta Bab-el Mandeb. Tiene un ancho máximo de 300 km y una profundidad que llega hasta los 2.500 metros pero la profundidad media no supera los 500 metros. En ambas márgenes encontramos las trazas de un antiguo volcanismo basáltico que se inició en el Mioceno. Igualmente gracias a las imágenes de Google Earth 2010, es posible observar una serie de estructuras tectónicas y **volcánicas** producto de la zona de acreción en el Estrecho de Bab-el-Mandeb (Las puertas del infierno o las puertas de las lágrimas) que separan el mar Rojo del Océano Índico a través del golfo de Adén. Este sector es uno de los grandes accidentes tectónicos del planeta ya que marca la separación entre la placa de la península Árabe y la placa Africana, por una parte y el inicio del Gran Rift Africano a partir del sector Yibuti-Etiopía.

El África Oriental se caracteriza por situarse en una zona tectónica de gran inestabilidad conocida como el gran Rift. Se trata de un lugar donde tres placas tectónicas divergen permitiendo la ascensión magmática y la construcción de volcanes importantes. El sector oriental dentro de unos millones de años se separará dando origen a un nuevo continente, tal y como lo hizo ya la isla de Madagascar. El punto triple del Afar es el punto de contacto de tres placas tectónicas; Árabe, Nubia y Somalí. Estas fronteras corresponden a dos dorsales oceánicas (Mar Rojo y Golfo de Adén y el Rift continental africano). Este sector se caracteriza por tener magmas alcalinos que tienen su origen en zonas profundas asociados al desarrollo de aperturas de Rift continentales. Las rocas más características son los basaltos alcalinos, siendo usual la presencia de términos evolucionados (traquitas y fonolitas). El **volcán** Dubbi en Eritrea, es un buen ejemplo de ello.




Figura 1 - Graben del Gran Rifi formado por la acreción de las placas tectónicas africana y somali.
Modelo de J.P. Bergoeing. Creación de Oscar Barrientos.

LA VERTIENTE ÁRABE DE LA DORSAL DEL MAR ROJO

Tectónica y Vulcanismo de la Península Árabe

La costa oriental del Mar Rojo es un reflejo del inicio del área de acreción que se prolonga por miles de kilómetros hacia el sur, dando nacimiento al Gran Rift Africano (Figura 2). En el sector peninsular Árabe, aparecen edificios volcánicos bien conservados, de la actividad que se inicia a comienzos del Plioceno y se prolonga de nuestros días.

Es un sector desértico, donde los paisajes de dunas recubren gran parte del relieve, sin embargo algunas grandes estructuras volcánicas se han conservado y desde el aire se pueden observar las grandes coladas de lava que emergen de un punto central que es el centro de emisión.

El Campo volcánico de Harrat Khaybar (Figuras 2 y 3) situado en 25° lat. N. y 40° long. E. es una de las zonas volcánicas más extensas de la península Árabe. Data de comienzos del Plioceno y con actividad verificada hasta el año 650 de nuestra era. Cubre una superficie de 14.000 km² y culmina a 2093m en el dcmo Jabal Abyad. Forma parte de un alineamiento volcánico de más de 600 km compuesto por varios edificios de volcanes escudos coalescentes donde sobresale el estrato-volcén del Jabal Qidr, domos y coladas. Algunos sitios neolíticos están recubiertos por coladas de lava. (<http://www.activolcans.info/volcan-HarratKhaybar.html>).




Figura 2 - Placas tectónicas del sector del Gran Rift entre África y Asia modificado de "Earth of fire"




Figura 3 - Campo volcánico de Harrat Khaybar recubierto por lavas basálticas al norte de Medina en Arabia Saudita, cercano al poblado de An Nuwayrah, compuesto por una serie de conos volcánicos de donde se originó una profusión de coladas basálticas hacia el oeste. Fotointerpretación basada en imagen satelital Google 2011.

Otro campo volcánico, en el mismo sector de coordenadas geográficas, conocido como Harrat Lunayyir (Figura 4) forma parte de la provincia volcánica de la costa oeste de Arabia Saudita y cubre una superficie de 180.000 km² en Arabia Saudita y se sitúa próximo a la ciudad de Medina a unos 200 km del mar Rojo, lo que viene a demostrar la influencia de la dorsal del mar Rojo hasta este punto. De abril a junio 2009 se registró un enjambre sísmico de 4 a 5.7 grados en la escala de Richter que hizo temer una posible erupción volcánica y por ello más de 40.000 personas fueron evacuadas. Durante este periodo una falla de 3 km se expandió en 8 km durante el sismo más importante que alcanzó los 5.7 grados. Este sector que se remonta al Mioceno era considerado como inactivo hasta ese momento.

El análisis de los sismos permitieron determinar que se trata de una ascensión magmática de lava fluida (basaltos) que se sitúa a lo largo de la falla mencionada (JONSSON et al. 2009)

El Estrecho de Bab-el-Mandeb

El sector propio del estrecho de Bab-el-Mandeb está constituido por un pequeño archipiélago de islas volcánicas (islas Hanish) expresión del accidente tectónico del Mar Rojo, que dará origen por una parte al Gran Rift africano que se origina a partir de Yibuti (en esta última región se encuentra el punto más bajo de toda África, el lago Assal, a 155 metros bajo el nivel del mar), y por otra parte a un sistema tectono-volcánico que se dibuja sobre las costas meridionales de Yemen, frente al golfo de Adén. El estrecho tiene unos 115 km de longitud, aunque en su parte más angosta, a veces considerada exclusivamente el propio estrecho, tiene menos de 30 km de ancho (isla Perim), desde Ras Menheli, en la costa árabe, a Ras Siyan en África

El Djehel Al-Tair es un volcán insular que se localiza en el mar Rojo entre 15.55° de lat. N. Y 41.82° de long. E. Es un volcán parcialmente emergido que alcanza una altitud de 244 m. Emite lavas basálticas (toleres). El volcán ha registrado erupciones explosivas en el siglo XVIII y XIX. El 7 de septiembre de 2007, después de una serie de sismos el volcán hizo erupción emitiendo coladas de lavas basálticas que bajaron por los flancos de su cono hasta el mar y haciendo víctimas entre los soldados de la dotación yemení apostada en ese lugar. (<http://www.activolcans.info/volean-Jebe-al-'Iair.html>)

Los Volcanes de la Dorsal del Golfo de Adén

Hacia el este, en Adén una fractura tectónica importante se dibuja a lo largo de la costa sur de la península Árabe. Esta fractura está asociada a la del Afar. Consecuencia de ello son los volcanes que se formaron en este sector y que igualmente son de tipo basáltico. La ciudad de Adén está edificada sobre estas estructuras volcánicas.

La costa sur del Yemen entre Bab-el Mandeb y Adén se caracteriza por ser un área tectónica de acreción donde las placas de Arabia y de Sornalia se encuentran frotando

Una dorsal submarina. Consecuencia de ello existen seis centros de emisión volcánicos que se remontan al Mioceno-Plioceno. En el sector donde está construido el puerto de Adén existen tres estructuras volcánicas muy erosionadas que son los volcanes de Adén, Pequeño Adén y Ras Imrán. Su avanzado grado de erosión permite hacer un estudio detallado de ellos. Están compuestos por basalto traquitas y riolitas. Los volcanes se caracterizaron por un periodo de calderas de explosión donde el volcán emitió traqui-andesitas, traquitas y riolitas alcalinas. En su última fase eruptiva los volcanes emitieron entre otros productos olivino toléítico.

La imagen satelital Google permite observar que geomorfológicamente los volcanes se encuentran muy erosionados conservando parte de su cono que conforma un gran rim. El cono está entallado por numerosas quebradas que han ido evolucionando propulsadas por el medio árido creando profundas quebradas. Al oeste del cráter de Adén se vislumbra un pequeño cráter en forma de media luna y al este lo que queda de un cráter sumergido (Figura 5). Parte de la ciudad de Adén se encuentra edificada al interior del cráter. Los tres volcanes alineados en dirección oeste-este se





Basado en Imagen Satelital 2009. Google Earth

39°49' E

Fotointerpretación: Dr. Jean Pierre Bergoeing

Cartografía Digital: SachoOsear Barrientos Ortiz


Simbología

D	Área de Vulcanismo Cuaternario Basáltico		Falla Tectónica con Escarpe
	Coladas del Holoceno		Falla Indiferenciada
	Coladas Antiguas Pleistoceno Superior	D	Área de Erosión y de Cobertura Eólica asociada al Rill - Wash
	Domos Volcánicos		Área Urbana de Medina
	Cráteres Volcánicos		Ia Kaba: Centro Sagrado del Islam



Figura 4 - Campo volcánico de Medina. Arabia Saudita,


unieron al continente, probablemente durante el Cuaternario mediante flechas **litorales**, producto de la erosión continental



Fotointerpretación: Dr. Jean Pierre Bergoeing

cartografía Digital:
Bach. Oscar Barrientos Ortiz

Leyenda



Área Volcánica (Sedimentaria)

Cursos de Agua (Sedimentaria)

Línea de Cresta

Centro Urbano - Portuario

Figura 5 - Cráter de Adén ocupado en parte por la edificación urbana de la ciudad portuaria. Al oeste emerge un cono desbocado (Al Tawahi) y al este una caldera cuyo borde conforma un promontorio. (Interpretación de una imagen satelital Google 2010)

Adén es un puerto situado al este del estrecho de Bab-el Mandeb construido sobre viejas estructuras volcánicas y que fue ocupado por los hombres desde el Siglo VI a.e. Está compuesto por varios centros urbanos; el puerto, la ciudad industrial conocida como (pequeño Adén) con su gran refinería de petróleo y Madinat esh Sha'b que es el centro del gobierno administrativo. Posee dos suburbios Khormaksary Sheikh Othman, que unen el norte de la ciudad vieja con el aeropuerto internacional. (Figura 5) Por su posición estratégica entre la India y el canal de Suez le confieren una importancia comercial y estratégica de primer orden. El almirante chino Zheng He hizo escala en Adén en 1421 en su viaje transoceánico. En 1538 pasó bajo soberanía Oimana en 1838 forma parte del Imperio colonial británico hasta su independencia en 1967.



Primeras Estructuras Volcánicas del Rift entre Egipto, Sudán y Eritrea, en la Margen Africana de la Dorsal del Mar Rojo

La Geología del Sector Nor-Oridental de África.

El sur del desierto de Libia, en Egipto está constituido por un zócalo cristalino formado por elementos graníticos de más de 600 millones de años (precámbrico) recubierto por sedimentos continentales muy erosionados (Cámbrico a Ordovícico inferior). Durante el Primario un mar tropical, poco profundo, se instala en esta parte del continente que se caracteriza por arcillas y calizas fosilíferas. Las areniscas de Nubia marcan una regresión marina que ~~duró~~ 70 millones de años. Del devónico al Cretácico el continente forma ~~parte~~ de una masa continental única; la Pangea.

Durante el Cretácico, el mar de Tethys sumerge esta parte de Egipto creando el continente de Gondwana. A finales de este periodo emerge nuevamente el territorio egipcio ya comienzos del Terciario (65 millones de años) los dinosaurios y ammonites han completamente desaparecido. Durante el Eoceno el mar de Tethys ya no existe y comienza a formarse el Gran Rift con la creación del mar Rojo que se ensancha progresivamente y se crean las grandes depresiones lacustres del África oriental. En el norte (Egipto, Nubia), las lluvias modelan cañones y mesetas, paulatinamente el clima se modifica hasta alcanzar la aridez actual. Es durante el Mioceno que una actividad volcánica comienza a manifestarse y se prosigue durante el Plioceno y se continúa manifestando hasta nuestros días a partir de Eritrea hacia el sur. Al norte de este punto quedan los remanentes de esta actividad, calderas, cráteres y coladas de basaltos principalmente. Entre la cuarta y sexta catarata del Nilo se extiende el desierto de Bayuda, que se caracteriza por sus rocas negras, basálticas, testimonio de la antigua actividad volcánica de esta zona. Igualmente se encuentra una caldera volcánica en Gebel Abu Nahl que data del pre-cámbrico y es más grande que todos los cráteres conocidos del norte del Sudán.

La Península del Sinaí y el golfo de Aqaba corresponde a un desprendimiento tectónico NE-SW producido por la placa tectónica de Arabia (Figura 6) durante el Plioceno y que da inicio a la dorsal del mar Rojo y el Gran Rift. (Jean Joseph Blanc). Al dirigirse hacia el sur, a partir de Egipto siguiendo la dorsal del Mar Rojo, comienzan a aparecer las primeras estructuras volcánicas del Mioceno-Plioceno.




Figura 6 - Gran Rift Africano (zona de acreción) con la Placa Nubia (Oeste) y la placa Somalí (Este).




LAS ESTRUCTURAS VOLCÁNICAS ACTIVAS DEL RIFT EN ERITREA

Al sur del Sudán comienza la cordillera del Afar en donde emergen volcanes importantes, corno son el Dubbi, el Nabro, el Erta Alé y la caldero del Musa Ali.

Volcán Dubbi

El Dubbi es un estrato volcán activo del sector del Rift Eritreo (Figura 7) que se alarga con una serie de conos por donde una serie de erupciones se han producido. Se trata de largas coladas de lava basáltica. Del Dubbi propiamente tal han emergido cuatro grandes coladas de las cuales la del año 1450 y la de 1861 llegaron hasta el mar Rojo recorriendo una distancia de 22 km.. En 1861 el volcán hizo erupción emitiendo 3.500 millones de metros cúbicos de lava basáltica que salieron de 19 conos volcánicos situados en la cima y sus cenizas se dispersaron en un radio de 250 km. Causó más de 100 víctimas en un área desértica que corresponde a la sierra del Danakil. Posee más de 20 conos cineríticos en su cima e innumerables conos parásitos emergen en su base en parte sumergidos por las poderosas coladas de lava que han fluido desde su cima Desde entonces el volcán ha tenido una serie de erupciones. El 13 de junio de 2011 la erupción del Nabro vecino, inicialmente fue atribuida al Dubbi.



Fotointerpretación: Dr. Jean Pierre Bergoeing
Cartografía Digital: Sacho Osear Barrrientos Ortiz

Simbología


	Cráteres
	Domos Volcánicos
	Cordón litoral
	Ríos Esporádicos
	Colada de lava 1861
	Coladas de lava recientes
	Coladas de lava antiguas
	Áreas de Influencia Eólica



Figura 7 - Volcán activo Dubi, Eritrea (1.625 m) Observóvene las largas coladas de lavas basálticas que han descendido de los diferentes cráteres de este macizo volcánico. (Fctninterpretación basada en imagen Google 2011).

Volcán Nabro

Próximo al volcán Dubi se encuentra el volcán Nabro (Figura 8) que hizo erupción recientemente en junio 2011. Los países más afectados hasta el momento han sido Etiopía, Eritrea, Sudán y Egipto, ubicándose dentro de los países con más cenizas y con vuelos cancelados. La última nube de cenizas llegó a la ciudad de El Cairo. Según los vulcanólogos la primera nube de cenizas incluía partículas pesadas, metálicas, hidrocarburos y dióxido de azufre, mientras que las últimas erupciones se cree que solo contiene dióxido de azufre, lo que la hace mucho más ligera. El Centro de Observaciones de Cenizas de Toulouse, Francia, no pudo determinar si las nuevas nubes de cenizas tendrían un impacto en los vuelos, sobre todo respecto al dióxido de azufre, pero la extensión de la erupción podrían llegar a afectar hasta Israel. (Figura 8)



Fotointerpretaci6n: Dr. Jean Pierre Bergoeing

Cartografia Digital: SachoOsear Sarrienlos Ortiz

Simbología

Cráteres	11 Colada de lava de 1210612011
"T" Domos Volcánicos	11 Coladas de lava recientes
Cono Volcánico	11 Coladas de lava antiguas
Red Hídrica	Límite Internacional

Figura g - Caldera del volcán Nabro en la frontera (en amarillo) entre Etiopía y Eritrea. El poblado de Aruku en Etiopía se encuentra construido sobre un segundo cráter. Obsérvase la colada basáltica más reciente que fluye hacia el nor-este de la caldera del Nabro. (Fotointerpretación basada en Imagen satelital Google 2011).

El 12 de junio de 2011 el cráter del Nabro hizo erupción a las 21 horas precedida de fuertes sismos de 5.7° en la escala de Richter, emitiendo gran cantidad de gases de dióxido de azufre y cenizas que se elevaron a unos 15 km afectando al Sudán y Egipto, y finalmente una colada incandescente de lava basáltica y riolítica que recorrió varios kilómetros. La erupción hizo siete víctimas en el poblado de Sireru y 31 victimas en el sector Etiope además de cientos de desplazados. El Nabro es un estrato-volcán de la región del Afar en la depresión del Danakil, que alcanza una altitud de

2.218 metros y se compone de una caldera habierta hacia el sur-oeste, de unos 20 km de diámetro en cuyo centro se **encuentra** el **cráter** activo que hizo erupción y por donde salió una colada de lava muy fluida, principalmente de tipo basáltica que fluyó hacia el nor-oeste recorriendo unos 25 km. También en el sector se encuentra obsidiana en profusión. **Fuera** de estos conos volcánicos hay una multitud de pequeños domos dacíticos que pululan entre grandes derrames de lavas en particular al norte del poblado de Arukú.

Los Volcanes del Rift Etiope

Volcán Erta Até

En este sector, el punto culminante es **el volcán** Erta Ale, (613 m. de **altitud**) o "montaña humeante". Es un **volcán** escudo y uno **más** de los volcanes de la cordillera oriental del África. Situado en Etiopía en las coordenadas 13°42' lat. N. y 40° 67' long. E. La lava basáltica que **sale** del **volcán** Erta Ale es del mismo tipo de la que emerge de los volcanes submarinos. El volcán Erta Ale se caracteriza por tener en su cráter un lago permanente de lava basáltica fundida, donde se forman costras que bajo el empuje de la lava suelen hacer explosiones espectaculares pero de débil amplitud.

La cadena volcánica del Erta Alé es una de los grandes ejes volcánicos del Afary el que mejor caracteriza a este sector. Se sitúa en el gran Rift, en Etiopía próximo a la frontera con Eritrea entre las coordenadas geográficas 13° 36' de latitud N. y 40° 37' de longitud Este. En lengua Afar, Erta Alé significa montaña humeante. Esta cadena volcánica mide 95 km de largo y 42 km de ancho y constituye el sector norte de la depresión del Danakil que baja hasta -120m bajo el nivel del mar, en Etiopía. La cadena volcánica se compone de seis conos; El Erta Alé, el Gada Alé, el Alu-Dala Filla, el Borale Alé, el Hayli Gub, y el Alé Bagu.. La depresión del Danakil marca el límite entre el Rift etíope y las dorsales del Mar Rojo y del golfo de Adén. El Erta Alé se eleva a 635 metros sobre el nivel del mar. El cono tiene pendientes suaves y la base cubre unos 30km de diámetro. Es un volcán escudo basáltico. La cumbre está constituida por una caldera de colapso elíptica que mide 1.6 km de largo por 07 km de ancho y ocupada por una serie de cráteres que **albergan** lagos de basalto fundido que pueden extruir en periodos de actividad intensa. Es uno de los únicos volcanes con lago eratérico de lava (desde 1906) junto al Kilauea en Hawái y el Erebus en la Antártida.

Los volcanes de Etiopía son desconocidos en su gran mayoría ya que muy pocos han sido estudiados. Hay 67 volcanes clasificados, de todo tamaño, que van desde simples cráteres hasta **calderas** que se caracterizan por su gran actividad desde géiser y fumarolas hasta erupciones violentas como las del Erta Alé. Todos han tenido actividad reciente (Holoceno). Estos volcanes son el testimonio del inicio del Rift africano, una zona de acreción tectónica que separa la placa Somalí de la placa Africana creando la depresión del Danakil (Figuras 9, 10, 11, 12 Y 13).

La depresión del Afar, que está por debajo del nivel del mar, en Yibuti, en donde se ubica el deprimido lago Abbe (-155 m) es el lugar donde se está dando la acreción, es decir la separación de la placa tectónica del África con la placa tectónica Somalí. El Mar Rojo ha invadido la depresión del Afar al menos en tres oportunidades en los últimos 200.000 años, y ello está evidenciado por los estratos **salinos** en los **taludes** expuestos de las quebradas. También se le conoce como "**triángulo** Afar, Danakil, Dancali e'. Cubre unos 4.000 km² y abarca el este de Etiopía, el centro de Eritrea, el sur de Yibuti, y el extremo norte de Somalia. Desde el punto de vista geológico constituye un graben limitado al noreste por el bloque del Danakil en posición de Horst, al oeste y al sur por la meseta etíope que dibuja **fallas** escalonadas o traps. Al sur la placa Somalí se adentra en el sistema **dorsal** del Yemen . El sector se caracteriza por un sistema de afallamientos normal.




Figura 9 - Cadena volcánica del Brta.Alé, situada en la frontera entre Etiopía y Btitrea. Se pueden observar en la imagen satelital los conos que conforman este macizo volcánico así como las numerosas coladas de lavas basálticas. A los pies del macizo, una georfolología de paisaje árido compuesta por conos de deyección surcados por cauces secos que terminan en depresiones cerradas (salares o chots). (Fotointerpretación basada en una imagen satelital Google 2011)




Figura 10 - Volcán Musa Ali. Cumbre de 2.026 m Punto limítrofe entre Eritrea, Etiópia y Jibuti, es una caldera de explosión muy erosionada en clima árido. [Fotointerpretación basada en imagen satelital Google 2007.]





Figura 11 - Volcán Alayta, Etiopía, próximo a la frontera con Eritrea en una de las áreas tectónico-volcánicas más activas del mundo. La colada de lava basáltica de 1915 se derramó hacia el oeste cubriendo gran parte del cono debido a su fluidez. (Potointerpretación basada en imagen satelital Google 2007.)



Fotointerpretación: Dr. Jean Pierre Bergoeing

Cartografía Digital: Sacho Oscar Sanientos Ortiz

Simbología

	Fallas		Ríos Esporádicos
	Domos Volcánicos		Coladas de lava más recientes
	Cráteres		Coladas de lava recientes
	Taludes		Coladas de lava antiguas
	Glacis		Chot o Salares



Figura 12 - Antiguas estructuras volcánicas del Danakil. (Fotointerpretación basada en imagen satelital Google)





Figura 13 - Lagos cratericos de Abijata y Langano dentro de una caldera de colapso, en el sur del Rift Etiope, cercanos al poblado de Shashamane. Al este emergen dos domos volcánicos. ((Fotointerpretación basada en imagen

EL RIFT ORIENTAL

Los Volcanes de Kenia y los Grandes Lagos

El lago Turkana ~~antiguamente~~ conocido como lago Rodolfo, se sitúa al norte de Kenia en la frontera con Etiopía. Se extiende por unos 300 km Y el espejo de agua cubre unos 6.453 km². Este es el lugar donde el Rift bifurca en dos partes, al este, el lago Turkana dibuja una curva que vendrá a unirse con el Rift oeste enmarcado por los grandes lagos; Alberto Eduardo, Kivu, Tanganika y Nyasa que son la expresión más profunda del desgarre de la corteza terrestre en este sector,



Fotointerpretación: Dr. Jean Pierre Bergoeing
Cartografía Digital: 8ach. Osear 8arrientos Ornz

Simbología

	Cráteres		Graben		Lagos
	Conos Volcánicos		Coladas de lavas más recientes		
	Red Hídrica		Coladas de lavas antiguas		
Ríos Esporádicos					
					Áreas Sedimentarias por Depósitos Fluviales Esporádicos

Figura 14 - Sistema volcánico de Kulai, al este del lago Turkana. La isla que conforma el South Island National Park, al centro del lago, es igualmente un cono volcánico emergente. La cima recubierta por una espesa vegetación tropical deja entrever algunas estructuras volcánicas (Cráteres y calderos). Al sur los Cráteres del Longonot y Suswa. (Fotointerpretación basada en imagen satelital Google 2011).

El Lago Turkana.

El lago Turkana, antiguamente lago Rodolfo bautizado en 1888 así en honor del archiduque de Austria Rodolfo de Hasburgo, es un largo endorreico que pierde su nivel por evaporación y se extiende sobre una superficie de 6.405 km² y está rodeado por un ambiente árido y seco. El lago es de tipo alcalino pero es alimentado por tres ríos, el Orno, el Turkwel y el Kerio. Hoy su fauna es solo de peces pero tuvo en el pasado cocodrilos del Nilo.

El sector que bordea el lago Turkana es eminentemente volcánico y aquí emergen, al sur del lago, los conos de los volcanes Longonot y Suswa. El lago Turkana es endorreico y por ello, solo la evaporación solar permite disminuir su masa líquida (Figura 14).

El Volcán Longonot.

El volcán Longonot se sitúa al sur del lago Turkana, en Kenia entre las coordenadas 0° 55' de lat, Norte y 36° 27' de long. Este (Figura 15). Es un estrato volcán que se eleva a 2776 m. de altitud. Está construido sobre una caldera de 8 km. por 12 km., cuyo fondo es plano y está recubierto por vegetación tropical. Es un volcán de fines del Pleistoceno ya que los geólogos piensan que se formó hace unos 21.000 años. Posee en su centro un cráter de 2 km de ancho. Las lavas del Longonot son traquíticas y posee al menos dos escurreimientos lávicos laterales fisurales. La caldera del Longonot corresponde a un colapso Holoceno que afectó igualmente el volcán Suswa vecino por lo que se cree que es un fenómeno ligado al drenaje magnético interior del Rift. Según relatos de los autóctonos Masai, el volcán habría hecho erupción en 1863 a partir de un cráter simado en su flanco norte. (<http://www.activolcans.info/volcan-Longonot.html>).

El Volcán Suswa.

El Suswa es un volcán escudo (Figura 16) que se sitúa a 58 km al este del estrato-volcán Longonot y a 50 km de Nairobi la capital de Kenia. Se eleva al sur del lago Turkana y es producto de la ascensión magnética del manto a través del Gran Rift. Aquí el Gran Rift ocupa el sector oriental ya que se desdobra formando un arco. El volcán Suswa se eleva a 2.536 m. de altitud y es un volcán activo cuya última erupción importante cubre todo su flanco este. La cima del volcán está formada por una caldera de 12 km por 8 km. Y en su interior conserva una meseta de lava basáltica muy aplana. Cerca del rim de la caldera donde el volcán alcanza su mayor altitud, este se caracteriza por poseer un cráter que ha emitido lavas recientes. El volcán se caracteriza igualmente por tener cavernas donde abunda la obsidiana y son el producto de túneles originados por la presión de las lavas que fluyeron al interior mientras los bordes se enfriaban. A los pies del cono volcánico del Suswa, hacia el este, donde se encuentra el poblado de Gicheru, existen derrames de lavas basálticas de tipo fisural que emergieron de una serie de fallas o fisuras tectónicas asociadas al Gran Rift. Aquí es donde torna plena vigencia la hipótesis del colapso de las calderas del Longonot y del Suswa asociadas al drenaje del receptáculo de llaves con aspiraciones del Gran Rift en un momento dado. Igualmente el volcán manifiesta actividad fumarólica en las zonas de fracturas tectono-volcánicas,

El Monte Kenya O Meru.

El Monte Kenya de 5.199 m es la segunda cumbre más alta de Kenia y del África detrás del Kilimanjaro. De 5892 m de altitud. Se sitúa al sur de la línea ecuatorial y es un macizo aislado constituyendo un estrato-volcán inactivo cuya última erupción data de fines del Plioceno 2.6 millones de años. En su cima existen pequeños remanentes de un gran glaciar que fue activo durante el último período glaciar. Es un volcán complejo, cuyo flanco este colapsó formando hace 7.800 años una caldera en semi-círculo. Está constituido principalmente por depósitos volcánicos piroclásticos de brechas y tobas y por lavas nefelínicas y fonolíticas. Su actividad comenzó a inicios del Cuaternario hace 2 M.a. según muestras datadas y se prosiguió hasta 1.5 M.a., Luego vino una fase de reposo y





Fotointerpretación: Dr. Jean Pierre Bergoeing


Cartografía Digital: Bach. Oscar Barrientos Ortiz

Leyenda

- | | | | |
|--|------------------|--|------------------|
| | Falas Tectónicas | | Dome |
| | Caldera | | Escarpes |
| | Fondo Caldera | | líneas de Cresta |
| | Cráteres | | |



Figura 15 - Cono y cráter del volcán Longonot. Obsérvese las numerosas coladas fluidas que componen su cono y en particular las oscuras que son las más recientes. (Fotointerpretación basada en imagen satelital Google 2011).



un reinicio de la actividad hace 0.16 M.a (fines del Pleistoceno superior) ininterrumpida. El cono principal se edificó entre 0.16 M.a. y 0.06M.a. (Holoceno). Durante este último periodo se construyó el Ash Cone o cono de cenizas founado por piroclastos nefelinicos y que continúa en actividad.

A los pies del monte Meru, al este emerge el cráter del Ngurdoto y al oeste el Monduli que es un complejo basáltico datado de 1.67 M.a. El sector aldeano está sembrado de conos parásitos estrombólicos que constituyen la meseta de Arusha-Mondoli (NONNOTTE Ph. 2007.)

El Kilimanjaro.

Tal vez el volcán más emblemático de África, por albergar nieves eternas en su cumbre lo cual dejó pasmados a los primeros exploradores europeos, en el siglo XIX, que no podían creer ver nieve a latitudes ecuatoriales. Descubierto por Johannes Rebmann en 1848, se sitúa al noreste de Tanzania y se compone por tres cráteres, el Shira al oeste que alcanza 3.962m, el Mawenzi al este que se eleva a 5.149 m y el Kibo que es el más joven estructuralmente hablando. El punto culminante se encuentra en el pico Uhuru, que es la cima del Kilimanjaro y que se eleva a 5.891.8 metros de altitud y es el punto más elevado de África.

El Kilimanjaro es un estrato volcán del Cuaternario (Figura 17), expresión de las subidas magnéticas del manto a través de la corteza terrestre en esta zona de debilidad que es el graben del Gran Rift. Se calcula que la edificación del Kilimanjaro comenzó con el cono del Shira hace 750.000 años, seguido por el colapso del mismo que formó una caldera. Posteriormente se edificó el Mawenzi seguido del Kibo. Las lavas viscosas del Kibo colmaron la caldera del Shira, constituyendo una meseta volcánica. La última erupción del Kibo se remonta a 360.000 años. La altitud alcanzada por este macizo volcánico le ha permitido albergar un casquete glaciar contemporáneo con las últimas glaciaciones lo que ha dejado trazas de valles en U y morrenas. El cono volcánico del Shira (3.962 m.) es un centro de emisión de lavas máficas con gran acumulación de piroclastos y tobas basálticas. El Mawenzi (5.149 m.) localizado en el este es una estructura densa founada por diques maficos y brechas pirocláticas. Al centro el cono Kibo representa el edificio central que alcanza los 5.895 m en el Pico Uhuru. Se presenta como una torre cuya cima tiene la forma de una silla de montar. Su actividad volcánica ha sido intensa y está rodeado por conos parásitos de tipo tobas estrombolianas a traquibasálticas. Las laderas del Kilimanjaro igualmente han tenido actividad eruptiva efusiva con lavas heterogéneas que van de las fonolitas africanas a las fonolitas téfricas (Ph Nonnoue, 2007).

204

VOLCANES AL SUR DEL LAGO NATRÓN, TANZANIA

Los volcanes al sur del lago Natrón en Tanzania fueron estudiados Philippe Nonnotte (Nonnotte, 2007) quien hizo su tesis de Doctorado en la Universidad de Bretaña occidental, Francia. Aquí emergen conos como el O1 Doinyo Longai, el Kerimasi, el volcán Olmoti que alcanza los 3.099 m y posee un lago pluvial al interior de su cráter, y la gran caldera del Ngorongoro. Al este emergen los conos aislados del volcán gelai y del Ketumbeine.

El Volcán O1 Doinyo Lengai

Se localiza en Tanzania por las coordenadas 2°75' lat. S. y 35° long. E. Localmente es mejor conocido bajo el nombre de O1 Doinyo Lengai y alcanza los 2.890 m. de altitud. Entró en erupción el 13 de marzo de 2008 lanzando columnas de cenizas de 10 km de altitud y flujos piroclásticos. El 6 de septiembre de 2008 el volcán emitió coladas fluidas basálticas

El Lengai es un pequeño cono volcánico comparado con los gigantes que se erigen más al sur en lo que podemos llamar la sierra del Ngorongoro (Figura 18).

Las cuencas del lago Natrón y del lago Engaruka se caracterizan por la presencia de cuatro edificios volcánicos principales. Al suroeste del lago Natrón emergen los conos de los volcanes;




Figura 17 - Vdcán Kilimanjaro y Monte Meru. Basado en una fotointerpretación de imagen satelital Google 2010.

Kerimasi, este último activo hasta 0.32 M.a y del Ol Doinyo Lengai cuya primera erupción data de 0.17 M.a y continúa en actividad hasta hoy. Es el único volcán carbonatítico del mundo. Son dos volcanes muy parecidos por estar constituidos por formaciones brechosas nefeliniticas a fanolíticas.

El borde suroriental del lago Natrón está constituido por dos grandes volcanes que culminan a 3.000 m. de altitud corno lo son el volcán GeLai y el volcán Ketumbeine formados por lavas basálticas y basaníticas. Las dataciones del Ketumbeine dan una edad de 1.87 a 1.54 M.a (pleistoceno inferior). La edad del volcán Gelai es más joven y da 0.96 M.a. (Pleistoceno medio).

Volean Olmoti.

Este volcán se sitúa entre el Empaki al sur y el Loolmalasin al Noreste. Descansa sobre una meseta que se eleva a 2.600 m. de altitud. Su cráter es en realidad una caldera de 10 km de diámetro y se caracteriza por depósitos de tobas y ha sido datado de 1.65 M.a a 1.07 M.a lo que lo sitúa en el Pleistoceno inferior. Ha emitido lavas de tipo traquianandesíticas, traquíticas y tefríticas así como pimclastos ignimbriticos datados de 1.25 M.a.

La actividad volcánica más antigua del área se remonta a 8.1 M.a. (Mioceno superior) que incluye los edificios volcánicos meridionales de Es simingor, Burko y Tamsero. Actualmente el único




Figura 18 - Sector volcánico sur del lago Natrón, Tanzania. Al sur en línea, los volcanes O Doyno Lengai, Kerima Empakai, Olmoti y la gran caldera del Ngorongoro. Al Este los conos aislados del volcán Gelai y del Keturnbeine,

volcán activo del sector es el 01 Doyno Lengai Los lagos Natrón y más al sur **Mayara** constituyen el valle axial del **Rifl**, constituido por un sistema de grabens que tienen desniveles que van de los 1.000m a los 3.000m.

Volean Ngorongoro.

Más al sur emerge la caldera inmensa del volcán Ngorongoro cuyas dimensiones son 23 km de diámetro y cubre una superficie de 260 km². y su rincón caídrico alcanza una altitud de 2.453 m con unos 300m. de desnivel sobre le fondo de la caldera. Es un volcán daado de 3.7 M.a (Plioceno) a 1.88 M.a. Cuaternario antiguo y que ha tenido un pasado muy explosivo cuyos depósitos se componen de lavas traquíticas, depósitos piroclásticos ignimbriticos y gran acumulación de cenizas que hoy tapizan la meseta del Serengeti. El Ngorongoro habría tenido su última actividad hacia 1.16 M.a. (pleistoceno medio). En efecto la caldera del Ngorongoro colapsó en varias etapas entrecortadas por erupciones de coladas de lavas. Al final del colapso persistió una débil actividad volcánica manifestada en el fondo del cráter por emisiones de lavas basálticas y formación de pequeños conos erráticos formados por escoria y que se remontarían a 1.16 M.a (Ph. Nonnotte, 2007).

EL RIFT OCCIDENTAL

El Rift Occidental o Rift Alberlino abarca el sector que comprende la extremidad norte del lago Alberto hasta el sur del lago Kivu, donde se ha trazado la frontera entre Uganda, la República Democrática del Congo, Ruanda, Burundi y Tanzania. En este sector, encontrarnos diferentes modalidades de actividad volcánica producto de la ascensión magmática a través de las fisuras del Gran Rift occidental. Aquí se destaca el Monte Ruwenzori con más de 5.000 m. y que posee glaciares en su cima.

El Campo Volcánico de Kichwambe.

El sector es conocido como campo volcánico de Kichwambe que se sitúa al sur del lago Jorge (Figura 19). Se caracteriza por maares o cráteres de explosión gaseosa que están datados de fines del Pleistoceno comienzos del Holoceno y probablemente su actividad se prolongó hasta tiempos históricos. Está compuesto por más de 130 maare ocupados por lagunas, de las cuales algunas son salobres. Los maares son cráteres producto de explosiones entre una napa freática o un no subterráneo y un ascenso magmático lo cual produce formación de enormes cantidades de gas que ascienden explotando en la superficie y creando un cráter que será luego alimentado por la napa freática. Se encuentran en este sector igualmente lavas que componen el subsuelo y que son de tipo diorítico-foidítico.

La Cordillera Volcánica del Virunga

En la frontera entre Uganda, Ruanda y la República Democrática del Congo se eleva una cadena montañosa **vulcánica**, conocida como Cordillera del Virunga (Figura 20), compuesta por ocho macizos volcánicos donde se destaca el Karisimbi de 4.507 m de altitud que es la mayor elevación de este complejo, le siguen el Muhavura (4.127 m), el Gahinga (3.474 m), el Visoke (3.711 m), el Munavu, el Niam Nagira. El volcán más antiguo es el Sabinyo que se eleva a 3.634 m. y finalmente el Nyiragongo que presenta gran actividad volcánica. Esta actividad volcánica es de reciente formación (Holoceno) que es un testimonio de la gran actividad tectónica del Rift occidental en este sector.

El Volcán Karisimbi

B. Karisimbi un estrato-volcán basanítico-traquítico llega a los 4.507 m. de altitud Y posee una caldera de 2 km de diámetro, la "caldera blanca" que es el testigo de un cono mellizo y además






Figura 19 - Sucesión de gasmaares del campo volcánico de Kichwambe, Uganda (Fotointerpretación basada en imagen satelital Google 2002.)




Figura 20 - Cordillera volcánica del Virunga compartida por la República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda. (Fotointerpretación basada en imagen satelital Google 2009.)




Figura 21 - Volcán Sabinyo (3.643 m.) Cordillera del Virunga. (Fotointerpretación basada en imagen satelital Google 2006).

tm cono **parásito** cercano de su cima, el Mutanjo, que conforman un mecizo volcánico Ha hecho erupción recientemente en 1977 y en 2002.

El Volean Niamuragira

El **Niamuragira** es uno de los volcanes más edvos de **Africa**. Es un **volcán-escudo** basáltico que se sitúa al norte del lago Kivu y **contrasta** con su vecino el Nyimgongo de 3.470m de altitud. Ha emitido **grandes** coladas de lavas basálticas. Su cima está ocupada por una caldera de 2 km de diámetro con un rirn de 100 metros de desnivel y el cono presenta numerosos conos cineríticos. Hasta 1938 poseyó un lago de lava que fue drenado por una erupción lateral catastrófica que recorrió 30 km antes de alcanzar el lago Kivu.

El Volean Muhavura

El Muhavura se sitúa al **Nor-este**, al final de la oordilLera del Virunga y **alcanza** los 4.127 de **altitud**, es un estrato-volean que alberga un lago pluvial en su **cráter**. El edificio está compartido por el cono del Gahinga que alcanza los 3.473 m. Ambos volcanes han emitido lavas traquítico-andesíticas.

Volean Sabinyo

El Sabinyo o Sabinio es un **volcán** inactivo de la Cordillera del Virunga (Figum 21) que **alcanza** los 3.634 m de altitud. Su cumbre marca la frontero entre la República Democrática del Congo, y Ruanda. Es el habitat del gorila de montaña.

El Volean Visoke

El Visoke es un **estrato-volcán** traquítico-andesítico que se ubica en el extremo meridional de la cordillera volcánica del Virunga. **Alcanza** los 3.711 metros de altitud y su **cráter** posee una laguna pluvial. Está rodeado igualmente por conos parásitos de los cuales dos se destacan en su flanco norte.

El Volcán Nyiragongo (3.470 M)

El Nyiragongo con ooordenadas 1°31'07" sw lat. S. y 29°15' 14" de long. E. es un estrato-volcán síruedo en la serranía del vinmgá, (hogar de los gorilas de **montaña**) entre la República Democrática del Congo y Ruanda. Es una de las manifestaciones más cspcteculercs del graben del Rift. Domina desde sus 3.470 m .la ciudad de Goma y el lago Kivu . Tiene erupciones frecuentes y **suele** derramar potentes coladas de lava basáltica que se escurren con gran velocidad por sus laderas. En su interior, el **cráter** alberga un lago de lava en fusión permanente cuyo diámetro alcanza 1.2 km. El volcán **suele** emitir emanaciones de CO₂ por lo que es peligroso y letal para el ser humano. Su última erupción data de 2002. Al norte del volcán se yergue el **estrato-volcán** Baruta y al sur el estrato-volcán Shaheru. El cráter fue explorado por primera vez por el explorador alemán Adolf Von Gotzen en 1894. La erupción de 1977 **precedida** por la creación del domo Murara, drenó el lago de lava en menos de una hora produciendo una corriente de lava que se desplazó a 70 km/hora haciendo muchísimas víctimas.

EL RIFT EN MALAWI y MOZAMBIQUE

El lago Malawi o Nyasa es una prolongación del Gran Rift africano que se extiende por 560 km. con un ancho de 75 km . El espejo de agua se sitúa a 460m. sobre el nivel del mar. Aquí nos encontramos en el límite de la **gran** fractura ya que los afloramientos geológicos, tanto del Malawi como del norte del Mozambique se **remontan** a la era Priñaria y Secundaria. Los sectores más recientes son **Jurásicos** y Cretácicos. El área es una prolongación del crntón del Zimbabwe. Un sector digno de hacer resaltar se sitúa al sur del lago Nyasa en Malawi, donde se encuentra el lago Chilwa






Figura 22 - Lago Chilwa, Malawi. Serie de relictos volcánicos del Pleistoceno inferior, que marcan el paisaje lacustre al sur y al oeste del lago. (Fcto interpretación basada en imagen satelital Google 2009).




Figura 23 - Caldera del volcán Karthal a, en la isla de Gran Comore, archipiélago de las Comores, con sus numerosos cráteres, y al centro el cráter principal con laguna pluvial. (Potoínterpretación basada en imagen satelital Google 2011).

(Figura 22) que ocupa una superficie de 650 km². Al sur y al oeste del lago quedan los remanentes de un antiguo volcanismo asociado al Gran Rift. En efecto una serie de conos, calderas y cráteres emergen como relictos volcánicos que podrían ser del Pleistoceno inferior ya que para Battistini (Battistini 1968) el Rift Valley en los sectores del lago Nyasa y de la región del Shire ya tenía sus rasgos definitivos a comienzos del Terciario, pero que el gran accidente tectónico que significa la apertura del Rift, va a permitir, en este sector, ascensos magmáticos cuyos testigos son los relictos volcánicos muy erosionados que se observan al sur del lago de Chilwa.

Más al sur el macizo de Mulanje que alcanza los 3.000 m. de altitud y cubre unos 572 km². Fue descubierto por David Livingstone en 1859. Su presencia se debe a una extrusión granítica del manto a través de la corteza terrestre ocurrida hace unos 130 millones de años (Cretácico) dando origen a un relieve de ínselberg. Este macizo vendría a ser un precursor en la formación del Rift.

En este sector el Rift se introduce y desgarra los afloramientos geológicos antiguos. Al este y oeste del Rift Valley ocupado por el lago Nyasa los bordes están conformados por mesetas antiguas que van de 915 m. a 1220 m de altitud. En el extremo sur, el lago desagua a través del río Shire para unirse al Zambeze en Mozambique. Al oeste de Mozambique, en la provincia de Tete, fronteriza con Zimbabwe, encontramos el Monte Muambe que es el resultado de un vulcanismo post-caldera del Mesozoico. Se sitúa en la margen sur del río Tete donde afirma un complejo grabro-diorítico del Precámbrico que se entremezcla con el sistema de areniscas del Karroo que se entremezcla con la formación volcánica de Stromberg que son coladas de lavas basálticas y diques de doleritas. A partir del Jurásico inferior y hasta el Cretácico el monte Muambe comienza una extraordinaria actividad volcánica que dará inicio a esta parte del Gran Rift. La caldera de Muambe tiene unos 5 km de diámetro. (ALFONSO, 1976.)

214

VOLCÁN KARTHALA, ARCHIPIÉLAGO DE LAS COMORES

Finalmente debemos incluir en este sistema del Rift el vulcanismo marginal insular representado aquí por el volcán Karthala en la isla de Gran Comore (Figura 23) que forma parte del archipiélago de las Comoras.

Es un volcán que ha tenido una gran actividad, con explosión de lavas basálticas y gases. Su morfología se caracteriza por ser una caldera con varios cráteres en su interior. La isla no es más que la parte emergida de un enorme cono volcánico, separado de Mozambique por el estrecho del mismo nombre. En el estrecho existen conos sumergidos y no por ello menos activos. El volcán Karthala, es un volcán Cuaternario, tiene una elevación de 2.361 m sobre el nivel del mar, es un volcán escudo y es muy activo. En 2005 y 2006 ha tenido una gran actividad emitiendo gases y cenizas y obligando a evacuar a la población cercana. El volcán tiene una historia eruptiva que tiene registros desde el año 1050. Hay menciones eruptivas desde 1808 y que se prosiguen en 1814, 1821, 1828, 1830, 1833, 1848, 1850, 1855, 1857, 1858, 1859, 1865, 1872, 1876, 1880, 1883, 1904, 1910, 1918, 1928, 1948, 1952, 1956, 1965, 1972, 1977, 1991, Y 2005.'112007. Con ello vemos que estamos en presencia de un volcán que tiene actividad continua.

El archipiélago de las Comores al parecer podría ser un sistema lineal de volcanes escudos alcalinos que iría de la Gran Comore hasta el norte de Madagascar bajo el canal de Mozambique y formaría parte de la placa Somali que se estaría separando del África a la velocidad de 45 mm/año. (Ole Nielsen 2008)

CONCLUSION

El Gran Rift Africano es uno de los grandes accidentes tectónicos del mundo, que se inicia en el río Jordán, mediante un antiguo accidente tectónico con subidas magmáticas ancestrales y cuyas referencias bíblicas son muy conocidas (Sodoma y Gomorra) para luego continuar hacia el sur por

la dorsal del mar Rojo, **separando** al África de la placa tectónica de **Arabia** Y ha dejado sus trazas en ambas **márgenes** mediante **relictos volcánicos** basálticos.

El segundo tramo importante es el sector de Eritrea-Etiopía-Yibuli en el continente africano donde grandes depresiones **tectónicas** ocupadas varias veces por el **mar**, alternan con más de cincuenta edificios volcánicos de todo tipo que hemos ilustrado brevemente.

Más al sur, en Kenya y Tanzania el Gran Rift se divide en tres grandes sectores dejando a la vista un **graben** escalonado en donde se han edificado una serie de macizos **volcánicos** que en Tanzania, superan los 5.000 metros (Kilimanjaro) pero igualmente grandes depresiones lacustres. Los grandes lagos orientales del África son una expresión más de esta zona de acreción pudiendo alcanzar profundidades de 1.700 metros.

El accidente tectónico del Gran Rift se continúa con dificultad a través del norte de Mozambique, fracturando los viejos escudos primarios metamórficos. La expresión más reciente de esta fractura se encuentra en el **archipiélago** de las Comores.

El **Gran Rift** africano es uno de los accidentes tectónicos N-S más notables del planeta. Es el inicio de la separación de dos **masas** continentales que en unos millones de **años** dará origen a un nuevo continente representado por la placa Somali.

No cabe duda que este es un campo de **investigaciones** en geofísica que puede abarcar cientos de años por cuanto las **investigaciones** en terreno son muy recientes y parciales, ello debido a la naturaleza tropical o árida de algunos sectores corno a los conflictos armados que prevalecen en muchos sectores.

BIBLIOGRAFIA

- AFONSO R S. A Geología de Moçambique. Maputo: Impresa Nacional de Mocambique, 1976.
- AHMPD DAOUD, M. Dynamique du rifting continental de 30 Ma à l'Actuel dans la partie Sud-Est du Triangle Afar. Tectonique et magmatisme du rift de Tadjoura et des domaines Danakil et d'Ali Sabieh, République de Djibouti. These présentée pour l'obtention du diplôme de Doctorat. Université de Bretagne Occidentale. France, 2006.
- BATTISTINI R. Problèmes morphologiques du sud du Malawi. Annales de Géographie N° 422, vol 77. pp.431-451. Paris: 1968.
- BART, F. L'Afrique Continent Pluriel. París: CNED SEDES, 2003.
- BERGER J. P. La chaîne d'obduction en Oman et aux Emirats Arabes Unis, 2005- 2011. <http://www.jpb-imagine.com/obductgeol/index.html>
- BERGOEING J.P. África, Continente mulufacético. San José: Editorial y Librería Alma Mater, 2008.
- BLANC J.J. 2006. 'Iburisme Géologique en Egypte: Les déserts, les oasis. Association des anciens et des amis du CNRS. Paris: Edil. Edmond Lise, 2006.
- EBETS. & DIEZ. Massam - The cliffdwellers of Kenya- Cass. Published by Moi University Press, 2000.
- FURON R; LOMBARD J. Carte Géologique de l'Afrique 1 :5.000.000. Paris: UNESCO-ASGA, 1964.
- GOVERNMENT OF MALAWI. Lake Chilwa wetland state of the environment. Environmental Affairs Department, Lilongwe. Malawi: 2000.
- HEMINGWAY, R. The Snows of Kilimanjaro and Other Stories. Scribner, 1995.
- JOHANSON, D.; BLAKE, E. From Lucy to Language. New York: Simon & Schuster, 1996.
- JONSSON S.; LU, Z.; LUNDGREN, P. INSAR observations of the 2009 Harrat Lunayyir dike intrusion and post dyking deformations. Geophysical research abstracta, 2009.
- KALK, M., MCLACHLAN, A. J.; HOWARD-WILLIAMS, C. (Eds.). Lake Chilwa: studies of change in a tropical ecosystem. London: The Hague Publishers, 1979.
- KOSCAL, M.; KACHAMILA, J. M.; STEFANOVRIC; JANJIC, M. Mineralización de fluorita de Monte Muambe carbonatite complejo, Mozambique. Resumen de la Segunda Congr. No-Met Minerals pg



103-114, Beograd, 1985.

LEAKEY, R. E. 1981. The Making of Mankind. New York: EP.Dutton.

NIELSEN, O. Volcan Karlhala, 2008. <http://my.operacomlnielsollblog/2008/11120/karthala-volcano-on-grand-comoro>

NONNOTTE Ph. Etude volcano-tellonique de la zone de divergence nord tanzanienne (terminaison sud du Rift Kenyan). Caractérisation pétrologique et géochimique du volcanisme récent (8 M.a. - Actuel) et du manteau de source. Contraintes de mise en place. Thèse de Doctorat. Université de Bretagne Occidentale. Géosciences Marines, 2007.

PAVITI, N. Africa's Great Rift Valley. New York: Harry N. Abrams, 200L

POWERS D. W. Geology of Mio-Pliocene sediments of the Lower Kerio River Valley, Kenya. USA: Princeton University, 1980.

STEDMAN, H. Kilimanjaro: A Guide to Climbing Africa's Highest Mountain, Includes City Guides to Arusha, Moshi, Marangu, Nairobi and Dar es Salaam. Trailblazer Publications, 2003.

RIDGEWAY, R. The Shadow of Kilimanjaro. Owl Books: 1999.

WRIGTH, H.E.; KUTZBACH, J.E.; WEB, T.; RUDDIMAN, W.F.; STREET PERROT, F.A.; BARTLEIN F.J. Global Climates since the last glacial maximum. University of Minnesota Press: 1993.

Trabalho enviado em novembro de 2012

Trabalho aceito em dezembro de 2012

