



Ciência Rural

ISSN: 0103-8478

cienciarural@mail.ufsm.br

Universidade Federal de Santa Maria

Brasil

Assis Casagrande, Renata; Wouters, Flademir; Marques Boabaid, Fabiana; Bobbi Antoniassi, Nadia Aline; Petinatti Pavarini, Saulo; Schneider de Oliveira, Luiz Gustavo; Mota Bandarra, Paulo; Zlotowski, Priscila; Driemeier, David

Raiva em bovino associada a intoxicação espontânea por *Sida carpinifolia*

Ciência Rural, vol. 42, núm. 10, octubre, 2012, pp. 1872-1875

Universidade Federal de Santa Maria

Santa Maria, Brasil

Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33124570017>

- Como citar este artigo
- Número completo
- Mais artigos
- Home da revista no Redalyc

redalyc.org

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal  
Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

## Raiva em bovino associada a intoxicação espontânea por *Sida carpinifolia*

Rabies in bovine poisoned by *Sida carpinifolia*

Renata Assis Casagrande<sup>1</sup> Flademir Wouters<sup>1</sup> Fabiana Marques Boabaid<sup>1</sup> Nadia Aline Bobbi Antoniassi<sup>1</sup>  
Saulo Petinatti Pavarini<sup>1</sup> Luiz Gustavo Schneider de Oliveira<sup>1</sup> Paulo Mota Bandarra<sup>1</sup>  
Priscila Zlotowski<sup>1</sup> David Driemeier<sup>1\*</sup>

### - NOTA -

#### RESUMO

Dois bovinos, fêmeas, mestiças, 6 anos (caso 1) e 18 meses (caso 2) de idade mantidos em pastagem com intensa invasão por *S. carpinifolia* apresentaram dificuldade locomotora com inicio nos membros pélvicos progredindo para decúbito esternal ou lateral, nistagmo, tremores e fasciculação de cabeça em um período de quatro a cinco dias. No exame histológico evidenciou-se meningoencefalite e ganglioneurite não supurativa com corpúsculos de Negri em neurônios do cerebelo, tronco encefálico, hipocampo, gânglio trigeminal e medula espinhal. Havia vacuolização citoplasmática nas células de Purkinje e nos neurônios do gânglio trigeminal. A imunofluorescência direta (IFD) para raiva foi positiva nos dois bovinos e na imuno-histoquímica (IHQ) houve marcação do antígeno rábico nos neurônios do córtex cerebelar e cerebral, hipocampo e gânglio trigeminal. A histoquímica com lectinas evidenciou que o citoplasma vacuolizado dos neurônios apresentaram marcação para Con-A, WGA e sWGA. De acordo com os achados morfológicos, os epidemiológicos, a IHQ e a IFD para raiva e o padrão histoquímico com lectinas conclui-se que o presente relato representa dois casos subclínicos de intoxicação por *S. carpinifolia* em bovinos com infecção pelo vírus da raiva.

**Palavras-chave:** doença de bovinos, sistema nervoso central, doença de depósito lisossomal, *Lyssavirus*.

#### ABSTRACT

Two female bovine, crossbreed, 6-year-old (case 1) and 18-month-old (case 2) grazing in pasture infested by *Sida carpinifolia* showed gait difficulties, initially at the pelvic limbs, progressing to sternal or lateral decubency, nystagmus,

tremors, and fasciculation of the head for four to five days. Histologically was observed meningoencephalitis and ganglioneuritis nonsuppurative with Negri corpuscles in the neurons of the cerebellum, brain stem, hippocampus, trigeminal ganglion and spinal cord. Another histological finding was a cytoplasmic vacuolation of the Purkinje cells and in the trigeminal ganglion neurons. Direct immunofluorescence (DIF) for rabies viral antigen was positive in both animals and anti-rabies immunohistochemistry (IHC) was positive in the neurons of the cerebellar and cerebral cortex, hippocampus, and trigeminal ganglion. Con-A, WGA, and sWGA lectin histochemistry were positive in the vacuolated neurons. Based on the morphological and epidemiological features, rabies DIF and IHC, and lectin histochemistry the present report consists of two cases of subclinical poisoning with *S. carpinifolia* in cattle infected with rabies virus.

**Key words:** disease in cattle, central nervous system, lisosomal storage disease, *Lyssavirus*.

A raiva é a principal causa de encefalite em bovinos no Sul do Brasil (SANCHES et al., 2000). Essa enfermidade ocorre frequentemente em herbívoros, e morcegos hematófagos são os principais transmissores para essas espécies, que desenvolvem uma doença geralmente paralítica associada a lesões na medula espinhal, tronco encefálico e cerebelo.

*Sida carpinifolia* (guanxuma, chá-da-índia), uma planta invasora de pastagens e lavouras, contém

<sup>1</sup>Setor de Patologia Veterinária (SPV), Faculdade de Veterinária (FAVET), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Av. Bento Gonçalves, 9090, 91540-000, Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail: davetpat@ufrgs.br. \*Autor para correspondência.

o alcaloide swainsonina, que inibe a enzima alfa-manosidase lisossômica e causa uma doença de depósito lisossomal (DDL) caracterizada pelo acúmulo de oligossacarídeos nos lisossomos (COODEL et al., 2002a). Essa enfermidade ocorre de forma espontânea em caprinos (DRIEMEIER et al., 2000; COODEL et al., 2002b) e bovinos (FURLAN et al., 2009; PEDROSO et al., 2010).

Nesse trabalho descreve-se o quadro clínico e anatomo-patológico de dois casos de raiva em bovinos com intoxicação espontânea subclínica por *Sida carpinifolia*. Os dados epidemiológicos e sinais clínicos foram obtidos junto aos proprietários e aos médicos veterinários responsáveis. Realizou-se visita às propriedades para levantamento de dados e realização da necropsia dos bovinos. Fragmentos de todos os órgãos foram coletados, fixados em formalina a 10% e processados rotineiramente para histologia. Fragmentos encéfalo, gânglio trigeminal e medula espinhal foram submetidos à imunofluorescência direta (IFD) para raiva, à técnica de imuno-histoquímica (IHQ) para raiva (PEDROSO et al., 2008) e de histoquímica com lectinas *Concanavalia ensiformis* (Con-A), *Triticum vulgaris* (WGA) e Succinil WGA (sWGA) (COODEL et al., 2002b).

A primeira propriedade visitada localizava-se no município de Maquiné (RS), em uma região com furnas e possuía apenas três bovinos destinados à produção de leite que eram mantidos em pastagem nativa com intensa invasão por *S. carpinifolia*. Dois bovinos, fêmeas, mestiças, 2 e 6 anos de idade, apresentaram paralisia progressiva, inicialmente nos membros posteriores que evoluiu para decúbito esternal em dois dias e morte cinco dias após. Realizou-se necropsia no bovino fêmea de 6 anos (caso 1), no qual foi observado sinais de sugadura de morcego na região torácica próximo as escápulas.

A segunda propriedade visitada localizava-se no município de Triunfo (RS) e possuía um rebanho de aproximadamente 30 bovinos de corte que eram mantidos em área de reflorestamento por Acácia negra (*Acacia* sp.) com intensa invasão por *S. carpinifolia*. O rebanho tinha sido vacinado para raiva seis meses antes e não havia histórico de doença prévia. Um bovino, fêmea, 18 meses, mestiça (caso 2) apresentou dificuldade locomotora com inicio nos membros pélvicos progredindo para decúbito lateral em um período de quatro dias. O animal não possuía sensibilidade nos membros pélvicos e apresentava nistagmo, tremores e fasciculação de cabeça. Realizou-se a eutanásia *in extremis* e na necropsia observou-se a bexiga repleta e o intestino com conteúdo ressecado, muco e sangue na porção final.

Na avaliação histológica do encéfalo havia infiltrado perivascular linfoplasmocitário e poucos macrófagos multifocal discreto no cerebelo (casos 1 e 2) e tronco encefálico (caso 2), moderado na medula espinhal (caso 2) e acentuado no cérebro (caso 1). No cerebelo evidenciou-se infiltrado linfoplasmocitário discreto nas leptomeninges (caso 2). No tronco encefálico (caso 2), no córtex cerebral e no hipocampo (caso 1) havia gliose multifocal discreta com satelítose e necrose neuronal. No gânglio trigeminal observou-se infiltrado linfoplasmocitário multifocal moderado (caso 2) e difuso acentuado (caso 1) com necrose neuronal e esferóides axonais (casos 1 e 2). Corpúsculos de Negri foram observados em grande quantidade nas células de Purkinje (Figura 1A) e em alguns neurônios de Golgi no cerebelo (casos 1 e 2), e nos neurônios do tronco encefálico (caso 2), hipocampo (casos 1 e 2), gânglio trigeminal (caso 1) e medula espinhal (caso 2). Além disso, evidenciou-se no cerebelo vacuolização citoplasmática difusa acentuada nas células de Purkinje (casos 1 e 2) (Figura 1A) e nos neurônios do gânglio trigeminal multifocal moderada (caso 1).

Os resultados de IFD para raiva dos dois bovinos foram positivos. Na IHQ houve marcação do antígeno rábico nos neurônios do córtex cerebral, hipocampo e gânglio trigeminal (caso 1), nos neurônios de Purkinje e seus processos na camada molecular e na camada granular e nos neurônios de Golgi (caso 2) (Figura 1B), caracterizada por agregados granulares ou em forma arredonda em grande quantidade no pericálio e prolongamentos.

Quanto a histoquímica das lectinas, evidenciou-se o citoplasma vacuolizado dos neurônios do cérebro e gânglio trigeminal com marcação difusa moderada (caso 1) e das células de Purkinje e neurônio de Golgi difusa acentuada (caso 2) para Con-A (Figura 1C), WGA e sWGA .

A raiva causa uma doença fatal em bovinos e o diagnóstico é estabelecido pela visualização dos corpúsculos de Negri, IFD ou IHQ. Infecções pelo vírus da raiva associada com outros agentes não são comumente reportadas. Há um relato de raiva em um bovino de um ano de idade em que foi isolado Herpesvírus bovino tipo 5 (BHV-5) do encéfalo, no entanto não foi possível determinar se o BHV-5 teve algum papel no desfecho do caso já que esse vírus poderia estar latente no tecido encefálico (SPILKI et al., 2003).

No presente relato os bovinos apresentaram quadro clínico neurológico e histopatológico que são característicos da infecção fatal pelo vírus da raiva, no entanto observou-se também vacuolização




Figura 1 - Raiva em um bovino intoxicado por *Sida carpinifolia* (caso 2). Cerebelo: A. vacuolização citoplasmática acentuada nas células de Purkinje com corpúsculos de Negri (setas). HE. obj. 40. B. Imunomarcação do antígeno da raiva nos neurônios de Purkinje e de seus processos (glóbulos e agregados em vermelho) com vacuolização intracitoplasmática (seta). Estreptavidina-biotina-peroxidase. obj. 40. C. Marcação nos neurônios de Purkinje para Con-A (setas) com corpúsculo de Negri (cabeça de setas). Lectina-histoquímica. obj. 40.

citoplasmática dos neurônios. Essas foram marcadas pelas lectinas que caracterizam uma DDL com acúmulo de oligossacarídeos. Esses bovinos encontravam-se em um ambiente com grande quantidade de *S. carpinifolia*, todavia não apresentavam alterações clínicas típicas de DDL caracterizadas por distúrbios crônicos de propriocepção, tremores e incoordenação motora (FURLAN et al., 2009). Portanto, o quadro clínico nesses bovinos provavelmente se devia à infecção pelo vírus rábico.

A vacuolização encontrada nos neurônios marcada pelas lectinas pode ter sido um achado incidental. COLODEL et al. (2002b) reproduziram experimentalmente a intoxicação por *Sida carpinifolia* em três caprinos e, um desses não apresentou alterações clínicas durante os 90 dias do experimento, no entanto no exame histológico havia lesões de DDL. FURLAN et al. (2008) reproduziram experimentalmente a intoxicação por esta planta em cinco bovinos e os sinais clínicos foram observados em dois bovinos que ingeriram diariamente 30g kg<sup>-1</sup> e 40g kg<sup>-1</sup> apenas a partir do 99º e 77º dias de experimentação, respectivamente. Sendo assim, se os bovinos do presente relato continuassem ingerindo a planta por um período maior

os sinais clínicos de DDL poderiam aparecer e levá-los a morte.

De acordo com os achados morfológicos, a IHQ e IFD para raiva e a histoquímica das lectinas conclui-se que o presente relato trata-se de dois casos subclínicos de intoxicação por *S. carpinifolia* em bovinos com raiva. Nessa espécie, não há relatos anteriores de lesão encefálica mista causada pelo vírus da raiva associada a um outro agente.

## AGRADECIMENTOS

A médica veterinária Laura R. B. Barreto da Secretaria da Agricultura do município de Triunfo pela disponibilização de um dos casos para este estudo. Ao Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor (IPVDF) pelos resultados de IFD de raiva dos materiais encaminhados.

## REFERÊNCIAS

- COLODEL, E.M. et al. Identification of Swainsonine as a glycoside inhibitor responsible for *Sida carpinifolia* poisoning. *Veterinary & Human Toxicology*, v.44, p.177-178, 2002a.
- COLODEL, E.M. et al. Aspectos clínicos e patológicos da intoxicação por *Sida carpinifolia* (*Malvaceae*) em caprinos no Rio Grande do Sul. *Pesquisa Veterinária Brasileira*, v.22, n.2, p.51-57, 2002b.

- Disponível em: <[http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-736X2002000200004&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-736X2002000200004&script=sci_arttext)>. Acesso em: 10 jul. 2011. doi:10.1590/S0100-736X2002000200004.
- DRIEMEIER, D. et al. Lysosomal storage disease caused by *Sida carpinifolia* poisoning in goats. **Veterinary Pathology**, v.37, p.153-159, 2000. Disponível em: <<http://vet.sagepub.com/content/37/2/153.full>>. Acesso em: 10 jul. 2011. doi:10.1354/vp.37-2-153.
- FURLAN, F.H. et al. Intoxicação experimental por *Sida carpinifolia (Malvaceae)* em bovinos. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v.28, p.57-62, 2008. Disponível em: <[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0100-736X2008000100009](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-736X2008000100009)>. Acesso em: 10 jul. 2011. doi:10.1590/S0100-736X2008000100009.
- FURLAN, F.H. et al. Spontaneous lysosomal storage disease caused by *Sida carpinifolia (Malvaceae)* poisoning in cattle. **Veterinary Pathology**, v.46, p.343-347, 2009. Disponível em: <<http://vet.sagepub.com/content/46/2/343.full>>. Acesso em: 10 jul. 2011. doi:10.1354/vp.46-2-343.
- PEDROSO, P.M.O. et al. Padronização da técnica de imuno-histoquímica para raiva em amostras de sistema nervoso central de bovinos fixados em formol e emblocados em parafina. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v.28, p.627-632, 2008. Disponível em: <[http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-736X2008001200012&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-736X2008001200012&script=sci_arttext)>. Acesso em: 09 set. 2011. doi:10.1590/S0100-736X2008001200012.
- PEDROSO, P.M.O. et al. Doença do armazenamento lisossomal induzida pelo consumo de *Sida carpinifolia* em bovinos do Rio Grande do Sul. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v.30, n.10, p.833-838, 2010. Disponível em: <[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0100-736X2010001000005](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-736X2010001000005)>. Acesso em: 10 jul. 2011. doi:10.1590/S0100-736X2010001000005.
- SANCHES, A.W.D. et al. Doenças do sistema nervoso central em bovinos no Sul do Brasil. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v.20, n.3, p.113-118, 2000. Disponível em: <[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0100-736X2000000300005](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-736X2000000300005)>. Acesso em: 10 jul. 2011. doi:10.1590/S0100-736X2000000300005.
- SPILKI, F.R. et al. Bovine herpesvirus type 5 (BHV-5) in a calf with rabies. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v.23, n.1, p.1-4, 2003. Disponível em: <[http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-736X2003000100001&script=sci\\_abstract](http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-736X2003000100001&script=sci_abstract)>. Acesso em: 10 jul. 2011. doi:10.1590/S0100-736X2003000100001.