



Ciência Rural

ISSN: 0103-8478

cienciarural@mail.ufsm.br

Universidade Federal de Santa Maria

Brasil

Casagrande, Leandro; Menegon Teixeira Detanico, Camila; Maia Franco, Robson  
Ocorrência de *Escherichia coli* em meias carcaças de bovinos abatidos em estabelecimento habilitado  
para exportação

Ciência Rural, vol. 43, núm. 6, junio, 2013, pp. 1025-1030

Universidade Federal de Santa Maria

Santa Maria, Brasil

Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33127018013>

- ▶ Como citar este artigo
- ▶ Número completo
- ▶ Mais artigos
- ▶ Home da revista no Redalyc

redalyc.org

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal  
Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

## Ocorrência de *Escherichia coli* em meias carcaças de bovinos abatidos em estabelecimento habilitado para exportação

Occurrence of *Escherichia coli* on beef carcass at an exporter slaughterhouse

Leandro Casagrande<sup>I\*</sup> Camila Menegon Teixeira Detanico<sup>I</sup> Robson Maia Franco<sup>II</sup>

### RESUMO

A análise de *Escherichia coli*, considerada bactéria indicadora de contaminação fecal, é utilizada na verificação do controle de processos de abate. Porém, poucos trabalhos foram publicados acerca da ocorrência desse micro-organismo nas indústrias de abate brasileiras. Assim, o presente estudo determinou a ocorrência de *E. coli* genérica em carcaças bovinas em um estabelecimento sob inspeção federal, habilitado à exportação, identificando as possíveis variações no ano de 2010. Foram coletadas 1111 amostras de suave de superfície de meias carcaças bovinas e analisadas pela metodologia Petrifilm™. A ocorrência encontrada foi de 4,4% ( $IC_{95\%}=3,3\% \text{ a } 5,7\%$ ), com uma média de contagem de  $4,08 \text{ UFC cm}^{-2}$ , não sendo significativamente afetada pelas estações de seca e chuva. As maiores ocorrências foram observadas nos meses de setembro (8,7%) e outubro (16,7%), no qual também foi detectada a maior média de contagem ( $14,06 \text{ UFC cm}^{-2}$ ). A diferença nos valores observada nesses períodos pode estar relacionada com o sistema de criação dos animais. A ocorrência foi significativamente maior no primeiro turno de abate (6,2%), em comparação com o segundo (1,6%), indicando uma possível relação entre a presença do micro-organismo e a realização de procedimentos operacionais. Interpretando-se os resultados encontrados, conclui-se que há necessidade da determinação de um perfil para a ocorrência de *E. coli* genérica em cada estabelecimento, considerando os fatores que a alteram, para orientar e tornar mais efetivas as medidas preventivas e corretivas de controle dos processos de abate e reduzir a contaminação microbiana das carcaças.

**Palavras-chave:** abate, análise bacteriológica, bovino, contaminação fecal, *Escherichia coli*.

### ABSTRACT

*Escherichia coli* testing are used to verify slaughter process control and it is regarded as an indicator of fecal contamination. However, there are few reports about *E. coli*

occurrence in Brazilian slaughter establishments. The present study evaluated the occurrence of generic *E. coli* in 1111 swab samples of beef carcasses collected at an exporter slaughterhouse, under federal inspection, in different periods of 2010 and analyzed by Petrifilm™ method. *E. coli* was detected on 4.4% of carcasses (95% CI, 3.3% to 5.7%) and its occurrence was not significantly affected by the dry or rainy season. The mean of generic *E. coli* recovered from sampled cattle carcasses was  $4.08 \text{ CFU cm}^{-2}$ . The higher incidence was observed in September (8.7%) and October (16.7%); in October the *E. coli* mean attained the highest value ( $14.06 \text{ CFU cm}^{-2}$ ). The observed increase may have been related to feedlot systems. The *E. coli* isolation occurred more frequently in the first shift (6.2%) than in the second shift (1.6%), indicating a possible relationship with the operating procedures. The results obtained in this study showed that an occurrence profile of generic *E. coli* should be determined in each establishment to guide and improve preventive measures and corrective actions of slaughter process control and reduce microbiological contamination on carcasses.

**Key words:** slaughter, bacteriological analysis, bovine, fecal contamination, *Escherichia coli*.

### INTRODUÇÃO

Grande parte da contaminação microbiana em carcaças bovinas provém da pele e do trato gastrointestinal dos animais, resultante de falhas operacionais ocorridas principalmente nas etapas iniciais do processo de abate, tais como a esfola e a evisceração (BARROS et al., 2007). Além dos riscos inerentes às etapas do processamento, pode ocorrer, ainda, a contaminação cruzada através do contato com equipamentos, instalações e manipuladores (BORCH & ARINDER, 2002).

<sup>I</sup>Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Serviço de Inspeção Federal, Rodovia MT 358, Km 05, s/n, 78300-000, Tangará da Serra, MT, Brasil. E-mail: leandro.casagrande@agricultura.gov.br. <sup>\*</sup>Autor para correspondência.

<sup>II</sup>Departamento de Tecnologia dos Alimentos, Faculdade de Veterinária, Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, RJ, Brasil.

Aanálise de *Escherichia coli* genérica - biotipo I, considerada o melhor indicador microbiológico de contaminação fecal, e seu monitoramento durante a produção contribuem para a manutenção dos processos de abate sob controle. Sua pesquisa em carcaças bovinas foi estabelecida como ferramenta de verificação de controle de processos nas indústrias de abate nos Estados Unidos em 1996 (USDA, 1996a). A ocorrência da bactéria nos estabelecimentos americanos sob inspeção federal foi de 15,8% em 1996 e de 16,6% nos dois anos seguintes (USDA, 1996b; EBLEN et al., 2005). Na Austrália, os resultados das análises bacteriológicas são reportados ao *Escherichia coli* and *Salmonella* spp. Monitoring Program do Australian Quarantine and Inspection Service – AQIS, permitindo o monitoramento dos micro-organismos, além de fornecer dados nacionais que auxiliam na identificação de tendências ou desvios nos controles operacionais das indústrias em relação à contaminação fecal (AQIS, 2003). Em 2003, foi relatada uma prevalência de 3,0% para *E. coli* genérica em novilhos, e de 7,1% em bovinos adultos naquele país (KIERMEIER et al., 2006).

Embora o Brasil tenha adotado para os estabelecimentos exportadores a análise de *E. coli* genérica a fim de avaliar a eficácia dos procedimentos operacionais e prevenir a contaminação de carcaças com resíduos fecais (BRASIL, 1996), ainda não há estudos relatando a ocorrência nacional da bactéria. Além disso, não foram estabelecidos parâmetros oficiais para a avaliação e o monitoramento da ocorrência de *E. coli* nas indústrias de abate. Assim, objetivou-se no presente estudo determinar a ocorrência de *E. coli* genérica em superfície de carcaças bovinas, verificando as possíveis variações sazonais e de turno de abate no período de um ano.

## MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em um matadouro-frigorífico de bovinos sob inspeção federal, localizado no município de Tangará da Serra, no estado de Mato Grosso, habilitado para comércio nacional e internacional (União Europeia, Estados Unidos da América e demais listas) e com capacidade diária de abate instalada de 1620 animais.

Foram analisadas amostras de suabe de superfície de meias carcaças bovinas para a pesquisa de *E. coli* genérica, coletadas no período de janeiro a dezembro de 2010, referentes ao programa de redução de patógenos implantado pela empresa conforme exigência do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento - MAPA (BRASIL, 2006). A frequência de amostragem foi determinada pelo volume de produção, sendo de um teste para cada 300 carcaças, totalizando 1111 amostras colhidas nos 303.110 animais abatidos nesse período. As coletas foram realizadas em meias carcaças resfriadas, sorteadas aleatoriamente, aproximadamente 24 horas após a matança. Cada amostra foi coletada em três pontos distintos das meias carcaças, demarcados por moldes metálicos estéreis com área de 100cm<sup>2</sup>, na seguinte ordem: vazio, peito e alcatra, totalizando 300cm<sup>2</sup>. Os suabes umedecidos em 10ml de solução salina peptonada 1% tamponada foram aplicados às regiões delimitadas por 10 vezes no sentido vertical e 10 vezes no horizontal (BRASIL, 1997). Em seguida, foram colocados em sacos estéreis e armazenados em caixas isotérmicas para envio ao laboratório para análise.

As amostras foram analisadas pela metodologia AOAC 998.08 – *E. coli* Petrifilm™ descrita no Official Methods of Analysis of AOAC International, (HORWITZ & LATIMER, 2005), validada pelo MAPA (BRASIL, 2005a), no Laboratório de Análise de Produtos de Origem Animal – LAPOA, no município de Várzea Grande, Mato Grosso, credenciado pelo MAPA (BRASIL, 2008). Alíquotas de 1ml das amostras foram inoculadas nas placas Petrifilm™ EC e, após incubação de 24±1h a 35±2°C, realizou-se a identificação e a contagem das colônias. Aquelas que apresentaram coloração azul com produção de gás foram contadas como *E. coli*. Os resultados das contagens foram expressos em Unidades Formadoras de Colônia (UFC) por unidade de área (cm<sup>2</sup>), sendo o limite de detecção 0,083UFC cm<sup>-2</sup>. Valores abaixo desse limite foram considerados resultados negativos e representados como <0,083UFC cm<sup>-2</sup>.

Foram comparadas as ocorrências de *E. coli* genérica em superfície de carcaças bovinas de animais abatidos nas estações de seca e de chuva do ano de 2010, definidas segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Para o período de seca, foram considerados os meses de abril a setembro e, para o período chuvoso, os meses de janeiro a março e outubro a dezembro. A ocorrência de *E. coli* genérica também foi comparada entre os dois turnos de abate do estabelecimento: o primeiro, das 05h30min as 13h30min; e o segundo das 13h30min as 21h30min, com uma média de 80 e 81 funcionários respectivamente. Para essa comparação, foram excluídos os dados das 63 amostras do mês de novembro, pois houve apenas um turno nesse período.

Os dados qualitativos foram analisados pelo teste qui-quadrado ( $\chi^2$ ) e qui-quadrado com correção para continuidade de YATES ( $\chi^2_{YATES}$ ),

utilizando-se o programa SPSS Statistics 17.0. As médias e desvios padrão foram obtidos no programa SigmaStat 3.5. Os valores foram considerados estatisticamente significativos quando valor-P<0,001.

## RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presença de *E. coli* genérica foi detectada em 49 das 1111 amostras coletadas, resultando em uma ocorrência de 4,4% ( $IC_{95\%}=3,3\%; 5,7\%$ ) para o ano de 2010 no estabelecimento estudado. A média das contagens do micro-organismo em superfície de carcaças bovinas foi de  $4,08\pm11,67\text{UFC cm}^{-2}$ . Os resultados das ocorrências e médias de contagem de *E. coli* genérica, bem como a comparação entre os meses do ano encontram-se na tabela 1. Quando comparadas as ocorrências mensais da bactéria, observaram-se valores significativamente maiores do que o esperado nos meses de setembro (8,7%) e outubro (16,7%). Em outubro, foi detectada também a maior contagem de *E. coli*,  $14,06\text{UFC cm}^{-2}$ .

Diversos fatores podem ter contribuído para esse aumento. Em setembro e outubro de 2010, segundo dados do Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária – IMEA, os animais confinados corresponderam, respectivamente, a 30,6% e a 31,8% da capacidade disponível de abate em Mato Grosso, as maiores porcentagens do ano, sendo também o período de maior entrega desses animais para o abate (23% e 24%, respectivamente) (IMEA, 2010; IMEA, 2011). Animais mantidos em regime intensivo de criação são mais suscetíveis

ao acúmulo de grandes quantidades de matéria fecal na pele, em função da maior aproximação dos bovinos, em comparação com o regime extensivo (DONKERSGOED et al., 1997). A influência das condições de higiene dos animais encaminhados para o abate na contaminação de carcaças durante a produção foi demonstrado por SERRAINO et al. (2012), que observaram uma correlação direta entre contaminação visível presente na pele de bovinos com a presença de bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas, enterobactérias e *E. coli*, tanto na pele quanto nas carcaças dos animais.

Além disso, bovinos nesse sistema de criação são geralmente alimentados com dietas de alta concentração de grãos para maximizar a eficiência da produção, o que pode resultar em um aumento na população de *E. coli* na microbiota ruminal (CALLAWAY et al., 2009). Conforme comentado na revisão de CALLAWAY et al. (2009), estudos demonstraram que a população de *E. coli* genérica em bovinos alimentados com dieta de alto grão (90% milho/soja) era 100 vezes maior do que em bovinos que receberam dieta de alto volumoso (100% feno), além de ser 1000 vezes mais resistente a um choque ácido similar ao conteúdo gástrico humano.

Dessa forma, a maior carga bacteriana na matéria fecal de animais confinados somada à maior possibilidade de contaminação da pele com resíduos fecais, devido ao adensamento populacional que ocorre nessas situações, poderia ter influenciado na ocorrência de *E. coli* genérica nos meses de setembro e outubro de 2010.

Tabela 1 - Comparação mensal da ocorrência e média de contagem de *E. coli* genérica em superfície de carcaças de bovinos abatidos em um matadouro-frigorífico do Mato Grosso.

Meses	Nº de amostras analisadas	Nº de resultados positivos	Ocorrência (%)	Média de contagem ( $\text{UFC cm}^{-2}$ )
Janeiro	108	2	1,9	1,25
Fevereiro	94	2	2,1	0,58
Março	110	2	1,8	0,29
Abri	99	6	6,1	2,71
Maio	78	2	2,6	0,46
Junho	80	2	2,5	0,71
Julho	100	3	3	1,57
Agosto	109	5	4,6	0,23
Setembro	115	10*	8,7	3,17
Outubro	54	9*	16,7	14,06
Novembro	63	4	6,3	3,26
Dezembro	101	2	2	0,08
Total	1111	49	4,4	4,08

\* valores observados desviam significativamente dos valores esperados no teste qui-quadrado ( $P<0,001$ ).

Sabe-se também que outros fatores além da contaminação fecal do animal vivo, como a eficiência da esfola e da evisceração e as práticas de higiene adotadas pelos estabelecimentos podem aumentar ou diminuir os níveis de bactérias nas carcaças bovinas (RIGOBELO et al., 2006).

A pele de bovinos tem sido indicada como a principal fonte de contaminação de carcaças ao longo dos processos de abate pela possibilidade de transferência de micro-organismos durante a esfola (BELL, 1997; MATHER et al., 2008). BRICHTA-HARHAY et al. (2008) indicaram maior prevalência de *Salmonella* spp. e *E. coli* na pele (89,6% e 46,9%, respectivamente) do que na superfície das carcaças bovinas após a esfola (50,2% e 16,7%) em quatro estabelecimentos localizados em diferentes regiões dos Estados Unidos. BELL (1997) demonstrou diferentes valores para *E. coli* em superfícies de carcaças bovinas, de acordo com o ponto em que as amostras foram coletadas, em três plantas exportadoras na Nova Zelândia. As maiores contagens ( $>100$ UFC cm $^{-2}$ ) foram detectadas nas regiões diretamente contaminadas com resíduos fecais e onde houve contato direto com a pele durante a esfola. Esses resultados evidenciam a importância da correta execução dos procedimentos realizados na linha de abate para reduzir a contaminação das carcaças.

Assim, nesta pesquisa, determinou-se a ocorrência de *E. coli* genérica em amostras de superfície de meias carcaças coletadas nos dois turnos de trabalho do estabelecimento estudado, a fim de detectar possíveis diferenças entre as equipes. Conforme apresentado na tabela 2, a ocorrência variou entre os turnos. O número de resultados positivos foi significativamente menor do que o esperado no segundo turno (1,6%) e maior do que o esperado no primeiro (6,2%), indicando, portanto,

que houve relação entre a presença da bactéria e os procedimentos operacionais.

SUMNER et al. (2003) compararam diferentes sistemas de abate e demonstraram que aqueles com práticas tradicionais e equipamentos rudimentares de 13 pequenos estabelecimentos australianos parecem ter sido mais eficientes em minimizar a contaminação fecal do que os sistemas mecanizados, com funcionários dispostos em série para a realização da esfola e evisceração e em grandes instalações de quatro abatedouros. Foram encontradas ocorrências de *E. coli* genérica em superfície de carcaças bovinas de 8,4% no sistema tradicional e de 28,4% no sistema moderno. A diferença foi atribuída ao maior número de pessoas que manipulam as carcaças nos grandes estabelecimentos. Além disso, há diferença significativa no volume de abate e, portanto, na velocidade de produção, o que pode contribuir para a ocorrência de falhas operacionais. Como na presente pesquisa o número de funcionários foi semelhante entre os dois turnos de trabalho, estudos adicionais considerando também os treinamentos e as capacitações dos operadores, além de outros fatores referentes à produtividade, tais como horas trabalhadas, quantidade de animais abatidos e velocidade de abate, seriam necessários para esclarecer as diferenças encontradas entre os resultados das duas equipes.

Alguns pesquisadores demonstraram ainda a influência das estações climáticas de chuva e seca na contaminação microbiana das carcaças. CASELANI (2010) encontrou uma frequência de resultados insatisfatórios, segundo a *Food Standards Agency* ( $>63,10$ UFC cm $^{-2}$ ), para *E. coli* em superfície de carcaças bovinas de 17,6% no período chuvoso e de 0,5% no período de seca no estado de São Paulo. RIGOBELO et al. (2006), também em São Paulo,

Tabela 2 - Ocorrência de *E. coli* genérica em superfície de carcaças bovinas em diferentes turnos de trabalho e estações climáticas em um matadouro-frigorífico do Mato Grosso.

Períodos analisados	Nº de amostras analisadas	Nº de resultados positivos	Ocorrência (%)
Turnos de trabalho <sup>a</sup>	Primeiro	611	38*
	Segundo	437	7*
	Total	1048	45
Estações climáticas	Seca	581	28
	Chuva	530	21
	Total	1111	49

<sup>a</sup> excluídos os resultados do mês de novembro em que houve apenas um turno.

\* valores observados desviam significativamente dos valores esperados no teste qui-quadrado ( $P<0,001$ ).

detectaram maior número de resultados positivos para a bactéria em amostras coletadas no período chuvoso. Entretanto, no presente estudo, como indicado na tabela 2, não foi observada diferença significativa na ocorrência de *E. coli* entre as estações seca e chuvosa de 2010 (4,8% e 4,0%, respectivamente), que permaneceram dentro do intervalo de confiança determinado para o ano estudado.

Embora tenham sido identificadas diferenças pontuais, a ocorrência de *E. coli* genérica encontrada no ano de 2010 é aproximadamente quatro vezes menor do que a prevalência nacional obtida no *Nationwide Sponge Microbiological Baseline Data Collection Program for Cattle*, publicado em 2005 nos Estados Unidos, que foi de 16,6% em aproximadamente 735 estabelecimentos sob Inspeção Federal (EBLEN et al., 2005). Além disso, no presente trabalho, não foram detectadas análises com valores acima de 100UFC cm<sup>-2</sup>, limite superior definido pelo FSIS e, apesar da média quantitativa da bactéria ter sido menor no estudo americano (0,26±1,10UFC cm<sup>-2</sup>), a porcentagem de resultados positivos com valores até 10UFC cm<sup>-2</sup> foi maior (5,5%) (EBLEN et al., 2005) do que a encontrada neste estabelecimento (4,0%).

O FSIS considera que o número de amostras positivas, porém abaixo do limite superior, também deve levantar questionamentos sobre a adequação dos controles de processos de um estabelecimento. Segundo determinações baseadas em seus estudos nacionais, aquele estabelecimento que opera em condições aceitáveis deve encontrar 80% de resultados satisfatórios para *E. coli* genérica (USDA, 1996a). Em 2000, o AQIS considerou que, em estabelecimentos com desempenho satisfatório em relação à higiene dos processos de abate, 95% dos resultados das análises de *E. coli* genérica estariam abaixo do limite superior (AQIS, 2000). Dessa forma, pode-se dizer que o processo estudado está sob controle, atendendo aos padrões americanos e australianos, uma vez que 95,6% das amostras não indicaram presença de *E. coli* genérica.

Além disso, a partir dos dados apresentados, evidencia-se a efetividade dos sistemas de autocontrole implantados, como foi demonstrado por SCHWACH (2007), que, ao comparar dados microbiológicos em estabelecimento de abate de bovinos, antes e após a implantação do sistema de verificação dos programas de autocontrole, conforme exigência do MAPA (BRASIL, 2005b,c), observou uma redução na ocorrência de *E. coli* genérica na superfície das carcaças, passando de aproximadamente 63% para 21%.

Os resultados obtidos apontam ainda para a necessidade do estabelecimento de um banco de dados nacional que possibilite caracterizar a situação brasileira acerca da ocorrência de *E. coli* genérica nas indústrias de abate, a fim de subsidiar futuras ações governamentais de melhoria para os sistemas de verificação e monitoramento dos processos e, consequentemente, dos programas de autocontrole por parte das empresas.

## CONCLUSÃO

A ocorrência de *E. coli* genérica está em conformidade com os padrões internacionais, indicando que o estabelecimento mantém seus processos de abate sob controle, apesar das variações observadas entre os meses do ano e os turnos de trabalho. Assim, a determinação anual da ocorrência de *E. coli* genérica em cada estabelecimento e o conhecimento dos fatores que possam alterá-la, aliada a um parâmetro de ocorrência nacional para a bactéria, propiciará a correta interpretação dos resultados microbiológicos e tomada de decisões para medidas corretivas e preventivas de controle.

## REFERÊNCIAS

AUSTRALIAN QUARANTINE AND INSPECTION SERVICE AQIS. *AQIS Notice Meat*: 2000/09. 2000. Acesso em: 18 ago. 2011. Online. Disponível em: <[http://www.daff.gov.au/\\_data/assets/pdf\\_file/0005/113918/2000\\_09.pdf](http://www.daff.gov.au/_data/assets/pdf_file/0005/113918/2000_09.pdf)>.

\_\_\_\_\_. *AQIS Notice Meat 2003/6*. 2003. Acesso em: 18 ago. 2011. Online. Disponível em: <[http://www.daff.gov.au/\\_data/assets/pdf\\_file/0003/113970/2003\\_06.pdf](http://www.daff.gov.au/_data/assets/pdf_file/0003/113970/2003_06.pdf)>.

BARROS, M.F.A. et al. Identification of main contamination points by hygiene indicator microorganisms in beef processing plants. *Ciência e Tecnologia de Alimentos*, v.27, n.4, p.856-862, 2007. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S0101-20612007000400028>>. Acesso em: 9 set. 2011. doi: 10.1590/S0101-20612007000400028.

BELL, R.G. Distribution and sources of microbial contamination on beef carcasses. *Journal of Applied Microbiology*, v.82, p.292-300, 1997. Disponível em: <[http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2672.1997.00356.x](http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2672.1997.00356.x/pdf)>. Acesso em: 16 set. 2011. doi: 10.1046/j.1365-2672.1997.00356.x.

BORCH, E.; ARINDER, P. Bacteriological safety issues in beef and ready-to-eat meat products, as well as control measures. *Meat Science*, v.62, n.3, p.381-390, 2002. Disponível em: <[http://dx.doi.org/10.1016/S0309-1740\(02\)00125-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0309-1740(02)00125-0)>. Acesso em: 8 set. 2011. doi: 10.1016/S0309-1740(02)00125-0.

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. *Circular n.245/96/DCI/DIPOA*, de 25 de novembro de 1996. Dispõe sobre a exportação de carnes e produtos cárneos para os EUA. Brasília, DF, 25 nov. 1996.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. Circular n.273/97/DIPOA, de 22 de dezembro de 1997. Dispõe sobre a exportação de produtos à base de carne para os EUA. Brasília, DF, 22 dez. 1997.

\_\_\_\_\_. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa n.40, de 12 de dezembro de 2005. Aprova métodos analíticos para análises microbiológicas de produtos de origem animal. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 16 dez. 2005a. Seção 1.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. Circular n.175/2005/CGPE/DIPOA, de 16 de maio de 2005. Dispõe sobre procedimentos de verificação dos programas de autocontrole. Brasília, DF, 16 maio 2005b.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. Circular n.176/2005/CGPE/DIPOA, de 16 de maio de 2005. Dispõe sobre a modificação das instruções para a verificação de PPHO, e dá outras providências. Brasília, DF, 16 maio 2005c.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. Circular n.835/2006/CGPE/DIPOA, de 13 de novembro de 2006. Dispõe sobre testes microbiológicos em carcaças de bovinos. Brasília, DF, 13 nov. 2006.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. Portaria n.47, de 6 de março de 2008. Dispõe sobre credenciamento de laboratório oficial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 7 mar. 2008. Seção 1.

BRICHTA-HARHAY, D.M. et al. *Salmonella* and *Escherichia coli* O157:H7 contamination on hides and carcasses of cull cattle present for slaughter in United States: an evaluation of prevalence and bacterial loads by immunomagnetic separation and direct planting methods. **Applied and Environmental Microbiology**, v.74, n.20, p.6289-6297, 2008. Disponível em: <<http://aem.asm.org/content/74/20/6289.full.pdf+html>>. Acesso em: 9 set. 2011. doi: 10.1128/AEM.00700-08.

CALLAWAY, T.R. et al. Diet, *Escherichia coli* O157:H7, and cattle: a review after 10 years. **Current Issues in Molecular Biology**, v.11, p.67-80, 2009. Disponível em: <<http://www.horizonpress.com/cimb/v/v11/67.pdf>>. Acesso em: 7 nov. 2011.

CASELANI, K. **Avaliação dos controles microbiológicos e do programa de redução de patógenos no abate de bovinos**. 2010. 123f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, SP.

EBLEN, D.R. et al. Nationwide microbiological baseline data collected by sponge sampling during 1997 and 1998 for cattle, swine, turkeys, and geese. **Journal of Food Protection**, v.68, n.9, p.1848-1852, 2005. Disponível em: <<http://ddr.nal.usda.gov/bitstream/10113/40542/1/IND43742269.pdf>>. Acesso em: 18 ago. 2011.

HORWITZ, W.; LATIMER, G.W. (Eds.). **Official methods of analysis of AOAC international**. 18.ed. Gaithersburg: AOAC International, 2005. 3000p.

INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGRÁRIA (IMEA). **3º Levantamento das intenções de confinamento em 2010**. 2010. Acesso em: 01 dez. 2011. Online. Disponível em: <<http://www.imea.com.br/destaque.php>>.

\_\_\_\_\_. **3º Levantamento de confinamento em 2011**. Acesso em: 01 dez. 2011. Online. Disponível em: <<http://www.imea.com.br/destaque.php>>.

KIERMEIER, A. et al. Use of routine beef carcass *Escherichia coli* monitoring data to investigate the relationship between hygiene status of incoming stock and processing efficacy. **International Journal of Food Microbiology**, v.111, p.263-269, 2006. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2006.05.006>>. Acesso em: 13 set. 2011. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2006.05.006.

MATHER, A.E. et al. Factors associated with cross-contamination of hides of Scottish cattle by *Escherichia coli* O157. **Applied and Environmental Microbiology**, v.74, n.20, p.6313-6319, 2008. Disponível em: <<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2570309/pdf/0770-08.pdf>>. Acesso em: 08 maio, 2012. doi: 10.1128/AEM.00770-08.

RIGOBELLO, E.C. et al. Characterization of *Escherichia coli* isolated from carcasses of beef cattle during their processing at an abattoir in Brazil. **International Journal of Food Microbiology**, v.110, p.194-198, 2006. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2006.03.013>>. Acesso em: 9 ago. 2011. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2006.03.013.

SCHWACH, E. **Validação do sistema de monitoramento para redução da contaminação microbiiana em carcaças bovinas**. 2007. 53f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, SP.

SERRAINO, A. et al. Visual evaluation of cattle cleanliness and correlation to carcass microbial contamination during slaughtering. **Meat Science**, v.90, p.502-506, 2012. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2011.08.001>>. Acesso em: 07 maio, 2012. doi: 10.1016/j.meatsci.2011.08.001.

SUMNER, J. et al. Microbial contamination on beef and sheep carcasses in South Australia. **International Journal of Food Microbiology**, v.81, p.255-260, 2003. Disponível em: <[http://dx.doi.org/10.1016/S0168-1605\(02\)00220-9](http://dx.doi.org/10.1016/S0168-1605(02)00220-9)>. Acesso em: 27 set. 2011. doi: 10.1016/S0168-1605(02)00220-9.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA). Food Safety and Inspection Service. Pathogen Reduction; Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) Systems; Final Rule. **Federal Register**, Washington, DC, v.61, n.144, p.38805, 25 jul. 1996a.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. **Nationwide beef microbiological baseline data collection program**: cows and bulls – December 1993 – November 1994. 1996b. Acesso em: 29 ago. 2011. Online. Disponível em: <[http://www.fsis.usda.gov/Science/Baseline\\_Data/index.asp](http://www.fsis.usda.gov/Science/Baseline_Data/index.asp)>.

VAN DONKERSGOED, J. et al. Preslaughter hide status of cattle and the microbiology of carcasses. **Journal of Food Protection**, v.60, n.12, p.1502-1508, 1997. Disponível em: <<http://www.ingentaconnect.com/content/iafp/jfp/1997/00000060/00000012/art00006>>. Acesso em: 07 maio, 2012.