



Revista Colombiana de Gastroenterología

ISSN: 0120-9957

revistagastro@cable.net.co

Asociación Colombiana de

Gastroenterología

Colombia

Vallejos N., Álvaro; Maldonado C., Laura; Calvache V., Juan Camilo; Hernandez D., William; Torres R., Sandra; Diaz S., Dieric

Descripción del uso de medicamentos gastroprotectores en pacientes con polifarmacia
en una población colombiana, a partir de bases de datos transaccionales

Revista Colombiana de Gastroenterología, vol. 31, núm. 2, abril-junio, 2016, pp. 102-110

Asociación Colombiana de Gastroenterología

Bogotá, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337746646003>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Descripción del uso de medicamentos gastroprotectores en pacientes con polifarmacia en una población colombiana, a partir de bases de datos transaccionales

Descriptive Analysis of Transactional Database Date on the Use of Gastroprotective Drugs in Patients With Polypharmacy in a Colombian Population

Álvaro Vallejos N., MD, Msc,¹ Laura Maldonado C.,² Juan Camilo Calvache V., MD,³ William Hernandez D.,⁴ Sandra Torres R.,⁵ Dieric Diaz S., MD Esp.⁶

¹ Médico cirujano, Magíster en Farmacología, Magíster en Educación Médica y Especialista en Epidemiología. Miembro de la Asociación Colombiana de Farmacología y Vicepresidente de Servicios Clínicos de Mc21 Colombia SAS. Bogotá, Colombia.

² Química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia. Farmacéutica Clínica en Mc21 Colombia SAS. Bogotá, Colombia.

³ Médico Cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del grupo de investigación en Farmaceoepidemiología de Mc21 Colombia SAS. Bogotá, Colombia.

⁴ Químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia. Farmacéutico Clínico en Mc21 Colombia SAS. Bogotá, Colombia.

⁵ Química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, Master en Atención Farmacéutica, Candidata a Espacialidad en Epidemiología. Farmacéutica Clínica Senior en Mc21 Colombia SAS. Bogotá, Colombia.

⁶ Médico especialista en Epidemiología. Candidato a Magíster en Ciencias-Farmacología. Medico de Gestión Clínica de Medicamentos en Mc21 Colombia SAS. Bogotá, Colombia.

Declaración de presentación preliminar: este trabajo se presentó como poster en el pasado XV Congreso Colombiano de Farmacología y Terapéutica en Pereira, Colombia (14-16 Agosto de 2015), previo a la presente publicación.

.....
Fecha recibido: 24-09-15
Fecha aceptado: 18-04-16

Resumen

Objetivo: el objetivo de este estudio fue describir y analizar los patrones de prescripción de fármacos antiulcerosos, los factores asociados a su prescripción y su costo en pacientes ambulatorios polimedicados en un periodo de 6 meses, en una Entidad Promotora de Salud (EPS) colombiana a nivel nacional. **Metodología:** estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal, basado en registros electrónicos de prescripción de medicamentos ambulatorios de 2 458 447 afiliados. Se incluyeron pacientes con prescripción de 5 o más fármacos por mes y se excluyeron aquellos cuyos registros transaccionales no tenían información completa para su análisis. Se evaluó la asociación entre prescripción de fármacos antiulcerosos y factores que justifican su prescripción mediante los *odds ratio* (OR) calculados a partir de un modelo de regresión logística. **Resultados:** de 2 458 447 afiliados, 60 671 pacientes estuvieron polimedicados mensualmente; 40% tuvieron fármacos antiulcerosos y 70% fármacos gastrolesivos. De los gastroprotegidos, 47% fueron adultos mayores y 12% tuvieron asociado diagnóstico de riesgo gastrointestinal superior. Gastroprotección no justificada en 35% de los pacientes polimedicados, representando \$75 millones de pesos colombianos (COP) mensuales. No hubo asociación estadística entre la prescripción de antiulcerosos y factores que justifiquen su prescripción (OR: 1,13; IC 95%: 1,00-1,27). **Conclusión:** ante la falta de asociación entre la prescripción de fármacos antiulcerosos y los factores que la justifican, es probable que su prescripción se haya realizado por la polifarmacia *per se*. Se recomienda optimizar la gastroprotección y reservarla a pacientes con más de un gastrolesivo y riesgo gastrointestinal superior, estén estos polimedicados o no.

Palabras clave

Polifarmacia, antiulcerosos, inhibidores de la bomba de protones, antiinflamatorios no esteroideos, anciano.

Abstract

Objective: The objective of this study was to describe and analyze patterns of use of prescription ulcer drugs, factors associated with prescriptions by physicians, and costs for outpatients With polypharmacy at a Colombian healthcare promotion entity (EPS) over a six-month period. **Methodology:** This is a retrospective and descriptive cross-sectional study based on electronic records of drugs prescribed to 2,458,447 outpatient members. Patients who took five or more prescription drugs per month were included. Patient were excluded if their records in the transactional data were not complete enough for analysis. Associations between anti-ulcer drugs and factors justifying their prescription were evaluated by the odds ratio (OR) which was calculated from a logistic regression model. **Results:** Of the 2,458,447 affiliates of the EPS, on average 60,671 patients had polypharmacy each month: 40% used anti-ulcer drugs and 70% used gastro-damaging drugs. Of the gastroprotected patients, 47% were elderly and 12% had associated diagnoses of upper gastrointestinal risk. Gastroprotection was not justified in 35% of patients with polypharmacy. This represents 75 million Colombian pesos every month. There was no statistical association between prescription of anti-ulcer drugs and factors that justify their prescription (OR: 1.13; 95% CI: 1.00 to 1.27). **Conclusion:** Given the lack of association between prescription of anti-ulcer drugs and factors which justify such prescriptions, it is likely that prescriptions contribute to polypharmacy *per se*. We recommended optimizing gastroprotection by reserving it for patients with more than one gastrointestinal lesion and with upper gastrointestinal risks whether or not they have polypharmacy.

Keywords

Polypharmacy, antiulcer, proton-pump inhibitor, NSAIDs, elderly.

INTRODUCCIÓN

Más del 50% de los pacientes mayores de 65 años presentan 2 o más enfermedades crónicas (1); la cronicidad y multimorbilidad conducen a la polifarmacia, definida como el uso de 5 o más medicamentos simultáneamente (2), aumentando la probabilidad de consulta por reacciones adversas a medicamentos (RAM) en un 88%, incrementando costos para los pacientes y sistemas de salud (3,4). Los medicamentos frecuentemente asociados a la polifarmacia son aquellos que actúan a nivel gastrointestinal, psicótropico y cardiovascular (5); identificando dentro de los grupos farmacológicos más prescritos en pacientes crónicos: antihipertensivos (82,6%), antiulcerosos (73,8%), antitrombóticos (70,3%) y antinflamatorios no esteroideos (AINE) (36,5%) (6). En Corea, durante el año 2002, el 81,6% de los médicos internistas incluía antiulcerosos en sus prescripciones (7,8), la inclusión de estos son un predictor de polifarmacia (9).

En el año 2014, se aclaró que únicamente requieren gastroprotección los pacientes en tratamiento con más de un fármaco gastrolesivo y factores de riesgo como historia previa de morbilidad gastrointestinal superior, diabetes *mellitus* o hipertensión arterial, edad mayor o igual a 65 años, terapia concomitante con otros fármacos gastrolesivos, comorbilidad grave y/o tratamiento crónico a dosis máximas de fármacos gastrolesivos (10,11); lo cual indica que no todos los pacientes con fármacos gastrolesivos o con polifarmacia necesitan gastroprotección (12). Por ende, el objetivo de este estudio fue describir y analizar los patrones de prescripción de fármacos antiulcerosos, los factores asociados a su prescripción y su costo en pacientes ambulatorios polimedidos en un período de 6 meses, en una Entidad Promotora de Salud (EPS) colombiana a nivel nacional.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio observacional descriptivo retrospectivo de corte transversal sobre patrones de prescripción de fármacos antiulcerosos en pacientes polimedidos en una EPS con 2 458 447 afiliados al mes, en 420 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), de 136 municipios de Colombia, durante un período de 6 meses (septiembre 2014-febrero 2015), a partir de los registros electrónicos de prescripciones ambulatorias de la EPS. Se incluyeron los pacientes con prescripción de 5 o más fármacos al mes y se excluyeron aquellos cuyos registros transaccionales no tenían información completa para el análisis. Los registros electrónicos de prescripciones se obtuvieron a partir del *Pharmacy Benefit Management* (PBM) MC21 Colombia y a partir de

esta información se analizaron las variables demográficas (edad), clínicas (diagnóstico médico) y farmacológicas (medicamentos prescritos por mes, medicamentos antiulcerosos y gastrolesivos prescritos por mes y costo de estos) de los pacientes.

La edad de los pacientes se agrupó en 4 categorías (paciente pediátrico (0-12 años), paciente adulto joven (13-44 años), paciente adulto maduro (45-64 años) y paciente anciano (\geq 65 años); de acuerdo a lo establecido por el Grupo Nacional de Estadísticas en Salud de Medicare y Medicaid (13). El diagnóstico médico se agrupó en 5 categorías de acuerdo a los objetivos del estudio (patología gastrointestinal, que incluyó gastritis, duodenitis, esofagitis, úlceras gástrica, duodenal, péptica y gastroyeyunal, enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), varices esofágicas, gástricas y duodenales y cánceres del tracto gastrointestinal superior; patologías graves que incluyó septicemias, otros cánceres, hepatitis y otras hepatopatías, insuficiencia renal crónica y otras disfunciones renales, traumatismos graves y quemaduras graves; hipertensión arterial, diabetes *mellitus* y otros, para ello se utilizó la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su décima versión (CIE-10).

Los medicamentos antiulcerosos y gastrolesivos fueron agrupados por grupos farmacológicos de acuerdo al Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química (ATC) de OMS; los grupos farmacológicos seleccionados como antiulcerosos fueron: antiácidos (A02A), antagonistas H2 (A02BA), prostaglandinas (A02BB), inhibidores de la bomba de protones (IBP) (A02BC) y los protectores directos de la mucosa (A02BX); y los grupos farmacológicos seleccionados como gastrolesivos fueron: antinflamatorios no esteroideos (AINE) (M01A), antiagregantes plaquetarios (B01AC), anticoagulantes (B01AA, B01AB, B01AE, B01AF, B01AX), inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) (N06AB) y corticosteroides sistémicos (H02AB).

Se realizó un análisis descriptivo univariado y multivariado; se calcularon los coeficientes de correlación (Pearson y Phi) para medir la correlación existente entre la prescripción de antiulcerosos y los factores que justifican su prescripción; y los odds ratio (OR) mediante un modelo de regresión logística. La especificidad y sensibilidad del modelo se verificó mediante la curva ROC (área bajo la curva: 0,62, el modelo predijo el comportamiento real en un 62%). El análisis se realizó en el software estadístico R (14), la manipulación de variables tipo fecha se realizó con el paquete "lubridate" (15), los procesos de transformación, extracción y agregación mediante el paquete "sqldf" (16) y las pruebas de bondad de ajuste del modelo mediante el paquete "pROC" (17).

RESULTADOS

De 2 458 447 afiliados al mes, el 13% (321 184) recibió medicamentos y de estos el 18% (60 671) tenían polifarmacia; el 11% (6 644) contaba con prescripciones de 10 o más fármacos y 49 pacientes llegaron a tener de 20 a 30 fármacos prescritos en un mismo mes. El 31% de los pacientes polimedicanos (18 808) fueron ancianos, 35% (21 235) adultos maduros, 24% (14 561) adultos jóvenes y 10% (6 067) pacientes pediátricos. La mayoría de pacientes estaban entre los 50 y los 70 años (**Figura 1**). A nivel nacional, el índice de polifarmacia (IP) (pacientes con polifarmacia/pacientes que recibieron medicamentos \times 100) se incrementó, se pasó de un 16% en noviembre 2014 al 22% en febrero de 2015; en este mes, 22 de cada 100 pacientes que recibieron medicamentos tenían prescritos 5 o más fármacos y 3 de cada 100 pacientes tenían prescritos 10 o más principios activos en el mismo mes.

El 40% de los pacientes polimedicanos (23 738) recibieron antiulcerosos. Los IBP fueron los más utilizados (19 157), seguidos por los antiácidos (**Figura 2a**). Del total de pacientes gastroprotegidos, el 17% (4 060) tuvo prescrito antiulceroso de 2 o más grupos farmacológicos simultáneamente; la asociación más frecuente fue IBP con antiácidos en el 65% de los pacientes (1 644). Se observó la prescripción simultánea de IBP, antiácidos y sucralfato

en 156 pacientes (6%) y 17 pacientes tuvieron prescripciones de fármacos antiulcerosos de los 4 grupos farmacológicos simultáneamente (IBP, antiácidos, protectores de la mucosa y antagonistas H2) (**Tabla 1**). El 70% de los pacientes polimedicanos (42 461) tuvieron prescripción de al menos un fármaco gastrolesivo y el 17% (10 140) prescripción simultánea de 2 o más fármacos gastrolesivos en el mismo mes. El grupo farmacológico gastrolesivo más prescrito en los pacientes polimedicanos fueron los antiagregantes en el 52% (27 078), seguido por los glucocorticoïdes y los AINE (**Figura 2b**).

En promedio, por mes, 280 pacientes tuvieron prescripción de 4 fármacos gastrolesivos simultáneamente; 28 pacientes, 5 o más gastrolesivos; y un paciente de 77 años fue prescrito con 7 fármacos gastrolesivos a la vez (3 glucocorticoïdes, 2 AINE, 2 ISRS). Del total de pacientes polimedicanos gastroprotegidos, el 47% (11 157) fueron ancianos, 35% (8 308) adultos maduros, 13% (3 086) adultos jóvenes y 5% (1 187) pacientes pediátricos. El 12% (2 901) tuvieron asociado diagnósticos de riesgo gastrointestinal superior y 24% (5 788) no tuvieron diagnósticos que justificaran el uso de antiulcerosos (**Figura 3**). El 48% de los pacientes gastroprotegidos (11 182) no tuvieron gastrolesivos y en 13% (3 370) estuvo justificado el uso de antiulcerosos al estar en tratamiento con 2 o más gastrolesivos. El 88% de los pacientes con anticoagulantes (1 116),




Figura 1. Densidad poblacional de pacientes polimedicanos.




Figura 2. Porcentaje de uso por grupo farmacológico por mes en pacientes con polifarmacia. **a)** Fármacos antiulcerosos; **b)** Fármacos gastrolesivos. AINE: antinflamatorios no esteroideos; H2: receptor de histamina tipo 2; IBP: Inhibidores de la bomba de protones; ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.

el 35% con antiagregantes plaquetarios (8 420), el 17% con glucocorticoides (1 645), el 11% con ISRS (452) y el 10% con AINE (924) estuvieron gastroprotegidos.

De acuerdo a la información transaccional de los pacientes, y a los criterios preestablecidos para justificar la gastro-

protección (10,11), la gastroprotección no estuvo justificada en el 35% de los pacientes (8 364), lo cual representa aproximadamente \$75 millones de pesos colombianos (COP) mensuales en fármacos antiulcerosos no justificados; con el uso adecuado y justificado de estos en pacientes




Figura 3. Diagnósticos asociados a la prescripción de antiulcerosos en pacientes con polifarmacia. Comorbilidad grave: septicemia, cáncer, hepatitis, insuficiencia renal crónica, traumatismos y quemaduras graves; Diabetes: diabetes mellitus tipo 1 y 2; HTA: hipertensión arterial; Otros diagnósticos: otros diagnósticos que no justifican el uso de antiulcerosos; Riesgo GIS: gastritis, duodenitis, esofagitis, ulceras gástrica, duodenal, péptica y gastroyeyunal, enfermedad de reflujo gastroesofágico, varices esofágicas, gástricas y duodenales y cánceres del tracto gastrointestinal superior.

Tabla 1. Pacientes con polifarmacia en tratamiento simultáneo con 2 o más antiulcerosos por mes y riesgo con el uso

Pacientes con uso simultáneo de 2 grupos gastroprotectores							
Combinación de gastroprotectores	Riesgo con el uso	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15
IBP - antiácidos	Disminuye absorción IBP	1 891	2 619	2 643	2 926	2 820	2 966
IBP - protectores de la mucosa	Disminuye absorción IBP	380	343	312	364	303	390
IBP - antagonistas H2	-	306	268	252	295	279	206
Antagonistas H2 - antiácidos	Disminuye absorción AntiH2	181	262	270	306	263	277
Antagonistas H2 - protectores de la mucosa	Disminuye absorción AntiH2	48	40	36	31	33	44
Antiácidos - protectores de la mucosa	Disminuye eficacia antiácido	29	43	46	58	61	59
Total	2.835	3 575	3 559	3 980	3 759	3 942	3 649
Pacientes con uso simultáneo de 3 y 4 grupos gastroprotectores							
Combinación de gastroprotectores	Riesgo con el uso	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15
IBP - antagonistas H2 - antiácidos	Disminuye absorción IBP y antiH2	77	156	143	166	151	130
IBP - antiácidos - protectores de la mucosa	Disminuye absorción IBP y eficacia del antiácido	73	135	143	140	128	156
IBP - antagonistas H2 - protectores de la mucosa	Disminuye absorción IBP y antiH2	15	18	8	11	17	20
antagonistas H2 - antiácidos - protectores de la mucosa	Disminuye absorción antiH2 y eficacia del antiácido	7	10	7	8	6	9
antagonistas H2 - antiácidos - IBP - protectores de la mucosa	Disminuye absorción IBP y antiH2 y eficacia del antiácido (fallo terapéutico generalizado)	10	15	14	11	14	17
Total	182	334	315	336	316	332	313

H2: receptor de histamina tipo 2; IBP: Inhibidores de la bomba de protones.

con polifarmacia se obtendría un ahorro estimado de \$450 millones de pesos colombianos en 6 meses. El cálculo de los coeficientes de correlación de Pearson y de Phi no encontró ninguna correlación entre la prescripción de fármacos antiulcerosos y alguno de los factores que justifican su prescripción (edad ≥ 65 años, consumo de 2 o más gastrolesivos y/o diagnóstico de riesgo gastrointestinal), los coeficientes calculados estuvieron cercanos al 0, con una distancia menor al 30% de este. Los OR estimados confirmaron este resultado (**Tabla 2**), ningún factor por sí solo aumentó la probabilidad de prescripción de fármacos antiulcerosos en pacientes con polifarmacia, únicamente la presencia de 2 o más fármacos gastrolesivos en pacientes mayores o iguales a 65 años aumentó la probabilidad de prescripción de un fármaco antiulceroso en 1,2 veces (OR: 1,19; IC 95%: 1,13-1,24) y la presencia de 2 o más fármacos gastrolesivos en pacientes mayores o iguales a 65 años con diagnóstico de riesgo gastrointestinal superior aumentó la probabilidad de prescripción de un fármaco antiulceroso en 1,1 veces (OR: 1,13; IC 95%: 1,01-1,27).

DISCUSIÓN

Guthrie B. y colaboradores, entre 1995-2010 en el Reino Unido, revelaron que los pacientes con 5 a 9 medicamentos aumentaron de 9,7% a 16,3%, de 10 a 14 medicamentos de 1,5% a 4,7%, y mayor o igual a 15 medicamentos, de 0,2% a 1,1%¹⁸ cifras que coinciden con los IP en este estudio (18,9% para ≥ 5 fármacos; 2,1% ≥ 10 fármacos y 0,2% para ≥ 15 fármacos). Qato D y colaboradores, al igual que en el presente estudio, encontraron que el 30% de los pacientes polimedidos eran ≥ 65 años (19) y 1 de cada 5 fármacos usados en estos pacientes pueden ser inapropiados (20), adicional a esto, Eiras A. y colaboradores indican una pro-

babilidad 4 veces mayor de tener medicamentos inapropiados si el paciente tiene polifarmacia (21), trayendo consigo mayor riesgo de RAM (22); la población de éste estudio tiene una alta probabilidad de tener fármacos inapropiados al ser polimedidos entre los 50 y 70 años.

Guthrie B. y colaboradores evaluaron la asociación entre el número de medicamentos y la probabilidad de presentar interacciones farmacológicas serias (IFS); 80,8% pacientes con ≥ 15 medicamentos tuvo potenciales IFS (18). Otros estudios encontraron asociación entre la polifarmacia y riesgo de hospitalizaciones (2,23-25), sin obtener mayor tasa de supervivencia, en comparación de los pacientes con menor número de medicamentos (25); por lo tanto, los 49 pacientes de nuestro estudio con ≥ 20 medicamentos tuvieron alta probabilidad de IFS y hospitalización. El IP hallado por Eiras A (23,9%) (23) fue cercano al encontrado en este estudio (22,3%). Los antiulcerosos fueron prescritos en el 31,8% (23); a pesar del similar IP, nuestro estudio mostró mayor uso de antiulcerosos (40%). Los IBP fueron los más empleados, de acuerdo a lo mencionado en estudios que recomiendan al omeprazol como primera línea en profilaxis de úlcera inducida por fármacos (10) al reducir el riesgo en un 50% (11).

De resaltar la prescripción simultánea de ≥ 2 antiulcerosos; no hay guías ni estudios que recomiendan o justifiquen el uso profiláctico de varios medicamentos antiulcerosos al mismo tiempo; resulta debatible entonces, el tratamiento recibido por 300 pacientes polimedidos con prescripciones de ≥ 3 medicamentos antiulcerosos, tratamiento que si bien no conlleva un beneficio adicional al paciente, si trae consigo un mayor riesgo de IFS, cuyo desenlace puede ser RAM o fallos terapéuticos de otros fármacos (al modificar la absorción de otros fármacos aumentando el pH gástrico) (26), que conlleven a hospitalizaciones. Las interaccio-

Tabla 2. Asociación entre la prescripción de antiulcerosos y los factores que justifican su prescripción (edad ≥ 65 años, consumo de 2 o más gastrolesivos y la presencia de un diagnóstico de riesgo gastrointestinal superior)

Factores que justifican la gastroprotección	OR a	IC 95%	NS b
Edad ≥ 65 años	0,89	0,86-0,92	+++
Diagnóstico de riesgo GIS	0,98	0,90-1,07	+++
Prescripción de ≥ 2 gastrolesivos	0,88	0,85-0,91	
Edad ≥ 65 años y diagnóstico de riesgo GIS	0,34	0,31-0,38	+++
Edad ≥ 65 años y prescripción de ≥ 2 gastrolesivos	1,19	1,13-1,24	+++
Diagnóstico de riesgo GIS y prescripción de ≥ 2 gastrolesivos	0,98	0,88-1,10	+++
Edad ≥ 65 años, diagnóstico de riesgo GIS y prescripción de ≥ 2 gastrolesivos	1,13	1,01-1,27	+
Niveles de significancia (NS)			+++ = 0 ++ = 0,001 + = 0,01

a OR: odds Ratio

b NS: nivel de significancia, a menor nivel de significancia más veracidad del intervalo de confianza (IC)

GIS: gastrointestinal superior

nes que se producen por el uso de IBP o antiH₂ pueden persistir aun si se administran con tiempo de separación, debido al amplio tiempo de vida media de estos fármacos (ranitidina 6-8 h, omeprazol >72 h) (26). Además, el uso simultáneo de sucralfato con antiácidos que contienen aluminio debe usarse con precaución, debido a que este también contiene aluminio, lo cual incrementaría el potencial de toxicidad (27).

La gastroprotección reduce la morbitmortalidad por uso de AINE y ASA a largo plazo (28). Ibáñez L y colaboradores (29) reportan 14,5% de casos de hemorragia de vías digestivas altas (HVDA) con antiagregantes plaquetarios, con incidencia de 50,6 casos/millón/año para ácido acetil salicílico (ASA) a dosis bajas. La incidencia reportada de HVDA por AINE: 152 casos/millón/año (30), notoriamente mayor; en nuestro estudio estaban gastroprotegidos el 31% de los pacientes con antiagregantes y solo un 10% de los pacientes con AINE, lo cual evidencia una posible infrautilización, concordante con otros estudios donde se ha observado infrautilización de gastroprotección en pacientes con AINE (11,31). Solo 12% de pacientes con fármacos gastrolesivos tenían justificado el uso de antiulcerosos, de acuerdo a la información transaccional existente y los criterios pre establecidos para justificar la gastroprotección (10,11); esto puede llevar a suponer que pacientes que sí requieren gastroprotección no la reciben y pacientes que no la requieren la utilizan inadecuadamente.

El 24% de los pacientes polimedicados gastroprotegidos no tenían asociado diagnóstico que justificara el uso de fármacos gastroprotectores en su información transaccional y solo el 12% tenían registro del diagnóstico de patología gastrointestinal superior de base; porcentaje muy por debajo de los reportados en estudios epidemiológicos, los cuales muestran una prevalencia de enfermedad ácido-péptica del 41% y de reflujo gastroesofágico en el 23% de los pacientes (32,33). Este hallazgo puede estar asociado al registro inadecuado del diagnóstico por el médico prescriptor. Resulta evidente, entonces, que la calidad de los resultados del presente estudio depende de la calidad de los registros transaccionales. Por ende, puede estarse subestimando el número de pacientes con diagnósticos o antecedentes de patología gastrointestinal superior que justificasen el uso de gastroprotección debido a la ausencia del registro del mismo.

Santiestevea P. y colaboradores encontraron un porcentaje de gastroprotección inadecuada del 28,2% en pacientes con prescripción de AINE en Barcelona (34); resultados similares a los observados en el presente estudio donde se encontró un porcentaje de gastroprotección inadecuada del 35%; este resultado representa \$75 millones de pesos colombianos mensuales. No se encontró ninguna asocia-

ción importante entre la prescripción de gastroprotectores y alguno de los factores que justifican su prescripción, dejando abierta la posibilidad de que se estén prescribiendo antiulcerosos por la presencia de polifarmacia *per se* y no por los factores de riesgo a nivel gastrointestinal superior. Se recomienda entonces utilizar gastroprotección en pacientes con más de un gastrolesivo y con factores de riesgo gastrointestinal de base, independientemente de si son polimedicados o no.

Existen varias herramientas que apoyan la optimización de la medicación y la reducción de la prescripción; por ejemplo, los criterios STOPP y los criterios de Beers (35) en el marco del seguimiento farmacoterapéutico y las intervenciones farmacéuticas, las cuales han demostrado reducir el número medio de medicamentos prescritos en un 53% (RR: 0,47) mejorando los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes (36). La principal limitación del estudio es la calidad de la fuente de información; lo cual trae consigo una probabilidad de baja calidad en el registro del diagnóstico médico y ausencia de registro de antecedentes y patologías de base en pacientes crónicos, que conlleva a una subestimación de los pacientes que requerirían gastroprotección. Además, el desconocimiento de RAM o fallos terapéuticos presentados en la población de estudio, así como los desenlaces clínicos de los pacientes cuya gastroprotección no fue adecuada, bien sea por exceso o por defecto, son otras limitaciones del presente estudio. Sin embargo, los hallazgos aquí encontrados abren las puertas a futuras investigaciones que demuestren la asociación existente entre la polifarmacia y la gastroprotección, y exhiban las consecuencias de una gastroprotección inadecuada en la calidad de vida de los pacientes, los costos asistenciales, el impacto financiero en el sistema de salud, entre otros.

Agradecimientos

Agradecemos a MC21 Colombia por suministrar la información con la cual se realizó el presente estudio y a Camilo Yate, estadístico del departamento clínico, por el análisis aplicado a los datos, sus aportes y comentarios para la realización de este artículo.

Fuente de apoyo financiero

Tanto la financiación como las bases de datos transaccionales, de las cuales se obtuvo la información de esta investigación, fueron brindadas por MC21 Colombia SAS. Sin embargo, los autores han declarado que no existe conflicto de intereses personales o de financiamiento en la realización del presente trabajo.

REFERENCIAS

1. Hung WW, Ross JS, Boockvar KS, Siu AL. Recent trends in chronic disease, impairment and disability among older adults in the United States. *BMC Geriatr.* 2011;11:47.
2. Jokanovic N, Tan ECK, Dooley MJ, Kirkpatrick CM, Bell JS. Prevalence and factors associated with polypharmacy in long-term care facilities: a systematic review. *J Am Med Dir Assoc.* 2015;16(6):S35.e1-12.
3. Bourgeois FT, Shannon MW, Valim C, Mandl KD. Adverse drug events in the outpatient setting: an 11-year national analysis. *Pharmacoepidemiol Drug Saf.* 2010;19(9):901-10.
4. Hovstadius B, Petersson G. The impact of increasing polypharmacy on prescribed drug expenditure-a register-based study in Sweden 2005-2009. *Health Policy.* 2013;109(2):166-74.
5. Fulton MM, Allen ER. Polypharmacy in the elderly: a literature review. *J Am Acad Nurse Pract.* 2005;17(4):123-32.
6. Ramírez-Duque N, Rivas-Cobas C, Bernabeu-Wittel M, Ruiz-Cantero A, Murcia-Zaragoza J, Oliver M, et al. [Drug prescription profile in patients with advanced chronic diseases]. *Rev Esp Geriatr Gerontol.* 2014;49(6):255-9.
7. Cho HJ, Kim CB. Prescription behaviours of office-based doctors to standardized common cold patients in Korea. *Pharmacoepidemiol Drug Saf.* 2002;11(5):401-5.
8. Kim S. An analysis of effects by delisting non-ethical gastrointestinal drugs. In College of Public Health. Seoul National University: Seoul, 2008.
9. Cho E, Sukyeong K. Prescribing Superfluous Gastroprotective Agents: an Indicator of Polypharmacy. *Kor J Clin Pharm.* 2011;21(2):156-60.
10. Vallès Fernández R, Franzi Sisó A, Ferro Rivera J. Condiciones clínicas y terapéuticas que requiere gastroprotección. FMC. 2014;21(9):528-33.
11. Grupo de Trabajo del Sector Zaragoza I SALUD. Guía de Práctica Clínica de empleo de los inhibidores de la bomba de protones en la prevención de gastropatías secundarias a fármacos. Unidad docente de medicina familiar y comunitaria. Zaragoza. 2012.
12. Información Farmacoterapéutica de la Comarca. Inhibidores de la bomba de protones: ¿se puede vivir sin ellos? 2010; 18(3).
13. Martin AB, Lassman D, Washington B, Catlin A, Team NHEA, others. Growth in US health spending remained slow in 2010; health share of gross domestic product was unchanged from 2009. *Health Affairs.* 2012;31(1):208-19.
14. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R. 2015. <http://www.R-project.org/>.
15. Dates and Times Made Easy with lubridate | Grolemund | Journal of Statistical Software [Internet]. [citado 20 de mayo de 2016]. Recuperado a partir de: <https://www.jstatsoft.org/article/view/v040i03>
16. Grothendieck G. sqldf: Perform SQL Selects on R Data Frames [Internet]. 2014 [citado 20 de mayo de 2016]. Recuperado a partir de: <https://cran.r-project.org/web/packages/sqldf/index.html>
17. Robin X, Turck N, Hainard A, Tiberti N, Lisacek F, Sanchez J-C, et al. pROC: an open-source package for R and S+ to analyze and compare ROC curves. *BMC Bioinformatics.* 2011;12:77.
18. Guthrie B, Makubate B, Hernandez-Santiago V, Dreischulte T. The rising tide of polypharmacy and drug-drug interactions: population database analysis 1995-2010. *BMC Med.* 2015;13:74.
19. Qato DM, Alexander GC, Conti RM, Johnson M, Schumm P, Lindau ST. Use of prescription and over-the-counter medications and dietary supplements among older adults in the United States. *JAMA.* 2008;300(24):2867-78.
20. Roughead EE, Anderson B, Gilbert AL. Potentially inappropriate prescribing among Australian veterans and war widows/widowers. *Intern Med J.* 2007;37(6):402-5.
21. Eiras A, Teixeira MA, González-Montalvo JI, Castell M-V, Queipo R, Otero Á. Consumo de medicamentos en mayores de 65 años en Oporto (Portugal) y riesgo de prescripción de medicamentos potencialmente inapropiados. *Atención Primaria.* 2016;48(2):110-20.
22. Atkin PA, Veitch PC, Veitch EM, Ogle SJ. The epidemiology of serious adverse drug reactions among the elderly. *Drugs Aging.* 1999;14(2):141-52.
23. Cherubini A, Eusebi P, Dell'Aquila G, Landi F, Gasperini B, Bacuccoli R, et al. Predictors of hospitalization in Italian nursing home residents: the U.L.I.S.S.E. project. *J Am Med Dir Assoc.* 2012;13(1):84.e5-10.
24. Nguyen JK, Fouts MM, Kotabe SE, Lo E. Polypharmacy as a risk factor for adverse drug reactions in geriatric nursing home residents. *Am J Geriatr Pharmacother.* 2006;4(1):36-41.
25. Díez-Manglano J, Giménez-López M, Garcés-Horna V, Sevil-Puras M, Castellar-Otín E, González-García P, et al. Excessive polypharmacy and survival in polypathological patients. *Eur J Clin Pharmacol.* 2015;71(6):733-9.
26. De las Salas-Martínez RB, Villarreal-Cantillo E. Interacciones en el uso de antiácidos, protectores de la mucosa y antisecretores gástricos. *Salud Uninorte.* Barranquilla (Col.) 2013; 29 (3): 441-57.
27. Ritschel WA, Banerjee PS, Koch HP, Czejka M. Cimetidine-sucralfate drug interaction. *Methods Find Exp Clin Pharmacol.* 1984;6(5):261-3.
28. Rostom A, Dube C, Wells G, Tugwell P, Welch V, Jolicoeur E, et al. Prevention of NSAID-induced gastroduodenal ulcers. *Cochrane Database Syst Rev.* 2002;(4):CD002296.
29. Ibáñez L, Vidal X, Vendrell L, Moretti U, Laporte JR, Spanish-Italian Collaborative Group for the Epidemiology of Gastrointestinal Bleeding. Upper gastrointestinal bleeding associated with antiplatelet drugs. *Aliment Pharmacol Ther.* 2006;23(2):235-42.
30. Laporte J-R, Ibáñez L, Vidal X, Vendrell L, Leone R. Upper gastrointestinal bleeding associated with the use of NSAIDs: newer versus older agents. *Drug Saf.* 2004;27(6):411-20.
31. Rostom A, Wells G, Tugwell P, Welch V, Dube C, McGowan J. Prevention of NSAID-induced gastroduodenal ulcers. *Cochrane Database Syst Rev.* 2000;(4):CD002296.

32. Morini S, Zullo A, Oliveti D, Chiriatti A, Marmo R, Chiuri DAE, et al. A very high rate of inappropriate use of gastroprotection for nonsteroidal anti-inflammatory drug therapy in primary care: a cross-sectional study. *J Clin Gastroenterol*. 2011;45(9):780-4.
33. Verdejo-Bravo C, Calleja-Panero JL, Guillén-Llera F, Ribera-Casado JM. Estudio epidemiológico sobre la enfermedad ácido-péptica en pacientes ancianos ambulatorios. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2006;41(1):21-8.
34. Del Piano M, Bianco MA, Cipolletta L, Zambelli A, Chilovi F, Di Matteo G, et al. The «Prometeo» study: online collection of clinical data and outcome of Italian patients with acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. *J Clin Gastroenterol*. 2013;47(4):e33-37.
35. Carrillo Santiesteve P, Amado Guirado E, de la Fuente Cadenas JA, Pujol Ribera E, Tajada C, Calvet S, et al. [Prescribing non-steroidal antiinflammatory drugs and gastrointestinal protection in primary care]. *Aten Primaria*. 2008;40(11):559-64.
36. Wilcock M, Hughes P. GP perceptions of medicines optimisation principles. *Prescriber*. 2014;25(18):13-7.