

ECOLOGÍA APLICADA

Ecología Aplicada

ISSN: 1726-2216

ecolapl@lamolina.edu.pe

Universidad Nacional Agraria La Molina

Perú

Vilca Mallqui, Karina; Vergara Cobián, Clorinda
LOS ÁFIDOS (Hemiptera: Aphididae) EN EL CALLEJÓN DE HUAYLAS - ANCASH, PERÚ
Ecología Aplicada, vol. 10, núm. 2, agosto-diciembre, 2011, pp. 93-98

Universidad Nacional Agraria La Molina

Lima, Perú

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34122395006>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

 redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

LOS ÁFIDOS (Hemiptera: Aphididae) EN EL CALLEJÓN DE HUAYLAS – ANCASH, PERÚ

APHIDS (Hemiptera: Aphididae) AT THE CALLEJÓN DE HUAYLAS – ANCASH, PERÚ

Karina Vilca Mallqui¹ y Clorinda Vergara Cobián²

Resumen

Se colectaron áfidos en plantas cultivadas y malezas en el Callejón de Huaylas, Ancash. Se realizaron micropreparados y se determinaron 31 especies de áfidos ubicadas en 4 subfamilias y 5 tribus. Se estableció 123 asociaciones áfido-planta, en 52 especies de plantas en 45 géneros de 19 familias. Se registran por primera vez en la localidad las siguientes 18 especies de áfidos: *Acyrtosiphon kondoi*, *Aphis cytisorum*, *A. fabae*, *A. helianthi*, *A. nerii*, *A. spiraecola*, *Brachycaudus schwartzii*, *Capitophorus elaeagni*, *Hyalopterus pruni*, *Metopolophium dirhodum*, *Myzus ornatus*, *Nasonovia ribisnigri*, *Rhopalosiphoninus latysiphon*, *Rhopalosiphum padi*, *Tuberolachnus salignus*, *Uroleucon ambrosiae*, *U. sonchi* y *Wahlgreniella nervata* y se cita por primera vez para el Perú a *Aphis helianthi* y *Aphis cytisorum*. Se confirmó el carácter polífago de *Aphis craccivora*, *A. gossypii*, *A. fabae*, *A. spiraecola*, *Brachycaudus helichrysi*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus ornatus*, *M. persicae*, *Uroleucon ambrosiae*. *Brevicoryne brassicae* mostró un amplio rango de hospederos. Se confirmó a *Aphis cytisorum* como el áfido que afecta a la retama en el Callejón de Huaylas, conjuntamente con *Aphis craccivora* y *A. fabae*, y la especificidad de *A. helianthi* para especies de la familia Asteraceae.

Palabras clave: áfidos, hospedantes, relación áfido – planta.

Abstract

Plant aphids were collected in different crop plants and weeds at the Callejón de Huaylas zone, Ancash, Perú. Micro slides were prepared for species determination, and 31 aphid species corresponding to 4 subfamilies and 5 tribes were identified. 123 aphid-plant relationships were established in 52 plant species from 45 genera and 19 families. The following 18 aphid species are registered for the first time in the Callejón de Huaylas: *Acyrtosiphon kondoi*, *Aphis cytisorum*, *A. fabae*, *A. helianthi*, *A. nerii*, *A. spiraecola*, *Brachycaudus schwartzii*, *Capitophorus elaeagni*, *Hyalopterus pruni*, *Metopolophium dirhodum*, *Myzus ornatus*, *Nasonovia ribisnigri*, *Rhopalosiphoninus latysiphon*, *Rhopalosiphum padi*, *Tuberolachnus salignus*, *Uroleucon ambrosiae*, *U. sonchi* y *Wahlgreniella nervata* and *Aphis helianthi* as well as *Aphis cytisorum* are registered for the first time in Peru. The oligophagous character of *Aphis craccivora*, *A. gossypii*, *A. fabae*, *A. spiraecola*, *Brachycaudus helichrysi*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus ornatus*, *M. persicae*, *Uroleucon ambrosiae* was confirmed. *Brevicoryne brassicae* showed a wide host range. *Aphis cytisorum* was confirmed as the aphid affecting the retama plant at the Callejón de Huaylas, together with *Aphis craccivora* y *A. fabae* as well as the specificity of *A. helianthi* for plant species of the Asteraceae family.

Key words: aphid, hosts, aphid – plant relationships.

Introducción.

El Callejón de Huaylas, que comprende territorios de las provincias de Huaraz, Yungay, Carhuaz y Huaylas, es una de las zonas agrícolas más importantes de la región Ancash y de la sierra peruana, donde se producen diferentes cultivos como maíz, papa, cebada, trigo; frutales como manzano, durazno y palto, cuyos productos son destinados al autoconsumo, los mercados locales y a las grandes ciudades como Huaraz y Lima, y flores que son

exportadas a diferentes países (Ministerio de Agricultura, 2007).

Los miembros de la familia Aphididae (Insecta: Hemíptera), conocidos como pulgones o áfidos, son insectos de amplia distribución geográfica, principalmente en las regiones templadas; infestan toda clase de vegetales y muchas especies son de gran importancia agrícola, por los daños directos que causan durante su alimentación (Klingauf, 1987; Quisenberry & Xinzhi, 2007) y especialmente por constituir el grupo de insectos más importante en la

LOS AFIDOS EN EL CALLEJÓN DE HUAYLAS – ANCASH, PERÚ

Agosto - Diciembre 2011

transmisión de virus fitopatógenos (Katis *et al.*, 2007), varios de los cuales son importantes en el Perú y específicamente en la región Ancash (Fribourg, 2007).

En el Callejón de Huaylas se han realizado muy pocos estudios sobre la ocurrencia de especies de áfidos que se encuentran afectando la vegetación de esta zona (Ortiz *et al.*, 1981; Vilca & Reyes, 1999), por lo tanto, no se cuenta con un registro de las especies de áfidos en los cultivos de esta zona; conocimiento que serviría de base para desarrollar estrategias de manejo integrado de estas plagas y, por consiguiente, de las enfermedades virósicas transmitidas por estas especies.

El presente estudio se realizó con el objetivo de contribuir en la determinación de especies de la familia Aphididae del Callejón de Huaylas, elaborando una clave dicotómica para la identificación de las especies encontradas.

Materiales y métodos.

El área de trabajo de la presente investigación abarcó la zona del Callejón de Huaylas, comprendida entre las localidades de Mato, en la provincia de Huaylas, provincias de Carhuaz y Yungay, hasta Olleros en la provincia de Huaraz; ubicada entre los paralelos 9° 00' y 10° 00' de latitud sur y entre los meridianos 77° 30' y 78° 00' de longitud oeste.

Para la colecta se procedió de acuerdo a Eastop & Van Emden (1972) y Sánchez & Vergara (2002). Se visitaron campos en toda la zona y se evaluó la presencia de áfidos en plantas en diferentes estados de desarrollo. Se tomaron muestras constituidas por los órganos afectados por colonias de áfidos, colocándolas en bolsas de papel kraft y luego se identificaron con los siguientes datos: lugar, fecha, altitud, hospedero, entre otros, y se colocaron en frascos de vidrio con alcohol al 70%. Otra parte de las muestras se colectaron directamente en alcohol al 70%.

Para el montaje de los áfidos se ajustaron las metodologías descritas por Eastop y Van Emden (1972), Heikinheimo (1988), Remaudière (1992) y Voegtlín *et al.* (2003), al siguiente procedimiento, que mostró ser eficiente para el tratamiento de los especímenes colectados: Se seleccionaron adultos alados y ápteros, se les hizo una punción en el primer ventrilo y se colocaron en un tubo de ensayo con alcohol al 70%, en baño maría por 2 a 3 minutos, luego se pasaron a KOH al 10% en baño maría por 2 a 5 minutos. Pasado el tiempo se transfirieron a agua destilada por 2 horas, luego se cambió el agua, dejándolos en ella por 12 horas. Se transfirieron y dejaron en cloralfenol por 24 horas. Los especímenes así tratados fueron colocados en alcohol al 95% por 2 a 3 minutos. Se decantó del alcohol y pasaron a ácido acético glacial por 5 minutos, para luego colocarlos en alcohol 95% por 2 a 3 minutos, transfiriéndose a eugenol (aceite de clavo) por 10 minutos. Se procedió al montaje sobre lámina portaobjeto en bálsamo de

Canadá, cubriendo con un cubreobjetos. Cada lámina así preparada se le colocó una etiqueta con su código de identificación y se llevó a una estufa por cinco días para el secado correspondiente.

La determinación de especies se realizó en el Laboratorio de Entomología de la Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, mediante el examen de los especímenes aclarados y montados, siguiendo las claves taxonómicas y descripciones de Blackman & Eastop (1984, 1994, 2006 y 2007), Cermeli (1984), Holman (1974), Heie (1980, 1982 y 1986), Pike *et al.* (2003); Voegtlín *et al.* (2003). Determinadas las especies, se procedió a la identificación de la lámina y se tomaron fotografías de los áfidos y sus estructuras más características. La colección de láminas micropreparados de las especies de áfidos se depositó en el Museo de Entomología "Klaus Raven Büsser" de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Resultados.

Especies de áfidos presentes en el callejón de Huaylas.

De las 269 muestras, se determinaron 31 especies de áfidos, en 55 especies de plantas, pertenecientes a 45 géneros y 19 familias. En algunas especies de plantas se determinaron dos y hasta tres especies diferentes de áfidos.

Los áfidos determinados, pertenecen a 4 subfamilias, 5 tribus y 19 géneros, de acuerdo a la clasificación de Remaudière & Remaudière (1997). De ellos, 16 géneros y 28 especies en la subfamilia Aphidinae, 4 géneros y 11 especies en la tribu Aphidiini y, 12 géneros y 17 especies en la tribu Macrosiphini; en la subfamilia Phemphiginae, en la tribu Eriosomatini 1 género y 1 especie; en la subfamilia Myzocallidinae, en la tribu Myzocallidini 1 género y 1 especie y en la subfamilia Lachninae en la tribu Lachnini 1 género y 1 especie. Se presenta la relación de áfidos determinados, sinonimia, hospederos y lugares donde fueron encontrados, considerando la localidad y provincia.

SUBFAMILIA APHIDINAE

***Aphis craccivora* Koch 1854**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz; Yungay y Huaylas. *Vicia faba* "haba", *Medicago sativa* "alfalfa", *Persea americana* "palto", *Spartium junceum* "retama", *Gladiolus* sp "gladiolo", *Piper angustifolium* "matico", *Phaseolus* sp.

En retama estuvo asociado a *A. cytisorum* y *A. fabae*. Citada para el Callejón de Huaylas por Vilca & Reyes (1999), sobre palto. En el Perú ha sido registrado por Alata (1973), Valencia & Cárdenas (1973), Valencia *et al.* (1975), Ortiz (1980), Da Silva *et al.* (1980), Nuñez (1993), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005) en diversos hospederos.

***Aphis cytisorum* Hartig 1841**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz; Yungay y Huaylas. *Spartium junceum* “retama”

A cytisorum fue encontrado como monófago en retama, tal como lo establecen Heie (1986), Blackman & Eastop (2006) y Holman (2009).

***Aphis fabae* Scopoli 1763**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz y Huaylas. *Tagetes minuta* “huacatay”, *Solanum tuberosum* “papa”, *Vicia faba* “haba”, *Spartium junceum* “retama”, *Nicotiana tabacum* “tabaco silvestre”.

En el Perú ha sido citado por Alata (1973), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005) en diversos hospederos.

***Aphis gossypii* Glover 1877**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz y Yungay. *Tagetes eliptica* “chincho”, *Persea americana* “palto”, *Cyphomandra betacea* “sachatomate”, *Malus domestica* “manzano”, *Hibiscus rosa-sinensis* “cucarda”, *Rosa* sp. “rosa”.

Fue registrada para el Callejón de Huaylas por Vilca & Reyes (1999). Citada para el Perú por Wille (1943), Alata (1973), Valencia & Cárdenas (1973), Valencia et al. (1975), Ortiz (1980), Da Silva et al. (1980), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005) en diversos hospederos.

***Aphis helianthi* Monell 1879**

Distribución y Hospederos: Huaraz. *Tagetes eliptica* “chincho”, *Helianthus annuus* “girasol”.

Fue encontrado en girasol y chincho, demostrando su especificidad para especies de la familia Asteraceae.

***Aphis nerii* Boyer de Fonscolombe 1841**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz; Yungay y Huaylas. *Euphorbia* sp. “lechera”.

En el Perú ha sido citada por Alata (1973), Valencia & Cárdenas (1973), Ortiz (1980), Da Silva et al. (1980) y Delfino (2005), en especies de las familias Asclepiadaceae y Euphorbiaceae.

***Aphis spiraecola* Patch 1914**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz; Yungay y Huaylas. *Citrus limetta* “lima”; *Malus domestica* “manzano”; *Citrus jambhiri* “limón rugoso”; *Cydonia oblonga* “membrillo”; *Schifflera* sp. “chiflera”; *Citrus sinensis* “naranjo” *Ipomoea* sp.; *Hibiscus rosa-sinensis* “cucarda”; *Persea americana* “palto”.

En el Perú ha sido citada por Alata (1973), Valencia & Cárdenas (1973), Valencia et al. (1975), Ortiz (1980), Da Silva et al. (1980), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005), en diversos hospederos.

***Hyalopterus pruni* (Geoffroy 1762)**

Distribución y Hospederos: Yungay y Huaylas. *Phragmites australis* “carrizo”.

En el Perú ha sido citado por Valencia & Cárdenas (1973), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005), sobre carrizo y tabaco silvestre.

***Rhopalosiphum maidis* (Fitch 1856)**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz; Yungay y Huaylas. *Zea mays* “maíz”; *Hordeum vulgare* “cebada”.

En el caso del maíz, se encontró junto con *R. padi*. Esta especie fue registrada para el Callejón de Huaylas por Vilca & Reyes (1999), sobre maíz. En el Perú es mencionada por Alata (1973), Ortiz (1980), Da Silva et al. (1980), Ortiz et al. (1981), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005), en diversas especies de poaceas y por Valencia & Cárdenas (1973), en tabaco silvestre.

***Rhopalosiphum padi* (Linnaeus 1758)**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz; Yungay y Huaylas. *Zea mays* “maíz”; *Prunus persica* “duraznero”.

En el caso del maíz, se encontró junto con *R. maidis*. Citada para el Perú por Valencia & Cárdenas (1973), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005) en varias especies de poaceas y *Asclepias curassavica* de la familia Asclepiadaceae.

***Toxoptera citricidus* (Kirkaldy 1907)**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz; Yungay y Huaylas. *Citrus sinensis* “naranjo”; *Citrus limetta* “lima” y *Citrus jambhiri* “limón rugoso”.

Fue registrada para el Callejón de Huaylas por Vilca & Reyes (1999). Alata (1973), Valencia & Cárdenas (1973), Ortiz (1980), Da Silva et al. (1980), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005) la citan para el Perú, en diversas especies de la familia Rutaceae, especialmente del género *Citrus*.

***Acyrthosiphon kondoi* Shinji 1938**

Distribución y Hospederos: Carhuaz. *Medicago sativa* “alfalfa”.

En el Perú fue citada por Ortiz & Raven (1990), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005).

***Acyrthosiphon pisum* (Harris 1776)**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz y Yungay. *Medicago sativa* “alfalfa”; *Pisum sativum* “arveja”.

Para el Callejón de Huaylas fue citada por Vilca & Reyes (1999). Citada para el Perú por Alata (1973), Valencia et al. (1975), Da Silva et al. (1980), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005) sobre diversas especies de Fabaceae.

***Brachycaudus helichrysi* (Kaltenbach 1843)**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Yungay y Huaylas. *Solanum tuberosum* “papa”; *Zea mays* “maíz”; *Prunus persica* “duraznero”; *Rosa* sp. “rosal”; *Helianthus annuus* “girasol”.

Fue registrada para el Callejón de Huaylas por Vilca & Reyes (1999). En el Perú fue citada por Alata (1973), Valencia et al. (1975), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005) en diversos hospederos.

***Brachycaudus schwartzi* (Börner 1931)**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz; Yungay y Huaylas. *Solanum tuberosum* “papa”; *Prunus persica* “duraznero” y *Medicago sativa* “alfalfa”.

LOS AFIDOS EN EL CALLEJÓN DE HUAYLAS – ANCASH, PERÚ
Agosto - Diciembre 2011

En el Perú ha sido registrada por Díaz & Lozada (2007) en duraznero.

***Brevicoryne brassicae* Linnaeus 1758**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz; Yungay y Huaylas. *Medicago sativa* “alfalfa”; *Pisum sativum* “arveja”; *Solanum tuberosum* “papa” *Tagetes eliptica* “chincho”; *Brassica oleracea* “repollo”; *Brassica oleracea* var. *botrytis* “coliflor”; *Brassica rapa* “nabo”; *Lactuca sativa* “lechuga”; *Nicotiana tabacum* “tabaco silvestre”.

Esta especie fue registrada por Vilca & Reyes (1999) para el Callejón de Huaylas sobre repollo. En el Perú ha sido citada por Wille (1943), Alata (1973), Valencia & Cárdenas (1973), Valencia *et al.* (1975), Da Silva *et al.* (1980), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005) en diversos hospederos.

***Capitophorus elaeagni* (Del Guercio 1894)**

Distribución y Hospederos: Carhuaz y Huaylas. *Rosa* sp. “rosa”; *Cynara scolymus* “alcachofa” y *Bouganvillea spectabilis* “buganvilia”.

En el Perú ha sido mencionada por Alata (1973), Valencia *et al.* (1975) y Delfino (2005), en alcachofa.

***Macrosiphum euphorbiae* (Thomas 1878)**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz; Yungay y Huaylas. *Zea mays* “maíz”; *Rumex crispus* “lengua de vaca”; *Solanum tuberosum* “papa”; *Medicago sativa* “alfalfa” *Triticum aestivum* “trigo”; *Malva sylvestris* “malva”; *Pisum sativum* “arveja”; *Tagetes minuta* “huacatay”; *Rosa* sp. “rosal”; *Ruta graveolens* “ruda”; *Prunus persica* “duraznero”; *Lactuca sativa* “lechuga”; *Dahlia* sp. “dalia”; *Hibiscus rosa-sinensis* “cucarda”; *Cynara scolymus* “alcachofa”; *Phaseolus vulgaris* “frijol”; *Bouganvillea spectabilis* “buganvilia”; *Physalis* sp. e *Ipomoea* sp.

Esta especie fue citada por Vilca & Reyes (1999) para el Callejón de Huaylas en repollo. Alata (1973), Valencia & Cárdenas (1973), Valencia *et al.* (1975), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005), lo mencionan para el Perú en diversos hospederos.

***Macrosiphum rosae* (Linnaeus 1758)**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz y Huaylas. *Rosa* sp. “rosal”.

Esta especie fue mencionada por Vilca & Reyes (1999) para el Callejón de Huaylas en rosal. Citada para el Perú por Alata (1973), Valencia *et al.* (1975), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005) en *Rosa* spp.

***Metopolophium dirhodum* (Walker 1849)**

Distribución y Hospederos: Huaraz. *Hordeum vulgare* “cebada”.

Fue citada para el Perú por Alata (1973), Valencia *et al.* (1975), Ortiz *et al.* (1981), Da Silva *et al.* (1980), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005) en diversas especies de gramíneas.

***Myzus ornatus* Laing 1932**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz y Yungay. *Solanum tuberosum* “papa”; *Viola tricolor* “pensamiento”; *Capsicum pubescens* “rocoto”;

Bouganvillea spectabilis “buganvilia”; *Piper angustifolium* “mático”; *Plantago major* “llantén”.

Para el Perú fue mencionada por Alata (1973), Valencia *et al.* (1975), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005), sobre diversos hospederos.

***Myzus persicae* (Sulzer 1776)**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz; Yungay y Huaylas. *Solanum tuberosum* “papa”; *Bidens pilosa* “amor seco”; *Schifflera* sp. “chifflera”; *Cyphomandra betacea* “sachatomate”; *Cynara scolymus* “alcachofa”; *Medicago sativa* “alfalfa”; *Lactuca sativa* “lechuga”; *Viola tricolor* “pensamiento”; *Persea americana* “palto”; *Prunus persica* “duraznero”; *Dahlia* sp. “dalia”; *Piper angustifolium* “mático”.

Esta especie fue citada por Vilca & Reyes (1999) para el Callejón de Huaylas. En el Perú ha sido registrado por Wille (1943), Alata (1973), Valencia & Cárdenas (1973), Valencia *et al.* (1975), Ortiz (1980), Da Silva *et al.* (1980), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005) en diversos hospederos.

***Nasonovia ribisnigri* (Mosley 1841)**

Distribución y Hospederos: Yungay. *Lactuca sativa* “lechuga”.

En el Perú fue citada por Valencia *et al.* (1975) y Delfino (2005).

***Rhopalosiphoninus latysiphon* (Davidson 1912)**

Distribución y Hospederos: Huaraz. *Solanum tuberosum* “papa”.

En el Perú ha sido citada por Ortiz (1973), Valencia *et al.* (1975) y Grados & Ortiz (2004), en diversos hospederos.

***Sitobion avenae* (Fabricius 1775)**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz; Yungay y Huaylas. *Triticum aestivum* “trigo”; *Hordeum vulgare* “cebada”; *Zea mays* “maíz”.

Fue citada para el Callejón de Huaylas por Vilca & Reyes (1999). En el Perú ha sido mencionada por Valencia *et al.* (1975), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005), sobre especies de Poaceae.

***Uroleucon ambrosiae* (Thomas 1878)**

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz; Yungay y Huaylas. *Rosa* sp. “rosal”; *Helianthus annuus* “girasol”; *Bidens pilosa* “amor seco”; *Chrysanthemum* sp. “crisantemo”; *Taraxacum* sp. “diente de león”; *Taraxacum officinale* “diente de león”; *Bellis perennis* “margarita”; *Bouganvillea spectabilis* “buganvilia”; *Aster* sp.

Citada para el Perú por Da Silva *et al.* (1980) y Delfino (2005) en diversos hospederos.

***Uroleucon sonchi* (Linnaeus 1767)**

Distribución y Hospederos: Huaraz. *Lactuca sativa* “lechuga”.

En el Perú ha sido citada por Valencia & Cárdenas (1973), Da Silva *et al.* (1980), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005) en especies de Asteraceae.

***Wahlgreniella nervata* (Gillette 1908)**

Distribución y Hospederos: Huaraz y Yungay. *Rosa* sp. “rosal”.

Escajadillo & Ortiz (1993) y Delfino (2005) la citaron para el Perú en rosal.

SUBFAMILIA PENPHIGINAE

Eriosoma lanigerum (Hausmann 1802)

Distribución y Hospederos: Huaraz y Carhuaz. *Malus domestica* “manzano”; *Pyrus communis* “peral”; *Cydonia oblonga* “membrillero”.

Fue citada para el Callejón de Huaylas por Vilca & Reyes (1999), en manzano. En el Perú ha sido mencionada por Wille (1943), Alata (1973), Valencia et al. (1975), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005) en el mismo hospedero.

SUBFAMILIA DREPHANOSIPHONINAE

Theroaphis trifolii (Monell 1882)

Distribución y Hospederos: Huaraz; Carhuaz y Yungay. *Medicago sativa* “alfalfa”.

Fue citada para el Callejón de Huaylas por Vilca & Reyes (1999) en alfalfa como *Theroaphis maculata*. En el Perú ha sido citada por Ortiz & Rubin de Celis (1992), Grados & Ortiz (2004) y Delfino (2005) en alfalfa.

SUBFAMILIA LACHNINAE

Tuberolachnus salignus (Gmelin 1790)

Distribución y Hospederos: Yungay. *Salix* sp. “sauce”.

Citada para el Perú por Alata (1973), Valencia et al. (1975) y Delfino (2005) en diversos hospederos.

Conclusiones.

- Las cuatro provincias del Callejón de Huaylas presentan una alta diversidad de áfidos: 26 especies en Huaraz, 23 en Carhuaz, 23 en Yungay y 18 en Huaylas.
- Se determinan 31 especies de áfidos ubicadas en 4 subfamilias y 5 tribus, en 52 especies de plantas, 19 familias botánicas, 45 géneros para el Callejón de Huaylas. Se establecen 123 asociaciones áfido-planta.
- Se registran por primera vez para el Callejón de Huaylas las siguientes 18 especies de áfidos: *Acyrthosiphon kondoi* Shinji 1938, *Aphis cytisorum* Hartig 1841, *Aphis fabae* Scopoli 1763, *Aphis helianthi* Monell 1879, *Aphis nerii* Boyer de Fonscolombe 1841, *Aphis spiraecola* Patch 1914, *Brachycaudus schwartzii* (Börner 1931), *Capitophorus elaeagni* (Del Guercio 1894), *Hyalopterus pruni* (Geoffroy 1762), *Metopolophium dirhodum* (Walker 1849), *Myzus ornatus* Laing 1932, *Nasonovia ribisnigri* (Mosley 1841), *Rhopalosiphoninus latysiphon* (Davidson 1912), *Rhopalosiphum padi* (Linnaeus 1758), *Tuberolachnus salignus* (Gmelin 1790), *Uroleucon ambrosiae* (Thomas 1878), *Uroleucon sonchi* (Linnaeus 1767) y *Wahlghreniella nervata* (Gillette 1908).

- Se cita por primera vez en el Perú a las especies *Aphis helianthi* y *Aphis cytisorum*.
- Se confirma a *Aphis cytisorum* como el áfido de la retama, y la especificidad de *A. helianthi* para especies de la familia Asteraceae.
- *Brevicoryne brassicae* tiene un amplio rango de hospederos, sobre 9 especies de plantas, 4 familias, 7 géneros.

La mayor diversidad de especies de áfidos se encuentra en plantas de las familias Asteraceae, Fabaceae, Solanaceae y Rosaceae.

Literatura citada.

- Alata J. 1973. Lista de insectos y otros animales dañinos a la agricultura en el Perú. Ministerio de Agricultura, Dirección General de Investigación Agraria. Lima.
- Blackman R.L. & Eastop V.F. 1984. Aphids on the world's Crops: An Identification Guide. John Wiley & Sons Ltd. Chichester, England.
- _____. 1994. Aphids on the world's Trees: An Identification Guide. CAB International and The Natural History Museum. London, U.K.
- _____. 2006. Aphids on the World's Herbaceous Plants and Shrubs. Vol I-II. John Wiley & Sons Ltd. Chichester.
- _____. 2007. Taxonomic issues. Pags: 1-29. In: Van Emden, H. F. and Harrington, R., Eds. Aphids as Crop Pests. CAB International. Wallingford.
- Carver M. 1999. *Uroleucon sonchi* (Linnaeus) (Hemiptera: Aphididae) in Australia. Australian Journal of Entomology. 38: 314-317.
- Cermeli M. 1984. Clave para la identificación de áfidos capturados en trampas en Venezuela. FONAIAP – Centro Nacional de investigaciones Agronómicas. Serie A Nº 2-02, Maracay. Venezuela.
- Da Silva T., Ortiz M. & Ojeda D. 1980. Aphididae (Homoptera) del departamento de Lambayeque. Rev. Per. Ent. 23(1): 121-123.
- Delfino M.A. 2005. Inventario de las relaciones áfido-planta en el Perú. Ecología Aplicada (Lima). 4 (1-2): 143-148.
- Díaz W. & Lozada P.W. 2007. Primer reporte de *Brachycaudus schwartzii* (Börner) (Hemiptera: Aphididae). Rev. Per. Biol. 14(2): 303.
- Eastop V.F. & Van Emden H.F. 1972. The insect material. Pp. 1-45. In: Emden, H.F. ed. Aphid technology. Academic Press. London.
- Escajadillo C. & Ortiz M. 1993. El áfido *Wahlghreniella nervata*, nuevo registro para el Perú y tres áfidos adicionales para Ica. Resumenes XXXV Convención Nacional de Entomología. Arequipa, Perú.: 42
- Fribourg C.E. 2007. Virus, viroides y mollicutes de las plantas cultivadas en el Perú. Servicio y Publicidad S.A.C. Lima.
- Grados J. & Ortiz M.S. 2004. Los áfidos (Homoptera: Aphididae) y sus hospederos en el monte ribereño del Río Rímac. Rev. Per. Ent. 44: 1-10.
- Heie O.E. 1980. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. I. General part. The families Mindaridae, Hormaphididae, Thelaxidae, Anoeciidae, and Pemphigidae. Fauna Entomologica Scandinavica. 9: 1-236.

LOS AFIDOS EN EL CALLEJÓN DE HUAYLAS – ANCASH, PERÚ
Agosto - Diciembre 2011

- _____. 1982. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. II. The family Drepanosiphidae. Fauna Entomologica Scandinavica. 11: 1-176.
- _____. 1986. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. III. Family Aphididae: subfamily Pterocommatine & tribe Aphidini of subfamily Aphidinae. Fauna Entomologica Scandinavica. 17: 314.
- Heikinheimo O. 1988. Mounting techniques, aphid collections. Pp. 31-44. In: Minks, A. K. and Harrewijn, eds. Aphids. Their biology, natural enemies and control. Vol B. Elsevier. Amsterdam.
- Holman J. 1974. Los áfidos de Cuba. Instituto Cubano del libro. La Habana.
- _____. 2009. Host Plant Catalog of Aphids. Palaearctic Region. Springer. 1216 p.
- Katis N.L., Tsitsipis J.A., Stevens, M. & Powell G. 2007. Transmission of plant viruses. Pags. 353-390. In: Van Emdem, H. F. and Harrington, R., Eds. 2007. Aphids as Crop Pests. CAB International. Wallingford.
- Klingauf F.A. 1987. Host plant finding and acceptance. Pp. 209-223. In: Minks, A. K. and Harrewijn, eds. Aphids. Their biology, natural enemies and control. Vol A. Elsevier. Amsterdam.
- Ministerio de Agricultura. 2007. Encuesta por muestreo (EPM). Resultados region Sierra 2006. Departamento: Ancash. Dirección General de Información Agraria.
- Nuñez E. 1993. Insectos del algarrobo (*Prosopis* sp.) en el Perú: Costa Norte (Piura) y Costa central (Ica). Rev. Per. Ent. 36: 69-83.
- Ortiz M. 1973. *Rophalosiphoninus latysiphon* (Davidson), un áfido de sifúnculos peculiares. Rev. Per. Ent. 16: 125-126.
- _____. 1980. Aphididae (Homoptera) procedentes de ceja de selva: Tingo María (Huánuco-Perú). Rev. Per. Ent. 23(1): 119-120.
- Ortiz M., Rodríguez A.C. & Sarmiento J. 1981. Los áfidos (Homoptera: Aphididae) de la cebada (*Hordeum vulgare* L.) en la sierra y costa centrales del Perú. Rev. Per. Ent. 24 (1): 133-136.
- Ortiz M. & Raven K.G. 1990. Ocho nuevos registros de Aphidiidae (Homoptera) para el Perú. Rev. Per. Ent. 33: 123-124.
- Ortiz M. & Rubín de Celis V. 1992. *Therioaphis trifolii* (Monell) (Homoptera: Aphididae), nuevo registro para el Perú. Rev. Per. Ent. 35: 51-52.
- Pike S.K., Boydston L.L. & Allison D.W. 2003. Aphids of Western North America North of Mexico. Washington State University.
- Quisenberry S.S. & Xinzhong N. 2007. Feeding injury. Pp. 331-352. In: Van Emdem, H. F. and Harrington, R., Eds. 2007. Aphids as Crop Pests. CAB International. Wallingford.
- Remaudière G. 1992. Une méthode simplifiée de montage des aphides et autres petits insectes dans le baumes du Canada. Rev. Fr. Ent. 14(4): 185-186.
- Remaudière G. & Remaudière M. 1997. Catalogue des Aphidiidae du Monde / Catalogue of the World's Aphidiidae. Homoptera Aphidoidea. INRA Editions. Versailles.
- Sánchez V.G. & Vergara C. 2002. Manual de Prácticas de Entomología Agrícola. Departamento de Entomología. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima- Perú.
- Valencia L. & Cárdenas N. 1973. Los áfidos (Homóptera: Aphididae) del valle de Ica, sus plantas hospederas y enemigos naturales. Rev. Per. Ent. 16(1): 6-14.
- Valencia L.V., Guerra C. & Gutierrez F. 1975. Los áfidos (Homóptera: Aphididae) del valle del Mantaro, sus plantas hospederas y enemigos naturales. Rev. Per. Ent. 18(1): 90-97.
- Vilca K. & Reyes E. 1999. Identificación de áfidos (Homoptera: aphidiidae) y sus parasitoídes en el Callejón de Huaylas, Ancash, Perú. Rev. Per. Ent. 41: 57-60.
- Voegtlin D., Villalobos W., Sánchez M.V., Saborío G. & Rivera C. 2003. Guía de los Afidos Alados de Costa Rica. Revista de Biología Tropical. Vol. 51 (2).
- Wille J. 1943. Entomología Agrícola del Perú. Junta de sanidad vegetal. Dirección de Agricultura, Ministerio de Agricultura. Lima, Perú.

¹ Universidad Nacional “Santiago Antunez de Mayolo”, Apartado Postal 75, Huaraz-Perú,
karinavilcamallqui@hotmail.com

² Universidad Nacional Agraria La Molina, Apartado Postal 456 Lima-Perú, cvc@lamolina.edu.pe