

ECOLOGÍA APLICADA

Ecología Aplicada

ISSN: 1726-2216

ecolapl@lamolina.edu.pe

Universidad Nacional Agraria La Molina

Perú

Giraudo, Liliana; Kufner, Maura; Torres, Ricardo; Tamburini, Daniela; Briguera, Verónica;
Gavier, Gregorio

Avifauna del bosque chaqueño oriental de la provincia de Córdoba, Argentina

Ecología Aplicada, vol. 5, núm. 1-2, diciembre, 2006, pp. 127-136

Universidad Nacional Agraria La Molina

Lima, Perú

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34150217>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

AVIFAUNA DEL BOSQUE CHAQUEÑO ORIENTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA

BIRD FAUNA OF THE ORIENTAL CHACO FOREST OF CÓRDOBA PROVINCE, ARGENTINA

Liliana Giraudo¹, Maura Kufner², Ricardo Torres¹, Daniela Tamburini², Verónica Briguera² y Gregorio Gavier¹

Resumen

El Chaco -hábitat reproductivo de aves migratorias- tiene mayor prioridad de conservación en Sudamérica. Su estacionalidad hídrica típica influye en la disponibilidad de recursos, así como en la composición y organización de avifauna. Sobre éstas inciden la fragmentación y reemplazo del bosque por expansión agrícola. Esta contribución proporciona la composición y riqueza de avifauna en remanentes del Chaco Oriental de Córdoba y realiza observaciones ecológicas sobre gremios tróficos, estatus de residencia y estado poblacional, a fin de interpretar su situación actual y promover su conservación. Dichos relictos se ubican entre la Reserva de Mar Chiquita y las Sierras del Norte, alternando con bosque secundario, parque y pastizales producidos por tala, y con parcelas cultivadas. Entre invierno de 2000 y otoño de 2002 se relevaron estacionalmente las aves en puntos fijos distribuidos al azar. Se detallaron: ubicación sistemática, nombre vulgar, estado poblacional, estatus de residencia y gremio trófico. Se hallaron un número elevado de especies (127) y entidades interesantes: amenazada (*Harpyhaliaetus coronatus*), en recuperación (*Ornithodoris canicollis*), acuáticas y “plagas agrícolas”, acorde con la variedad de fisionomías y condiciones ecosistémicas del área. Las especies permanentes fueron mayoría expresándose su adaptación al bosque en la diversidad alimentaria. Las alteraciones del hábitat provocaron un cambio de 24% de especies antiguas permanentes, a ocasionales. Las migrantes estivales –coherentemente con la disponibilidad de recursos- triplicaron las invernales. Del gremio insectívoro participaron especies permanentes, migrantes y ocasionales, acorde a provisión de insectos en bosque subtropical semiárido. La biodiversidad remanente de aves chaqueñas aconseja su conservación.

Palabras clave: Chaco, Bosque relictual, Avifauna, Composición, situación y características funcionales

Abstract

The Chaco -reproductive habitat of migratory birds- has a great conservation priority in South America. Its typical seasonality influences the availability of resources, and the composition and organization of avifauna. Fragmentation and substitution of the forest for agricultural expansions, impact on these characteristics. This contribution provides the composition and richness of avifauna in relicts of the Oriental Chaco of Córdoba, and carries out ecological observations on trophic guilds, residence and conservation status, in order to interpret its current situation and to promote conservation. These forest remnants located between the Reserve of Mar Chiquita and Sierras del Norte, alternate with secondary forest, park and grassland, and cultivated parcels. From the 2000 winter to the 2002 autumn birds were observed seasonally in fixed points distributed at random. Characteristics detailed were: systematic classification, common name, population state, residence status and trophic guild. A high number of species (127) and interesting entities were found, according with the variety of ecosystem physiognomies and conditions in the area: threatened species (*Harpyhaliaetus coronatus*), in recovery (*Ornithodoris canicollis*), aquatic birds and "agricultural plagues". Permanent or resident species were the majority and their adaptation to the forest was expressed in diverse alimentary categories. Habitat alterations influenced a change of 24% in old permanent to occasional species. The spring-summer migrants –according to seasonal resources- tripled the winter ones. Permanent, migrants and occasional species participated in the insectivorous guild, according to a good provision of insects in semi-arid subtropical forest. Remainder biodiversity and functions of avifauna recommend the conservation of the Chaco forest in Córdoba.

Key words: Chaco, Relict forest, Birds Composition, Situation and Functional Characteristics

Introducción

El Chaco se extiende en el S de Bolivia, W de Paraguay y el N de Argentina, con límite austral en el Norte de la provincia de Córdoba; es considerado una de las regiones con mayor prioridad de conservación en América del Sur (Beissinger *et al.*, 1996). Su vegetación dominante, el bosque xerófilo caducifolio, se extiende en llanuras y serranías bajas, también con diferentes biomas neotropicales: palmares, sabanas y estepas arbustivas (Cabrera & Willink, 1980). Florística y faunísticamente esta región posee características propias y pocos endemismos. Los bosques semiáridos chaqueños constituyen hábitat de reproducción de muchas aves migrantes neotropicales y neárticas (Codesido & Bilenca, 2004). A mediados del siglo pasado se citaban más de 200 especies de aves chaqueñas (Olrog, 1963), en una basta planicie boscosa sin barreras físicas para el flujo aviar (Short, 1975). La avifauna del Chaco está compuesta por ensambles de distintas especies (Brooks, 1997), muchas distribuidas fuera de la región.

En la actualidad el Chaco está muy alterado por la explotación forestal y rápidamente modificado por el avance de la frontera agrícola, especialmente de soja. Al reemplazarse el bosque nativo por cultivos o potreros, se simplifica la estructura del hábitat, influyendo en la diversidad de aves y la extinción local de especies (Morello & Matteucci, 1999; Albarece & Antelo, 2000).

No obstante, se considera que el conocimiento ecológico y funcional de los ambientes chaqueños es aún inconcluso y superficial (Chani *et al.*, 1998). Existen listas regionales como la de Short (1975) y la de Nores (1996) en Córdoba, que necesitan ser actualizadas. Asimismo, hay evidencia respecto a la marcada estacionalidad hídrica del Chaco y su influencia en la disponibilidad de recursos y en los gremios de aves, cuya variación -al menos desde el punto de vista trófico- se relacionaría con el ingreso estival de especies migrantes diferentes a las residentes (Capurro & Bucher, 1988; Codesido & Bilenca, 2004).

El objetivo de esta contribución es proporcionar la composición y riqueza específica de la avifauna hallada en remanentes de bosque del Chaco Oriental de Córdoba, Argentina, así como realizar observaciones de características ecológicas sobre gremios tróficos, estatus de residencia y estado poblacional. Ello, con el fin de mejorar la interpretación de su situación actual y destacar la importancia de conservar la biodiversidad chaqueña remanente.

Material y Método

Área de estudio. El área comprende relictos de bosque que se extienden entre la Reserva Bañados del Río Dulce-Laguna de Mar Chiquita y las Sierras del Norte.

Los dominantes fisonómicos son: *Aspidosperma quebracho-blanco*, *Celtis tala*, *Lithraea ternifolia*, *Schinopsis* sp., *Acacia* sp. *Prosopis* sp. y *Geoffroea decorticans*. Ésta y el cardón *Stetsonia coryne* forman bosquecillos en suelos salinos. Fragmentos del hábitat chaqueño alternan con la fisonomía de parque de *Schinopsis* sp. y pastizales producto de tala selectiva, así como con parcelas en distinto grado de modificación entre bosque secundario y cultivos (Cabido & Zak, 1999). Descripción detallada del área de estudio en Kufner *et al.* (2005).

La investigación se llevó a cabo en el interior de unidades homogéneas de bosque natural, seleccionadas en base a cartografía vegetal, resuelta a partir de la clasificación de una imagen Lansat (Zak & Cabido, 2002). Entre invierno de 2000 y otoño de 2002 se muestrearon las especies de aves en un total de 12 puntos fijos distribuidos al azar, separados entre sí por no menos de 200 m. Por estación, en cada punto, se realizaron 5 observaciones de 15 minutos cada una (Kufner *et al.*, 1998; Albarece & Antelo, 2000). En cada observación se registraron todas las especies vistas y oídas en un radio aproximado de 15 m. Se llevaron a cabo en total 8 muestreos, cada uno tuvo una duración de 3 días, extendiéndose desde el amanecer hasta las 11 horas y desde las 16 horas hasta el anochecer.

La lista de especies se elaboró considerando su ubicación sistemática actualizada, incluyendo el nombre vulgar más frecuente en Argentina (Mazar Barnett & Pearman, 2001; Narosky & Yzurieta, 2003). Siempre que fue posible se consignó el estado poblacional de las especies, siguiendo las categorías publicadas a nivel internacional (CI) y provincial (P), tomando las de Birdlife International (2006) y la de Miatello (1994), respectivamente.

Se analizó la presencia estacional de las especies en el área, asignándoles categorías o estatus de residencia (Codesido & Bilenca, 2004; Almazán-Núñez & Navarro, 2006), según se describe a continuación: Permanente (Per): especie registrada en las cuatro estaciones; Estacional: especie registrada únicamente en estación húmeda estival (septiembre-marzo) (Eest) o en estación seca invernal (Abril-Agosto) (Einv) y Ocasional (Oca): especie registrada sólo en una ocasión y/o en bajo número. Asimismo, se clasificaron las especies según la principal característica de su dieta en los siguientes gremios tróficos: O: Omnívoro, I: Insectívoro, G: Granívoro, C: Carnívoro, Ñ: Carroñero, F: Frugívoro, N: nectarívoro y H: Herbívoro (Sick, 1985; Leveau & Leveau, 2004).

Resultados

Se relevó un total de 127 especies de aves pertenecientes a 33 familias, reunidas en 16 órdenes. Las aves clasificadas según gremios tróficos

integraron alrededor del 49% de insectívoras, 16% de omnívoras (incluyendo a F-I), 16% de granívoras (incluyendo a G-F), 14% de carnívoras (incluyendo a C-Ñ-I), 3% de carroñeras, menos de 2% de nectarívoros- insectívoros y sólo un herbívoro (Tabla 1).

En cuanto a su estatus de residencia, correspondió el 46% a especies de presencia permanente, 27% a las ocasionales, 19% a las estacionales de período estival húmedo (Eest) y 6% a las de período invernal seco (Env). Del total, se identificaron 31 especies que cambiaron su estatus de permanente (Nores, 1996) a ocasional, principalmente. Además, la proporción de visitantes estivales triplicó a los invernales (Tabla 1).

Las especies insectívoras resultaron las mejor representadas en todas las categorías de residencia. Del gremio de insectívoros participaron tanto aves permanentes como ocasionales y migrantes y, en cada caso, con mayoría de integrantes. Por su parte, las aves de residencia permanente concentraron la mayor diversidad de categorías alimenticias (Tabla 1).

Lista comentada de las especies

Clase AVES

Orden RHEIFORMES

Familia **Rheidae**

Rhea americana Lynch Arribálzaga y Holmberg 1878. (ñandú).
Estación observada: otoño.
Estado poblacional: CI: amenazado. P: Vulnerable
Observaciones generales: Se registraron dos pequeños grupos únicamente en campos con perímetro alambrado.

Orden TINAMIFORMES

Familia **Tinamidae**

Crypturellus tataupa (Temmink) (tataupá común).
Estado poblacional: CI: preocupación menor.
Observaciones generales: Se identifica por su canto característico.
Más escuchado que visto.

Nothoprocta cinerascens (Burmeister) (inambú montaraz).
Estado poblacional: CI: preocupación menor. P: Marcado retroceso numérico.

Nothura maculosa Conover (inambú común).
Estación observada: verano, otoño e invierno
Estado poblacional: CI: preocupación menor

Eudromia elegans Olrog (martineta común).
Estación observada: primavera y otoño
Estado poblacional: CI: preocupación menor. P: Marcado retroceso numérico.

Orden CICONIIFORMES

Familia **Ardeidae**

Syrigma sibilatrix (Temmink) (chiflón).
Estación observada: otoño
Estado poblacional: CI: preocupación menor.
Observaciones generales: en relación con bañados próximos y pastizales, donde se alimenta.

Bubulcus ibis (Linnaeus) (garcita bueyera).

Estación observada: Primavera
Estado poblacional: CI: Preocupación menor
Observaciones generales: en relación con bañados próximos y pastizales, donde se alimenta.

Casmerodius albus = *Egretta alba* (Gmelin) (garza blanca).

Estación observada: Invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Observaciones generales: en relación con bañados próximos y pastizales, donde se alimenta.

Orden FALCONIFORMES

Familia **Cathartidae**

Coragyps atratus (Bechstein) (jote cabeza negra).

Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Observaciones generales: Integra el apéndice II de CITES

Cathartes aura (Molina) (jote cabeza colorada).

Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Observaciones generales: Integra el apéndice II de CITES

Cathartes burrovianus Pelzeln (jote cabeza amarilla).

Estación observada: primavera, verano

Estado poblacional: CI: Preocupación menor.

Observaciones generales: escaso registro en la provincia.

Mencionado en el sur de Mar Chiquita, en las Salinas Grandes (Torres & Michelutti, 2001). Integra el apéndice II de CITES.

Sarcoramphus papa (Linnaeus) (jote real).

Estación observada: otoño.

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Observaciones generales: Registros escasos en Córdoba. Integra el apéndice II de CITES.

Familia **Accipitridae**

Elanus leucurus (Vieillot) (milano blanco).

Estación observada: otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Observaciones generales: Integra el apéndice II de CITES.

Harpyhaliaetus coronatus (Vieillot) (águila coronada).

Estación observada: otoño, invierno, verano

Estado poblacional: CI: Vulnerable, En peligro; P: Marcado retroceso numérico

Observaciones generales: Integra el apéndice II de CITES

Buteo magnirostris (Slater & Salvin) (taguató común).

Estación observada: verano

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Buteo swainsoni Bonaparte (aguilucho langostero).

Estación observada: Otoño

Estado poblacional: CI: preocupación menor

Observaciones generales: Migrante en bandadas del Hemisferio Norte (Nores, 1996).

Buteo polysoma (Quoy & Gaimard) (aguilucho común).

Estación observada: Otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Familia **Falconidae**

Polyborus plancus (Miller) (carancho).

Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Observaciones generales: Integra el apéndice II de CITES

Polyborus chimango Vieillot (chimango).

Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Observaciones generales: Integra el apéndice II de CITES

Spizapteryx circumcinctus (Kaup) (halconcito gris).

Estación observada: Otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Observaciones generales: Integra el apéndice II de CITES

Falco femoralis Temmink (halcón plomizo).

Estación observada: Verano

Estado poblacional: CI: Preocupación menor. P: Marcado retroceso numérico

Observaciones generales: Integra el apéndice II de CITES

Falco sparverius Swainson (halconcito colorado).

Estación observada: Invierno

Estado poblacional: CI: preocupación menor

Observaciones generales: Integra el apéndice II de CITES

Orden GALLIFORMES

Familia **Cracidae**

Ortalis canicollis (Wagler) (charata).

Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor. P: Vulnerable

Observaciones generales: su presencia en los bosques al W de Mar Chiquita confirma la recuperación poblacional mencionada por

Nores (1996).

Orden GRUIFORMES

Familia **Cariamidae**

Chunga burmeisteri (Hartlaub) (chuña patas negras).

Estación observada: Primavera

Estado poblacional: CI: Preocupación menor. P: Marcado retroceso numérico

Orden CHARADRIIFORMES

Familia **Charadriidae**

Vanellus chilensis (Wagler) (tero común).

Estación observada: Primavera, verano, otoño

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Observaciones generales: relacionado con pastizales.

Orden COLUMBIFORMES

Familia **Columbidae**

Columba picazuro Temmink (paloma picazuró).

Estación observada: Primavera

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Columba maculosa Temmink (paloma manchada).

Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Zenaida auriculata (Reichenbach) (torcaza).

Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Observaciones generales: es la granívora con mayor número de individuos en este estudio. Considerada plaga agrícola a nivel provincial.

Columbina picui (Temmink) (torcacita común).

Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Leptotila verreauxi (Salvadori) (yerutí común).

Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Orden PSITTACIFORMES

Familia **Psittacidae**

Aratinga acuticaudata (Vieillot) (calancate común).

Estación observada: Verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Myiopsitta monachus (Jardine & Selby) (cotorra).

Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Observaciones generales: considerada plaga agrícola a nivel provincial.

Orden CUCULIFORMES

Familia **Cuculidae**

Coccyzus melacoryphus Vieillot (cuclillo canela).

Estación observada: Primavera, verano

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Tapera naevia (Vieillot) (crespín).

Estación observada: Primavera, verano

Estado poblacional: CI: P preocupación menor

Observaciones generales: Más escuchado que visto.

Crotophaga ani Linnaeus (anó chico).

Estación observada: verano

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Observaciones generales: su presencia puede variar localmente con los años (Nores, 1996).

Guira guira (Gmelin) (pirincho).

Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Orden STRIGIFORMES

Familia **Tytonidae**

Tyto alba (J. E. Gray) (lechuza del campanario).

Estación observada: Otoño, invierno.

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Familia **Strigidae**

Otus choliba (Vieillot) (alecuco común).

Estación observada: otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Glaucidium sp.

Estación observada: Otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Observaciones generales: Nores (1996) reconoce dos especies, *G. brasiliianum brasiliianum* (Gmelin) (caburé chico) y *G. nanum* (King) (caburé grande), ambos de difícil identificación por su similitud de apariencia y canto.

Athene cunicularia Olrog (lechucita de las vizcacheras).

Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor. P: Marcado retroceso numérico

Strix rufipes Cherrie & Reichenberger (lechuza bataraz)

Estación observada: verano

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Orden CAPRIMULGIFORMES

Familia **Caprimulgidae**

Podager nacunda Vieillot (ñacundá)

Estación observada: Primavera, verano

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Caprimulgus longirostris Olrog (atajacaminos ñañarca)

Estación observada: Otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Caprimulgus parvulus Gould (atajacaminos chico)

Estación observada: Otoño, verano, primavera

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Hydropsalis brasiliiana Vieillot (atajacaminos tijera común)

Estación observada: Verano

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Orden TROCHILIFORMES

Familia **Trochilidae**

Chlorostilbon aureoventris (d'Orbigny & Lafresnaye) (picaflor común).

Estación observada: Primavera

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Heliodoxa fuscicollis (Shaw) (picaflor de barbijo).

Estación observada: Primavera	<i>Coryphistera alaudina</i> Burmeister (crestudo).
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	Estación observada: Primavera, verano, otoño
Orden PICIFORMES	Estado poblacional: CI: Preocupación menor
Familia Bucconidae	
<i>Nystalus maculatus</i> (Sclater) (durmilí).	<i>Anumbius annumbi</i> (Vieillot) (leñatero).
Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno	Estación observada: Otoño, primavera
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	Estado poblacional: CI: Preocupación menor
Familia Picidae	
<i>Melanerpes cactorum</i> (d'Orbigny) (carpintero de los cardones)	<i>Pseudoseisura lophotes</i> Parkes (cacholote castaño).
Estación observada: Primavera, otoño	Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	Estado poblacional: CI: Preocupación menor
<i>Picoides mixtus</i> (Wetmore) (carpinterito bataraz chico).	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Berlepsch (choca común).
Estación observada: Verano, otoño, invierno	Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	Estado poblacional: CI: Preocupación menor
<i>Colaptes melanochloros</i> Leybold (carpintero real).	
Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno	
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	
<i>Colaptes campestris</i> (Malherbe) (carpintero campestre)	
Estación observada: Primavera, verano	
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	
Orden PASSERIFORMES	
Familia Dendrocolaptidae	
<i>Drymornis bridgesii</i> (Eyton) (chinchoro grande).	<i>Rhinocryptidae</i>
Estación observada: Invierno	<i>Rhinocrypta lanceolata</i> (Geoffroy Saint-Hilaire) (gallito copetón).
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	Estación observada: Otoño
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> Esteban (chinchoro chico).	Estado poblacional: CI: Preocupación menor. P: Marcado retroceso numérico
Estación observada: Primavera, verano, invierno	
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	
Familia Furnariidae	
<i>Upucerthia certhioides</i> (Wetmore & Peters) (bandurrita chaqueña).	<i>Furnariidae</i>
Estación observada: Primavera, verano, invierno	<i>Campyloptoma obsoletum</i> (Temminck) (piojito silbón)
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	Estación observada: Otoño
<i>Furnarius rufus</i> Cherrie & Reichenberger (hornero).	Estado poblacional: CI: Preocupación menor
Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno	
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	
<i>Furnarius cristatus</i> Burmeister (hornerito).	<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln (fiofio pico corto).
Estación observada: Verano	Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	Estado poblacional: CI: Preocupación menor
<i>Leptasthenura platensis</i> Reichenbach (coludito copetón).	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot) (piojito común)
Estación observada: Invierno	Estación observada: Primavera, verano
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	Estado poblacional: CI: Preocupación menor
<i>Synallaxis frontalis</i> Pelzeln (Pijú Frente Gris).	<i>Stigmatura budytoides</i> Wetmore & Peters (calandrita).
Estación observada: Primavera, verano	Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	Estado poblacional: CI: Preocupación menor
<i>Synallaxis albescens</i> Zimmer (pijú cola parda).	<i>Euscarthmus meloryphus</i> Wied (barullero).
Estación observada: Primavera, verano	Estación observada: Verano
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	Estado poblacional: CI: Preocupación menor
<i>Cranioleuca pyrrhophia</i> (Vieillot) (curuté vientre blanco).	<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert) (churrinche).
Estación observada: Invierno, primavera	Estación observada: Verano
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	Estado poblacional: CI: Preocupación menor
<i>Asthenes baeri</i> (Berlepsch) (canastero chaqueño).	<i>Agriornis murina</i> d'Orbigny & Lafresnaye (gaucho chico)
Estación observada: Invierno	Estación observada: Invierno
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	Estado poblacional: CI: Preocupación menor
<i>Phacellodomus sibilatrix</i> Sclater (espinero chico).	Observaciones generales: Migrante del sur argentino (Nores, 1996).
Estación observada: Otoño	
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	
<i>Xolmis irupero</i> (Vieillot) (monjita blanca).	<i>Xolmis coronata</i> (Vieillot) (monjita coronada).
Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno	Estación observada: Otoño, invierno
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	Estado poblacional: CI: Preocupación menor
<i>Neoxolmis rubetra</i> (Burmeister) (monjita castaña)	Observaciones generales: Migrante del sur argentino (Nores, 1996).
Estación observada: Primavera	
Estado poblacional: CI: Preocupación menor	
<i>Knipolegus aterrimus</i> Kaup (viudita común).	Observaciones generales: Migrante del sur argentino (Nores, 1996).
Estación observada: Verano, otoño, invierno	

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Knipolegus striaticeps d'Orbigny & Lafresnaye (viudita chaqueña).
Estación observada: Primavera, verano, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Myiarchus swainsoni Cabanis (burlisto pico pardo).

Estación observada: Primavera

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Pitangus sulfuratus Todd (benteveo común).

Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Empidonax aurantioatrocristatus d'Orbigny & Lafresnaye (tuquito gris).

Estación observada: Primavera, verano

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Sublegatus modestus d'Orbigny & Lafresnaye (suirirí pico corto).

Estación observada: Verano

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Hirundinea ferruginea Hartert & Goodson (birro común).

Estación observada: Otoño

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Machetornis rixosus (Vieillot) (picabuey).

Estación observada: Primavera

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Hemitriccus margaritaceiventer d'Orbigny & Lafresnaye (mosqueta ojo dorado).

Estación observada: Otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Myiophobus fasciatus Gould (mosqueta estriada).

Estación observada: Primavera, verano

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Tyrannus savana Vieillot (tijereta).

Estación observada: Primavera, verano

Estado poblacional: CI: Preocupación menor. P: Marcado retroceso numérico

Observaciones generales: Nidifica en la provincia en el período estival (Nores, 1996).

Pachyramphus polychopterus (Swainson) (anambé común).

Estación observada: Verano

Estado poblacional: P: Vulnerable

Familia Phytotomidae

Phytotoma rutila Vieillot (cortarramas).

Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Observaciones generales: Única especie de Córdoba exclusivamente herbívora.

Familia Hirundinidae

Phaeprogne tapera (Vieillot) (golondrina parda).

Estación observada: Primavera, verano

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Observaciones generales: Nidifica en la provincia en el período estival (Nores, 1996).

Tachycineta leucorrhoa (Vieillot) (golondrina ceja blanca).

Estación observada: Primavera

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Observaciones generales: Nidifica en la provincia en el período estival (Nores, 1996).

Progne modesta = elegans Baird (golondrina negra).

Estación observada: Verano

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Observaciones generales: Nidifica en la provincia en el período estival (Nores, 1996).

Notiochelidon cyanoleuca d'Orbigny & Lafresnaye (golondrina barranquera)

Estación observada: Primavera, verano

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Observaciones generales: Nidifica en la provincia en el período estival (Nores, 1996).

Familia Troglodytidae

Troglodytes aedon Berlepsch & Leverkuhn (ratona común).

Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Familia Muscicapidae

Subfamilia Sylviinae

Polioptila dumicola (Vieillot) (tacuarita szul).

Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Subfamilia Turdinae

Turdus amaurochalinus Cabanis (zorzal chalchalero).

Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Turdus rufiventris Vieillot (zorzal colorado).

Estación observada: Verano

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Familia Mimidae

Mimus saturninus (Gould) (calandria grande).

Estación observada: Invierno, primavera

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Mimus triurus (Vieillot) (calandria real).

Estación observada: Otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Familia Motacillidae

Anthus correndera Vieillot (cachirla común)

Estación observada: Verano, otoño

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Familia Vireonidae

Vireo olivaceus (Vieillot) (chiví común).

Estación observada: Primavera, verano

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Cyclarhis gujanensis (Vieillot) (juan chiviro).

Estación observada: Primavera, verano, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Familia Emberizidae

Subfamilia Parulinae

Parula pitayumi (Vieillot) (pitayumí).

Estación observada: Verano

Estado poblacional: Sin datos.

Geothlypis aequinoctalis (Vieillot) (arañero cara negra).

Estación observada: Primavera, verano

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Euphonia chlorotica d'Orbigny & Lafresnaye (tangará común)

Estación observada: Otoño

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Subfamilia Thraupinae

Thraupis bonariensis Brodkorb (naranjero)

Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno

Estado poblacional: CI: Preocupación menor

Subfamilia Cardinalinae		
<i>Saltator aurantirostris</i> Vieillot (pepitero de collar).		
Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno		
Estado poblacional: CI: Preocupación menor		
Subfamilia Emberizinae		
<i>Paroaria coronata</i> (Miller) (cardenal común).		
Estación observada: Primavera, invierno		
Estado poblacional: CI: Preocupación menor. P: Vulnerable		
Observaciones generales: Integra el apéndice II de CITES.		
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot) (corbatita común).		
Estación observada: Verano, otoño		
Estado poblacional: CI: Preocupación menor. P: Marcado retroceso numérico		
<i>Coryphospingus cucullatus</i> Brodkorb (brasita de fuego).		
Estación observada: Primavera, verano, otoño		
Estado poblacional: CI: Preocupación menor. P: Marcado retroceso numérico		
<i>Saltatricula multicolor</i> (Burmeister) (pepitero chico).		
Estación observada: Primavera, verano, otoño		
Estado poblacional: CI: Preocupación menor		
<i>Sicalis flaveola</i> Sclater (jilguero dorado).		
Estación observada: Primavera		
Estado poblacional: CI: Preocupación menor		
<i>Sicalis luteola</i> (meyen) (misto).		
Estación observada: Primavera, verano, otoño		
Estado poblacional: CI: Preocupación menor		
<i>Embernagra platensis</i> d'Orbigny (verdón).		
Estación observada: Otoño		
Estado poblacional: CI: Preocupación menor		
<i>Poospiza melanoleuca</i> (d'Orbigny & Lafresnaye) (monterita cabeza negra).		
Estación observada: Invierno, primavera		
Estado poblacional: CI: Preocupación menor. P: Marcado retroceso numérico		
<i>Poospiza nigrorufa</i> (d'Orbigny & Lafresnaye) (sietevestidos)		
Estación observada: Verano		
Estado poblacional: CI: Preocupación menor		
<i>Poospiza torquata</i> Todd (monterita de collar).		
Estación observada: Verano, invierno		
Estado poblacional: CI: Preocupación menor		
<i>Aimophila strigiceps</i> (Gould) (cachilo corona castaña).		
Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno		
Estado poblacional: CI: Preocupación menor		
<i>Zonotrichia capensis</i> (Wetmore & Peters) (chingolo).		
Estación observada: Primavera, verano, otoño, invierno		
Estado poblacional: CI: Preocupación menor		
Familia Icteridae		
<i>Sturnella superciliaris</i> (Bonaparte) (pecho colorado)		
Estación observada: Primavera, otoño		
Estado poblacional: CI: Preocupación menor		
Observaciones generales: Común en bañados (Nores, 1996).		
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin) (tordo renegrido).		
Estación observada: Primavera, verano, otoño		
Estado poblacional: CI: Preocupación menor		
<i>Molothrus rufoaxillaris</i> Cassin (tordo pico corto).		
Estación observada: Primavera		
Estado poblacional: CI: Preocupación menor		

<i>Molothrus badius</i> (Vieillot) (tordo músico).		
Estación observada: Primavera, verano, otoño		
Estado poblacional: CI: Preocupación menor		
<i>Carduelis magellanica</i> (Ridgeway) (cabecita negra común)		
Estación observada: Primavera, verano		
Estado poblacional: CI: Preocupación menor		

Tabla 1. Gremios tróficos y estatus de residencia de las aves observadas en el Bosque Chaqueño Oriental de Córdoba.

ESPECIES	GREMIO TRÓFICO	ESTATUS DE RESIDENCIA
<i>Rhea americana</i>	O	Oca ¹
<i>Crypturellus tataupa</i>	O	Per
<i>Nothoprocta cinerascens</i>	O	Per
<i>Nothura maculosa</i>	O	Per
<i>Eudromia elegans</i>	O	Per
<i>Syrigma sibilatrix</i>	C-I	Oca
<i>Bubulcus ibis</i>	C-I	Oca
<i>Camerarius albus</i>	C	Oca
<i>Coragyps atratus</i>	Ñ	Per
<i>Cathartes aura</i>	Ñ	Per
<i>Cathartes burrovianus</i>	Ñ	Eest
<i>Sarcoramphus papa</i>	Ñ	Oca
<i>Elanus leucurus</i>	C	Einv
<i>Harpyhaliaetus coronatus</i>	C	Per
<i>Buteo magnirostris</i>	C	Oca ¹
<i>Buteo swainsoni</i>	C-I	Oca
<i>Buteo polyosoma</i>	C	Oca ¹
<i>Polyborus plancus</i>	C-Ñ-I	Per
<i>Polyborus chimango</i>	C-Ñ-I	Per
<i>Spizapteryx circumcinctus</i>	C-I	Einv
<i>Falco femoralis</i>	C-I	Oca ¹
<i>Falco sparverius</i>	C-I	Oca ¹
<i>Ornithodoris canicollis</i>	O	Per
<i>Chunga burmeisteri</i>	O	Oca ¹
<i>Vanellus chilensis</i>	I	Per
<i>Columba picazuro</i>	G	Oca ¹
<i>Columba maculosa</i>	G	Per
<i>Zenaida auriculata</i>	G	Per
<i>Columbina picui</i>	G	Per
<i>Leptotila verreauxi</i>	G-I	Per
<i>Aratinga acuticaudata</i>	F-G	Per
<i>Myiopsitta monachus</i>	F-G	Per
<i>Coccyzus melacoryphus</i>	I	Eest
<i>Tapera naevia</i>	I	Eest
<i>Crotophaga ani</i>	I	Oca ¹
<i>Guira guira</i>	C-I	Per
<i>Tyto alba</i>	C	Oca ¹
<i>Otus choliba</i>	I	Einv ¹
<i>Glaucidium sp.</i>	I	Einv
<i>Athene cunicularia</i>	I-C	Per
<i>Strix rufipes</i>	C	Oca ¹
<i>Podargus nacunda</i>	I	Eest
<i>Caprimulgus longirostris</i>	I	Einv ¹
<i>Caprimulgus parvulus</i>	I	Per
<i>Hydropsalis brasiliiana</i>	I	Eest
<i>Chlorostilbon aureoventris</i>	N-I	Eest
<i>Heliomaster furcifer</i>	N-I	Eest
<i>Nystalus maculatus</i>	I	Per
<i>Melanerpes cactorum</i>	I-F	Per
<i>Picoides mixtus</i>	I-G	Per
<i>Colaptes melanochloros</i>	I	Per
<i>Colaptes campestris</i>	I	Eest ¹
<i>Drymornis bridgesii</i>	I	Oca ¹
<i>Lepidocolaptes</i>	I	Per

<i>angustirostris</i>			<i>Zonotrichia capensis</i>	G-I	Per
<i>Upucerthia certhioides</i>	I	Per	<i>Sturnella superciliaris</i>	G-I	Eest ¹
<i>Furnarius rufus</i>	I	Per	<i>Molothrus bonariensis</i>	G-I	Per
<i>Furnarius cristatus</i>	I	Oca ¹	<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	G-I	Oca ¹
<i>Leptasthenura platensis</i>	I	Oca ¹	<i>Molothrus badius</i>	G-I	Per
<i>Synallaxis frontalis</i>	I	Eest	<i>Carduelis magellanica</i>	G	Eest ¹
<i>Synallaxis albescens</i>	I	Eest			
<i>Cranioleuca pyrrhophia</i>	I	Per			
<i>Asthenes baeri</i>	I	Per			
<i>Phacellodomus sibilatrix</i>	I	Oca ¹			
<i>Coryphistera alaudina</i>	I	Per			
<i>Anumbius annumbi</i>	I	Per			
<i>Pseudoseisura lophotes</i>	I	Per			
<i>Taraba major</i>	I	Per			
<i>Thamnophilus</i>	I	Per			
<i>caerulescens</i>					
<i>Rhinocrypta lanceolata</i>	I	Oca ¹			
<i>Camptostoma obsoletum</i>	I	Oca ²			
<i>Elaenia parvirostris</i>	I	Per			
<i>Serpophaga subcristata</i>	I	Eest ¹			
<i>Stigmatura budytoides</i>	I	Per			
<i>Euscarthmus meloryphus</i>	I	Eest			
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	I	Eest			
<i>Agricnornis murina</i>	I	Oca			
<i>Xolmis irupero</i>	I	Per			
<i>Xolmis coronata</i>	I	Einv			
<i>Neoxolmis rubetra</i>	I	Oca ³			
<i>Knipolegus aterrimus</i>	I	Per			
<i>Knipolegus striaticeps</i>	I	Per			
<i>Myiarchus swainsoni</i>	I	Oca ²			
<i>Pitangus sulphuratus</i>	O	Per			
<i>Empidonax</i>	I	Eest			
<i>aurantioatrocristatus</i>					
<i>Sublegatus modestus</i>	I	Oca ¹			
<i>Hirundinea ferruginea</i>	I	Oca ¹			
<i>Machetornis rixosus</i>	I	Oca ¹			
<i>Hemitriccus</i>	I	Einv ¹			
<i>margaritaceiventer</i>					
<i>Miyophobus fasciatus</i>	I	Eest			
<i>Tyrannus savana</i>	I	Eest			
<i>Pachyramphus</i>	I	Oca ²			
<i>polychopterus</i>					
<i>Phytotoma rutila</i>	H	Per			
<i>Phaeoprogne tapera</i>	I	Eest			
<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	I	Eest			
<i>Progne modesta</i>	I	Eest			
<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	I	Eest			
<i>Troglodytes aedon</i>	O	Per			
<i>Polioptila dumicola</i>	I	Per			
<i>Turdus amaurochalinus</i>	O	Per			
<i>Turdus rufiventris</i>	O	Oca ¹			
<i>Mimus saturninus</i>	O	Per			
<i>Mimus triurus</i>	O	Einv			
<i>Anthus correndera</i>	I	Per			
<i>Vireo olivaceus</i>	I	Eest			
<i>Cyclarhis guayanensis</i>	I	Per			
<i>Parula pitiayumi</i>	I	Oca			
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	I	Eest			
<i>Euphonia chlorotica</i>	F-I	Oca ¹			
<i>Thraupis bonariensis</i>	F-I	Per			
<i>Saltator aurantiirostris</i>	G-F	Per			
<i>Paroaria coronata</i>	G-I	Per			
<i>Sporophila caerulescens</i>	G	Eest			
<i>Coryphospingus cucullatus</i>	G-I	Per			
<i>Saltatricula multicolor</i>	G	Per			
<i>Sicalis flaveola</i>	G-I	Oca ¹			
<i>Sicalis luteola</i>	G	Per			
<i>Embernagra platensis</i>	G	Oca ¹			
<i>Poospiza melanoleuca</i>	G	Per			
<i>Poospiza nigrorufa</i>	G	Eest ¹			
<i>Poospiza torquata</i>	G	Per			
<i>Aimophila strigiceps</i>	G	Per			

Referencias: Gremio trófico: O: Omnívoro, I: Insectívoro, G: Granívoro, C: Carnívoro, N: Carroñero, F: Frugívoro, N: Nectarívoro, H: Herbívoro. Estatus de residencia: Per: Permanente, Einv: Estacional invernal, Eest: Estacional estival, Oca: Ocasional. Superíndices ¹: Permanente; ²: Estival, ³: Invernal, según Nores (1996).

Discusión

El conjunto de aves registradas en los relictos de bosque al NW de la Mar Chiquita, representa alrededor del 30% de las especies que habitan el Chaco en toda su extensión (Bolivia, Paraguay y Brasil) (Short, 1975). En Argentina son escasos los relevamientos de aves en esta ecorregión; en la provincia de Córdoba, Dardanelli & Nores (2001) citan 73 especies y Bucher *et al.* (2001) 87 en parches de Chaco y Espinal (éste aún más degradado). En Santiago del Estero Codesido & Bilenca (2004) mencionan 96 especies. El número de entidades registrada en este trabajo (127) es superior, posiblemente por el mosaico determinado por una variedad de fisonomías y condiciones ecosistémicas (parches de bosque y pastizal, cultivos, proximidad de bañados y laguna, etc.) que allí se presentan.

En la composición específica se advierten elementos de interés. En primer lugar, cabe destacar la presencia de *Harpyhaliaetus coronatus* y *Buteo polyosoma* predadores de pequeños y medianos mamíferos. La primera es una rapaz de gran volumen que necesita amplia continuidad de hábitat chaqueño típico, ya que caza en cercanías o dentro del mismo; en adición se trata de una especie Vulnerable a nivel nacional (Collar *et al.*, 1994). Ésta y la especie *Ornithodoris canicollis*, que estaría recuperándose en la provincia (Nores, 1996), resultaron más frecuentes en la condición de bosque maduro, con alto dosel arbóreo. Se constataron asimismo especies que frecuentan ambientes acuáticos (Nores & Izurieta, 1980), tales como *Bubulcus ibis*, *Casmerodius albus*, *Syrrigma sibilatrix* y *Vanellus chilensis*, por la proximidad de los Bañados del Río Dulce y la Laguna de Mar Chiquita, ubicados entre 10 a 20 km hacia el Este.

Como en otros sitios de bosque chaqueño, en nuestro estudio las insectívoras compusieron una elevada proporción de las especies (Capurro & Bucher, 1986; Codesido & Bilenca, 2004). Evidentemente, los insectos constituyen un recurso importante en este bosque con variados microhábitats en corteza, suelo, follaje y espacio aéreo (Caziani, 1996). La utilización de una variedad mayor de categorías alimenticias por las especies de residencia permanente se relacionaría con su capacidad

adaptativa para aprovechar diversos recursos que proporciona la complejidad estructural del bosque.

En cuanto al estatus de residencia, las especies de presencia permanente fueron las mejor representadas. Codesido & Bilenca (2004) obtienen porcentaje mayor (69%) de éstas en el bosque de Santiago del Estero. En nuestro estudio un 24% de las "permanentes" citadas por Nores (1996) fueron registradas con baja frecuencia, sumando en la categoría "ocasional". Esta mengua en los encuentros de dichas especies sugiere disminución de su abundancia, en lo cual influiría la fragmentación y rápida pérdida de hábitat chaqueño, ocurrida en la última década en Córdoba (Kufner *et al.*, 2005). La proporción de visitantes estivales triplicó a los invernales en relación con la mayor disponibilidad de recursos en general durante la faz húmeda en el Chaco (Codesido & Bilenca, 2004).

El paisaje fragmentado de bosque rodeado por una matriz de mosaicos cultivados y vegetación secundaria, probablemente influyó en la presencia de especies de hábitats abiertos y antropizados. Así, habrían sido favorecidas aquéllas que duermen y nidifican en árboles frecuentemente en forma colonial (Ej.: *Columba maculosa*, *Zenaida auriculata* y *Myiopsitta monacha*). Estas granívoras y frugívoras presentaron elevados números y son consideradas plagas de la agricultura en Córdoba (Bucher & Nores, 1988).

La región de estudio está relacionada con las *Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina* (AICA) de la provincia de Córdoba (Di Giacomo, 2005) y la información que aporta la presente publicación será de utilidad para la planificación de estrategias tendientes a la conservación de dichas áreas.

Agradecimientos: La investigación fue parcialmente financiada por la SECyT de la Universidad Nacional de Córdoba. Especial reconocimiento al Biól. Gustavo Bruno por sus comentarios y aportes al manuscrito.

Literatura citada

- Albarece E.A. & Antelo C.M. 2000. Estudio preliminar de la avifauna residente en primavera en un sector del bosque chaqueño (Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana*, 45(2): 181-188. Tucumán.
- Almazán-Núñez R.C. & Navarro A.G. 2006. Avifauna de la subcuenca del río San Juan, Guerrero, México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 77: 103-114. México.
- Capurro H.A. & Bucher E.H. 1986. Variación estacional en la comunidad de aves del bosque chaqueño de Chimalcal. *Phycis* (Buenos Aires), Secc. C. 44(106): 1-6.
- Caziani S.M. 1996. Interacción plantas-aves dispersoras en un bosque chaqueño semiárido. Tesis Doctoral Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Codesido M.A. & Bilenca D.B. 2004. Variación Estacional de un Ensamble de Aves en un Bosque Subtropical Semiárido del Chaco Argentino. *Biotrópica*, 36(4): 544-554.
- Beissinger S.R., Steadman E.C., Wohlgemant T.W., Blate G., & Zack S. 1996. Null models for assessing ecosystem conservation priorities: threatened birds as titres of threatened ecosystems in South America. *Conserv. Biol.* 10: 1343-1352.
- Birdlife International (2006). www.birdlife.org.
- Brooks D.M. 1997. Avian seasonality at a locality in the central Paraguayan Chaco. *Hornero*, 14: 193-203. Buenos Aires.
- Bucher E.H., Costa Gorri B. & Leynaud G. 2001. Bird diversity and forest fragmentation in the semiarid espinal woodland of Córdoba, Argentina. *Bol. Acad. Nac. Ciencias, Córdoba*, 66: 117-124.
- Bucher E.H. & Nores M. 1988. Present status of birds in steppes and savannas of Northern and Central Argentina. *ICBP Technical Publication N° 7*.
- Cabido M. & Zak M. 1999. Vegetación del Norte de Córdoba. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables. Córdoba.
- Cabrera A. & Willink A. 1980. *Biogeografía de América Latina. Serie de Biología. Monografía N° 13*. 117 pp. OEA, Washington.
- Capurro H.A. & Bucher E.H. 1988. Lista comentada de las aves del bosque chaqueño de Joaquín V. González, Salta, Argentina. *Hornero*, 13: 39-46. Buenos Aires.
- Chani J.M., Lucero M.M., Marigliano N.L. & Echevarría A.L. 1998. Lista comentada de aves de El Salvador, departamento Chuquisaca, Bolivia. *Acta Zoológica Lilloana*, 44(1): 191-217. Tucumán.
- CITES. 2006 (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) www.cites.org.
- Collar N.J., Crosby M.J. & Stattersfield A.J. 1994. *Birds to watch 2: the World List of Threatened Birds*. Birdlife, Cambridge.
- Dardanelli S. & Nores M. 2001. Extinción y colonización de aves en fragmentos de bosque de la Provincia de Córdoba, Argentina. *Bol. Acad. Nac. Ciencias, Córdoba*, 66: 55-60.
- Di Giacomo A.S. (editor) 2005. *Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Monografía de Aves Argentinas N° 5:1-514*. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Kufner M., Giraudo L., Gavier G., Altrichter M., Tamburini D. & Sironi M. 1998. Fauna de tetrápodos y sus biotopos en la Reserva La Quebrada, Río Ceballos, Córdoba. *Acta Zoológica Lilloana*, 44 (1): 177-184.
- Kufner M., Tamburini D., Giraudo L. & Briguera V. 2005. Conservación de mastofauna en fragmentos de Bosque Chaqueño en la región de Mar Chiquita, Córdoba, Argentina. *Ecología Aplicada*, 4(1,2): 53-58.
- Leveau L.M. & Leveau CM. 2004. Comunidades de aves en un gradiente urbano de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. *Hornero* (Buenos Aires), jan./ago. 19(1): 13-21. ISSN 0073-3407.
- Mazar Barnett J. & Pearman M. 2001. Lista comentada de las aves argentinas. Asociación Ornitológica del Plata. Birdlife International. Lynx Edicions. Barcelona.
- Miatello R. 1994. Vertebrados en vías de extinción de la provincia de Córdoba. *Tras la Huella. Recursos Naturales*, 3(11): 36-39. Córdoba.
- Morello J. & Matteucci S. 1999. El difícil camino al manejo rural sostenible en la Argentina. 41 - 54. En: S.

- Matteucci, O. Solbrig, J. Morello & G. Halfster (Eds.). Biodiversidad y uso de la tierra. Conceptos y ejemplos de Latinoamérica. Eudeba. B. Aires.
- Narosky T. & Izurieta D. 2003. Aves de Argentina y Uruguay: guía para la identificación. Asociación Ornitológica del Plata. Birdlife International. 15^a Edición. Buenos Aires. Vázquez Mazzini Editores.
- Nores M. & Izurieta D. 1980. Aves de ambientes acuáticos de Córdoba y centro de Argentina. Sec. Est. Agr. Gan. Córdoba.
- Nores M. 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. 255 – 338. En: I. di Tada y E. Bucher (Eds.). Biodiversidad de la Provincia de Córdoba. Vol. 1. Fauna. Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto.
- Olrog C.C. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. Opera Lilloana, 9. Tucumán.
- Sick H. 1985. Ornitología brasileira, uma introdução. Brasilia, Editora Universidade de Brasilia. Vol I y II. : 598.
- Short L.L. 1975. A zoogeographic análisis of the South American Chaco avifauna. Bulletin of the American Museum of Natural History. 154 (3): 166-352. New York.
- Torres R. & Michelutti P. 2001. Nuevos registros de aves escasas en la región central de Argentina. Nótulas Faunísticas (Segunda Serie). 1: 1-5.
- Torres R. & Michelutti P. 2005. Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita Pp: 134-137, En: Di Giacomo A.S. (Ed.) Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación. 5: 1-514. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Zak M. & Cabido M. 2002. Spatial patterns of the Chaco vegetation of central Argentina: Integration of remote sensing and phytosociology. Applied Vegetation Science. 5: 213-226.

²CERNAR y ¹Cátedra Diversidad Animal II, FCEFyN, UNC. Avenida Vélez Sarsfield 299, 5000, Córdoba, Argentina.

Direcciones electrónicas de contacto: lgiraudo@com.uncor.edu; bkufner@com.uncor.edu