



Revista Chilena de Cirugía

ISSN: 0379-3893

editor@cirujanosdechile.cl

Sociedad de Cirujanos de Chile
Chile

NORERO M., ENRIQUE; RADDATZ E., ALEJANDRO; GUZMÁN B., SERGIO

Intususcepción intestinal posterior a bypass gástrico en Y de Roux

Revista Chilena de Cirugía, vol. 62, núm. 2, abril-, 2010, pp. 175-178

Sociedad de Cirujanos de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=345531941015>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Intususcepción intestinal posterior a bypass gástrico en Y de Roux*

Drs. ENRIQUE NORERO M.¹, ALEJANDRO RADDATZ E.¹, SERGIO GUZMÁN B.¹

¹ Departamento de Cirugía Digestiva. División de Cirugía.
Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

Abstract

Intussusception after Roux-en-Y Gastric Bypass causing bowel obstruction. Report of one case

We report a 41 years old female who underwent a gastric bypass 10 years ago. She presented an excess weight loss of 114%. She required a cholecystectomy and another surgical procedure due to an internal hernia. The patient complained of recurrent abdominal pain and an abdominal computed tomography showed an intestinal intussusception located at the jejunoo-jejuno anastomosis. She was operated and the diagnosis was confirmed. An enlargement of the biliopancreatic loop and a bezoar were also found. A 15 cm intestinal resection of the enlarged portion of the biliopancreatic loop and a new jejunoo-jejuno anastomosis were performed. The patient recovered uneventfully and was discharged on the fourth postoperative day. The occurrence of intestinal intussusception as a cause of intestinal obstruction after gastric bypass is rare. It has been reported after open and laparoscopic surgery. There are several theories about the cause of intussusception, like changes in intestinal motility, a high excess weight loss, but a conclusive cause has not been identified. Generally the location of the intussusceptions is at the jejunoo-jejuno anastomosis and it appears to be in a retrograde fashion in the majority of cases. The treatment is controversial, with several options; simple reduction, reduction and intestinal fixation, but apparently intestinal resection has better results.

Key words: Gastric bypass, bowel obstruction, intestinal intussusception.

Resumen

Reportamos el caso de una paciente con antecedente de un bypass gástrico hace 10 años, que presentó una pérdida del exceso de peso de 114%. Posteriormente se realizó una colecistectomía y cirugía por hernia interna. Debido a cuadros de dolor abdominal a repetición fue estudiada con una tomografía computada de abdomen que demostró una intususcepción intestinal a nivel de la entero-entero anastomosis. La paciente fue intervenida, se confirmó el diagnóstico y se encontró también una dilatación del asa biliopancreática y un bezoar. Se realizó una resección intestinal del asa biliopancreática de 15 cms y anastomosis yeyuno-yeyunal, con buena evolución postoperatoria y alta a los 4 días de la cirugía. La intususcepción intestinal posterior a un bypass gástrico es poco frecuente como causa de obstrucción intestinal y ha sido descrita luego de cirugía

*Recibido el 24 de Agosto de 2009 y aceptado para publicación el 19 de Octubre de 2009.

Correspondencia: Dr. Enrique Norero M.
Marcoleta 367, Casilla 114-D, Santiago, Chile.
Fax: 56 2 6329620
E-mail: enorero@puc.cl

abierta y laparoscópica. No existe una explicación definitiva para su patogenia. Presenta algunas características particulares como producirse en la mayoría de los casos en relación a la entero-entero anastomosis y ser una intususcepción retrograda. Su tratamiento es controversial, existiendo varias alternativas; reducción simple, reducción y fijación del asa comprometida, pero aparentemente la resección intestinal tendría mejores resultados, con menor frecuencia de recurrencia.

Palabras clave: Bypass gástrico, obstrucción intestinal, intususcepción intestinal.

Introducción

La obesidad representa una verdadera epidemia a nivel mundial¹. La cirugía bariátrica es el tratamiento con los mejores resultados a largo plazo². El bypass gástrico presenta buenos resultados, sin embargo, no está exento de morbilidad tanto a corto como a largo plazo³. Un grupo de pacientes puede presentar obstrucción intestinal en el seguimiento, secundario a hernias internas o bridas⁴. Una causa rara descrita de obstrucción intestinal posterior a bypass gástrico es la intususcepción intestinal. Reportamos el caso de una paciente de sexo femenino con antecedente de bypass gástrico que presentó una obstrucción intestinal debido a una intususcepción intestinal.

Caso clínico

Paciente de sexo femenino, de 41 años de edad, con antecedentes de insuficiencia suprarrenal congénita bajo tratamiento, síndrome depresivo mayor y tabaquismo crónico. Luego de evaluación multidisciplinaria fue operada hace 10 años atrás por obe-

sidad mórbida (IMC 44, peso 96 kg), realizándose un bypass gástrico abierto en Y de Roux, con bolsa gástrica de 15-20 cc y asa alimentaria de 150 cm de longitud ascendida por vía transmesocólica.

La paciente es controlada en forma ambulatoria; a los 9 meses presentaba una pérdida del exceso de peso de 71% (peso de 66 kg); se diagnosticó colelitiasis por lo que se realiza una colecistectomía abierta.

Logra en forma estable una pérdida del exceso de peso de 123% (IMC 20, peso de 44 kg). Se mantiene en controles periódicos.

A los 10,5 años del bypass gástrico, debido a repetidos cuadros de dolor abdominal e imagen compatible con hernia interna, se realiza laparotomía identificándose una hernia interna en el mesocolon transverso con ascenso del asa biliopancreática la cual está dilatada. Se reduce el asa y se cierra el orificio del mesocolon, con buena evolución postoperatoria.

A los 11 años del bypass gástrico la paciente presenta nuevamente cuadros de dolor abdominal a repetición, asociado a vómitos y náuseas por los que se estudia con tomografía computada de abdomen encontrándose una imagen de intususcepción en re-



Figura 1. Tomografía computada de abdomen que muestra intususcepción intestinal a nivel de la entero-entero anastomosis (flecha).




Figura 2. Asa biliopancreática dilatada que fue reseada y bezoar.

lación a la entero-entero anastomosis (Figura 1). Se realiza laparotomía, confirmando este diagnóstico, encontrándose también una importante dilatación del asa biliopancreática y un bezoar proximal a la entero-entero anastomosis. No hay hernias internas en esta laparotomía. Se resecan 15 cm del asa biliopancreática y se rehace la anastomosis yeyuno-yeyunal manual, fijando el asa biliopancreática a la alimentaria (Figura 2). La paciente presenta buena evolución postoperatoria, siendo dada de alta el día 4 postoperatorio.

Discusión

El bypass gástrico es una de las técnicas de cirugía bariátrica más difundidas en el mundo, con buenos resultados a largo plazo. Sin embargo, no está exento de morbilidad, destacando a corto plazo la filtración anastomótica y/o de la bolsa gástrica, estenosis de la anastomosis gastro-yeyunal³ y a largo plazo la obstrucción intestinal⁴, así como los déficit nutricionales a vitaminas, calcio, vitamina B12, entre otros.

La obstrucción intestinal post bypass gástrico se puede deber a bridas o a hernias internas, a nivel del mesocolon, brecha del meso del intestino delgado o espacio de Petersen⁵. En nuestro centro se ha reportado previamente una cifra de obstrucción intestinal de 4% para bypass gástrico laparoscópico⁴ y este caso, representa el primer reporte de una intususcepción post bypass gástrico en nuestro centro en más de 15 años de experiencia en cirugía bariátrica.

La primera comunicación de intususcepción posterior a bypass gástrico data de 1991⁶. Desde entonces se han comunicado alrededor de 50 casos, la mayoría durante los últimos 5 años, representando una causa rara de obstrucción intestinal post bypass gástrico^{5,7-19}. Se ha descrito tanto como cuadro agudo como subagudo con episodios de dolor abdominal recurrente. En algunos casos se ha descrito necrosis y perforación del asa^{6,8,11}.

La intususcepción posterior al bypass gástrico presenta algunas particularidades, como producirse en la gran mayoría de casos a nivel de la entero-entero anastomosis. En segundo lugar es típicamente de tipo retrogrado, o sea el asa distal se intususcepta en un asa proximal. Estas particularidades no parecerían ser diferentes en los casos ocurridos con posterioridad a cirugía abierta y laparoscópica^{7-9,11,16,17,19}.

La mayoría de los casos de intususcepción intestinal primaria se producen en población pediátrica. En adultos es menos frecuente y generalmente se identifica alguna causa que lo favorece, como un tumor intestinal, enfermedad inflamatoria y divertículo de Meckel, entre otras²⁰⁻²². En la situación de los pacientes sometidos a bypass gástrico se han planteado varias teorías, como alteraciones de la motilidad intestinal debido a la aparición de marcapasos anómalos con producción de ondas peristálticas que podrían llegar a la anastomosis yeyuno-yeyunal en forma simultánea creando una onda de mayor amplitud^{6,14,16}. Otra teoría es que las líneas de corchetes podrían actuar como punto de tracción¹⁴. También se ha planteado que la baja excesiva de peso disminuye la tracción de los mesos y de esta manera el intestino estaría más propenso a esta condición¹⁶; en nuestro caso la paciente tuvo una pérdida del exceso de peso de 114%, lo que podría haber favorecido esta situación. También creemos que la dilatación del asa biliopancreática que presentaba la paciente, favorecido por la hernia interna por la cual fue intervenida meses atrás, puede haber favorecido la intususcepción. Sin embargo, siendo esta una complicación infrecuente no hay una causa definitiva^{5,14,16}.

El tratamiento es quirúrgico. La presencia de necrosis del asa o perforación es indicación de resección intestinal^{6,8,11}. En los cuadros en que se logra reducir el asa y ésta se encuentra vital, existe controversia sobre la mejor alternativa; simple reducción,

fijación del intestino o resección intestinal. En la mayor experiencia comunicada de esta patología que incluye 23 casos por el grupo de Salt Lake City, se encontró que la tasa de recurrencia era menor con una resección intestinal¹¹. En este caso, a pesar de la vitalidad del intestino, se optó por esta técnica, con el objetivo de resecar el asa biliopancreática dilatada, sin complicaciones en el postoperatorio inmediato.

Referencias

1. Klein S, Wadden T, Sugerman HJ. AGA technical review on obesity. *Gastroenterology* 2002; 123: 882-932.
2. Christou N, Sampalis J, Liberman M, Look D, Auger S, Mclean A, et al. Surgery decreases long-term mortality, morbidity and health care use in morbidly obese patients. *Ann Surg* 2004; 240: 416-424.
3. Escalona A. Complicaciones quirúrgicas del bypass gástrico laparoscópico. *Rev Chil Cir* 2006; 58: 97-105.
4. Escalona A, Devaud, Pérez G, Crovari F, Boza C, Viviani P, et al. Antecolic versus retrocolic alimentary limb in laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: a comparative study. *Surg Obes Relat Dis* 2007; 3: 423-427.
5. Edwards M, Grinbaum R, Ellsmere J, Jones D, Schneider B. Intussusception after Roux-en-Y gastric bypass for morbid obesity: case report and literature review of rare complication. *Surg Obes Relat Dis* 2006; 2: 483-489.
6. Hocking M, Mccoy D, Vogel S, Kaude J, Sninsky C. Antiperistaltic and isoperistaltic intussusception associated with abnormal motility after Roux-en-Y gastric bypass: a case report. *Surgery* 1991; 110: 109-112.
7. Kasotakis G, Sudan R. Retrograde intussusception after Roux-en-Y gastric bypass for morbid obesity. *Obes Surg* 2009; 19: 381-384.
8. Efthimiou E, Court O, Christou N. Small bowel obstruction due to retrograde intussusceptions after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. *Obes Surg* 2009; 19: 378-380.
9. Pauli E, Haluck R. Antiperistaltic (retrograde) intussusceptions after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass procedure. *Surg Obes Relat Dis* 2008; 4: 567-568.
10. Lessmann J, Soto E, Merola S. Intussusceptions after Roux-en-Y gastric bypass for morbid obesity. *Surg Obes Relat Dis* 2008; 4: 664-667.
11. Simper S, Erzinger J, Mckinlay R, Smith S. Retrograde (reverse) jejunal intussusceptions might not be such a rare problem: a single group's experience of 23 cases. *Surg Obes Relat Dis* 2008; 4: 77-83.
12. Al-Sabah S, Christou N. Intussusceptions after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. *Surg Obes Relat Dis* 2008; 4: 205-209.
13. Zainabadi K, Ramanathan R. Intussusceptions after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. *Surg Obes* 2007; 17: 1619-1623.
14. Coster D, Sundberg S, Kermode D, Beitzel D, Noun S, Severidt M. Small bowel obstruction due to antegrade and retrograde intussusceptions after gastric bypass: three case reports in two patients, literature review, and recommendations for diagnosis and treatment. *Surg Obes Relat Dis* 2008; 4: 69-72.
15. Wax J, Wolff R, Cobean R, Pinette M, Blackstone J, Cartin A. Intussusception complicating pregnancy following laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. *Obes Surg* 2007; 17: 977-979.
16. Ver Steeg K. Retrograde intussusception following Roux-en-Y gastric bypass. *Obes Surg* 2006; 16: 1101-1103.
17. Majeski J, Fried D. Retrograde intussusception after Roux-en-Y gastric bypass surgery. *J Am Coll Surg* 2004; 1999; 988-989.
18. Papadie F. Intussusception after gastric bypass. *Obes Surg* 2004; 14: 705.
19. Bocker J, Vasile J, Zager J, Goodman E. Intussusception: an uncommon cause of postoperative small bowel obstruction after gastric bypass. *Obes Surg* 2004; 14: 116-119.
20. Goverman J, Greenwald M, Gellman L, Gadaleta D. Antiperistaltic (retrograde) intussusception after Roux-en-Y gastric bypass. *Am Surg* 2004; 70: 67-70.
21. Duane T, Wohlgemuth S, Ruffin K. Intussusception after Roux-en-Y gastric bypass. *Am Surg* 2000; 66: 82-84.
22. Marinis A, Yiallourou A, Samanides L, Dafnios N, Anastasopoulos G, Vassiliou I, et al. Intussusception of the bowel in adults: a review. *World J Gastroenterol* 2009; 15: 407-411.