



Enfermería Nefrológica

ISSN: 2254-2884

seden@seden.org

Sociedad Española de Enfermería
Nefrológica
España

Fernández González, Carmen; García Alonso, Beatriz; García Fernández, María Belén;
Granda Fernández, Lidia Elena; López Álvarez, Carolina; Castañón Plasín, Rocío
Terapia de presión negativa para cura de escara abdominal en paciente diagnosticada de
calcifilaxis

Enfermería Nefrológica, vol. 16, núm. 1, 2013, pp. 133-134
Sociedad Española de Enfermería Nefrológica
Madrid, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=359860158066>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Terapia de presión negativa para cura de escara abdominal en paciente diagnosticada de calcifilaxis

Carmen Fernández González, Beatriz García Alonso, María Belén García Fernández, Lidia Elena Granda Fernández, Carolina López Álvarez, Rocío Castañón Plasín

Hospital Central de Asturias (HUCA). Oviedo

Introducción:

La calcifilaxis o arteriopatía urémica calcificante se debe a la calcificación vascular que provoca isquemia/necrosis a nivel de la piel, del tejido celular subcutáneo y los músculos. Es una enfermedad grave con mal pronóstico que puede afectar del 1 al 4% de la población en diálisis. Los primeros casos fueron descritos en la década de los 60. Las heridas por calcifilaxis son un reto para el personal de enfermería ya que tienen una escasa incidencia a la vez que un mal pronóstico. Además son lesiones muy dolorosas con gran riesgo de infección, siendo la sobre infección y sepsis la principal causa de muerte en estos pacientes. Por eso es tan importante llevar a cabo unos buenos cuidados enfermeros.

Material y método:

Se presenta un caso clínico en el que se utiliza la terapia de presión negativa para la cura de una placa necrótica abdominal, de gran tamaño, en paciente con Insuficiencia Renal Crónica Avanzada y diagnóstico de calcifilaxis.

Técnica de cura

La aplicación, a través de una bomba portátil, de presión negativa tópica (80-100 mmHg), produce una succión que da lugar a la limpieza de las úlceras, disminuye la carga bacteriana, incrementa el flujo sanguíneo local y favorece el crecimiento del tejido de granulación. Además protege de la contaminación externa. Se limpia la herida con suero, se protege la piel periulceral para evitar que la presión negativa lesione esos tejidos y se

coloca la esponja o gasa en el lecho de la herida. Se cubre todo con film transparente y se coloca la ventosa a través de la cual se realiza el vacío y todo el material succionado pasa a un receptáculo.

Desarrollo:

Mujer de 72 años de edad con Insuficiencia Renal Crónica Avanzada que ingresa por placa necrótica que ocupa todo el faldón abdominal. Antecedentes de obesidad, HTA, DM2, hiperparatiroidismo, ... Ingresa en planta en marzo de 2012 con el diagnóstico de calcifilaxis mediante biopsia cutánea. Se pauta hemodiálisis (HD) cinco días a la semana y tiosulfato sódico al 25% endovenoso después de cada HD (tres dosis semanales). Después de estar realizando durante un mes curas convencionales en ambiente húmedo se decide desbridar la placa necrótica con bisturí, recortando la mitad de la lesión para valorar la evolución. En la siguiente cura se puede observar que todo el tejido graso se ha vuelto a necrosar (abril 2012). Seguimos durante un tiempo con curas según pauta de cura húmeda hasta que en junio de 2012 nos decidimos a desbridar y seguidamente colocamos **TPN**. Realizamos curas dos veces a la semana, durante cuatro meses, siguiendo la técnica anteriormente mencionada.

Conclusiones:

La utilización de la TPN supuso una mejoría significativa en el proceso de curación de la herida abdominal. Por la buena evolución que hemos tenido en este caso consideramos que debería valorarse su aplicación en todo paciente que presente úlceras por calcifilaxis.

Referencias Bibliográficas

1. Soto PMT, García GMD, Barrios RP. Úlceras vasculares. Calcifilaxis secundaria a insuficiencia renal crónica terminal. 1 st. España: Bubok Publishing; 2012.
2. Marrón B, Coronel F, López-Bran E, Barrientos A. Calcifilaxis: una patogenia incierta y un tratamiento controvertido. *Nefrol.* 2001; 21 (6): 596-600. Bliss DE. Calciphylaxis: what nurses need to know. *Nephrol Nurs j.* 2002; 29 (5):433-438, 443-444.
3. Martin R. Mysterious calciphylaxis: wounds with eschar – to debride or not to debride? *Ostomy Wound Manage.* 2004; 50 (4): 64-66, 68-70.
4. Gómez de la Fuente E, Vicente FJ, Álvarez J, Elena Naz SI, et al. Calcifilaxis en pacientes dializados. *Esp. Card.* 2004; 95 (3): 178-182.
5. González HA, Piña SD, Gálvez SM, Gago GMC, Sánchez MJR, Martínez GS, et al. Manifestaciones dérmicas en hemodiálisis. Cuidados de enfermería ¿nuevo enfoque?. *Soc. Esp. Enferm. Nefrol.* 2005; 8 (4): 326-326.
6. Verdalles GU, Verde E, García de Vinuesa S, Goicoechea M, Mosse A, López GJM, et al. Calcifilaxis: complicación grave del síndrome cardio-metabólico en pacientes con enfermedad renal crónica terminal (ERCT). *Nefrol.* 2008; 28 (1): 32-36.
7. Polaina RM, Sánchez MMD, Biechy BM, Liébana CA. Calcifilaxis. *Sem. Fundac. Esp. Reuma.* 2009; 10 (4): 124-127.
8. Rodríguez VI, Callejas R, Sánchez M, Laso N, Gallar P, Ortega O, et al. Calcifilaxis o arteriopatía urémica calcificante: combinación de tratamientos. *Nefroplus.* 2010; 3 (3): 39-44.
9. Piña SD, González HA, Gálvez SMC, Marco GB, Rubio GE. Actuación de enfermería ante un paciente con calcifilaxis. *Soc. Esp. Enferm. Nefrol.* 2010; 13 (3): 205-208.
10. Prados SMC, del Pino y Pino MD, Garrófano LR, Moriana DC. Calcifilaxis severa en paciente en hemodiálisis. *Diál. Traspl.* 2010; 31 (3): 76-78.
11. Vasallo M, Bello I, Hamana L, Ferrer A, Rojas F, Cantele H. Arteriopatía cálcica urémica: comunicación de un caso y revisión de la literatura. *Clín. Esp.* 2011; 211 (7): 37-41.
12. Terapia de presión negativa [homepage on the Internet]. España: Smith&Nephew. Disponible en: <http://www.heridas.smith-nephew.es>. Malmsjö M, Borgquist O. TPN opciones de configuración y de apósitos hecha fácil. *Wounds International.* 2010; 1 (3). Disponible en: <http://woundsinternational.com>.