



Revista da Escola de Enfermagem da USP  
ISSN: 0080-6234  
reeusp@usp.br  
Universidade de São Paulo  
Brasil

Cavagioni, Luciane; Geraldo Pierin, Angela Maria  
Risco cardiovascular em profissionais de saúde de serviços de atendimento pré-hospitalar  
Revista da Escola de Enfermagem da USP, vol. 46, núm. 2, abril, 2012, pp. 395-403  
Universidade de São Paulo  
São Paulo, Brasil

Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=361033316018>

- Como citar este artigo
- Número completo
- Mais artigos
- Home da revista no Redalyc

# Risco cardiovascular em profissionais de saúde de serviços de atendimento pré-hospitalar\*

CARDIOVASCULAR RISK AMONG HEALTH PROFESSIONALS WORKING IN PRE-HOSPITAL CARE SERVICES

RIESGO CARDIOVASCULAR EN PROFESIONALES DE SALUD DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA

Luciane Cavagioni<sup>1</sup>, Angela Maria Geraldo Pierin<sup>2</sup>

## RESUMO

Avaliar os fatores de risco cardiovascular, com ênfase na hipertensão, e estratificá-los de acordo com o Escore de Risco de Framingham (ERF). Estudo com 154 profissionais que atuavam em atendimento pré-hospitalar na cidade de São Paulo e rodovia Br-116. Foi considerado significante o valor de  $p<0,05$ . A prevalência de hipertensão foi de 33%, sendo que 20,1% eram tabagistas, 47% ingeriam bebidas alcoólicas, 64% eram sedentários, 66% apresentaram obesidade/sobre peso e 70% cintura abdominal alterada, glicemia  $\geq 110\text{mg/dL}$  - 11%, colesterol total  $\geq 200\text{mg/dL}$  - 36%, LDL-c  $\geq 130\text{mg/dL}$  - 33%, HDL-c  $< 60\text{mg/dL}$  - 89%, triglicírides  $\geq 150\text{mg/dL}$  - 30% e proteína C reativa  $\geq 0,5\text{mg/dL}$  - 16%. O ERF foi médio em 10,3% e alto em 1,3%. Na análise de regressão logística verificou-se que a hipertensão associou-se com as variáveis: HDL-c (odds ratio: 0,257) e ERF (odds ratio: 23,159). Houve forte associação entre ERF e hipertensão. Os dados chamam a atenção, por se tratar principalmente de profissionais da área da saúde relativamente jovens.

## DESCRITORES

Hipertensão  
Fatores de risco  
Pessoal de saúde

## ABSTRACT

The objective of this study was to assess the cardiovascular risk factors among health professionals, particularly hypertension, and stratify them according to the Framingham Risk Score (FRS). The participants were 154 professionals working in pre-hospital care in São Paulo, Brazil, and on the Br-116 highway. Values were considered significant for  $p<0.05$ . The prevalence of hypertension was 33%, 20.1% were smokers, 47% consumed alcoholic beverages, 64% were sedentary, 66% were obese/overweight and 70% had an altered abdominal circumference. In terms of laboratory values: glucose  $\geq 110\text{mg/dL}$  - 11%, total cholesterol  $\geq 200\text{mg/dL}$  - 36%, LDL-c  $\geq 130\text{mg/dL}$  - 33%, HDL-c  $< 60\text{mg/dL}$  - 89%, triglycerides  $\geq 150\text{mg/dL}$  - 30% and C reactive protein  $\geq 0.5\text{mg/dL}$  - 16%. The FRS was average in 10.3% and high in 1.3%. In logistic regression analysis, it was verified that hypertension was associated with: HDL-c (odds ratio: 0.257,) and FRS (odds ratio: 23.159). There was strong correlation between hypertension and FRS. Data are noteworthy, as this is a relatively young sample of health professionals.

## DESCRIPTORS

Hypertension  
Risk factors  
Health personnel

## RESUMEN

Evaluar los factores de riesgo cardiovascular con énfasis en hipertensión y estratificarlos de acuerdo a Score de Riesgo de Framingham (ERF). Estudio con 154 profesionales con actuación en atención prehospitalaria en ciudad de São Paulo y ruta Br-116. Se consideró significativo el valor  $p<0,05$ . La prevalencia de hipertensión fue 33%, 20,1% eran fumadores, 47% ingería bebidas alcohólicas, 64% sedentarios, 66% con obesidad/sobrepeso, 70% con cintura abdominal alterada, glucemia  $\geq 110\text{mg/dL}$ -11%, colesterol total  $\geq 200\text{mg/dL}$ -30%, LDL-c  $\geq 130\text{mg/dL}$ -33%, HDL-c  $< 60\text{mg/dL}$ -89%, triglicéridos  $\geq 150\text{mg/dL}$ -30% y proteína C reactiva  $\geq 0,5\text{mg/dL}$ -16%. El ERF fue medio en 10,3% y alto en 1,3%. En análisis de regresión logística se verificó que la hipertensión se asociaba a las variables: HDL-c (odds ratio: 0,257), y ERF (odds ratio: 23,159). Hubo fuerte asociación entre ERF y hipertensión. Los datos llaman la atención por tratarse principalmente de profesionales del área de la salud relativamente jóvenes.

## DESCRIPTORES

Hipertensión  
Factores de riesgo  
Personal de salud

\* Extraído da tese “Influência do plantão de 24 horas sobre a pressão arterial e o perfil de risco cardiovascular em profissionais da área da saúde que atuam em serviços de atendimento pré-hospitalar”, Programa de Pós-Graduação. <sup>1</sup> Enfermeira. Doutora em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação Enfermagem na Saúde do Adulto da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010. Enfermeira. Doutora em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação Enfermagem na Saúde do Adulto da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. São Paulo, SP Brasil. luciane.cavagioni@gmail.com <sup>2</sup> Professora Titular do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. São Paulo, SP. Brasil. pierin@usp.br

## INTRODUÇÃO

Segundo a World Health Organization as doenças cardiovasculares são responsáveis por, aproximadamente, 30% das mortes em todo o mundo e nos países desenvolvidos 80% das mortes podem ser atribuídas às doenças cardiovasculares<sup>(1)</sup>. Estas apresentam uma etiologia multifatorial decorrente de hábitos e estilos de vida inadequados como o tabagismo, ingestão de bebidas alcoólicas, estresse físico e mental, obesidade e sedentarismo. Esses estilos de vida contribuem para o desenvolvimento de aterosclerose e hipertensão arterial que são fatores responsáveis pelo desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Dados do Ministério da Saúde revelam que as doenças cardiovasculares foram as principais causas de mortalidade no ano de 2007 com 30% dos óbitos<sup>(2)</sup>. Em razão de sua alta prevalência, cronicidade, baixo controle e elevado custo sócio-financeiro, a hipertensão arterial destaca-se dentre os fatores de risco cardiovascular. Estima-se que há cerca de 1 bilhão de indivíduos hipertensos no mundo, sendo a hipertensão responsável por, aproximadamente, 7,1 milhões de óbitos por ano<sup>(3)</sup>.

Nas últimas décadas outros fatores de risco emergentes foram o sobrepeso/obesidade e o sedentarismo. As autoridades sanitárias e os estudiosos consideram o excesso de peso e o sedentarismo como uma pandemia havendo uma correlação positiva entre o excesso de peso, o sedentarismo e as altas prevalências de hipertensão arterial. Corroborando com essa visão, o estudo de Framingham revelou que 70% dos novos casos de hipertensão arterial estavam relacionados diretamente ao excesso de peso<sup>(4)</sup>.

Dentro do contexto atual de prevenção cardiovascular não se deve caracterizar o indivíduo só como hipertenso, hiperlipidêmico, obeso ou diabético, mas, também, determinar seu risco cardiovascular total. Um dos estudos que mais contribuiu para essa nova visão de risco cardiovascular total foi o estudo de Framingham. Após seu término foi elaborado um escore que estima o risco cardiovascular, pela soma das características clínicas, permitindo aos profissionais de saúde que tomem melhor decisão terapêutica e, em conjunto com o paciente, elaborarem intervenções preventivas de acordo com o risco cardiovascular total encontrado e a prevenção primária das doenças cardiovasculares<sup>(5)</sup>.

Os profissionais de saúde que atuam no atendimento pré-hospitalar podem estar sujeitos aos fatores de risco cardiovascular pelo estilo de vida adotado e pelas características específicas de sua ocupação. Em nosso meio não existem registros conhecidos sobre o risco cardiovascular entre esses profissionais. Desse modo o presente estudo teve como objetivos: avaliar fatores de risco cardiovascular, com ênfase na hipertensão arterial, e estratificá-los, de acordo com o Escore de Risco de Framingham (ERF).

## MÉTODO

Tratou-se de um estudo transversal com 154 profissionais da área da saúde que atuavam nos seguintes serviços de atendimento pré-hospitalar: Serviço de Atendimento Médico de Urgência - 192 (SAMU-192) e Grupo de Atendimento às Urgências - 193 (GRAU-193), ambos da cidade de São Paulo com abrangência nas quatro regiões da cidade (norte, sul, leste e oeste), e SAMU - Vale do Ribeira-SP, localizado na Rodovia BR-116. O cálculo do tamanho da amostra foi realizado para uma variável dicotômica em estudo descritivo, no qual a proporção de casos esperados foi de 20%, com a largura de confiança de 0,10 (0,5 acima e 0,5 abaixo) a um nível de confiança de 99%, obtendo-se amostra mínima de 130 participantes. Os critérios de inclusão foram: ser profissional da área da saúde, atuar diretamente no atendimento às vítimas e ter no mínimo três meses de atividade profissional no serviço pré-hospitalar. Os profissionais foram convidados para participar do estudo de forma aleatória, através de contato telefônico, e-mail ou pessoalmente em suas bases de trabalho. Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tendo sido o projeto aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, sob nº 742/2008.

**Os profissionais de saúde que atuam no atendimento pré-hospitalar podem estar sujeitos aos fatores de risco cardiovascular pelo estilo de vida adotado e pelas características específicas de sua ocupação.**

há, pelo menos, 30 minutos. Para a análise estatística foi considerada a média das duas últimas aferições, sendo os participantes classificados como hipertensos quando a pressão sistólica fosse  $\geq 140$  mmHg e/ou pressão diastólica  $\geq 90$  mmHg ou referência de uso de anti-hipertensivos.

Os participantes receberam um questionário auto-aplicável com as seguintes variáveis socioeconômicas: idade (em anos); categoria profissional (médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem); tabagismo (qualquer quantidade de cigarro diária e os que pararam há menos de 1 ano); consumo de bebidas alcoólicas (considerados bebedores todos que referiram uso independente do tipo e quantidade); atividade física (considerada regular a prática de, pelo menos, 30 minutos de atividade, de forma contínua ou acumulada, três ou mais vezes por semana); tempo de formado; carga de trabalho semanal e uso atual de medicamentos.

O peso (em quilogramas) e a altura (em metros) foram determinados por meio de uma balança antropométrica mecânica, possibilitando o cálculo do Índice de Massa Corpórea (peso/altura<sup>2</sup>) classificado segundo os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS) em: saudável (<25 kg/m<sup>2</sup>), sobre peso (25 a 29,9 kg/m<sup>2</sup>) e obeso ( $\geq 30$  kg/m<sup>2</sup>)<sup>(7)</sup>. Na determinação da circunferência abdominal a medida foi realizada à meia distância, entre a crista ilíaca e o rebordo costal, usando-se fita métrica inelástica ajustada ao corpo, adotando-se a classificação de acordo com os critérios da OMS (para o sexo masculino: <94 cm, normal;  $\geq 94$  cm, risco aumentado; e  $\geq 102$  cm, risco muito aumentado. Para o sexo feminino os valores foram: <80 cm, normal;  $\geq 80$  cm, risco aumentado; e  $\geq 88$  cm, risco muito aumentado).

Para a coleta de exames laboratoriais usou-se o sistema vacutainer. Foi colhido sangue venoso antecubital, após 12 horas de jejum e encaminhado, logo em seguida, ao laboratório. Após a obtenção dos resultados laboratoriais os participantes foram classificados de acordo com seu perfil lipídico, glicemia e a proteína C reativa (em quartis).

Com base no escore de risco de Framingham foi calculado o risco cardiovascular global de cada indivíduo. O escore de risco de Framingham inclui em sua análise os seguintes fatores de risco: idade, colesterol total, HDL-c, pressão arterial, diabetes e tabagismo, com pontuação específica para cada um dos itens<sup>(8)</sup>. A soma dos pontos conferiu o escore global de cada indivíduo assim discriminado: baixo risco  $\leq$  a 10%; médio risco, maior que 10%, porém, menor do que 20%; e alto risco  $\geq$  a 20%.

Para a análise estatística foi usado o software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 7.5. As variáveis classificatórias descritivas são apresentadas em frequências absolutas (n) e relativas (%) e os dados contínuos em média e desvio padrão. Os testes Qui-quadrado e o exato de Fischer foram usados quando pertinentes. O valor de  $p<0,05$  foi considerado estatisticamente significante. As variáveis que apresentaram significância na análise univariada foram submetidas à regressão logística.

## RESULTADOS

Foram avaliados 154 profissionais, sendo pouco mais da metade da amostra composta por enfermeiros (59%), seguida pelos médicos (26%) e auxiliares de enfermagem (15%). Houve predomínio do sexo feminino (60% vs 40%) e de adultos jovens ( $40,9 \pm 7,8$  anos). A referência de familiares com hipertensão foi elevada (82,5%), e apenas 20,1% citaram antecedentes pessoais. Em relação aos hábitos de vida, um quinto informou ser tabagista, porém a ingestão de bebidas alcoólicas foi bem mais elevada (47,5%), o mesmo ocorrendo com a falta de atividade física regular (65%). No tocante às características profissionais, pouco menos da metade (43,5%) trabalhava mais que 60 horas semanais e, montante similar, (45%) referiu dormir durante o dia quando estava no serviço de atendi-

mento pré-hospitalar. A maioria possuía duas décadas de formada (74%), trabalhava até 10 anos no serviço (70%) e mais da metade mencionou trabalhar cansado frequentemente, ou algumas vezes (58,8%). Os entrevistados informaram ainda que atualmente realizavam tratamento de saúde (48%), sendo o mais apontado o tratamento anti-depressivo (77%). Verificou-se também a informação de acidentes durante o atendimento no serviço pré-hospitalar (43,5%), sendo o mais frequente lesões com material perfurocortante (33%) (Tabela 1).

**Tabela 1** - Características sóciodemográficas dos profissionais que atuam no atendimento pré-hospitalar - São Paulo, SP - 2010

Características	N (%)
<b>Sexo</b>	
Masculino	61 (39,6)
Feminino	93 (60,4)
Média ± desvio-padrão	40,9 ± 7,8
<b>Idade (anos)</b>	
20 I—I 30	15 (9,7)
31 I—I 40	61 (39,6)
41 I—I 50	56 (36,6)
> 50	22 (14,1)
Média ± desvio padrão	15,9 ± 7,8
<b>Anos de formado</b>	
01 I—I 05	15 (9,7)
06 I—I 10	30 (19,5)
11 I—I 15	33 (21,4)
16 I—I 20	36 (23,4)
> 20	40 (26,0)
<b>Categoria profissional</b>	
Enfermeiros	90 (58,4)
Médicos	41 (26,6)
Auxiliares de enfermagem	23 (14,9)
<b>Carga de trabalho semanal (horas)</b>	
12 I—I 24	07 (4,5)
25 I—I 30	14 (9,1)
31 I—I 40	13 (8,4)
41 I—I 50	19 (12,3)
51 I—I 60	34 (22,1)
> 60	67 (43,5)
Antecedentes pessoais p/ hipertensão arterial	31 (20,1)
Antecedentes familiares p/ hipertensão arterial	127 (82,5)
Atualmente realiza outros tratamentos de saúde	48 (31,2)
<b>Tipo de tratamento</b>	
Depressão	37 (77,1)
Hipotiroidismo	08 (16,7)
Obesidade	03 (6,3)
Já sofreu acidentes durante o atendimento	67 (43,5)
Perfurocortante	22 (33,0)
Tabagismo	31 (20,1)
Ingestão de bebidas alcoólicas	73 (47,5)
Atividade Física	54 (35,1)
Atividade Física	54 (35,1)

**Tabela 2** - Características clínicas e antropométricas dos profissionais que atuam em serviços de atendimento pré-hospitalar - São Paulo, SP - 2010

Características	N (%)	
<b>Pressão arterial (mmHg)</b>		
< 140 e < 90		103 (66,9)
≥ 140 / ≥ 90		51 (33,1)
Média ± desvio-padrão		125,3 ± 14,9 / 79,3 ± 10,8
<b>Índice de massa corporal (kg/m<sup>2</sup>)</b>		
Saudável: < 25		54 (34,4)
Sobre peso: 25 – 29,9		66 (42,9)
Obesidade: ≥ 30		35 (22,7)
Média ± desvio-padrão		27,4 ± 4,6
<b>Circunferência abdominal (cm)</b>		
Masculino:	Masculino:	Feminino:
Normal: < 94	< 94	< 80
Risco aumentado: ≥ 94	≥ 94	≥ 80
Risco muito aumentado: ≥ 102	≥ 102	≥ 88
Média ± desvio-padrão		91,3 ± 13,1
<b>Glicemia (mg/dL)</b>		
Normal: < 110		137 (89,0)
Tolerância diminuída a glicose: > 110 e < 126		13 (8,4)
Diabetes mellitus: ≥ 126		04 (2,6)
Média ± desvio-padrão		89 ± 13,2
<b>Colesterol total (mg/dL)</b>		
Ótimo: < 200		99 (64,3)
Limítrofe: 200 — 239		38 (24,7)
Alto: ≥ 240		17 (11,0)
Média ± desvio-padrão		188,8 ± 37,1
<b>LDL-c: Low Density Lipoprotein (mg/dL)</b>		
Ótimo: < 100		52 (33,8)
Desejável: 100 — 129		55 (35,7)
Limítrofe: 130 — 159		35 (22,7)
Alto: 160 — 189		10 (6,5)
Muito alto: ≥ 190		02 (1,3)
Média ± desvio-padrão		116,3 ± 30,6
<b>HDL-c: High Density Lipoprotein (mg/dL)</b>		
Baixo: < 40		43 (27,9)
Limítrofe: 40 — 60		94 (61,0)
Alto: > 60		17 (11,0)
Média ± desvio-padrão		47,5 ± 11,9
<b>Triglicérides (mg/dL)</b>		
Ótimo: < 150		108 (70,1)
Limítrofe: 150 a 200		21 (13,6)
Alto: 201 a 499		23 (14,9)
Muito alto: ≥ 500		02 (1,3)
Média ± desvio-padrão		128,1 ± 85,2
<b>Proteína C reativa (mg/dL)</b>		
Primeiro quartil: < 0,1		41 (26,6)
Segundo quartil: 0,1 — 0,3		51 (33,1)
Terceiro quartil: 0,3 — 0,5		38 (24,7)
Quarto quartil: > 0,5		24 (15,6)
Média ± desvio-padrão: 0,2 ± 0,8		
<b>Escore de Risco Framingham</b>		
Baixo risco (≥ 10%)		136 (88,4)
Médio Risco (> 10% e < 20%)		16 (10,3)
Alto risco (≥ 20%)		02 (1,3)

Os dados clínicos e antropométricos encontram-se sumarizados na Tabela 2. Em relação à pressão arterial verificou-se que 33,1% dos profissionais apresentavam níveis pressóricos considerados alterados, compatíveis com hipertensão arterial; mais da metade estava com seu Índice de Massa Corpórea e cintura abdominal também alterados (65,6% e 70,2%, respectivamente). Observou-se que 11% apresentaram glicemia acima da faixa da normalidade. Os níveis de colesterol estavam acima do desejável em 35,7%, o LDL-c em 29,2% e triglicérides em 29,8%. Apenas 11,0 % apresentaram níveis ideais de HDL-c e 40,3% proteína C reativa nos maiores quartis. Em relação ao Escore

de Risco de *Framingham*, 11,6% classificaram-se na faixa de médio ou alto risco para apresentarem evento coronariano em 10 anos.

Os dados da Tabela 3 apresentam as variáveis estudadas que se associaram, de forma estatisticamente significante ( $p < 0,05$ ), com os níveis da pressão arterial, classificados ou não em hipertensão. Dessa forma a presença de níveis compatíveis com hipertensão arterial associou-se ao sexo masculino, idade acima de 40 anos, trabalhar frequentemente cansado e o Escore de Risco *Framingham* nos níveis médio e alto.

**Tabela 3** - Distribuição dos profissionais que atuam em serviços de atendimento pré-hospitalar, segundo as variáveis que se associaram com a pressão arterial normal ou alterada - São Paulo, SP - 2010

Variável	Pressão Arterial				Valor de p
	< 140 mmHg e/ou N	< 90 mmHg %	≥ 140 mmHg e/ou N	≥ 90 mmHg %	
<b>Sexo</b>					
Masculino	32	52,5	29	47,5	0,02
Feminino	71	76,3	22	23,7	
<b>Idade (anos)</b>					
≤ 40	56	54,6	20	39,2	0,02
> 40	47	45,6	31	60,7	
<b>Trabalha cansado</b>					
Frequentemente	06	35,3	11	64,7	
Algumas vezes	54	74,0	19	26,0	0,01
Raramente/nunca	43	67,1	21	32,9	
<b>Escore de Risco de Framingham</b>					
Baixo risco ( $\leq 10\%$ )	98	72,0	38	28,0	
Médio Risco ( $> 10\%$ e $< 20\%$ )	05	31,0	11	62,0	0,00
Alto risco ( $\geq 20\%$ )	-	-	02	100	

Nos dados da Tabela 4 observa-se a distribuição das variáveis antropométricas e laboratoriais em relação aos níveis pressóricos entre os profissionais que se encontravam nas categorias consideradas alteradas para as variáveis: índice de massa corporal, circunferência abdominal, nível de colesterol total e glicemia apresentaram valores mais elevados da pressão arterial. Já para aqueles com o nível de HDL-c considerado baixo, portanto, inadequado, cursavam com maiores níveis pressóricos sistólicos.

No modelo de regressão logística verificou-se que a presença de hipertensão arterial associou-se com as variáveis HDL-c e Escore de Risco de *Framingham*. Assim, o HDL-c apareceu como um fator protetor. A chance de apresentar hipertensão diminuiu em, aproximadamente, 25% quando o HDL-c encontrava-se na faixa acima de 40 mg/dL. Por outro lado, para o Escore de Risco de *Framingham* a chance de apresentar hipertensão aumentou 23 vezes quando se muda da faixa de médio para alto risco (Tabela 5).

**Tabela 4** - Distribuição dos profissionais que atuam em serviços de atendimento pré-hospitalar, segundo as variáveis laboratoriais e antropométricas em relação aos níveis da pressão arterial - São Paulo - SP - 2010

Variável	Pressão Arterial Casual			
	Pressão Arterial Sistólica		Pressão Arterial Diastólica	
	Média ± DP	Valor de p	Media ± DP	Valor de p
<b>Índice de Massa Corpórea</b>				
Normal	117,6 ± 13,1		75,2 ± 9,6	
Sobrepeso	128,9 ± 15,9	0,00	80,8 ± 11,9	0,00
Obeso <sup>c</sup>	130,2 ± 10,7		82,7 ± 8,4	
<b>Circunferência Abdominal</b>				
Normal	119,3 ± 17,1		75,1 ± 11,2	
Risco aumentado	126,4 ± 14,9	0,00	80,0 ± 11,0	0,00
Risco muito aumentado	129,1 ± 11,4		82,1 ± 9,4	
<b>Colesterol total</b>				
Ótimo	122,7 ± 13,0		78,3 ± 9,9	
Limítrofe	129,2 ± 18,7	0,01	79,4 ± 13,1	0,04
Alto	131,6 ± 12,5		85,3 ± 8,7	
<b>LDL-c</b>				
Ótimo	123,2 ± 14,1		78,0 ± 9,8	
Desejável	124,1 ± 12,7		78,6 ± 10,8	
Limítrofe	126,0 ± 17,9	0,06	79,6 ± 12,2	0,15
Alto	137,2 ± 15,6		85,9 ± 5,1	
Muito alto	135,5 ± 22,6		90,5 ± 26,1	
<b>HDL-c</b>				
Baixo	129,3 ± 13,7		81,8 ± 10,0	
Limítrofe	125,0 ± 15,3	0,01	79,1 ± 11,2	0,06
Alto	116,9 ± 12,2		74,6 ± 8,9	
<b>Triglicérides</b>				
Ótimo	123,4 ± 14,9		78,6 ± 10,6	
Limítrofe	128,2 ± 15,8	0,07	80,6 ± 10,1	0,61
Alto	130,1 ± 13,1		81,2 ± 12,7	
Muito alto	140,5 ± 3,5		84,0 ± 1,4	
<b>Glicemia</b>				
Normal	124,0 ± 13,7		78,3 ± 10,3	
Tolerância diminuída glicose	136,6 ± 23,0	0,00	87,3 ± 13,3	0,00
Diabetes mellitus	133,7 ± 4,5		88,2 ± 2,8	
<b>Proteína C reativa (mg/dL)</b>				
Primeiro quartil	122,2 ± 16,6		76,0 ± 11,0	
Segundo quartil	127,5 ± 13,0	0,23	79,3 ± 10,1	
Terceiro quartil	123,7 ± 15,0		80,5 ± 11,4	0,70
Quarto quartil	128,4 ± 15,1		83,1 ± 10,0	

**Tabela 5** – Resultados do modelo de regressão logística para presença de hipertensão arterial, de acordo com a medida casual da pressão arterial dos profissionais que atuam em serviços de atendimento pré-hospitalar - São Paulo – SP - 2010

Variável	Parâmetro estimado	Erro padrão	p	Odds Ratio	IC 95%
<b>Intercepto</b>	-0,683	0,177	0,00		
<b>HDL-c &gt; 40 mg/dL</b>	-1,360	0,589	0,02	0,257	0,081 0,813
<b>Escore de Risco de Framingham &gt; 10%</b>	3,142	1,242	0,01	23,159	2,029 264,378

## DISCUSSÃO

O presente estudo identificou uma população relativamente jovem em plena atividade laboral com elevada prevalência de fatores de risco cardiovascular. A prevalência de 33,1% para a hipertensão arterial entre os profissionais de saúde estudados é um achado coincidente com estudos nacionais. Considera-se que, no Brasil, 30% dos adultos sejam hipertensos podendo dobrar na faixa etária dos idosos<sup>(6)</sup>. Estudos realizados entre outros grupos específicos de trabalhadores demonstraram uma prevalência variável de hipertensão arterial. Em trabalhadores da indústria de refrigerantes<sup>(9)</sup> observou-se 27% de hipertensos e em trabalhadores de empresa metalúrgica e siderúrgica 24,7%<sup>(10)</sup>. Em funcionários de um complexo hospitalar da cidade de São Paulo a prevalência foi de 26%<sup>(11)</sup> e, também na cidade de São Paulo, estudo com prevalência referida mostrou índice de 32%<sup>(12)</sup>.

A prevalência de hipertensão do presente estudo pode ter sido influenciada pelo tipo de atividade realizada por esses profissionais, como a exposição mais intensa ao estresse físico e mental e alteração do ritmo circadiano durante a jornada de trabalho (geralmente de 24 horas). Tem-se verificado estreita relação entre estresse e elevação dos níveis pressóricos<sup>(13)</sup>.

Outro aspecto que poderia influenciar a prevalência de hipertensão observada foi o achado do índice de massa corporal acima dos níveis considerados saudáveis em 65,6% dos profissionais. Tal achado supera os dados de um estudo<sup>(14)</sup> que observou uma proporção de sobrepeso de 35,7% e obesidade de 17,7%, entre profissionais de saúde da cidade de Teresina no Piauí. Investigação com motoristas de caminhão que trafegavam pela Rodovia Regis Bittencourt, no trecho paulista, mostrou índices também elevados, pois 46% tinham sobrepeso, 36% obesidade e 58% circunferência abdominal aumentada<sup>(15)</sup>. O presente estudo mostrou ainda que o sobrepeso esteve mais presente no sexo masculino, e a obesidade no sexo feminino.

Os dados da literatura demonstram a importância do excesso de peso na hipertensão arterial. O estudo de Framingham relatou que 70% de novos casos de hipertensão arterial estavam relacionados ao excesso de massa corpórea<sup>(16)</sup>. Dada à associação entre hipertensão, envelhecimento e obesidade, pode-se supor que a prevalência de hipertensão entre os profissionais estudados possa progressivamente aumentar se estes não alterarem seu estilo de vida e controlarem o peso corpóreo, já que o envelhecimento é uma variável não modificável. Estudo com hipertensos atendidos em uma Liga de Hipertensão na cidade de São Paulo mostrou que pressão arterial mais elevada (diastólica > 110 mmHg) se associou com envelhecimento e aumento de peso corporal<sup>(17)</sup>. Concomitante aos altos níveis de sobrepeso e obesidade verificou-se ainda que 70% dos profissionais apresentavam cintura abdominal acima do considerado

normal, dados estes que preocupam. Neste contexto destaca-se em relação às características do tecido subcutâneo abdominal, que ele constitui-se em um compartimento do tecido adiposo de grande influência na sensibilidade à insulina predispondo ao Diabetes mellitus, além de secretar mediadores inflamatórios e, assim, aumentando o risco para Diabetes mellitus e intolerância à glicose. A esse cenário acrescenta-se o elevado índice de sedentarismo, pois 65% dos participantes não realizavam nenhuma atividade física. É amplamente aceito que a atividade física regular conduz a uma série de respostas benéficas do sistema cardiovascular. Na população estudada surpreende a alta prevalência de sedentarismo, já que esses profissionais estão expostos, constantemente, a demandas físicas em suas atividades rotineiras no pré-hospitalar.

Em relação ao perfil lipídico os achados também foram preocupantes. Têm se evidenciado relação positiva entre o excesso de peso e a dislipidemia, sendo encontradas elevações leves a moderadas dos níveis séricos de triglicérides e níveis séricos mais baixos de HDL-c. Contudo, os níveis séricos de LDL-c podem ou não estar aumentados<sup>(6)</sup>. A dislipidemia está envolvida na gênese da aterosclerose que se caracteriza por uma resposta inflamatória da parede vascular, as injúrias, como o aumento do LDL-c e proteína C reativa. No presente estudo o achado de 15% dos profissionais com altos níveis de proteína C reativa pode caracterizar um estado de inflamação e/ou infecção. A relação entre o nível de HDL-c e pressão arterial demonstra a sua importância, tendo em vista que permaneceu no modelo de regressão logística.

Outro aspecto relevante foi a presença do tabagismo e ingestão de bebidas alcoólicas, com dados superiores a achados de estudos. Observa-se que 47,5% dos profissionais referiu uso de bebida alcoólica, índice superior ao do estudo<sup>(18)</sup> em população geral da área rural de Minas Gerais (37,6%).

A referência de outros problemas de saúde foi expressiva, pois cerca de um quarto dos profissionais citou tratar a depressão. Dessa forma, a prevalência de depressão nesse grupo foi maior do que na população geral, cuja prevalência estimada é em torno de 3% a 11%<sup>(18)</sup> e maior também encontrada em residentes de enfermagem na pesquisa<sup>(19)</sup> que, utilizando o Índice de Depressão de Beck, verificou uma prevalência de 19,1%. Em nosso meio estudo com amostra de 258 motoristas profissionais de transporte de cargas em uma rodovia brasileira encontrou prevalência de 37% de hipertensão e 33% eram portadores de possíveis transtornos mentais comuns e os participantes referiram sentirem-se nervosos, tensos ou preocupados (56%), dormirem mal (47%), dores de cabeça (37%), ter dificuldade de tomar decisões (38%) e dificuldade de pensar com clareza (20%)<sup>(20)</sup>. A depressão é uma doença altamente incapacitante e crônica. Além dos sintomas emocionais, cognitivos e físicos, exerce importante influência na qualidade de vida. Den-

tre os sintomas da depressão, ocorre humor deprimido, perda do interesse, fadigabilidade, redução da concentração e atenção, sono perturbador, apetite diminuído ou aumentado. Nesse grupo de profissionais a diminuição da concentração e atenção, em especial, é extremamente perigosa, pois estão expostos em situação de risco biológico e ambiental extremos, podendo aumentar as chances de acidentes de trabalho. Quase metade dos profissionais (43,5%) referiu acidente de trabalho e, aproximadamente um terço deles (33%) foi acidente com material perfuro-cortante.

Analizando-se a estratificação de risco cardiovascular da amostra estudada e dentro do conceito atual de prevenção cardiovascular, quando aplicado o ERF, a maioria expressiva (88,4%) encontrava-se na faixa de baixo risco, dados semelhantes aos de pesquisadores<sup>(21)</sup> em sua amostra entre motoristas de ônibus (85%). A presença de maior prevalência de pessoas no escore de baixo risco provavelmente devia-se ao fato de se encontrarem na quarta década de vida, e a idade é um fator importante na determinação do ERF. Deve-se destacar que o princípio fundamental da prevenção é de que um grande número de indivíduos expostos a um risco baixo, provavelmente produzirá mais casos do que um pequeno número de pessoas expostas a um alto risco. O ERF demonstrou ser uma ferramenta importante como preditor de doença coronariana, pois permaneceu no modelo de regressão logística.

## REFERÊNCIAS

1. World Health Organization (WHO). Who Statistical Information System [Internet]. Geneva; 2010 [cited 2010 Sept 8]. Available from: <http://www.who.int/whosis/database/>
2. Brasil. Ministério da Saúde. Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico [Internet]. Brasília; 2010 [citado 2011 maio 15]. Disponível em: [http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/vigitel\\_2009\\_preliminar\\_web\\_20\\_8\\_10.pdf](http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/vigitel_2009_preliminar_web_20_8_10.pdf)
3. Mancia G, Grassi G. The new European Society of Hypertension/European Society of Cardiology (ESH/ESC) Guidelines. Ther Adv Cardiovasc Dis. 2008;2(1):5-12.
4. Kotsis V, Stabouli S, Bouldin M, Low A, Toumanidis S, Zakopoulos N. Impact of obesity on 24-hour ambulatory blood pressure and hypertension. Hypertension. 2005;45(2):602-7.
5. Polanczyc CA. Fatores de risco cardiovascular no Brasil: os próximos 50 anos. Arq Bras Cardiol. 2005;84(3):199-201.
6. Sociedade Brasileira de Hipertensão; Sociedade Brasileira de Cardiologia; Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Rev Bras Hipertensão. 2010;17(1):1-69.
7. Organização Mundial da Saúde (OMS). Obesidade: prevenindo e controlando a epidemia global. São Paulo: Roca; 2004.
8. Wilson PWF, Agostino RBD, Levy D, Belangen AM, Silbershat H, Kannel WB. Prediction of coronary heart disease using risk factor categories. Circulation. 1998;97(18):1837-47.
9. Cassani RSL, Nobre F, Pazin Filho A, Schmidt A. Prevalência de fatores de risco cardiovascular em trabalhadores de uma indústria brasileira. Arq Bras Cardiol. 2009;92(1):16-22.
10. Martinez MC, Latorre MRDO. Fatores de risco para hipertensão arterial e diabetes mellitus em trabalhadores de empresa metalúrgica e siderúrgica. Arq Bras Cardiol. 2006;87(4):471-79.
11. Mion Junior D, Pierin AMG, Bambirra AP, Assunção JH, Monteiro JM, Chinen RY, et al. Hypertension in employees of a university general hospital. Rev Hosp Clin Fac Med S Paulo. 2004;59(6):329-36.

## CONCLUSÃO

Os achados do presente estudo mostraram elevada prevalência de hipertensão arterial e forte associação com ERF. Os dados chamam a atenção por se tratar, principalmente, de profissionais da área da saúde com faixa etária relativamente jovem. A presença de estilos e hábitos de vida inadequados, aliados às características do trabalho da amostra estudada, foram determinantes importantes para a presença de níveis da pressão arterial compatíveis com hipertensão arterial. Salienta-se que estudos transversais não permitem a possibilidade de atribuir causalidade às associações encontradas, já que analisam desfecho e exposição simultaneamente, podendo ser uma das limitações do presente estudo. Entretanto, verificou-se que os profissionais estudados estão expostos a risco cardiovascular, em especial os resultantes do aumento do índice de massa corporal. O desafio é ainda maior por se tratar de profissionais da área da saúde, grupo que detém a informação. Deve ser estimulada a conciliação entre a experiência profissional, adquirida ao longo dos anos de atuação no serviço pré-hospitalar, com boas condições de saúde através da prática de atividade física, como forma de prevenção e reversão dos altos níveis de sobrepeso, obesidade e sedentarismo. Por outro lado, cabe às instituições seu papel de zelar por boas condições de saúde de seus trabalhadores. A excessiva jornada de trabalho identificada, provavelmente seja decorrente de salários insuficientes para garantir uma renda mínima satisfatória.

- 
12. Mion Junior D, Pierin AMG, Bensenor IM, Marin JCM, Costa KRA, Henrique LFO, et al. Hypertension in the city of São Paulo: self-reported prevalence assessed by telephone surveys. *Arq Bras Cardiol.* 2010;95(1):99-106.
  13. Rau R. The association between blood pressure and work stress: the importance of measuring isolated systolic hypertension. *Work Stress.* 2006;20(1):84-97.
  14. Sousa RMRP, Sobral DP, Paz SMRS, Martins MCC. Prevalência de sobre peso e obesidade entre funcionários plantonistas de Unidades de Saúde de Teresina, Piauí - BR. *Rev Nutr. (Campinas).* 2007;20(5):473-82.
  15. Cavagioni LC, Pierin AMG. Hipertensão arterial e obesidade em motoristas profissionais de transporte de cargas. *Acta Paul Enferm.* 2010;23(4):455-60.
  16. Garrison RJ, Kannel WB, Stokes J, Castelli WP. Incidence and precursors of hypertension in young adults: the Framingham Offspring Study. *Prev Med.* 1987;16(2):235-51.
  17. Pierin AMG, Mion Junior D, Fukushima JT, Pinto AR, Kamimura MM. The profile of hypertensive patients related to awareness and level of hypertension. *Rev Esc Enferm USP.* 2001;35(1):11-8.
  18. Fleck MPA, Lafer B, Sougey EB, Del Porto JA, Brasil MA, Juruna MF. Diretrizes da Associação Médica Brasileira para o tratamento da depressão. *Rev Bras Psiquiatr.* 2003;25(2):114-22.
  19. Franco GP, Barros ALBL, Nogueira-Martins LA. Qualidade vida e sintomas depressivos em residentes de enfermagem. *Rev Latino Am Enferm.* 2005;13(2):139-44.
  20. Cavagioni LC, Pierin AMG, Batista KM, Bianchi ERF, Costa ALS. Health problems, hypertension and predisposition to stress in truck drivers. *Rev Esc Enferm USP [Internet].* 2009 [cited 2011 Apr 12];43(n.esp 2):1267-71. Available from: [http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v43nspe2/en\\_a21v43s2.pdf](http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v43nspe2/en_a21v43s2.pdf)
  21. Landim MBP, Victor EG. Framingham score for public transportation drivers in the city of Teresina, Piauí. *Arq Bras Cardiol.* 2006;87(3):280-5.