



Revista Peruana de Medicina
Experimental y Salud Pública

ISSN: 1726-4642

revmedex@ins.gob.pe

Instituto Nacional de Salud
Perú

Guio, Heinner; Levano, Kelly S.; Sánchez, Cesar; Tarazona, David
ROL DE LA FARMACOGENÓMICA EN EL RÉGIMEN DE TRATAMIENTO DE
TUBERCULOSIS
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, vol. 32, núm. 4, 2015, pp.
794-800
Instituto Nacional de Salud
Lima, Perú

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36342990024>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

ROL DE LA FARMACOGENÓMICA EN EL RÉGIMEN DE TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS

Heinner Guio^{1,a}, Kelly S. Levano^{1,b}, Cesar Sánchez^{1,c}, David Tarazona^{1,d}

RESUMEN

La tuberculosis es un problema de salud Pública a nivel mundial con un tercio de la población infectada por el bacilo *Mycobacterium tuberculosis*. El tratamiento de primera línea incluye a las drogas isoniazida (INH) y rifampicina (RIF) metabolizadas en el hígado. La metabolización de drogas está directamente relacionada con la variación genética de *NAT2* y *CYP2E1* (asociados a metabolismo de INH) y *AADAC* (asociados a metabolismo de RIF), y los efectos pueden producir que un individuo sea metabolizador rápido, intermedio o lento. Los polimorfismos en genes de personas con tratamiento estándar de tuberculosis pueden ocasionar efectos en el metabolismo de drogas con consecuencias de hepatotoxicidad e, incluso, posible drogoresistencia. Algunos países han empezado ensayos clínicos enfocados en la personalización del tratamiento a tuberculosis para reducir las consecuencias en pacientes en tratamiento. En países como el Perú, donde se registran altos índices de tuberculosis y, por consiguiente, más población en tratamiento, la farmacogenómica de individuos se convierte en una herramienta crucial para un óptimo tratamiento. La presente revisión destaca la importancia de tener estudios en farmacogenómica e identificar los polimorfismos asociados al metabolismo de las drogas antituberculosas en nuestra población peruana.

Palabras clave: Farmacogenética; *Mycobacterium tuberculosis*; Variación genética (fuente: DeCS BIREME).

THE ROLE OF PHARMACOGENOMICS IN THE TUBERCULOSIS TREATMENT REGIME

ABSTRACT

Tuberculosis is a health problem worldwide with one-third of the population infected with the *Mycobacterium tuberculosis* bacilli. The first-line of treatment for tuberculosis includes the drugs Isoniazid (INH) and Rifampicin (RIF) metabolized in the liver. Drug metabolism is directly related to the genetic variation of *NAT2* and *CYP2E1* (associated with INH metabolism) and *AADAC* (associated with RIF metabolism), and the effects produced in an individual may be a fast, intermediate or slow metabolizer. Polymorphisms in genes of people in standard tuberculosis treatment can cause effects on drug metabolism with consequences of hepatotoxicity and even drug resistance. Countries have began clinical trials focused on personalization of tuberculosis treatment to reduce the consequences for patients in treatment. In countries like Peru, where high rates of tuberculosis are recorded and therefore more people in treatment, the pharmacogenomic of individuals becomes a crucial tool for an optimum tuberculosis treatment. This review highlights the importance of having pharmacogenomic studies and having the identification of polymorphisms associated to the metabolism of the anti-tuberculosis drugs in our Peruvian population.

Key words: Pharmacogenetics; *Mycobacterium tuberculosis*; Genetic variation (source: MeSH NLM).

LA GENÓMICA

La genómica, definido por Guttmacher y Collins como el estudio de genes individuales en relación a sus efectos en la fisiología y la interacción con otros genes del genoma, está tomando cada vez más importancia en los estudios biomédicos ⁽¹⁾. De acuerdo con el artículo "A vision for the future of genomics research" (una visión del futuro de la investigación genómica)

escrito por Collins *et al.*, la genómica inició con el descubrimiento de las leyes de la herencia de Gregor Mendel en 1865 ^(2,3) y junto con el reconocimiento de ADN como el material hereditario en 1944 por Oswald Avery, Collin MacLeod y Maclyn McCarty ⁽⁴⁾, el establecimiento de la estructura de doble hélice del ADN en 1953 por Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick ⁽⁵⁾, el desarrollo de la tecnología de ADN recombinante en 1972 por Stanley Cohen y Herbert Boyer ⁽⁶⁾, la invención

¹ Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú

^a Médico PhD en Ciencias Médicas; ^b bióloga PhD en Bioquímica; ^c médico; ^d genetista-biotecnólogo, máster en Biología Molecular

Recibido: 20-10-15 Aprobado: 18-11-15

Citar como: Guio H, Levano KS, Sanchez C, Tarazona D. Rol de la farmacogenómica en el régimen de tratamiento de tuberculosis. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2015;32(4):794-800.

del método de secuenciación en 1977 por Frederick Sanger y Allan Maxam ^(6,7), el desarrollo de la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en 1985 ⁽⁸⁾, y el desarrollo de la primera generación de un mapa genético humano en 1987 ⁽⁹⁾ en conjunto, llevaron al desarrollo del Proyecto del Genoma Humano en 1990 y culminaron con el secuenciamiento total del genoma humano en el año 2003. La genómica está llevando la investigación biomédica a una nueva gran escala (*Big data*) permitiendo la aparición de nuevas perspectivas y aplicaciones de este conocimiento profundo de la interacción de genes y medioambiente.

LA FARMACOGENÓMICA

Estamos viviendo en la era de las “ómicas”, con nuevas áreas de investigación, incluyendo, la genómica humana, metagenómica, nutrigenómica, transcriptómica, proteómica y farmacogenómica. Esta última es una de las más prometedoras para la llamada “medicina personalizada”. La genómica humana ha generado mucha información, en especial entre las interacciones de genoma-enfermedad y genoma-droga, la cual ha transformado la farmacogenética a la farmacogenómica ^(10,11). La farmacogenética se enfoca en estudiar el efecto de polimorfismos de un gen en el metabolismo y la acción de medicamentos en cada individuo para poder así optimizar el tratamiento, aumentando la eficacia y reduciendo los efectos adversos. La farmacogenómica, nos traslada al siguiente paso, encontrar nuevas y potenciales dianas, evaluando la respuesta no solo de un gen sino de múltiples genes, y así poder proponer nuevas estrategias para evaluar y desarrollar medicamentos ⁽¹²⁾.

TUBERCULOSIS, FARMACOGENÓMICA Y DROGORRESISTENCIA

Se conoce que la farmacogenómica desempeña un papel importante en el estudio del metabolismo de las drogas antituberculosas y así en las aplicaciones clínicas en términos de la eficacia al tratamiento ⁽¹³⁾, y es aquí donde nos centraremos en el presente simposio.

Como se conoce, la tuberculosis (TB) es un problema de salud pública a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2013 se reportaron nueve millones de casos de tuberculosis, y 1,5 millones de muertes. Más del 95% de muertes por TB ocurren en los países de bajo y mediados ingresos como el Perú, el cual tuvo una incidencia de TB estimada a 124 000 en el 2013. Casi al 100% de los casos de TB sensible pueden ser curados si la terapia es administrada adecuadamente y a tiempo. Adicionalmente a este problema, el incremento de casos de drogorresistencia se está haciendo cada vez más evidente, en el 2013, la

OMS reportó 480 000 casos de TB multidrogorresistente (TB-MDR) a nivel mundial, y en el Perú 3,9% de casos de TB fueron TB-MDR.

La drogorresistencia en TB puede ocurrir debido a la administración inadecuada de los medicamentos. La dosis o concentración adecuada de un medicamento depende de su tasa de absorción, distribución, biotransformación y excreción dentro del organismo. La farmacocinética se enfoca en esta fase estudiando el curso y distribución del medicamento/droga y sus metabolitos. La farmacodinámica se encarga de estudiar los mecanismos de acción, y los efectos bioquímicos y fisiológicos de la droga ⁽¹⁴⁾. La farmacocinética y la farmacodinámica son afectadas por la variabilidad genética que existe entre distintas poblaciones e individuos. La presencia de polimorfismos en genes que codifican las enzimas que procesan los medicamentos puede afectar su actividad metabólica y, por consiguiente, la concentración del medicamento en sangre, llevando a un tratamiento fallido. La dinámica de concepción en el tratamiento médico está cambiando desde la medicina curativa (diagnóstico y tratamiento), la medicina preventiva (intervención para evitar o retrasar la aparición de la enfermedad) a la medicina predictiva (identificación del perfil genético para un tratamiento personalizado). Por consiguiente, vemos la necesidad de incluir un análisis personalizado de los polimorfismos en los genes asociados al metabolismo de los medicamentos antes de la prescripción y dosificación de un tratamiento indicado.

A la fecha, todavía están pendientes los estudios del perfil completo de polimorfismos presentes en los genes que codifican las enzimas que procesan los medicamentos de tratamiento de primera línea para TB en la población peruana. Las drogas de primera línea para tratar TB son isoniazida (INH) y rifampicina (RIF) y la resistencia a ellas no solamente sería debido a una falta de adherencia al tratamiento, sino también a un factor genético ⁽¹⁵⁾. Estudios han reportado que deleciones y mutaciones en el gen *katG*, el cual codifica una catalasa-peroxidasa que convierte la INH a su forma activa, fueron asociados con resistencia a INH ^(15,16). La resistencia a RIF es conferida por mutaciones puntuales, deleciones de nucleótidos o inserciones en una región del gen *rpoB*, la cual codifica la β -subunidad de la ARN polimerasa ^(15,17). La sensibilidad y resistencia a drogas está relacionado al genoma del patógeno; sin embargo, como ya se mencionó, polimorfismos en los genes del huésped involucrados en el procesamiento y disponibilidad de las drogas antituberculosas pueden llevar a la adquisición de resistencia, así como en los genes que codifican las enzimas que procesan INH, *N*-acetiltransferasa 2 (NAT2) y el citocromo P4502E1 (CYP2E1) en humanos ⁽¹⁸⁻²¹⁾.

Estas dos enzimas se encuentran en el hígado y trabajan en conjunto para metabolizar INH a acetilisoniazida, seguido por hidrólisis a acetilhidrazina y oxidación a metabolitos tóxicos (Figura 1). Aunque se conoce menos sobre las enzimas que metabolizan a RIF, estudios previos han reportado que polimorfismos en la enzima arilacetamida desacetilasa (AADAC) ⁽²²⁾, el cual desacetiliza a RIF, ocasionando cambios en su actividad farmacológica (Figura 1). Polimorfismos en estos genes pueden causar un incremento en la actividad metabólica llevando a una disminución en la concentración mínima inhibitoria para eliminar el *Mycobacterium tuberculosis*, la cual podría resultar eventualmente en drogoresistencia. Por el contrario, los polimorfismos también pueden causar una disminución en la actividad metabólica llevando a un incremento en la concentración sérica de las drogas, resultando en hepatotoxicidad inducida por drogas antituberculosas.

NAT2

La enzima NAT2 ha sido extensamente estudiada. Es una enzima detoxificante expresada principalmente en el hígado. Acetiliza varias drogas actualmente en el mercado, incluyendo, INH, sulfamidina, hidralazina, dapsona, procaina amida, sulfapiridina y nitrazepam ⁽²³⁾. El gen *NAT2*, el cual contiene un solo exon de 870 pares de bases, codifica 290 aminoácidos, y se conocen 16 polimorfismos de nucleótido único (SNP) y una deleción de un par de bases, los cuales han sido asociados con una alteración en la actividad metabólica ⁽²⁴⁻²⁶⁾. Existen 36 haplotipos de alelos conocidos, y cada haplotipo individual tiene un fenotipo predictivo de lento, intermedio o rápido (Tabla 1). El fenotipo de un individuo (metabolizador lento, intermedio o rápido) está basado en la identificación de los SNP y los haplotipos encontrados en *NAT2*. Durante la genotipificación se identificará dos haplotipos. La identificación de dos haplotipos rápidos nos lleva a fenotipificar como un metabolizador rápido, mientras que genotipificar dos haplotipos lentos fenotipifica un metabolizador lento. En el caso de encontrarse un haplotipo rápido y el otro lento el fenotipo resultante será catalogado como intermedio ⁽²⁷⁾. Kuznetsov *et al.* han desarrollado un servidor web de acceso libre para la determinación rápida de los fenotipos de *NAT2* en un tamizaje genético (<http://nat2pred.tit.albany.edu>) ⁽²⁷⁾.

Los estudios de diversidad genética en las poblaciones son importantes porque identifica los polimorfismos propios para cada población. La base de la farmacogenómica es que no se puede extrapolar el genotipo obtenido en otras poblaciones para la elección y dosificación de un determinado fármaco. Basado en estos conceptos, el Instituto Nacional de Salud del Perú en colaboración con la

Tabla 1: Los 36 haplotipos de alelos para NAT2.

	ALELO	CAMBIO NUCLEÓTIDO	CAMBIO DE AMINO ACIDO	FENOTIPO
1	NAT2*4	ninguno		RÁPIDO
2	NAT2*5A	341T-->C 481C-->T	I114T	LENTO
3	NAT2*5B	341T-->C 481C-->T 803A-->G	I114T K268R	LENTO
4	NAT2*5C	341T-->C 803A-->G	I114T K268R	LENTO
5	NAT2*5D	341T-->C	I114T	LENTO
6	NAT2*5E	341T-->C 590G-->A	I114T R197Q	LENTO
7	NAT2*5F	341T-->C 481C-->T 759C-->T 803A-->G	I114T K268R	LENTO
8	NAT2*5G	282C-->T 341T-->C 481C-->T 803A-->G	I114T K268R	LENTO
9	NAT2*5H	341T-->C 481C-->T 803A-->G 859T-->C	I114T K268R I287T	LENTO
10	NAT2*5I	341T-->C 411A-->T 481C-->T 803A-->G	I114T L137F K268R	LENTO
11	NAT2*5J	282C-->T 341T-->C 590G-->A	I114T R197Q	LENTO
12	NAT2*6A	282C-->T 590G-->A	R197Q	LENTO
13	NAT2*6B	590G-->A	R197Q	LENTO
14	NAT2*6C	282C-->T 590G-->A 803A-->G	R197Q K268R	LENTO
15	NAT2*6D	111T-->C 282C-->T 590G-->A	R197Q	LENTO
16	NAT2*6A	481C-->T 590G-->A	R197Q	LENTO
17	NAT2*7A	857G-->A	G286E	LENTO
18	NAT2*7B	282C-->T 857G-->A	G286E	LENTO
19	NAT2*10	499G-->A	E167K	INDETERMINADO
20	NAT2*11A	481C-->T	None	INDETERMINADO
21	NAT2*11B	481C-->T 859Del	S287 Frameshift	INDETERMINADO
22	NAT2*12A	803A-->G	K268R	RÁPIDO
23	NAT2*12B	282C-->T 803A-->G	K268R	RÁPIDO
24	NAT2*12C	481C-->T 803A-->G	K268R	RÁPIDO
25	NAT2*12D	364G-->A 803A-->G	D122N K268R	INDETERMINADO
26	NAT2*13	282C-->T	None	RÁPIDO
27	NAT2*14A	191G-->A	R64Q	LENTO
28	NAT2*14B	191G-->A 282C-->T	R64Q	LENTO
29	NAT2*14C	191G-->A 341T-->C 481C-->T 803A-->G	R64Q I114T K268R	LENTO
30	NAT2*14D	191G-->A 282C-->T 590G-->A	R64Q R197Q	LENTO
31	NAT2*14E	191G-->A 803A-->G	R64Q K268R	LENTO
32	NAT2*14F	191G-->A 341T-->C 803A-->G	R64Q I114T K268R	LENTO
33	NAT2*14G	191G-->A 282C-->T 803A-->G	R64Q K268R	LENTO
34	NAT2*17	434A-->C	Q145P	INDETERMINADO
35	NAT2*18	845A-->C	K282T	INDETERMINADO
36	NAT2*14A	190C-->T	R64W	INDETERMINADO

Tabla 2a: Frecuencias de alelos de NAT2 en diferentes poblaciones del mundo

	Surcoreanos	Españoles	Sur Brasileños	Egipcios	Argentinos	Sudafricanos	Japoneses	Indios	Marroquíes
NAT2*5	0,01	0,47	0,289	0,497	0,37	0,361	0,019	0,33	0,53
NAT2*6	0,224	0,25	0,104	0,26	0,256	0,17	0,23	0,38	0,25
NAT2*7	0,132	0,006	0,021	0,028	0,08	0,067	0,011	0,38	0,02
NAT2*14	0	0,004	0,014	-	0,013	0,103	-	0,03	0,04
n	288	258	254	199	185	97	79	61	163

n=número de muestra

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis (ESNPCT) está identificando los polimorfismos en los genes que codifican a las enzimas (NAT2, AADAC y CYP2E1) responsables de metabolizar INH y RIF en la población peruana con diagnóstico de tuberculosis. Fuselli *et al.* en el 2007, analizaron los polimorfismos en NAT2 en 456 participantes de 12 poblaciones nativo americanas (Chipewyan y Cree de Canadá; Pima y Maya de México; Piapoco y Curripaco de Colombia; Cayapa de Ecuador; San Martín y Tayacaja de Perú; Karitiana, y Surui, Xavante de Brasil.

Los polimorfismos en NAT2⁽²⁶⁾. En los resultados no se observó ningún polimorfismo único o propio para las poblaciones americanas, y el promedio de frecuencias de metabolizadores rápidos, intermedios y lentos fue de 18, 56, 25% respectivamente, en todas las poblaciones nativas. Este primer estudio de polimorfismos en varias poblaciones basado en 66 muestras de Perú, no provee suficiente evidencia para optimizar la concentración de la droga y disminuir los efectos secundarios de la isoniazida en la población peruana con diagnóstico de tuberculosis. El estudio "Frecuencia de los genotipos NAT2, CYP2E1 y AADAC en pacientes peruanos con diagnóstico de tuberculosis pulmonar" que se está planteando desde el Instituto Nacional de Salud analizará 500 pacientes con diagnóstico de TB en Lima, la cual concentra el 70% de pacientes del Perú.

Otros países ya han reportado los genotipos de NAT2 en sus poblaciones, entre ellos están, China⁽²⁸⁾, México⁽²⁸⁻³⁰⁾, Morocco⁽³¹⁾, India⁽³²⁾ y Brasil⁽³³⁾, encontrado diferencias en sus genotipos comparados con los de otras poblaciones. La Tabla 2a muestra un metaanálisis de las frecuencias de los alelos de NAT2 en nueve poblaciones⁽³¹⁾.

Tabla 2a: Frecuencias de alelos de NAT2 en diferentes poblaciones del mundo

	Turcos	Taiwaneses	Serbios	Franceses	Ingleses	Brasileños	Chinos	Indios	Españoles	Marroquíes
c1/c1	0,947	0,55	0,904	0,916	0,968	0,908	0,598	0,98	0,879	0,985
c1/c2	0,053	0,401	0,09	0,047	0,032	0,592	0,374	0,02	0,121	0,015
c2/c2	0	0,048	0,006	0	0	0	0	0,028	0	0
n	302	269	177	172	155	141	107	100	58	130

n=número de muestra

CYP2E1

El gen CYP2E1 es miembro de la familia de enzimas del citocromo P450, su función es importante en el metabolismo y bioactivación de compuestos de bajo peso molecular (etanol y acetona), procarcinógenos (benceno, N-nitrosodimetilamina y estireno), y drogas (INH, acetaminofeno, clorzoxazona y anestésicos)⁽³⁴⁾. Se ha reportado que el gen CYP2E1 tiene varios polimorfismos, pero solo uno (rs2031920 (-1053 C>T)) ha sido extensamente evaluado en asociación con las drogas antituberculosas, este polimorfismo puede afectar la actividad de la enzima^(31,35). El genotipo (C/C) ha sido asociado a la reducción de actividad metabólica (metabolizador lento) de CYP2E1 y así causando un alto riesgo de hepatotoxicidad. La tabla 2b muestra un metaanálisis de las frecuencias de los genotipos reportados para CYP2E1, en el cual se demuestra la variación genética entre diferentes poblaciones⁽³¹⁾.

AADAC

Actualmente no existe mucha información de frecuencias de genotipos en la enzima AADAC. Se ha reportado que es una enzima relacionada al metabolismo de RIF, miembro de la superfamilia de serina esterasa, la cual se expresa en el hígado y en el tracto gastrointestinal⁽³⁶⁾. Uno de los polimorfismos que ha sido reportado por afectar la actividad de esta enzima es AADAC*3: 14008T>C. Esta enzima está siendo considerada y analizada en un estudio actual del Instituto Nacional de Salud en pacientes con tuberculosis, trabajo en el que reportarán los genotipos presentes en nuestra población.

TERAPIA BASADA EN LA FARMACOGENÓMICA

Como hemos venido mencionando, la importancia de determinar la variabilidad genética de la población

peruana con el fin de rediseñar el régimen de tratamiento antituberculoso y administrar la dosis adecuada. En Japón ya se han empezado ensayos clínicos para evaluar el cambio de régimen de tratamiento basado en los polimorfismos del gen *NAT2* ⁽³⁷⁾, Azuma *et al.*, se basaron en estudios previos de farmacocinética para determinar la dosis clínica apropiada para cada genotipo. De acuerdo con estos estudios, individuos con fenotipo lento deben recibir mitad de la dosis estándar, mientras que individuos con fenotipo rápidos deben recibir 1,5 veces la dosis estándar ⁽³⁸⁾. De acuerdo con la Norma Técnica de salud para la atención integral de las personas afectadas por tuberculosis/Ministerio de Salud del 2013 y a nivel mundial, la dosis actual de los medicamentos antituberculosos de primera línea, isoniazida (INH) y rifampicina (RIF) para pacientes con diagnóstico de TB mayores de 15 años son: para la fase inicial, 5 mg/kg (máximo 300 mg) de INH y 10 mg/kg (máximo 600 mg) de RIF de forma diaria, y para segunda fase 10 mg/kg (máximo 900 mg) de INH y 10 mg/kg (máximo 600mg) de RIF tres veces por semana. Debemos de considerar la reevaluación de estas dosis basándonos en los genotipos de nuestra población y/o de cada individuo. Los resultados del ensayo clínico de Azuma *et al.* mostraron que hubo una incidencia baja de lesión hepática del 15% para los metabolizadores rápidos que recibieron la dosis modificada basada en el genotipo de *NAT2* comparada con una incidencia de 38% de los que recibieron la dosis estándar. Asimismo, un 78% de los metabolizadores lentos que recibieron la dosis estándar tuvieron una lesión hepática relacionada a INH, mientras que ninguno de los metabolizadores lentos que recibieron la dosis modificada basado en el genotipo de *NAT2* tuvieron problemas hepáticos. El ensayo clínico demuestra el beneficio en la reducción de los efectos adversos de pacientes en tratamiento estándar y pacientes en tratamiento modificado basado en los genotipos de metabolización de drogas INH.

En países con población homogénea y heterogénea,

se observa individuos con genotipos distintos en la metabolización de drogas. ¿Cual será la distribución en nuestra población? En nuestro estudio "Frecuencia de los genotipos *NAT2*, *CYP2E1* y *AADAC* en pacientes peruanos con diagnóstico de tuberculosis pulmonar", ampliaremos nuestro conocimiento de la distribución alélica para los genes involucrados en la metabolización de drogas INH y RIF en nuestra población.

COMENTARIOS FINALES

Las concentraciones en sangre de las drogas antituberculosas varían significativamente entre poblaciones y/o individuos. La estrategia de "una sola dosis para todos" en el tratamiento contra TB debería reevaluarse. Como hemos venido enfatizando en este simposio, si el tratamiento es inadecuado puede fracasar, provocar hepatotoxicidad y drogoresistencia. Los polimorfismos en las enzimas responsables del metabolismo de INH y RIF son uno de los factores más comunes que causa variabilidad interindividual. En un futuro cercano, la determinación del genotipo metabolizador debe de incluirse en el protocolo de evaluación para así dar un tratamiento personalizado adecuado que incremente la eficacia y disminuya los efectos secundarios (Figura 2). El análisis de los genotipos de *NAT2*, *CYP2E1* y *AADAC* en personas con diagnóstico de TB en el Perú será de gran importancia para determinar los polimorfismos presentes en nuestra población y así determinar nuestro fenotipo metabolizador.

Contribuciones de autoría: HG y KL han participado en la concepción del artículo. HG, KL, CS y DT participado en la recolección de datos, análisis e interpretación del artículo, redacción del artículo, revisión crítica del artículo.

Fuentes de financiamiento: Instituto Nacional de Salud, CNSP.
ctos de interés: ninguna.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Gutmacher AE, Collins FS. *Genomic medicine--a primer*. N Engl J Med. 2002 Nov 7;347(19):1512-20.
- Mendel G. *Versuche über Pflanzen-Hybriden*. Verhandlungen des naturforschenden Vereines, Abhandlungen, Brünn. 1866;4:3-47.
- Collins FS, Green ED, Gutmacher AE, Guyer MS; US National Human Genome Research Institute. *A vision for the future of genomics research*. Nature. 2003 Apr 24;422(6934):835-47.
- Avery OT, Macleod CM, McCarty M. *Studies on the Chemical Nature of the Substance Inducing Transformation of Pneumococcal Types: Induction of Transformation by a Desoxyribonucleic Acid Fraction Isolated from Pneumococcus Type III*. J Exp Med. 1944 Feb 1;79(2):137-58.
- Watson JD, Crick FH. *Molecular structure of nucleic acids; a structure for deoxyribose nucleic acid*. Nature. 1953;171(4356):737-8.
- Cohen SN, Chang AC, Boyer HW, Helling RB. *Construction of biologically functional bacterial plasmids in vitro*. Proc Natl Acad Sci U S A. 1973 Nov;70(11):3240-4.
- Sanger F, Coulson AR. *A rapid method for determining sequences in DNA by primed synthesis with DNA polymerase*. J Mol Biol. 1975 May;94(3):441-8.
- Smith LM, Sanders JZ, Kaiser RJ, Hughes P, Dodd C, Connell CR, *et al*. *Fluorescence detection in automated*

- DNA sequence analysis. *Nature*. 1986 Jun 12-18;321(6071):674-9.
9. Committee on Mapping and Sequencing the Human Genome, Commission on Life Sciences. *Mapping and Sequencing the Human Genome*. Washington D.C: National Academies Press; 1988.
 10. Ginsburg GS, Willard HF. *Genomic and personalized medicine: foundations and applications*. *Transl Res*. 2009 Dec;154(6):277-87. doi: 10.1016/j.trsl.2009.09.005.
 11. Ma Q, Lu AY. *Pharmacogenetics, pharmacogenomics, and individualized medicine*. *Pharmacol Rev*. 2011 Jun;63(2):437-59. doi: 10.1124/pr.110.003533.
 12. Soto Alvarez J. [Economic evaluation in the pharmacogenetics and pharmacogenomics era: a light in the darkness?]. *Med Clin (Barc)*. 2006 Nov 4;127(17):657-9. [Artículo en español]
 13. Ramachandran G, Swaminathan S. *Role of pharmacogenomics in the treatment of tuberculosis: a review*. *Pharmacogenomics Pers Med*. 2012;5:89-98.
 14. Teixeira R, Quinhones M, Noel P, Rezende A. *Tuberculosis Pharmacogenetics: State of The Art*. Croacia: InTech; 2013.
 15. Nachega JB, Chaisson RE. *Tuberculosis drug resistance: a global threat*. *Clin Infect Dis*. 2003 Jan 15;36(Suppl 1):S24-30.
 16. Zhang Y, Heym B, Allen B, Young D, Cole S. The catalase-peroxidase gene and isoniazid resistance of *Mycobacterium tuberculosis*. *Nature*. 1992 Aug 13;358(6387):591-3.
 17. Telenti A, Imboden P, Marchesi F, Lowrie D, Cole S, Colston MJ, *et al*. *Detection of rifampicin-resistance mutations in Mycobacterium tuberculosis*. *Lancet*. 1993 Mar 13;341(8846):647-50.
 18. Lauterburg BH, Smith CV, Todd EL, Mitchell JR. *Pharmacokinetics of the toxic hydrazino metabolites formed from isoniazid in humans*. *J Pharmacol Exp Ther*. 1985 Dec;235(3):566-70.
 19. Calver AD, Falmer AA, Murray M, Strauss OJ, Streicher EM, Hanekom M, *et al*. *Emergence of increased resistance and extensively drug-resistant tuberculosis despite treatment adherence, South Africa*. *Emerg Infect Dis*. 2010 Feb;16(2):264-71. doi: 10.3201/eid1602.090968.
 20. Srivastava S, Pasipanodya JG, Meek C, Leff R, Gumbo T. *Multidrug-resistant tuberculosis not due to noncompliance but to between-patient pharmacokinetic variability*. *J Infect Dis*. 2011 Dec 15;204(12):1951-9. doi: 10.1093/infdis/jir658.
 21. Pasipanodya JG, Srivastava S, Gumbo T. *Meta-analysis of clinical studies supports the pharmacokinetic variability hypothesis for acquired drug resistance and failure of antituberculosis therapy*. *Clin Infect Dis*. 2012 Jul;55(2):169-77. doi: 10.1093/cid/cis353.
 22. Nakajima A, Fukami T, Kobayashi Y, Watanabe A, Nakajima M, Yokoi T. *Human arylacetamide deacetylase is responsible for deacetylation of rifamycins: rifampicin, rifabutin, and rifapentine*. *Biochem Pharmacol*. 2011 Dec 1;82(11):1747-56. doi: 10.1016/j.bcp.2011.08.003.
 23. Harmer D, Evans DA, Eze LC, Jolly M, Whibley EJ. *The relationship between the acetylator and the sparteine hydroxylation polymorphisms*. *J Med Genet*. 1986 Apr;23(2):155-6.
 24. Hein DW, Doll MA, Fretland AJ, Leff MA, Webb SJ, Xiao GH, *et al*. *Molecular genetics and epidemiology of the NAT1 and NAT2 acetylation polymorphisms*. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2000 Jan;9(1):29-42.
 25. Leff MA, Fretland AJ, Doll MA, Hein DW. *Novel human N-acetyltransferase 2 alleles that differ in mechanism for slow acetylator phenotype*. *J Biol Chem*. 1999 Dec 3;274(49):34519-22.
 26. Fuselli S, Gilman RH, Chanock SJ, Bonatto SL, De Stefano G, Evans CA, *et al*. *Analysis of nucleotide diversity of NAT2 coding region reveals homogeneity across Native American populations and high intra-population diversity*. *Pharmacogenomics J*. 2007 Apr;7(2):144-52.
 27. Kuznetsov IB, McDuffie M, Moslehi R. *A web server for inferring the human N-acetyltransferase-2 (NAT2) enzymatic phenotype from NAT2 genotype*. *Bioinformatics*. 2009 May 1;25(9):1185-6. doi: 10.1093/bioinformatics/btp121.
 28. Chen B, Li JH, Xu YM, Wang J, Cao XM. *The influence of NAT2 genotypes on the plasma concentration of isoniazid and acetylisoniazid in Chinese pulmonary tuberculosis patients*. *Clin Chim Acta*. 2006 Mar;365(1-2):104-8.
 29. Taja-Chayeb L, Agúndez JA, Miguez-Muñoz C, Chavez-Blanco A, Dueñas-Gonzalez A. *Arylamine N-acetyltransferase 2 genotypes in a Mexican population*. *Genet Mol Res*. 2012 Apr 27;11(2):1082-92. doi: 10.4238/2012.April.27.7.
 30. Salazar-González R, Gómez R, Romano-Moreno S, Medellín-Garibay S, Núñez-Ruiz A, Magaña-Aquino M, *et al*. *Expression of NAT2 in immune system cells and the relation of NAT2 gene polymorphisms in the anti-tuberculosis therapy in Mexican mestizo population*. *Mol Biol Rep*. 2014 Dec;41(12):7833-43. doi: 10.1007/s11033-014-3677-5.
 31. Guaoua S, Ratbi I, Laarabi FZ, Elalaoui SC, Jaouad IC, Barkat A, *et al*. *Distribution of allelic and genotypic frequencies of NAT2 and CYP2E1 variants in Moroccan population*. *BMC Genet*. 2014;15:156.
 32. Mishra S, Daschakraborty S, Shukla P, Kapoor P, Aggarwal R. *N-acetyltransferase and cytochrome P450 2E1 gene polymorphisms and susceptibility to antituberculosis drug hepatotoxicity in an Indian population*. *Natl Med J India*. 2013 Sep-Oct;26(5):260-5.
 33. Santos NP, Callegari-Jacques SM, Ribeiro Dos Santos AK, Silva CA, Vallinoto AC, Fernandes DC, *et al*. *N-acetyl transferase 2 and cytochrome P450 2E1 genes and isoniazid-induced hepatotoxicity in Brazilian patients*. *Int J Tuberc Lung Dis*. 2013 Apr;17(4):499-504. doi: 10.5588/ijtld.12.0645.
 34. Tang K, Li X, Xing Q, Li W, Feng G, He L, *et al*. *Genetic polymorphism analysis of cytochrome P4502E1 (CYP2E1) in Chinese Han populations from four different geographic areas of Mainland China*. *Genomics*. 2010 Apr;95(4):224-9. doi: 10.1016/j.ygeno.2010.01.005.
 35. Sheng YJ, Wu G, He HY, Chen W, Zou YS, Li Q, *et al*. *The association between CYP2E1 polymorphisms and hepatotoxicity due to anti-tuberculosis drugs: a meta-analysis*.

Infect Genet Evol. 2014 Jun;24:34-40. doi: 10.1016/j.meegid.2014.01.034.

36. Shimizu M, Fukami T, Kobayashi Y, Takamiya M, Aoki Y, Nakajima M, et al. A novel polymorphic allele of human arylacetamide deacetylase leads to decreased enzyme activity. Drug Metab Dispos. 2012 Jun;40(6):1183-90. doi: 10.1124/dmd.112.044883.

37. Azuma J, Ohno M, Kubota R, Yokota S, Nagai T, Tsuyuguchi K, et al. NAT2 genotype guided regimen reduces

isoniazid-induced liver injury and early treatment failure in the 6-month four-drug standard treatment of tuberculosis: a randomized controlled trial for pharmacogenetics-based therapy. Eur J Clin Pharmacol. 2013 May;69(5):1091-101. doi: 10.1007/s00228-012-1429-9.

38. Kinzig-Schippers M, Tomalik-Scharte D, Jetter A, Scheidel B, Jakob V, Rodamer M, et al. Should we use N-acetyltransferase type 2 genotyping

to personalize isoniazid doses?. Antimicrob Agents Chemother. 2005 May;49(5):1733-8.

Correspondencia: Heinner Guio
 Dirección: Av. Defensores del Morro 2268. Chorrillos, Perú
 Teléfono: 748-0000, Anexo: 424
 Correo electrónico: hguio@ins.gob.pe

<http://www.ins.gob.pe/rpmesp>

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
REVISTA PERUANA DE MEDICINA EXPERIMENTAL Y SALUD PÚBLICA
 Peruvian Journal of Experimental Medicine and Public Health

INICIO ACERCA DE INICIAR SESIÓN BUSCAR ÚLTIMO NÚMERO NÚMEROS ANTERIORES INSTRUCCIONES
 EVENTOS

Inicio > Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública

Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública

NÚMERO ACTUAL

LA TELESALUD Y LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA INFORMÁTICA BIOMÉDICA EN EL PERÚ

El Perú se encuentra enfrentando el desafío histórico que significa dar un salto cuantitativo y cualitativo en la mejora del estado de salud de los peruanos a través de una serie de medidas de política de reforma orientadas a construir un sistema de salud integrado que fortalezca el Sistema Nacional de Salud.

Sin embargo, la modernización de la salud pública en el Perú no será posible sin la incorporación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) de manera integral, eficiente, apropiada e implementada de manera progresiva de acuerdo a un plan estratégico que contribuya a fortalecer los sistemas de información en salud y mejorar la salud de la población.

La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (RPMESP) no es ajena a estos temas, y dedica este número, por primera vez, a la informática biomédica y la telesalud. Las TIC son herramientas que favorecen la calidad, seguridad, eficiencia y productividad de los servicios de salud.

Asimismo, las TIC están demostrando ser un instrumento poderoso para mejorar la prevención y promoción de la salud pública. Por medio de la telesalud, servicio de salud a distancia que utiliza las TIC, se brinda mayor accesibilidad al personal asistencial de salud, en especial en áreas rurales, zonas aisladas y con limitada capacidad resolutoria a través de la conexión con establecimientos de salud.

Portada: La implementación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas como parte de las políticas de gobierno electrónico y del fortalecimiento de los sistemas de información en salud del Perú.

USUARIO/A
 Nombre de usuario/a
 Contraseña
 No cerrar sesión

CONTENIDO DE LA REVISTA
 Buscar
 Ambito de la búsqueda
 Todo

Examinar

- Por número
- Por autor/a
- Por título

PALABRAS CLAVE
 Accidentes de tránsito
 Adolescente Demencia
 Diversidad cultural Educación
 medicina Epidemiología
 Factores de riesgo
 Leptospirosis Malaria Niño
 Obesidad Perú Plantas
 medicamentos Prevención
 salud ambiental Salud
 pública Sobrepeso
 Tuberculosis VIH

Encuétranlos en:

2015_VOL_32_N2