



Anales de la Facultad de Medicina

ISSN: 1025-5583

anales@unmsm.edu.pe

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Perú

Cárdenas, Joel; Huertas, Erasmo; Oré, Ismenia; Carbajal, Semiramis

Hidrops fetalis no immune: A propósito de un caso

Anales de la Facultad de Medicina, vol. 65, núm. 2, 2004, pp. 133-137

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Lima, Perú

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37965208>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Hidrops fetalis no immune: A propósito de un caso

JOEL CÁRDENAS^{1,4}, ERASMO HUERTAS^{1,2,4}, ISMENIA ORÉ^{1,3}, SEMIRAMIS CARBAJAL¹

¹Instituto Especializado Materno Perinatal. ²Unidad de Medicina Materno Fetal. ³Laboratorio de Citogenética,

⁴Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Resumen

Presentamos un caso de hidrops fetalis no inmune por trisomía del par 21, diagnosticado a las 31 semanas de gestación. Mediante cordocentesis y estudio cromosómico de linfocitos se llegó al diagnóstico etiológico de síndrome Down. La paciente reingresó a los 6 días del procedimiento con diagnóstico de óbito fetal, produciéndose el parto vaginal electivo al siguiente día. La importancia de este trabajo radica en destacar la factibilidad del diagnóstico citogenético antenatal en nuestro medio mediante técnicas invasivas.

Palabras clave: *Hydrops fetalis; edema; síndrome de Down; enfermedades fetales; perinatología.*

Non-immune hidrops fetalis: Apropos of a case

Abstract

We present a case of non-immune hydrops fetalis diagnosed by antenatal ultrasound at 31 weeks of gestation. Fetal karyotyping of blood sample obtained by cordocentesis was abnormal. The fetus died 6 days later. Postmortem examination was compatible with Down syndrome. We report the possibility of antenatal hydrops fetalis diagnosis by invasive techniques.

Key words: *Hydrops fetalis; edema; Down syndrome; fetal diseases; perinatology.*

INTRODUCCIÓN

El hidrops fetalis es un grave proceso, de elevada mortalidad perinatal, de etiología multifactorial y caracterizado por anasarca generalizada, con o sin acumulación de líquido en las cavidades serosas del organismo fetal, con algún grado de edema cutáneo y, frecuentemente, con placenta edematosa (¹). Hipócrates describió el primer caso. Pero, fue Ballantyne, en 1892, quien estableció los criterios clinicopatológicos para el diagnóstico de hidropsia fetal. La incidencia varía de 1 en 1600 a 1 en 7000 (²). Presentamos el primer

caso de diagnóstico citogenético antenatal de síndrome de Down, en el Instituto Materno Perinatal (IMP).

REPORTE DEL CASO

Segundigesta de 25 años de edad, acude por primera vez al IMP referida de un centro de salud a las 31 semanas de gestación por la presencia de polihidramnios e hidrops fetalis en una ecografía de control. La paciente no tuvo hijo con malformaciones en la gestación previa. Es hospitalizada para estudio. Al examen físico se encontró una presión arterial de 110/60, frecuencia de pulso 96, frecuencia respiratoria 18 y temperatura 37°C; altura uterina 30 cm, longitudinal cefálico derecho, latidos fetales 152 por minuto, con cierta disnea. Se realizó una ecografía en la Unidad de Medicina Fetal

Correspondencia:

Dr. Segundo Joel Cárdenas Goicoechea
Av. Faucett Cdra. 32, Mz K-19. Urb. Aeropuerto
Callao 1, Perú.
E-mail: joelcardenas@yahoo.com

(UMF), encontrándose: gestación única activa de 31 semanas, polihidramnios (índice de líquido amniótico 25,5 cm), edema subcutáneo, hidrotórax, ascitis (circunferencia abdominal 36,7 cm), arteria umbilical única, sexo femenino, ausencia de flujo diastólico de arteria umbilical, vasodilatación compensatoria de la arteria cerebral media. (Figuras 1 a 4). La evaluación del estado fetal fue complementada con prueba no estresante, informado como activo reactivo.



Figura 1. Muestra el gran hidrotórax con marcado compromiso pulmonar

Durante su hospitalización, se determinó el grupo sanguíneo O y factor Rh positivo, prueba de Coombs indirecta negativa. La paciente fue dada de alta con feto vivo al 4º día.

El equipo médico, ante la ausencia de anomalías estructurales mayores, decidió realizar una cordocentesis ambulatoria a los 2 días, para precisar el diagnóstico, previa firma del consentimiento informado. Posteriormente, se realizó amniocentesis para aliviar la sintomatología de la paciente, extrayéndose 850 mL de líquido.

La paciente reingresó al 6º día del procedimiento por ausencia de movimientos fetales, diagnosticándose óbito fetal. El parto se produjo vía vaginal de manera electiva al día siguiente, con los hallazgos anatomo-patológicos de feto macerado, talla 48 cm, perímetro cefálico 27,2, perímetro torácico 28,5 cm, perímetro abdominal 31cm, pie 6 cm, peso 2460 gramos, primer dedo separado del pie, implantación baja de oreja, boca ampliamente abierta con macroglosia, nariz corta, hipertelorismo, piel redundante en la nuca, hipoplasia pulmonar bilateral, severa anasarca; hallazgos compatibles con síndrome de Down (Figuras 5 y 6). El cariotipo (Figura 7) de sangre obtenida por cordocentesis, mediante técnica de bandeo



Figura 2. Presencia de arteria umbilical única con polihidramnios




Figura 3. Flurometría Doppler que muestra ausencia de flujo diastólico en arteria umbilical



Figura 4. Marcada ascitis en un corte abdominal.



Figura 5. Hidrops fetalis (derecha). Marcada separación del primer dedo (izquierda).

cromosómico GTG, confirmó una trisomía del par 21. La paciente fue dada de alta 2 días más tarde, previa consejería genética.

DISCUSIÓN

El hidrops fetalis es uno de los 24 marcadores ecográficos de aneuploidía (27). Puede ser

clasificado de acuerdo a su origen en inmune y no inmune. Ecográficamente, ambos tipos son caracterizados por extensa acumulación de fluidos en tejidos fetales o cavidades del cuerpo, reflejando una alteración masiva del balance de agua fetal (³).

En 1943, Potter describió una entidad clínica que afectaba a embarazos sin sensibilización



Figura 6. Implantación baja de oreja, piel redundante en nuca, nariz corta y macroglosia.




Figura 7. Cariotipo obtenido de la cordocentesis.

Rh(D) y se caracterizaba por anasarca fetal, edema placentario y, a menudo, derrames serosos en el feto. Potter reconoció que esta entidad, denominada desde entonces hidrops fetalis no inmune, no representaba una enfermedad específica, sino más bien una manifestación tardía de muchas enfermedades severas. Cuando Potter describió por primera vez el hidrops fetalis no inmune, esta entidad constituía menos del 20% de los casos de hidrops; en cambio, desde el advenimiento de profilaxis efectiva contra la sensibilización Rh(D), la frecuencia relativa del hidrops fetalis no inmune ha aumentado al 90% (4).

La incidencia global del hidrops fetal, según Santolaya (5), es de 13% para la forma inmune y 87% para la no inmune. La incidencia ecográfica de hidrops fetalis en centros de referencia puede ser tan alto como 1 en 165 embarazos (5). Esta entidad puede ocurrir en poblaciones de riesgo bajo y se la puede detectar con estudio ecográfico a inicios del 2º trimestre. Mas aun, la complejidad de esta condición y la alta tasa de anomalías cromosómicas requieren la transferencia a centros de alto riesgo para su evaluación y manejo.

Resultó fácil orientar el diagnóstico no inmune al ser la paciente grupo O Rh positivo y con prueba de Coombs indirecta negativa. Sin embargo, nos quedaba una amplia gama de posibilidades causales, según Holzgreve y col. (6), cardiovasculares, cromosómicas, síndromes malformativos, hematológicas, respiratoria, urinaria, gastrointestinales, hepática, materna, medicamentosa, infecciosa. Otra clasificación etiológica la hace Santolaya (5) en inmune, intrínseca y extrínseca. Los hallazgos ecográficos y cardiotocográficos alejaron la posibilidad de una cardiopatía, la cual se presenta con mayor frecuencia (40%) (7). Debido a que la siguiente causa lo representan las anomalías cromosómicas (15%), se procedió a realizar una cordocentesis, a fin de obtener una muestra para estudio citogenético (8,9). En el estudio de las metáfases analizadas mediante técnica de bandeo cromosómico GTG, se

encontró 47 cromosomas, hallándose un cromosoma 21 adicional. Dado que para esta entidad se cuenta con marcadores ecográficos tales como edema nucal, ausencia del hueso nasal, braquicefalia, aplanamiento de la cara, intestino hiperecogénico, foco hiperecogénico intracardiaco, acortamiento de huesos largos, ectasia piélica, signo de la sandalia, clinodactilia (10-14), se debe hacer énfasis en exploraciones ecográficas en el 2º trimestre, a fin de arribar a un diagnóstico más temprano. Hay que hacer notar que de los marcadores ecográficos antes mencionados, no pudieron detectar el signo de la sandalia y la nariz corta (ausencia del hueso nasal), probablemente por el marcado edema subcutáneo.

El tratamiento depende de la causa del hidrops. Así, si se debiera a un problema de isoimmunización, se maneja con transfusiones intrauterinas; pero, en casos de hidrops no inmune, el tratamiento puede variar desde una conducta expectante hasta el manejo invasivo (derivaciones, transfusiones). Debido a que la mayoría de lesiones asociadas con estos síndromes son en última instancia fatales para el feto o recién nacido, el conocimiento de la causa es importante para planificar la vía del parto. Para el presente caso, se manejó de manera expectante, con vigilancia estrecha anteparto, con el fin de lograr una mayor madurez, situación con pocas probabilidades por el severo hidrotórax e hipoplasia pulmonar. El tratamiento prenatal de los signos de hidrops mediante paracentesis abdominal fetal y/o punción torácica, sólo tiene sentido de efectividad teórica cuando se va a realizar de inmediato un parto electivo y se requiere descomprimir el abdomen para permitir el parto vaginal, o cuando se observa que el hidrotórax no facilitará la suficiente expansión pulmonar (1,15,16).

Se ha publicado varias comunicaciones sobre transfusión intrauterina para el tratamiento. Así, Sahakian y col, en 1990; informaron un resultado exitoso después de la transfusión intravascular en un feto de 20 semanas con infección por parvovirus B-19 (15,17). En nuestro caso, no se

pudo evaluar el grado de anemia fetal, por carecer del instrumento apropiado para ello. Sin embargo, se describe un procedimiento no invasivo para determinar la anemia con flujometría Doppler de la arteria cerebral media (^{18,19}).

La tasa de mortalidad del hidrops fetal no inmune varía entre 50 y 98%, la misma que depende de la causa del problema (²⁰⁻²⁵). La muerte fetal fue comprobada al 6º día del procedimiento. Es importante el consejo genético, ya que existen trastornos recesivos autosómicos específicos que ocasionarían hasta un 25% de recurrencia.

No se produjo complicaciones maternas, como preeclampsia, parto pretérmino, hemorragia posparto, como se describe en algunas series (²⁶).

El presente caso sirve para evaluar la capacidad de diagnóstico antenatal y manejo de patologías fetales como el hidrops en la unidad de Medicina Fetal del IMP y, a la vez, motivar la realización de estudios descriptivos y analíticos sobre el tema.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acien P. Tratado de Obstetricia y Ginecología. 1ª ed. Ed Alicante: Ed. Molloy; 1998.
- IM SS, Rizos N, Joutsi P, et al. Non immunologic hydrops fetalis. Am J Obstet Gynecol 1984;148:566.
- Saltzman DH, Frigoletto FD, Harlow BL, et al. Sonographic evaluation of hydrops fetalis. Obstet Gynecol 1989;74:106.
- Warsof SL, Nicolaides KH, Roedeck C. Immune and non immune hydrops. Clin Obstet Gynecol 1986;29:533.
- Santolaya J, Alley D, Jaffe R, et al. Antenatal classification of hydrops fetalis. Obstet Gynecol 1992;79:256.
- Holzgreve W, Curry Jr. Non immune hydrops fetalis: Diagnosis and management. Semin Perinatol 1985;9:52.
- Callen PW. Ecografía en Obstetricia y Ginecología. 3ª ed. Ed Panamericana; 1995.
- Holzgreve W, Curry CJR, Golbus MS, et al. Investigation of non immune hydrops fetalis. Am J Obstet Gynecol 1984;150:805.
- Hsieh FJ, Chang FM, Ko TM, Chen HU. Percutaneous ultrasound-guided fetal blood sampling in management of non immune hydrops fetalis. Am J Obstet Gynecol 1987;157:44.
- Jenderny J. Increased nuchal translucency, hydrops fetalis or hygroma colli. A new test strategy for early fetal aneuploidy detection. Fetal Diagn Ther 2001;16(4):211-4.
- Smith-Bindman R. Second-trimester ultrasound to detect fetuses with Down syndrome: a meta-analysis . JAMA 2001;285(8):1044-55 .
- Nyberg DA. Isolated sonographic markers for detection of fetal Down syndrome in the second trimester of pregnancy. J Ultrasound Med 2001;20(10):1053-63 .
- Vautier-Rit S. Echographic signs of trisomy 21 in the second trimester of pregnancy: actual value after analysis of the literature]. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2000;29(5):445-53.
- Simona C, Curcio P, Papageorghiou A, Sonek J, Nicolaides K. Absence of nasal bone in fetuses with trisomy 21 at 11-14 weeks of gestation : an observational study. Lancet 2001;358:1665-7.
- Sahakian V, Weiner CP, Naides SJ, Williamsom RA, Sharosch LL. Intrauterine transfusion treatment of non immune hydrops fetalis secondary to human parvovirus b19 infection. Am J Obstet Gynecol 1991;164:1090.
- Jones DC. Non immune fetal hydrops. Diagnosis and obstetrical management. Semin Perinatol 1995;19:447-61.
- Nicolaides K, Soothill PW, Rodek CH, Clewell W. Rh disease. Intravascular fetal blood transfusion by cordocentesis. Fetal Therapy 1986;1:185-92.
- Sherif A, Abdel-Fattah, Soothill PW, Carroll SG, Kyle PM. Noninvasive diagnosis of anemia in hydrops fetalis with the use of middle cerebral artery Doppler velocity .Am J Obstet Gynecol 2001;185:1411-5.
- Teixeira JMA, Duncan K, Letsky E, Fisk NM. Middle cerebral artery peak systolic velocity in the prediction of fetal anemia. Ultrasound Obstet Gynecol 2000;15:205-8.
- Etches PC, Lemmos JA. Non immune hydrops fetalis: Report of 22 cases including three siblings. Pediatrics 1979;64:326.
- Hutchison A, Drew JA, Yu V, Williams HL, Fortune DW, Beischer NA. Non immunologic hydrops fetalis: A review of 61 cases. Obstet Gynecol 1982;59:247.
- Castillo RA, De Vope LD, Hadi HA, Martin S, Geist D. Non immunologic hydrops fetalis. Clinical experience and factors related to poor outcome. Am J Obstet Gynecol 1986;155:812.
- Mahony BS, Filly RA, Callen PW, Chinn DH, Golbus MS. Severe non immunologic hydrops fetalis: Sonographic evaluation. Radiology 1984;151:757.
- Watson J, Campbell S. Antenatal evaluation and management in non immune hydrops fetalis. Obstet Gynecol 1986;67:589.
- Graves GR, Baskett TF. Non immune hydrops fetalis. Antenatal diagnosis and management. Am J Obstet Gynecol 1984;148:563.
- Bianchi DW. Fetology. Diagnosis and Management of Fetal Patient. Edit. Mac Graw Hill; 2000.
- Snijders RJM, Nicolaides KH. Ultrasound markers for fetal chromosomal defects. Ed. Parthenon Publishers; 1996.