



Colombia Forestal

ISSN: 0120-0739

colombiaforestal@udistrital.edu.co

Universidad Distrital Francisco José de
Caldas
Colombia

Medina, Ruth; Reina-E., Miriam; Herrera, Edna; Ávila, Fabio Andres; Chaparro, Omar;
Cortés-B., Rocio

CATÁLOGO PRELIMINAR DE LA FLORA VASCULAR DE LOS BOSQUES
SUBANDINOS DE LA CUCHILLA EL FARÁ (SANTANDER-COLOMBIA)

Colombia Forestal, vol. 13, núm. 1, junio, 2010, pp. 55-85

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Bogotá, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423939613003>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

CATÁLOGO PRELIMINAR DE LA FLORA VASCULAR DE LOS BOSQUES SUBANDINOS DE LA CUCHILLA EL FARÁ (SANTANDER-COLOMBIA)

Preliminary checklist of the vascular flora of the Sub-Andean forest at Cuchilla El Fará (Santander-Colombia)

Palabras clave: Andes, biodiversidad, bosque andino, catálogo florístico, Colombia, Cuchilla El Fará, flora neotropical.

Key words: Andes, biodiversity, Andean forest, floristic checklist, Colombia, Cuchilla El Fará, neotropical flora.

Ruth Medina¹
Miriam Reina-E.²
Edna Herrera³
Fabio Andres Ávila⁴
Omar Chaparro⁵
Rocio Cortés-B.⁶

RESUMEN

Se presenta el catálogo preliminar de la flora vascular de los bosques subandinos de la Cuchilla El Fará, ubicada dentro del Corredor Biológico Guantiva – La Rusia – Iguaque, entre los municipios de Charalá, Gámbita y Suaita (Santander–Colombia). El catálogo incluye para cada especie información sobre su hábito de crecimiento, el rango altitudinal local y los especímenes de referencia. Se registraron 409 especies de plantas vasculares, distribuidas en 226 géneros y 105 familias. Se encontró que las familias con mayor número de géneros fueron Rubiaceae (18), Asteraceae (10), Melastomataceae (10), Orchidaceae (10), Euphorbiaceae (8), Arecaceae (7) y Fabaceae (7). Las familias con más especies fueron Rubiaceae (33), Melastomataceae (28), Lauraceae (21), Asteraceae (17), Araceae (17), Orchidaceae (17) y Gesneriaceae (15). Se discute la semejanza de los bosques de la Cuchilla El Fará con otros bosques del Corredor Biológico Guantiva – La Rusia – Iguaque, y con bosques subandinos del neotrópico. Finalmente, se señalan las especies que se encuentran en algún grado de

amenaza en las categorías de la UICN, y que se deben tener en cuenta en programas de restauración y conservación.

ABSTRACT

A preliminary checklist of the vascular flora of the sub-Andean forest of the Cuchilla El Fará is presented. El Fará is located at the Guantiva – La Rusia – Iguaque biological corridor, in the municipalities of Charala, Gambita, and Suaita (Santander–Colombia). Information on habit, local altitudinal range, and collection number is recorded for each species. A total of 409 species of vascular plants included in 226 genera, and 105 families were recorded. The families with the highest number of genera were Rubiaceae (18), Asteraceae (10), Melastomataceae (10), Orchidaceae (10), Euphorbiaceae (8), Arecaceae (7) and Fabaceae (7). At specific level, the best represented families were Rubiaceae (33), Melastomataceae (28), Lauraceae (21), Asteraceae (17), Araceae (17), Orchidaceae (17) and Gesneriaceae (15). The affinities of the flora with other Neotropical sub-Andean forests

¹ Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. ruthmargaritamedina@yahoo.es. Autor para correspondencia.

² Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. miresvi@gmail.com

³ Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. edroheca85@hotmail.com

⁴ Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. andresduguetia@gmail.com

⁵ Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. omar_chapas@yahoo.com

⁶ Herbario Forestal, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. herbarioforestal@udistrital.edu.co

are discussed. Finally, species of all IUCN threat categories are highlighted so that the information presented here can make a contribution to restoration and conservation programs.

INTRODUCCIÓN

La Región Andina posee gran diversidad biológica, cultural, social y económica en Colombia, en donde además se concentra el 77.4 % de la población total del país (Armenteras & Rodríguez 2007). Por consiguiente, los bosques andinos se consideran los ecosistemas más amenazados en Colombia y requieren de manera prioritaria un manejo sostenible con el objeto de evitar su degradación. En este sentido, la Fundación Natura se encuentra adelantando el proyecto “Corredor de conservación de robles, una estrategia para la conservación y el manejo forestal en Colombia”, el cual tiene como objetivo principal establecer lineamientos de conservación y manejo del recurso forestal en el Corredor de Conservación Guantiva – La Rusia – Iguaque (Solano *et al.* 2005). Teniendo en cuenta que el corredor incluye un total aproximado de 1'073.000 ha, se han definido algunas áreas piloto para desarrollar estudios detallados que brinden elementos para proponer el plan de manejo, dentro de las cuales se encuentra la Cuchilla El Fara.

Los bosques de la Cuchilla El Fara se denominan robledales debido a que se encuentran dominados principalmente por *Quercus humboldtii*, especie que se distribuye a lo largo de las tres cordilleras en un amplio rango altitudinal que va desde 1000 hasta 3600 m de altitud (Salinas & Cárdenas 2007a) y en menor proporción por *Colombobalanus excelsa*, otra especie de la familia Fagaceae que sólo se ha registrado en tres localidades en Colombia entre 1500 y 2200 m de altitud (Salinas & Cárdenas 2007b). Del mismo modo, el término robledal se aplica también a los bosques dominados por alguna de las numerosas especies del género *Quercus*, número que de acuerdo con Kappelle (2008) asciende a 220 especies en América, siendo México el país que alberga el mayor número de especies (165).

La diversidad florística de los bosques de roble no se puede caracterizar fácilmente debido principalmente al alto número de especies del género

Quercus en el trópico americano, en donde cada especie posee un rango de distribución particular debido a las variaciones altitudinales, climáticas y edáficas. Kappelle (2008) estima que de las 220 especies de *Quercus* que se han registrado en América, entre 150 y 175 se distribuyen en el neotropical. En México, por ejemplo, Kappelle (2008) señala que los robledales se encuentran asociados comúnmente a especies nativas del género *Pinus*, con las cuales domina el estrato superior del dosel, y que son acompañadas por especies de las familias Lauraceae, Melastomataceae, Myrsinaceae, Styracaceae y Theaceae en el estrato inferior del dosel. De acuerdo con Kapelle & Zamora (1995), en robledales de Costa Rica localizados entre 2000 y 2400 m, las familias mejor representadas son las Rubiaceae, Lauraceae, Melastomataceae, Asteraceae y Myrsinaceae. Según Kappelle (2008), en los robledales colombianos el estrato arbustivo es muy rico en especies, en donde dominan Ericaceae, Piperaceae, Rosaceae, Rubiaceae y Solanaceae, mientras que en el estrato herbáceo se encuentran especies de las familias Acanthaceae, Araceae (con muchas especies del género *Anthurium*), Campanulaceae, Gesneriaceae y Schrophulariaceae. Al parecer, de todos los bosques de roble del neotropical, los de Costa Rica son muy similares a los de Colombia desde el punto de vista florístico, tal como lo señala Kappelle (1996), quien encontró el 75% de similitud de géneros en los bosques de roble entre los dos países.

En términos generales, la composición florística de los bosques de roble en Colombia es muy similar a la de los bosques montanos tropicales. De acuerdo con Gentry (1995), en los bosques montanos, la cota de 1500 m de altitud representa el límite inferior o superior de muchos géneros y familias botánicas. A partir de 1500 y hasta 2500 m de altitud, Lauraceae es la familia de plantas leñosas dominante, seguida de Melastomataceae, Rubiaceae y Moraceae. Entre 2500 y 3000 m de altitud las familias Lauraceae y Melastomataceae mantienen los primeros lugares, seguidas de Asteraceae, Solanaceae, Myrsinaceae, Aquifoliaceae y Araliaceae. Por encima de 3000 m de altitud las Asteraceae y Melastomataceae constituyen las familias más diversas, seguidas de Ericaceae y Myrsinaceae

(Gentry 1995). En cuanto a géneros, Gentry (1995) observó que *Miconia* es el género más diversificado en los bosques andinos y que *Psychotria* y *Palicourea* ocupan puestos destacados en cuanto a número de especies. Este patrón de diversidad en los bosques andinos es muy similar a lo registrado en algunos bosques de roble en Colombia. Por ejemplo, Galindo *et al.* (2003, 2006) encontraron que las familias más ricas en algunos robledales de la Cordillera Oriental son Melastomataceae, Rubiaceae, Lauraceae, Asteraceae, Myrsinaceae y Ericaceae, las mismas que en otros bosques andinos a altitudes similares, al igual que la mayoría de los géneros, siendo *Miconia*, *Palicourea*, *Cybianthus*, *Ilex* y *Schefflera* los más ricos en cuanto a número de especies. Del mismo modo, Galindo & Correa (2006) encontraron que las familias Asteraceae, Melastomataceae y Rubiaceae fueron las más ricas en especies en un bosque de roble de la Cordillera Oriental. Por el contrario, Gentry (Phillips & Miller 2002) encontró resultados diferentes en dos transectos en la Reserva Carpanta, Cundinamarca. En uno de los transectos estudiados a 2350 m, las familias con mayor número de especies fueron Lauraceae, Rubiaceae y Asteraceae, mientras que en otro transecto, a 2900 m, las familias más diversas fueron Cyatheaceae, Myrsinaceae y Clusiaceae (Phillips & Miller 2002).

Dentro del Corredor Biológico Guantiva–La Rusia–Iguaque, se han realizado estudios encaminados a conocer la composición florística de estos bosques, los cuales han permitido obtener una aproximación a la flora de la zona. Entre estos se encuentra el de Murillo *et al.* (2002) quienes realizaron un inventario de flora de la Inspección de Policía de San José de Suaita, describiendo su composición florística. En este mismo sector, Valencia (2004) realizó un inventario general de orquídeas. Del mismo modo, Zernig & Betancur (1994) realizaron la flora del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. Algunos estudios propuestos para conocer la estructura de la vegetación también han contribuido a caracterizar la flora del corredor. Por ejemplo, en el Santuario de Flora y Fauna Guanentá–Alto Río Fonce (Galindo *et al.* 2003) y en el Área Natural Única Los Estoraques (Galindo *et al.* 2006), se han realizado estudios de caracterización florística y estructural.

Así mismo, Marín *et al.* (1996) y Marín & Betancur (1997) describieron la vegetación del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque. Por último, Cardona (2004), Ocaña (2005), Paredes & Martínez (2005), Ávila *et al.* (en este número) y Jiménez (2009), estudiaron aspectos florísticos y estructurales en bosques del municipio de Encino, Santander.

En la zona que corresponde a la Cuchilla El Fara se han desarrollado solamente dos estudios en los que se mencionan generalidades sobre su flora. Castro (1986) realizó un estudio de las hepáticas de la zona y publicó una lista preliminar de la flora vascular del área. Por su parte, Rocha (1987) realizó un inventario de la avifauna, en donde adicionalmente presentó una descripción general de la vegetación. Dentro de las colecciones de flora realizadas en el área de estudio se destacan las realizadas por el Grupo de Exploración y Monitoreo Ambiental (GEMA), del Instituto Alexander von Humboldt (IAVH), quienes realizaron varios inventarios de plantas leñosas de las familias Rubiaceae y Melastomataceae en la Cuchilla El Fara y en el Santuario de Flora y Fauna Guanentá–Alto Río Fonce entre 1800 y 2000 m de altitud (www.siac.net.co/metadatos/). Adicionalmente, el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia ha realizado numerosas colecciones botánicas, las cuales se encuentran depositadas en el Herbario Nacional Colombiano (COL).

Aunque los estudios mencionados anteriormente permiten tener una idea general de la flora de la zona, el área de La Cuchilla El Fara no se ha explorado en detalle. Teniendo en cuenta que el conocimiento de la flora es un aspecto primordial para el desarrollo de estrategias acerca del uso, el manejo y la conservación de los bosques, en este trabajo se presenta el catálogo preliminar de la flora vascular de la Cuchilla El Fara y se estima la riqueza de las familias botánicas, géneros y especies presentes en los sectores muestreados.

ÁREA DE ESTUDIO

La Cuchilla El Fara, también conocida como Cuchilla La Vieja, se encuentra sobre el flanco occidental de la Cordillera Oriental, departamento de Santander, Colombia. La Cuchilla El Fara hace

parte del Corredor Biológico Guantiva – La Rusia – Iguaque y se encuentra en la jurisdicción de los municipios de Charalá, Gámbita y Suaita (Figura 1). La zona de estudio posee un área aproximada de 1293 ha, y se encuentra ubicada entre las coordenadas $06^{\circ}06'40''$ - $06^{\circ}06'27''$ de latitud norte y $73^{\circ}13,3''$ - $73^{\circ}13'12,1''$ de longitud oeste, en un rango altitudinal que va desde 1700 a 2650 m de altitud.

La Cuchilla El Fara corresponde a un anticlinorio con pendientes que varían entre 25 y 45°, donde las quebradas forman cañones profundos de laderas escarpadas (Rocha 1987). El área de estudio se caracteriza por contar con temperaturas relativamente uniformes, siendo marzo el mes que registra la temperatura máxima (29.3°C) y abril el que registra la temperatura mínima (13.5°C). La temperatura media es relativamente constante (20.5°C). De acuerdo con Castro (1986), el comportamiento de la humedad relativa se caracteriza por tener un periodo con valores altos de humedad (abril-noviembre) y un periodo con valores bajos (diciembre-marzo), mientras que en los meses de mayo y junio se registran los valores

máximos (83.5%) y en enero los valores mínimos (77%). El régimen de precipitación de la zona es bimodal, con un periodo seco que inicia en junio y culmina en septiembre. Por otro lado, se presentan dos épocas húmedas fuertemente marcadas entre los meses marzo – mayo y septiembre – octubre, donde se alcanzan valores de precipitación mensual mayores a 325 mm. La precipitación media mensual es de 215.3 mm y la precipitación media anual es de aproximadamente 2643 mm (Alcaldía Municipal de Charalá 2003).

La vegetación de la Cuchilla El Fara corresponde a bosques subandinos, también denominados selvas subandinas según la clasificación de Cuatrecasas (1989), quien los ubica en las faldas de las cordilleras entre los 1000 y 2400 m de altitud. De acuerdo al sistema de clasificación de Holdridge (1987), estos bosques se encuentran dentro de las zonas de vida de Bosque Húmedo Montano Bajo y Bosque Húmedo Premontano. Según el Mapa de Ecosistemas Andinos del Instituto Alexander von Humboldt (2004), esta zona corresponde al Orobioma andino de la Cordillera Oriental.




Figura 1. Ubicación del área de estudio, señalando los sitios de muestreo en la Cuchilla El Fara. Basado en la cartografía elaborada por la Fundación Natura.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las áreas de muestreo se seleccionaron con base en la cartografía y en las salidas de reconocimiento a la zona de estudio. Se realizaron tres salidas de campo entre enero y junio de 2008 como parte del proyecto: “Caracterización florística y estructural de la región de La Cuchilla El Fara en el municipio de Charalá (Santander–Colombia)”. La identificación de los especímenes se realizó con base en la literatura especializada y con la ayuda de la colección de referencia depositada en los herbarios UDBC y COL. Las colecciones fueron depositadas en los herbarios COL, FMB, UDBC, UIS y UPTC.

Las angiospermas se organizaron en tres grandes grupos: (magnólidas, monocotiledóneas y eudicotiledóneas) de acuerdo al APG (*Angiosperm Phylogeny Group*) (Stevens 2001-2010). Dentro de cada grupo y cada familia los taxones se organizaron en orden alfabético. Las abreviaturas de los nombres de los autores se estandarizaron de acuerdo con las bases de datos *The International Plant Names Index* (<http://www.ipni.org/>) y W3-Tropicos (<http://www.mobot.mobot.org/>).

En el Anexo 1, se presenta el catálogo preliminar de la flora vascular de la Cuchilla El Fara. Para cada especie se incluye además del nombre científico y autor(es), el hábito (herba, arbusto, arbolito, árbol y bejucos). También se incluye el rango altitudinal en que fueron colectados los ejemplares y los números de colección con los colectores (O. Chaparro, S. Cómbita, R. Cortés-B, E. Herrera, C. Huertas, M.

Jiménez, R. López, R. Medina y M. Reina). Finalmente, para algunas especies se incluyen nombres vernáculos.

RESULTADOS

Se recolectaron un total de 409 especies de plantas vasculares, distribuidas en 226 géneros y 105 familias, con base en 804 números de colección. La determinación del material vegetal a nivel de especie fue del 73.5%, mientras que el 26.5% restante corresponde a morfoespecies. En la Tabla 1, se pueden observar los porcentajes de la flora de acuerdo a grandes grupos. El grupo mejor representado es el de las angiospermas con el 94.4% de la flora; dentro de éste, las eudicotiledóneas constituyen el grupo con mayor número de familias, seguido por las monocotiledóneas y el complejo de magnólidas.

La familia que presentó mayor riqueza en cuanto a número de géneros fue Rubiaceae (Tabla 2). Otras familias de angiospermas que se destacan por la alta riqueza genérica son Asteraceae, Melastomataceae y Euphorbiaceae.

En cuanto al número de especies, la familia Rubiaceae ocupa el primer lugar, seguida de Melastomataceae, Lauraceae y Asteraceae, como se puede observar en la Tabla 3.

En la Tabla 4, se pueden observar los géneros más ricos en número de especies, en donde el género *Miconia* ocupa el primer lugar, seguido por *Anthurium* y *Psychotria*.

Tabla 1. Resumen de la flora de la Cuchilla El Fara según grandes grupos taxonómicos.

	Familias	Géneros	Especies	Morfoespecies	TOTAL	%
Helechos y afines	12	16	6	16	22	5.4
Gimnospermas	1	1	1	0	1	0.2
Angiospermas	92	209	294	92	386	94.4
Complejo magnólidas	8	16	31	16	47	11.5
Monocotiledóneas	15	35	42	21	63	15.4
Eudicotiledóneas	69	158	221	55	276	67.5
TOTAL	105	226	301	108	409	

Tabla 2. Familias con mayor número de géneros en la Cuchilla El Fara.

Familias	No. géneros
RUBIACEAE	18
ASTERACEAE	10
MELASTOMATACEAE	10
ORCHIDACEAE	10
EUPHORBIACEAE	8
ARECACEAE	7
FABACEAE	7
ERICACEAE	6
GESNERIACEAE	6
LAURACEAE	6

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Al comparar los resultados obtenidos en la Cuchilla El Fara con otros estudios de vegetación realizados en el corredor biológico, se evidencian diferencias importantes en la composición florística. Por ejemplo, Murillo *et al.* (2002) estudiaron la flora de San José de Suaita, muy cerca a nuestra zona de estudio, y registraron 684 especies de plantas vasculares, lo que equivale a 285 especies adicionales a las registradas en la Cuchilla El Fara. Aunque no se puede descartar la influencia de posibles variaciones

fisiográficas entre las zonas mencionadas que puedan afectar la diversidad de especies, el mayor número de especies probablemente es debido a una mayor intensidad de colección, lo cual se evidencia en el número de especies de orquídeas (72) colectadas en San José de Suaita (Murillo *et al.* 2002, Valencia 2004). Sin embargo, es interesante notar que en la familia Rubiaceae registramos un mayor número de especies que las registradas por Murillo *et al.* (2002). En este mismo sentido, aunque Reina *et al.* (en este número) registraron un número de especies similar a nuestros resultados en la Reserva Biológica Cachalú, relativamente cerca al área de estudio, cerca del 50% de las especies que registramos, no se presentan en Cachalú. Estas diferencias señalan la alta diversidad de especies de plantas vasculares que se encuentran en el corredor biológico Guantiva – La Rusia – Iguaque, y la importancia de continuar explorando sus bosques.

Los bosques de la Cuchilla El Fara poseen algunos elementos característicos de los bosques subandinos de la Cordillera Oriental. Por ejemplo, en la Cuchilla El Fara las familias Rubiaceae, Melastomataceae y Lauraceae coinciden con las de mayor riqueza en otros bosques del norte de la cordillera, aunque con algunas diferencias en el orden de importancia. Mientras que Lauraceae es la familia que presenta mayor riqueza en los estudios de Cardona & Cadena

Tabla 3. Familias con mayor número de especies en la Cuchilla El Fara.

Familias	No. especies	No. morfoespecies	TOTAL
RUBIACEAE	29	4	33
MELASTOMATACEAE	24	4	28
LAURACEAE	10	11	21
ASTERACEAE	15	2	17
ARACEAE	11	6	17
ORCHIDACEAE	11	6	17
GESNERIACEAE	12	3	15
PIPERACEAE	11	3	14
EUPHORBIACEAE	12	2	14
MYRSINACEAE	8	3	11
ARALIACEAE	9	1	10
ARECACEAE	8	0	8

Tabla 4. Géneros con mayor número de especies en la Cuchilla El Fara.

Género	No. especies	No. morfoespecies	TOTAL
<i>Miconia</i>	12	2	14
<i>Anthurium</i>	9	2	11
<i>Psychotria</i>	8	1	9
<i>Peperomia</i>	6	2	8
<i>Ocotea</i>	4	3	7
<i>Aniba</i>	4	3	7
<i>Ficus</i>	5	1	6
<i>Piper</i>	5	1	6
<i>Solanum</i>	5	1	6

(2006) y Cadena (2004), en nuestro estudio y en el de Cadena, *et al.* (2007), la familia más importante es Rubiaceae. Es interesante observar en nuestro estudio la presencia de Orchidaceae como la cuarta familia más rica en número de especies. Esto se debe probablemente al tipo de muestreo realizado, ya que Cardona & Cadena (2006) y Cadena (2004) realizaron muestreos de individuos con DAP > 2.5 cm. Del mismo modo, Cadena *et al.* (2007) realizó los muestreos en individuos con DAP > 1 cm, razón por la cual probablemente coincide con nuestros resultados al encontrar a la familia Rubiaceae como la de mayor importancia.

Del mismo modo, la composición florística de la Cuchilla El Fara es semejante a la descrita en otras localidades de bosques andinos neotropicales. En la Cuchilla El Fara se encontraron 44 de los 58 géneros que según Gentry (1995), son los más representativos de los Andes. De allí se pueden destacar el género *Miconia* como el más diverso de esta región y el de mayor número de especies en la Cuchilla El Fara, así como los géneros *Anthurium*, *Ficus* y *Piper*. De igual forma, Gentry (1995) define a la familia Lauraceae como la más rica en especies arbóreas en bosques montanos neotropicales, pero en este estudio su participación es relativamente baja. Este último aspecto es coherente con lo registrado en localidades de Suaita (Murillo *et al.* 2002), Guantánamo-Alto Rio Fonce (Galindo *et al.* 2003) y en la Reserva Biológica Cachalú (Reina *et al.* en este número). La ausencia de la familia Lauraceae en el

primer puesto de riqueza podría deberse a que la familia tiene una distribución restringida a nivel local. Sin embargo, también podría deberse a la metodología usada en cada estudio ya que, mientras que Gentry (1995) incluía los individuos mayores a 10 cm de DAP, en otros estudios se incluyeron individuos con diámetros inferiores a 10 cm, aumentando la posibilidad de que otras familias aparecieran en los primeros puestos de riqueza. Adicionalmente, considerando la importancia económica que han tenido históricamente las especies de Lauraceae como fuente de maderas de alta calidad, no se puede descartar que la intervención humana también podría contribuir a explicar el número de especies de esta familia en la zona de estudio.

Al comparar las familias con mayor número de especies, con los resultados de otros estudios realizados en los Andes colombianos, se observa gran similitud en la composición florística. Sin embargo, es evidente la dominancia de la familia Rubiaceae en la Cuchilla El Fara sobre las otras zonas (Tabla 5). Estas similitudes también se reflejan al comparar las familias más diversas de la Cuchilla El Fara con las familias con mayor número de individuos registradas en algunas de las parcelas permanentes ubicadas en las tres cordilleras (Alvarez *et al.* 2007). Es importante observar que a pesar de tales semejanzas a nivel de familias en los Andes colombianos, se presentan grandes diferencias a nivel de especies, lo cuál sugiere la alta diversidad que se presenta en esta región.

A pesar de las diferencias geológicas entre los bosques montanos de Centro América y los bosques andinos, los robledales presentes en la Cuchilla El Fara son similares a algunos robledales de Costa Rica en cuanto a las familias y géneros más diversos. Kapelle & Zamora (1995) encontraron que en la Cordillera de Talamanca en Costa Rica, a 2000 m de altitud, las familias de plantas leñosas mejor representadas fueron las Rubiaceae, Lauraceae, Melastomataceae y Asteraceae, lo cual coincide con nuestros resultados. A nivel genérico se puede observar que en la Cordillera de Talamanca los géneros de especies leñosas más diversos a 2000 m de altitud fueron: *Miconia*, *Ocotea*, *Palicourea*, y *Piper* (Kapelle & Zamora 1995), géneros que también son ricos en especies en la Cuchilla El Fara. Sin embargo, se pueden observar algunas diferencias en los géneros *Psychotria*, *Aniba* y *Peperomia*, muy ricos en especies en nuestro estudio, pero no muy bien representados en la Cordillera de Talamanca en Costa Rica. Kappelle *et al.* (1992), compararon la composición florística de los robledales de la Cordillera de Talamanca en Costa Rica con bosques de roble tanto en México como en Colombia, encontrando una mayor afinidad con los robledales colombianos. Según Kappelle *et al.* (1992), en adición a las diferencias climáticas que

se presentan entre los robledales de Costa Rica y México, las diferencias también podrían estar relacionadas con la depresión que se presenta en el sur de Nicaragua, la cuál separa las principales cadenas montañosas entre Nicaragua y México. Por el contrario, existe una conexión casi completa entre la Cordillera de Talamanca con la parte norte de los Andes, que sólo se interrumpe en la zona del Canal de Panamá y en el valle del Atrato en Colombia.

Considerando la poca información que existe sobre especies amenazadas en Colombia con relación a la totalidad de su flora, es importante destacar el número de especies que se encontraron en algún grado de amenaza en la Cuchilla El Fara. Por ejemplo, las tres especies de la familia Magnoliaceae registradas en nuestro estudio se encuentran catalogadas como especies en peligro y peligro crítico debido a que presentan una distribución geográfica restringida (Calderón *et al.* 2007a, 2007 b, 2007 c). De la familia Arecaceae también se registran tres especies (*Ceroxylon vogelianum*, *Geonoma orbigniana* y *Wettinia praemorsa*) consideradas casi amenazadas (Galeano & Bernal 2005). Del mismo modo, se registró *Dichapetalum bernallii* y otras tres especies de importancia maderable como vulnerables (*Colombobalanus excelsa*, *Quercus*

Tabla 5. Familias con mayor número de especies en otros bosques andinos.

Cordillera Occidental		Cordillera Central			Cordillera Oriental
Transecto Tatama (1150-2500 m) (Rangel 1995)	Parque Nacional Natural Munchique (1800-3050 m) (Lozano-C <i>et al.</i> 1996)	Transecto Volcán del Puracé (1150-2500 m) (Rangel 1995)	Transecto Parque Los Nevados (1150-2500 m) (Rangel 1995)	Cañón Río Santo Domingo (700-1100 m) (Giraldo 2001)	Serranía de Perijá (700-3550 m) (Rivera 2001)
Polypodiaceae	Melastomataceae	Orchidaceae	Fabaceae	Melastomataceae	Asteraceae
Melastomataceae	Orchidaceae	Polypodiaceae	Polypodiaceae	Rubiaceae	Rubiaceae
Rubiaceae	Rubiaceae	Solanaceae	Rubiaceae	Orchidaceae	Orchidaceae
Araceae	Ericaceae	Piperaceae	Araceae	Asteraceae	Fabaceae
Orchidaceae	Gesneriaceae	Asteraceae	Solanaceae	Poaceae	Solanaceae
Moraceae	Solanaceae	Rubiaceae	Piperaceae	Piperaceae	Euphorbiaceae
Myrsinaceae	Piperaceae	Ericaceae	Lauraceae	Araceae	Poaceae
Lauraceae	Asteraceae	Melastomataceae	Melastomataceae	Fabaceae	Piperaceae
Piperaceae	Araceae	Araceae	Orchidaceae	Moraceae	Myrtaceae
Gesneriaceae				Clusiaceae	Lauraceae

humboldtii y *Podocarpus oleifolius*) (Calderón *et al.* 2002, Cogollo *et. al.* 2007, Salinas & Cárdenas 2007a, 2007b) y una más en peligro crítico (*Aniba perutilis*) (Salinas & Cárdenas 2007c). Estas especies deben considerarse prioritarias para desarrollar programas de restauración y conservación en los bosques andinos del corredor y del país.

Como novedades taxonómicas, registramos una especie nueva de *Erythroxylum* (Erythroxylaceae) recolectada en la vertiente oriental de la Cuchilla El Fara, que se encuentra en proceso de descripción (A. Jara com. pers.), y probablemente una especie nueva de *Byrsonima* (Malpighiaceae) (C. & W. R. Anderson com. pers.).

En conclusión, se puede observar que los bosques de la Cuchilla El Fara presentan una gran similitud florística a nivel de familias y géneros con los bosques andinos de Colombia y con los bosques de roble de Centro América. Sin embargo, a nivel de especies existen grandes diferencias aún entre áreas muy cercanas. Es posible que estas diferencias a nivel específico estén asociadas a variaciones climáticas y edáficas locales. Por otra parte, el registro de nuevas especies, así como el reporte de especies en diversas categorías de amenaza en la zona, demuestran la importancia de continuar con el estudio de la flora de estos bosques y la necesidad de formular estrategias orientadas a la conservación en esta región.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Fundación Natura por el apoyo económico. De igual forma a todas las personas que colaboraron en el trabajo de campo: Luis Mario Cárdenas, Andrés Avella, América Melo, Fausto Sáenz, Catalina Bello y Pablo Zambrano. También agradecemos a Luis Carlos Jiménez, director de COL, y a los especialistas que realizaron la identificación de algunas familias botánicas: Adolfo Jara, Alejandro Zuluaga, Dubán Canal, Gloria Galeano, José Luis Fernández, Julio Betancur, María José Sanín, Nelson Salinas, Néstor Alzate, Orlando Rivera, Silvana Cómita, Natalia Castaño y Thomas Croat. Un agradecimiento especial a Sonia Angel, Diego Moreno y a los funcionarios del Herbario Forestal, Doris Huertas y Germán Téllez.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcaldía Municipal de Charalá – GEOBIOTA L.O.F.T.** 2003. Esquema de Ordenamiento Territorial. Municipio de Charalá. Santander, Colombia. Documento resumen. 76 p.
- Alvarez, E., A. Cogollo, O. Melo, E. Rojas, D. Sánchez, O. Velásquez, E. Jiménez, D. Benítez, C. Velásquez, M. Serna, J. Pérez, F. Cardona & D. Devia.** 2007. Monitoreo de los Andes colombianos (2000-3000 msnm) a través del establecimiento de parcelas permanentes, pp.:77-89. En: Armenteras, D. & N. Rodríguez (eds.), Monitoreo de los ecosistemas andinos: 1985-2005. Síntesis y Perspectivas. Instituto de Investigación Alexander von Humboldt. Bogotá.
- Armenteras, D. & N. Rodríguez.** 2007. Introducción, pp.: 15-17. En: Armenteras, D. & N. Rodríguez (eds.), Monitoreo de los ecosistemas andinos: 1985-2005. Síntesis y Perspectivas. Bogotá Instituto de Investigación Alexander von Humboldt.
- Cadena, J.** 2004. Estructura y composición florística de un parche de vegetación subandino ubicado en la Vereda Agua de la Virgen, Cordillera Oriental Colombiana., p. 114. En: Ramírez-Padilla, B. *et al.* (eds.). Libro de Resúmenes III. Congreso Colombiano de Botánica. Universidad del Cauca. Popayán.
- Cadena, J., W. Ardila & E. Escalante.** 2007. Diversidad florística de un bosque subandino aledaño al Área Natural Única los Estoraques, municipio La Playa de Belén, Norte de Santander. Actualidades Biológicas 29 (Supl. 1): 85-342.
- Calderón, E., G. Galeano & N. García.** 2002. *Dichapetalum bernalii.*, pp.: 123-124. En: Galeano, G., E. Calderón, H. Dueñas & I. Tobón (eds.). Libro Rojo de Plantas Fanerógamas de Colombia. Volumen 1: Chrysobalanaceae, Dichapetalaceae y Lecythidaceae. Serie de libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Instituto Alexander von Humboldt, Instituto de Ciencias Naturales-Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá.

- Calderón, E., A. Cogollo, C. Velásquez-Rúa, M. Serena-González & N. García.** 2007 a. Tomo: *Magnolia argyrotricha*, pp.:91-93. En: García, N. (ed.), Libro rojo de las plantas de Colombia. Vol. 5: Las magnoliáceas, las miristicáceas y las podocarpáceas. Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Instituto Alexander von Humboldt – CORANTIOQUIA – Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín – Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá.
- Calderón, E., A. Cogollo, C. Velásquez-Rúa, M. Serena-González & N. García.** 2007 b. Almanegra de Tamá: *Magnolia cararensis*, pp.: 61-62. En: García, N. (ed.), Libro rojo de las plantas de Colombia. Vol. 5: Las magnoliáceas, las miristicáceas y las podocarpáceas. Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Instituto Alexander von Humboldt – CORANTIOQUIA – Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín – Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá.
- Calderón, E., A. Cogollo, C. Velásquez-Rúa, M. Serena-González & N. García.** 2007 c. Platero: *Magnolia virolinensis*, pp.: 82-84. En: García, N. (ed.). Libro rojo de las plantas de Colombia. Vol. 5: Las magnoliáceas, las miristicáceas y las podocarpáceas. Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Instituto Alexander von Humboldt – CORANTIOQUIA – Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín – Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá.
- Cardona, C.** 2004. Potencial de Regeneración del Banco de Semillas Germinable en dos tipos de Bosque secundario: Implicaciones para la restauración ecológica Reserva Biológica Cachalú- (Santander Colombia). Tesis de pregrado en Ingeniería Forestal. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bogotá, Colombia. 130 p.
- Cardona, C. & J. Cadena.** 2006. Caracterización florística de un bosque subandino, vereda Palmitos, Cordillera Oriental colombiana, corregimiento Agua de la Virgen, Ocaña Santander, p. 45. En: Pimentel *et al.* (eds.). Libro de resúmenes IX Congreso Latinoamericano de Botánica. Santo Domingo, República Dominicana.
- Castro, G.** 1986. Contribución al estudio de las hepáticas en dos formaciones selváticas en la región subandina de Virolín (Charalá- Santander). Tesis de Pregrado en Biología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 160 p.
- Cogollo, A., C. Velásquez-Rúa, J. L. Toro & N. García.** 2007. Pino colombiano: *Podocarpus oleifolius*, pp.: 208-212. En: García, N. (eds.). Libro rojo de las plantas de Colombia. Vol. 5: Las magnoliáceas, las miristicáceas y las podocarpáceas. Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Instituto Alexander von Humboldt – CORANTIOQUIA – Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín – Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá.
- Cuatrecasas, J.** 1989. Aspectos de la Vegetación Natural de Colombia. Peréz–Arbelaeza. 2(8): 147-283.
- Galeano, G. & R. Bernal.** 2005. Palmas, pp.: 59-224. En: Calderón, E., G., Galeano & N. García (eds.), Palmas. Libro rojo de las plantas de Colombia. Vol. 2: Palmas, Frailejones y Zamiás. Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Instituto Alexander von Humboldt – Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá.
- Galindo, R., J. Betancur & J. Cadena.** 2003. Estructura y composición florística de cuatro bosques andinos del Santuario de flora y fauna Guanentá-Alto Río Fonce, cordillera oriental colombiana. Caldasia 25(2): 313-335.
- Galindo C., T. & D.F. Correa G.** 2006. Caracterización fisonómica de un relictio de bosque de roble ubicado en la vereda El Ocaso, municipio de Bojacá, pp.: 130-135. En: Solano C. & Vargas N (Eds.). Memorias del I simposio

- Internacional de Robles y Ecosistemas asociados. Fundación Natura- Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.
- Galindo, G., J. Betancur & H. Mendoza.** 2006. Estructura y Composición Florística de los bosques de roble en dos parques nacionales naturales en la cordillera Oriental colombiana, pp.: 95-100. En: Solano, C. & N. Vargas (eds.), Memorias del I Simposio Internacional de Roble y Ecosistemas Asociados. Fundación Natura – Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.
- Gentry, A.** 1995. Patterns of diversity and floristic composition in neotropical montane forests, pp.: 103-148. En: Churchill S. P., H. Balslev, E. Forero & J.L. Luteyn (eds.), Biodiversity and Conservation of Neotropical Montane Forests. The New York Botanical Garden. New York.
- Giraldo-Cañas, D.** 2001. Análisis florístico y fitogeográfico de un bosque secundario pluvial andino, Cordillera Central (Antioquia, Colombia). Darwiniana 39(3-4): 187-199.
- Holdridge, L. R.** 1987. Ecología basada en zonas de vida. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 217 p.
- IAVH (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt).** 2004. Mapa de Ecosistemas Andinos. Acceso: septiembre de 2009. Disponible en: <http://www.humboldt.org.co/unisig/ecosistemas/andes/ecosistemas>
- IAVH (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt).** Metadato de Rubiaceae y Melastomataceae, SFF Guanentá-Alto Río Fonce y RNP Cachalú, Santander, Colombia. Acceso: noviembre de 2007. Disponible en: <http://www.siac.net.co/metadatos/showMetadato.jsp?conjunto=517>
- Kappelle, M.** 1996. Los bosques de roble (*Quercus*) de la Cordillera de Talamanca, Costa Rica: Biodiversidad, Ecología, Conservación y Desarrollo. Universidad de Amsterdam (UvA) e Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio). Amsterdam - Santo Domingo de Heredia. 319 p.
- Kappelle, M.** 2008. Biodiversity of the oak forests of tropical America / Biodiversidad de los bosques de roble (encino) de la América tropical. Bilingual edition. Santo Domingo de Heredia. Costa Rica. 336 p.
- Kappelle, M. & N. Zamora.** 1995. Changes in woody species richness along an altitudinal gradient in Talamanca montane *Quercus* forests, Costa Rica, pp.: 135-148. En: Churchill S. P., Balslev, E. Forero & J.L. Luteyn (eds.). Biodiversity and Conservation of Neotropical Montane Forests. The New York Botanical Garden. Bronx, New York.
- Kappelle, M., A. M. Cleef & A. Chaverri.** 1992. Phytogeography of Talamanca montane *Quercus* forests, Costa Rica. Journal of Biogeography 19 (3): 299-315.
- Jiménez, A.** 2009. Caracterización fisionómica y estructural de la vegetación natural en claros de roble, en la Reserva Biológica Cachalú. Tesis de Pregrado. Ingeniería Forestal. Facultad del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá. 58 p.
- Lozano-C G., N. Ruiz, F. A. González & M. T. Murillo.** 1996. Diversidad Vegetal del Parque Nacional Natural Munchique, Cauca (Colombia entre 1.800 y 3.050 msnm), pp.: 9-64. En: Notas sobre Biodiversidad. Polidoro Pinto (ed.). Instituto de Ciencias Naturales. Museo de Historia Natural. Biblioteca José Jerónimo Triana. No. 13. Bogotá.
- Marín, C. A., J. Betancur & J. O. Rangel-Ch.** 1996. Diversidad y estructura de la vegetación en el sector occidental del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque (Boyacá), p. 51. En: Uribe, A., J. Cavelier & A. M. González. (eds). Biodiversidad, conservación y manejo de los ecosistemas de montañas en Colombia. Segundo Simposio Nacional. Universidad de Antioquía, Medellín.
- Marín-C., C. & J. Betancur.** 1997. Estudio florístico en un robledal del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque (Boyacá, Colombia). Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 21 (80): 249-259.
- Murillo, J., J. Betancur, J. Fernández, G. Galeano, G. González, L. C. Jiménez, E. Linares, C. I. Orozco, J. Uribe, S. Suárez, D. Giraldo, C. Parra, H. Dueñas & M. Galeano.** 2002. La flora de San José de Suaita, p. 359. En: Rangel O., J. Aguirre & G. Andrade (eds.), Libro de resúmenes octavo Congreso Latinoamericano y Segundo Colombiano de Botánica. Instituto

- de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Ocaña, Y.** 2005. Caracterización florística y estructural de unidades de bosque andino en las veredas Minas y Patios Altos del municipio de Encino Santander. Colombia Forestal 9 (18): 70 – 86. Bogotá.
- Paredes, A. & A. Martínez.** 2005. Diversidad y caracterización florística y estructural de la vegetación secundaria de la reserva biológica Cachalú, con propósitos de restauración. (Encino–Santander). Tesis de Pregrado. Ingeniería Forestal. Facultad del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá. 238 p.
- Phillips, O. & J. Miller.** 2002. Global patterns of plant diversity: Alwyn H. Gentry's forest transect data set. St. Louis-Missouri: Missouri Botanical Garden Press. 319 p.
- Rangel- CH., J. O.** 1995. La Diversidad Florística en el Espacio Andino de Colombia, pp.: 187-205. En: Churchill S. P., H. Balslev, E. Forero & J.L. Lutelyn (eds.), Biodiversity and Conservation of Neotropical Montane Forests. The New York Botanical Garden. New York.
- Rivera, O.** 2001. Caracterización florística y fitogeográfica de la Serranía de Perijá (Departamentos de Cesar y La Guajira, Colombia). Tesis de Maestría Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Bogotá. 234 p.
- Rocha, C.** 1987. Contribución al estudio avifaunístico en un bosque subandino. Virolín, Santander. Tesis de Pregrado. Biología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 92 p.
- Salinas, N. & D. Cárdenas.** 2007 a. Roble: *Quercus humboldtii*. En: Cárdenas, D. & N. R. Salinas (eds.), Libro rojo de las plantas de Colombia. Vol. 4: 203-209. Especies maderables amenazadas: Primera parte. Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Instituto de Investigaciones Científicas SINCHI – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá.
- Salinas, N. & D. Cárdenas.** 2007b. Roble negro: *Colombobalanus excelsa*, pp.: 210-212. En: Cárdenas, D. & N. R. Salinas (eds.), Libro rojo de las plantas de Colombia. Vol. 4. Especies maderables amenazadas. Primera parte. Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Instituto de Investigaciones Científicas SINCHI – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá.
- Salinas, N. & D. Cárdenas.** 2007c. Comino: *Aniba perutilis*, pp.: 77-81. En: D. Cárdenas, D. & N. R. Salinas (eds.), Libro rojo de las plantas de Colombia. Vol. 4. Especies maderables amenazadas: Primera parte. Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Instituto de Investigaciones Científicas SINCHI – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá.
- Stevens, P. F.** 2001. Sitio web Angiosperm Phylogeny. Version 9, junio 2008 y actualizaciones recientes. Acceso: septiembre de 2009. Disponible en: <http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/>.
- Solano, C., C. Roa & Z. Calle.** 2005. Estrategia de Desarrollo Sostenible. Corredor de Conservación. Guantiva-La Rusia-Iguaque. Boyacá-Santander-Colombia. Bogotá: The Nature Conservancy–Fundación Natura. 92 p.
- Valencia, J. & F. González.** 2004. Las Orquídeas de San José de Suaita (Santander, Colombia). Acta Biológica Colombiana 9 (2): 71.
- Zernig, K. & J. Betancur.** 1994. Flora de Iguaque: En: Cavelier, J., & A. Uribe (eds.), Resúmenes del Simposio Nacional “Diversidad Biológica, Conservación y Manejo de los Ecosistemas de Montaña de Colombia”. Bogotá: Universidad de los Andes. 93 p.

ANEXO: CATÁLOGO PRELIMINAR DE LA FLORA VASCULAR DE LA CUCHILLA EL FARAL

HELECHOS Y AFINES

ASPLENIACEAE

(1 género, 2 especies)

Asplenium sp. 1

Hierba; 1830 m; E. Herrera 344.

Asplenium sp. 2

Hierba; 1830 m; E. Herrera 229.

CYATHEACEAE

(1 género, 1 especie)

Cyathea multiflora Sm.

Arbolito; 1770 - 2100 m; E. Herrera 178; E. Herrera 265; M. Jiménez 27; R. Medina 2424.

Nombre vernáculo: Helecho flaco, Guaco.

DENNSTAEDTIACEAE

(3 géneros, 3 especies)

Hypolepis cf. microchlaena Mickel & Beitel

Hierba; 1830 m; E. Herrera 342.

Odontosoria sp.

Hierba; 1800 m; C. Huertas 357.

Saccoloma sp.

Hierba; 1830 m; E. Herrera 341.

DRYOPTERIDACEAE

(1 género, 1 especie)

Tectaria sp.

Hierba; 1750 m; E. Herrera 394.

GLEICHENIACEAE

(1 género, 1 especie)

Sticherus sp.

Hierba; 1830 m; E. Herrera 347.

GRAMMITIDACEAE

(1 género, 1 especie)

Melpomene sp.

Hierba; 2000 m; E. Herrera 370.

HYMENOPHYLLACEAE

(1 género, 1 especie)

Hymenophyllum sp.

Hierba; 2000 m; E. Herrera 359.

LYCOPODIACEAE

(1 género, 1 especie)

Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm.

Hierba; 1730 - 1750 m; R. López 12723; R. Medina 129.

Nombre vernáculo: Cacho de venado, caminadora.

NEPHROLEPIDACEAE

(1 género, 1 especie)

Nephrolepis sp.

Hierba; 1830 m; E. Herrera 348.

POLYPODIACEAE

(3 géneros, 7 especies)

Microgramma percussa (Cav.) de la Sota

Hierba; 1830 m; E. Herrera 349.

Polypodium fraxinifolium Jacq.

Hierba; 1760 - 1830 m; E. Herrera 340; M. Jiménez 12.

Nombre vernáculo: Manchador.

Polypodium thyrsanolepis A. Braun ex Klotzsch

Hierba; 1830 m; E. Herrera 346.

Polypodium sp. 1

Hierba; 1830 m; E. Herrera 345.

Polypodium sp. 2

Hierba; 1760 - 1830 m; E. Herrera 342A; M. Jiménez 11.

Polypodium sp. 3

Hierba; 1800 m; C. Huertas 347.

Polypodiaceae

Hierba; 1830 m; E. Herrera 343.

PTERIDACEAE

(2 géneros, 2 especies)

Adiantum sp.

Hierba; 1800 m; C. Huertas 274.

Pteris sp.

Hierba; 1830 m; E. Herrera 338.

THELYPTERIDACEAE

(1 género, 1 especie)

Thelypteris sp.

Hierba; 1750 m; E. Herrera 409.

GIMNOSPERMAS

PODOCARPACEAE

(1 género, 1 especie)

Podocarpus oleifolius D.Don ex Lamb

Árbol; 1910 - 2000 m; R. Medina 343; R. Medina 420.

Nombre vernáculo: Pino.

ANGIOSPERMAS

COMPLEJO DE MAGNOLIDAS

ANNONACEAE

(2 géneros, 3 especies)

Annona sp.

Árbol; 1800 - 2200 m; C. Huertas 103; O. Chaparro 39; O. Chaparro 42; R. Medina 505.

Guatteria crassipes R.E. Fries.

Árbol; 1810 m; E. Herrera 249.

Guatteria cf. *laurifolia* (Sw.) Dunal (Figura 2a)

Árbol; 1910 m; R. Medina 425.

CHLORANTHACEAE

(1 género, 2 especies)

Hedyosmum cuatrecasanum Occhioni

(Figura 2b)

Arbolito; 2090 m; S. Cómbita 69.

Hedyosmum racemosum (Ruiz y Pav.) G. Don

Arbolito; 1720 - 2000 m; E. Herrera 202; E. Herrera 280; E. Herrera 390; M. Jiménez 47; S. Cómbita 65; S. Cómbita 126; R. López 12731; R. Medina 152.

Nombre vernáculo: Granizo.

LAURACEAE

(6 géneros, 21 especie)

Aniba panurensis Mez

Árbol; 1770 m; E. Herrera 269; E. Herrera 326; R. López 12776.

Nombre vernáculo: Punte.

Aniba cf. *perutilis* Hemsl.

Árbol; 2000 m; R. Medina 494.

Nombre vernáculo: Punte.

Aniba puchury-minor (Mart.) Mez

Árbol; 1750 - 1810 m; E. Herrera 246; R. Medina 130.

Nombre vernáculo: Amarillo.

Aniba robusta (Klotzsch & H. Karst.) Mez

Árbol; 1770 - 2200 m; E. Herrera 238; E. Herrera 325; R. Medina 431; R. Medina 456.

Nombre vernáculo: Amarillo, Amarillo comino.

Aniba sp. 1

Árbol; 1830 m; O. Chaparro 16.

Nombre vernáculo: Canelo.

Aniba sp. 2

Árbol; 1770 - 2000 m; E. Herrera 354; E. Herrera 362; E. Herrera 206A.

Nombre vernáculo: Amarillo.

Aniba sp. 3

Árbol; 2200 m; R. Medina 448.

Beilschmiedia costaricensis (Mez & Pittier) C.K.

Allen

Árbol; 2000 m; R. Medina 495.

Endlicheria sp.

Árbol; 1770 - 1800 m; C. Huertas 104; E. Herrera 267.

Nombre vernáculo: Laurel baboso.

Ocotea aciphylla (Nees) Mez

Árbol; 2050 m; R. Medina 477.

Ocotea cernua (Nees) Mez

Árbol; 2000 - 2300 m; R. Medina 499; R. Medina 500; R. Medina 528.

Ocotea longifolia Kunth

Árbol; 1900 m; R. Medina 391.

Ocotea oblonga (Meisn.) Mez

Árbol; 1800 m; C. Huertas 118.

Ocotea sp. 1 (Figura 2c)

Árbol; 1730 - 2000 m; E. Herrera 306; E. Herrera 202A; R. López 12769; R. Medina 375; R. Medina 498.

Nombre vernáculo: Laurel baboso, Amarillo.

Ocotea sp. 2

Árbol; 1770 m; E. Herrera 302.

Ocotea sp. 3

Árbol; 1830 - 2480 m; E. Herrera 351; E. Herrera 352; E. Herrera 355; R. Medina 370.

Persea sp. 1

Árbol; 1980 - 2200 m; O. Chaparro 35; R. Medina 451.

Persea sp. 2

Árbol; 1770 m; E. Herrera 276; E. Herrera 304.

Nombre vernáculo: Jaboncillo.

Persea sp. 3

Árbol; 1880 m; R. Medina 371.

Rhodostemonodaphne cf. *velutina* (Mez)

Madriñán

Árbol; 1910 m; R. Medina 426.

Rhodostemonodaphne sp.

Árbol; 1770 - 2300 m; E. Herrera 284; E. Herrera 364; O. Chaparro 17; R. Medina 449; R. Medina 458; R. Medina 509; R. Medina 521.

Nombre vernáculo: Amarillo comino, Garrocho, Canelo.

MAGNOLIACEAE

(1 género, 3 especies)

- Magnolia argyrotricha* (Lozano) Govaerts**
Árbol; 2130 - 2200 m; *R. Medina* 447; *R. Medina* 461.
- Magnolia cf. cararensis* (Lozano) Govaerts**
Árbol; 1750 - 1770 m; *E. Herrera* 334; *O. Chaparro* 1.
- Magnolia virolinensis* (Lozano) Govaerts**
Árbol; 1800 m; *E. Herrera* 309.
- MONIMIACEAE**
(1 género, 1 especie)
- Mollinedia* sp.** (Figura 2d)
Arbolito; 1720 - 2000 m; *C. Huertas* 103A; *E. Herrera* 231; *E. Herrera* 293; *M. Reina* 10; *R. López* 12748; *R. Medina* 507.
Nombre vernáculo: Arrayán.
- MYRISTICACEAE**
(2 géneros, 2 especies)
- Compsoneura rigidifolia* W. A. Rodrigues**
(Figura 2e)
Árbol; 1370 - 2480 m; *E. Herrera* 174; *E. Herrera* 299; *R. Medina* 363; *R. Medina* 480.
Nombre vernáculo: Chirimoyo, Otobo.
- Virola macrocarpa* A.C. Sm.**
Árbol; 1770 - 2100 m; *E. Herrera* 294; *E. Herrera* 327; *E. Herrera* 378; *O. Chaparro* 36.
Nombre vernáculo: Otobo.
- PIPERACEAE**
(2 géneros, 14 especies)
- Peperomia aguilae* Trel. & Yunck.**
Hierba; 1800 - 2600 m; *M. Jiménez* 32; *S. Cómbita* 78; *S. Cómbita* 113; *R. Medina* 215; *R. Medina* 229; *R. Medina* 281.
- Peperomia aff. choroniana* C. DC.**
Hierba; 2100 m; *R. Medina* 215A.
- Peperomia enantiostachya* C. DC.**
Hierba; 1900 m; *R. Medina* 275A.
- Peperomia omnincola* C. DC.**
Hierba; 1800 - 1960 m; *M. Jiménez* 30; *R. Medina* 218.
- Peperomia peltoides* Kunth**
Hierba; 2000 m; *R. Cortés-B.* 2400.
- Peperomia cf. vulcanicola* C. DC.**
Hierba; 1800 - 2050 m; *S. Cómbita* 97; *R. Medina* 201.
- Peperomia* sp. 1**
Hierba; 1800 m; *R. Medina* 215B.
- Peperomia* sp. 2**
Hierba; 1800 m; *R. Medina* 206.

- Piper angustum* Rudge ex Spreng.**
Hierba; 1750 m; *E. Herrera* 414.
- Piper crassinervium* Kunth**
Hierba; 1880 m; *R. Medina* 389; *R. Medina* 390.
- Piper eriopodon* (Miq.) C. DC.**
Hierba; 1900 m; *R. Medina* 257.
- Piper obliquum* Ruiz & Pav.** (Figura 2f)
Arbusto; 1730 - 2000 m; *E. Herrera* 416; *S. Cómbita* 68; *S. Cómbita* 118; *R. López* 12714; *R. Medina* 136.
- Piper phytolaccifolium* Opiz**
Hierba; 1770 m; *E. Herrera* 273.
- Piper* sp.**
Hierba; 2000 m; *R. Medina* 337.
- WINTERACEAE**
(1 género, 1 especie)
- Drimys granadensis* L. f.**
Arbolito; 2600 m; *S. Cómbita* 106.
- MONOCOTILEDONEAS**
- ARACEAE**
(5 géneros, 17 especies)
- Anthurium cf. bogotense* Schott**
Hierba; 1800 m; *R. Medina* 226.
- Anthurium cf. cundinamarcense* Engl.**
Hierba; 1800 m; *R. Medina* 208.
- Anthurium formosum* Schott**
Hierba; 1730 - 1800 m; *C. Huertas* 100; *E. Herrera* 188; *R. López* 12722; *R. López* 12759; *R. Medina* 195.
- Anthurium longigeniculatum* Engl.**
Hierba; 2600 m; *S. Cómbita* 113A.
- Anthurium cf. oblongo-cordatum* Engl.**
Hierba; 1770 - 2000 m; *R. Cortés-B.* 2402; *R. Medina* 167; *R. Medina* 227; *R. Medina* 267.
- Anthurium cf. oxybelium* Schott**
Hierba; 1770 m; *R. Medina* 183.
- Anthurium scandens* (Aubl) Engl.**
Hierba; 1750 - 1800 m; *E. Herrera* 403; *R. Medina* 204.
- Anthurium smithii* Croat**
Hierba; 2480 m; *R. Medina* 365.
- Anthurium stipitatum* Benth.**
Hierba; 1730 m; *R. López* 12749.
- Anthurium* sp. 1**
Hierba; 1900 m; *R. Medina* 301.
- Anthurium* sp. 2**
Hierba; 1900 m; *R. Medina* 279.

***Dieffenbachia* sp.**

Hierba; 1750 m; E. Herrera 405.

***Dracontium spruceanum* (Schott) G.H.Zhu**

Hierba; 1730 - 1770 m; R. López 12736; R. Medina 165.

***Philodendron* cf. *ornatum* Schott**

Hierba; 1770 - 1800 m; E. Herrera 237; R. López 12773; R. López 12774.

Nombre vernáculo: Tripa de Perro.

***Philodendron* sp. 1**

Hierba; 1770 m; R. López 12775.

***Philodendron* sp. 2**

Hierba; 1900 m; R. Medina 303.

***Stenospermation* sp.**

Hierba; 1770 - 2380 m; E. Herrera 241B; M. Jiménez 7; R. Medina 224; R. Medina 266; R. Medina 354; R. Medina 222A.

ARECACEAE

(7 géneros, 8 especies)

***Bactris setulosa* H. Karst.**

Árbol; 1750 m; E. Herrera 398.

Nombre vernáculo: Cubarro.

***Ceroxylon vogelianum* (Engel) H. Wendl.**

Árbol; 1880 - 2300 m; S. Cómbita 116; R. Medina 531.

***Chamaedorea pinnatifrons* (Jacq.) Oerst.**

Árbol; 1730 - 1810 m; E. Herrera 248; R. López 12753.

***Euterpe precatoria* Mart.**

Árbol; 1770 - 2050 m; E. Herrera 308; R. Medina 477A.

Nombre vernáculo: Palmito.

***Geonoma orbigniana* Mart.**

Árbol; 1720 - 1900 m; E. Herrera 296; M. Reina 9; R. Medina 313; R. Medina 327.

Nombre vernáculo: Palma San Pablo.

***Geonoma pinnatifrons* Willd.**

Árbol; 1770 - 1800 m; E. Herrera 274; R. Medina 205.

***Prestoea acuminata* (Willd.) H.E. Moore**

Árbol; 2050 m; R. Medina 479.

Nombre vernáculo: Palmito colorado.

***Wettinia praemorsa* (Willd.) Wess. Boer**

Árbol; 1770 - 2090 m; E. Herrera 230; E. Herrera 264; M. Jiménez 21; M. Jiménez 24; S. Cómbita 84; R. Medina 388.

Nombre vernáculo: Macana.

BROMELIACEAE

(4 géneros, 7 especies)

***Guzmania acorifolia* (Grises.) Mez**

Hierba; 1800 m; R. Medina 233.

***Guzmania triangularis* L.B. Sm.**

Hierba; 2200 m; R. Medina 321.

***Guzmania* sp. 1**

Hierba; 1730 m; R. López 12719.

Nombre vernáculo: Helecho flaco.

***Guzmania* sp. 2**

Hierba; 2380 m; R. Medina 353.

***Pitcairnia* cf. *microcalyx* Baker**

Hierba; 1750 m; E. Herrera 395.

Nombre vernáculo: Robla.

***Racinaea spiculosa* (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.**

Hierba; 2000 m; R. Medina 350.

Bromeliaceae

Hierba; 2050 m; S. Cómbita 85.

CANNACEAE

(1 género, 1 especie)

***Canna indica* L.**

Hierba; 1800 m; R. Medina 231.

COMMELINACEAE

(1 género, 1 especie)

Commelinaceae

Hierba; 1770 m; R. Medina 179A.

CYCLANTHACEAE

(1 género, 1 especie)

***Sphaeradenia* cf. *acutitetala* Harling**

Hierba; 1880 m; S. Cómbita 121.

CYPERACEAE

(2 géneros, 2 especies)

***Rhynchospora* cf. *fusca* (L.) W.T. Aiton**

Hierba; 2300 m; R. Medina 523.

Cyperaceae

Hierba; 1910 m; R. Medina 421.

DIOSCOREACEAE

(1 género, 1 especie)

***Dioscorea* sp.**

Hierba; 1770 m; E. Herrera 210.

ERIOCAULACEAE

(1 género, 1 especie)

***Syngonanthus caulescens* (Poir.) Ruhland**

Hierba; 1730 - 1810 m; E. Herrera 253; R. López 12750; R. Medina 120.

HELICONIACEAE

(1 género, 1 especie)

***Heliconia* sp.**

Hierba; 1800 - 1900 m; *R. Medina* 222; *R. Medina* 223; *R. Medina* 271; *R. Medina* 297.

MARANTACEAE

(1 género, 1 especie)

***Calathea* sp.**

Hierba; 1800 m; *R. Medina* 222; *R. Medina* 223; *R. Medina* 224.

ORCHIDACEAE

(11 género, 17 especies)

***Comparettia falcata* Poepp. & Endl.**

Hierba; 1750 - 2000 m; *E. Herrera* 417A; *R. Medina* 329.

***Dichaea brachypoda* Rchb. f.**

Hierba; 1900 m; *R. Medina* 273.

***Dichaea* cf. *trulla* Rchb. f.**

Hierba; 1770 m; *R. Medina* 166.

***Elleanthus* cf. *blatteus* Garay**

Hierba; 2000 m; *R. Medina* 335.

***Elleanthus smithii* Schltr.**

Hierba; 1750 - 1960 m; *M. Jiménez* 15; *R. Medina* 153; *R. Medina* 277.

***Epidendrum ibaguense* Kunth**

Hierba; 1750 m; *R. Medina* 137.

***Epidendrum ramosum* Jacq.**

Hierba; 2380 m; *R. Medina* 356A.

***Eriopsis* sp.**

Hierba; 1900 m; *R. Medina* 299.

***Lepanthes* cf. *decipiens* Ames & C. Schweinf.**

Hierba; 1750 m; *M. Reina* 13.

***Lepanthes* sp.**

Hierba; 1770 m; *R. Medina* 174.

***Maxillaria aurea* (Poepp. & Endl.) L.O. Williams**

Hierba; 1900 m; *R. Medina* 300.

***Pelezia* sp.**

Hierba; 1880 m; *S. Cómbita* 125.

***Pleurothallis nutans* Schltr.**

Hierba; 1750 - 1750 m; *M. Reina* 14; *R. Medina* 124.

***Pleurothallis* sp. 1**

Hierba; 1750 m; *R. Medina* 123.

***Pleurothallis* sp. 2**

Hierba; 1900 m; *R. Medina* 270.

***Stelis* sect. *Humboldtia* sp.**

Hierba; 1900 m; *R. Medina* 287.

Orchidaceae

Hierba; 1900 m; *R. Medina* 284.

POACEAE

(1 género, 1 especie)

Poaceae

Hierba; 2300 m; *R. Medina* 523A.

XYRIDACEAE

(1 género, 2 especies)

***Xyris jupicai* Rich.**

Hierba; 1770 m; *R. Medina* 187.

***Xyris laxiflora* F. Muell.**

Hierba; 1730 - 1750 m; *R. López* 12717; *R. Medina* 132.

ZINGIBERACEAE

(1 género, 1 especie)

***Hedychium coronarium* J. König**

Hierba; 1760 m; *E. Herrera* 204.

***Renealmia thyrsoides* (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.**

Hierba; 1770 - 2050 m; *E. Herrera* 204; *S. Cómbita* 86; *R. Medina* 274; *R. Medina* 275; *R. Medina* 291; *R. Medina* 297.

EUDICOTILEDÓNEAS

ACANTHACEAE

(1 género, 1 especie)

***Aphelandra aristei* Leonard**

Hierba; 1770 - 1900 m; *E. Herrera* 184; *E. Herrera* 300; *R. Medina* 232; *R. Medina* 262.

Nombre vernáculo: Limoncillo.

ADOXACEAE

(1 género, 2 especies)

***Viburnum cornifolium* Killip & A.C.Sm.**

Arbolito; 2380 m; *R. Medina* 357.

Nombre vernáculo: Garrocho.

***Viburnum* cf. *tinoides* L. f.**

Arbolito; 1750 - 1900 m; *E. Herrera* 415; *R. Medina* 312.

Nombre vernáculo: Garrocho.

ALZATEACEAE

(1 género, 1 especie)

***Alzatea verticillata* Ruiz & Pav.**

Árbol; 1780 m; *E. Herrera* 182.

AMARANTHACEAE

(1 género, 1 especie)

***Iresine diffusa* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Hierba; 1770 m; *R. Medina* 179.

ANACARDIACEAE

(1 género, 1 especie)

Tapirira guianensis Aubl.

Árbol; 1770 m; *E. Herrera* 310.

Nombre vernáculo: Cedrillo.

APOCYNACEAE

(3 géneros, 3 especies)

Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll. Arg.

Árbol; 2000 m; *E. Herrera* 363.

Nombre vernáculo: Otobo.

Tabernaemontana heterophylla Vahl

Arbusto; 1900 m; *R. Medina* 302.

Apocynaceae

Árbol; 1880 m; *R. Medina* 378.

AQUIFOLIACEAE

(1 género, 2 especies)

Ilex laurina Kunth

Árbol; 1770 - 2200 m; *C. Huertas* 105; *E. Herrera* 216; *E. Herrera* 232; *E. Herrera* 278; *E. Herrera* 335; *O. Chaparro* 23; *O. Chaparro* 37; *S. Cómbita* 36; *S. Cómbita* 88; *R. Medina* 418; *R. Medina* 452.

Nombre vernáculo: Verdecito, Hueso, Mulato.

Ilex danielis Killip & Cuatrec.

Árbol; 1800 - 1910 m; *E. Herrera* 224; *R. Medina* 404; *R. Medina* 413.

ARALIACEAE

(3 géneros, 9 especies)

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch.

Arbolito; 1720 - 2200 m; *E. Herrera* 387; *R. Medina* 464.

Dendropanax aff. caucanus (Harms) Harms

Arbolito; 2200 m; *O. Chaparro* 46.

Oreopanax incisus (Willd. ex Schult.) Decne. & Planch.

Arbolito; 1800 m; *R. Medina* 221.

Oreopanax palamophyllus Harms

Arbolito; 1770 m; *E. Herrera* 208.

Schefflera elachistocephala Harms

Arbolito; 1730 - 2000 m; *R. López* 12772; *R. Medina* 513.

Schefflera fontiana Cuatrec. (Figura 2g)

Arbolito; 1730 - 1770 m; *E. Herrera* 281; *R. López* 12760; *R. Medina* 135.

Nombre vernáculo: Mano de león.

Schefflera aff. jahnnii (Harms) Steyermark

Arbolito; 2000 - 2100 m; *E. Herrera* 371; *E. Herrera* 377; *R. Medina* 471.

Nombre vernáculo: Candelillo, Candelero.

Schefflera quindiuensis Harms

Arbolito; 1765 - 2000 m; *E. Herrera* 295; *M. Jiménez* 6; *M. Jiménez* 41; *R. Medina* 346.

Nombre vernáculo: Mano de León.

Schefflera sphaerocoma Harms

Arbolito; 1730 - 2200 m; *C. Huertas* 112; *E. Herrera* 186; *M. Jiménez* 13; *O. Chaparro* 46A; *R. López* 12772A.

ASTERACEAE

(10 géneros, 17 especies)

Ageratum conizoides L.

Hierba; 2000 m; *R. Medina* 348.

Baccharis brachylaenoides DC.

Arbusto; 1750 m; *R. Medina* 156.

Baccharis decussata (Klatt) Hieron.

Arbusto; 1900 m; *R. Medina* 309.

Baccharis sp.

Arbusto; 1770 m; *E. Herrera* 180.

Nombre vernáculo: Ahumadero.

Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob.

Hierba; 1900 m; *R. Medina* 260.

Chromolaena tacotana Pers.

Hierba; 1730 m; *R. López* 12754.

Critoniopsis glandulata (Cuatrec.) H. Rob.

Arbusto; 1730 - 2480 m; *E. Herrera* 187; *E. Herrera* 331; *O. Chaparro* 38; *R. López* 12720; *R. Medina* 368; *R. Medina* 465.

Nombre vernáculo: Cucharo.

Ichthyothere garcia-barrigae H. Rob.

Arbusto; 1750 - 2000 m; *R. Medina* 142; *R. Medina* 345.

Mikania aristei B.L. Rob.

Arbusto; 2380 m; *R. Medina* 360.

Mikania banisteriae DC.

Bejuco; 1750 m; *R. Medina* 155.

Mikania lawrancei B.L. Rob.

Bejuco; 1730 m; *R. López* 12751.

Munnozia asplundii H. Rob.

Hierba; 1900 m; *R. Medina* 256; *R. Medina* 293.

Munnozia hastifolia (Poepp.) H. Rob. & Brettell

Hierba; 2100 m; *E. Herrera* 382.

Munnozia senecionidis Benth.

Hierba; 1960 m; *M. Jiménez* 40.

Paragynoxys sp.

Arbolito; 1900 - 2200 m; *R. Medina* 315; *R. Medina* 457.

Pollalesta macrophylla (Sch.Bip.) Aristeg.

Arbusto; 1730 m; *R. López* 12757.

Nombre vernáculo: Salvio.

Steiractinia aspera Cuatrec.

Hierba; 1880 - 2100 m; *R. Cortés-B.* 2391; *R. Medina* 382.

BEGONIACEAE

(1 género, 4 especies)

Begonia fischeri Schk.

Hierba; 1900 m; *R. Medina* 242.

Begonia gamolepis L.B. Sm. & B.G. Schub.

Hierba; 1800 m; *R. Medina* 210; *R. Medina* 211; *R. Medina* 212; *R. Medina* 213.

Begonia toledana L.B. Sm. & B.G. Schub.

Hierba; 1800 - 2200 m; *R. Medina* 322; *R. Medina* 361.

Begonia sp.

Hierba; 1900 m; *R. Medina* 301A.

BIGNONIACEAE

(1 género, 1 especie)

Tabebuia chrysanthia (Jacq.) G. Nicholson

Árbol; 2000 m; *R. Medina* 510.

Nombre vernáculo: Guayacán.

BORAGINACEAE

(1 género, 2 especies)

Cordia cylindrostachya Ruiz & Pav.

Árbol; 1800 - 2050 m; *S. Cómbita* 89; *R. Medina* 339; *R. Medina* 394.

Nombre vernáculo: Mulato.

Cordia fuertesii J. Estrada

Árbol; 1750 - 1800 m; *C. Huertas* 107; *E. Herrera* 393.

BURSERACEAE

(2 géneros, 2 especies)

Dacryodes sp.

Árbol; 1910 m; *R. Medina* 410; *R. Medina* 429.

Protium sp.

Árbol; 1800 - 1810 m; *E. Herrera* 233; *R. Medina* 396.

CACTACEAE

(1 género, 1 especie)

Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw.

Hierba; 1750 m; *E. Herrera* 400.

CAMPANULACEAE

(1 género, 1 especie)

Centropogon solanifolius Benth.

Hierba; 2000 m; *R. Medina* 349.

CELASTRACEAE

(1 género, 1 especie)

Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) Briq.

Árbol; 2000 m; *R. Medina* 504.

CLETHRACEAE

(1 género, 1 especie)

Clethra fagifolia Kunth (Figura 2h)

Arbolito; 1750 - 1950 m; *E. Herrera* 215; *O. Chaparro* 32; *R. Medina* 150; *R. Medina* 154.

Nombre vernáculo: Ahuyamo.

CLUSIACEAE

(4 géneros, 9 especies)

Calophyllum brasiliense Cambess.

Árbol; 1800 - 1910 m; *C. Huertas* 109; *E. Herrera* 252; *R. Medina* 192; *R. Medina* 416.

Nombre vernáculo: Cachicamo.

Chrysochlamys clusiifolia Maguire (Figura 3a)

Arbolito; 1800 - 1880 m; *C. Huertas* 102; *E. Herrera* 201; *E. Herrera* 242; *R. Medina* 207; *R. Medina* 383.

Chrysochlamys colombiana (Cuatrec.) (Figura 3c)

Arbolito; 2000 m; *S. Cómbita* 66.

Nombre vernáculo: Gaque.

Chrysochlamys sp.

Arbolito; 1730 m; *R. López* 12739.

Clusia bracteosa Cuatrec.

Árbol; 1750 - 2000 m; *E. Herrera* 277; *E. Herrera* 361; *O. Chaparro* 2.

Nombre vernáculo: Gaque.

Clusia discolor Cuatrec.

Arbolito; 2000 m; *E. Herrera* 372; *R. Medina* 334.

Nombre vernáculo: Manteca de marrano.

Clusia ducuoides Engl.

Árbol; 1720 m; *E. Herrera* 391.

Nombre vernáculo: Gaque.

Clusia schomburgiana (Benth) Tr. & P. (Figura 3b)

Árbol; 1730 - 2000 m; *E. Herrera* 211; *E. Herrera* 408; *E. Herrera* 301A; *M. Jiménez* 16; *O. Chaparro* 6; *S. Cómbita* 63; *R. López* 12770; *R. Medina* 122; *R. Medina* 253; *R. Medina* 380.

Nombre vernáculo: Gaque.

Clusia sp.

Árbol; 1770 m; *E. Herrera* 318.

Nombre vernáculo: Gaque.

CUNONIACEAE

(1 género, 2 especies)

Weinmannia pinnata L.

Árbol; 2200 m; *O. Chaparro* 44.

Nombre vernáculo: Encenillo.

Weinmannia sp.

Árbol; 1800 m; *C. Huertas* 114.

Nombre vernáculo: Encenillo.

CYRILLACEAE

(1 género, 1 especie)

Purdiae a nutans Planch.

Hierba; 2130 m; *R. Medina* 440.

DICHAPETALACEAE

(2 géneros, 3 especies)

Dichapetalum bernalii Prance

Bejuco; 1960 m; *M. Jiménez* 36.

Dichapetalum sp.

Bejuco; 1810 m; *E. Herrera* 236.

Stephanopodium sp.

Árbol; 1770 m; *E. Herrera* 333.

ELAEOCARPACEAE

(1 género, 2 especies)

Sloanea brevispina Earle Sm.

Árbol; 1770 - 2130 m; *E. Herrera* 234; *E. Herrera*

261; *E. Herrera* 319; *R. Medina* 445.

Nombre vernáculo: Sapote.

Sloanea cf. merevariensis Steyermark.

Árbol; 2300 m; *R. Medina* 525.

Nombre vernáculo: Carreto.

ERICACEAE

(6 géneros, 9 especies)

Cavendishia compacta A.C.Smith (Figura 3d)

Arbusto; 1730 - 1770 m; *R. López* 12746; *R. Medina* 160; *R. Medina* 181.

Cavendishia guatapeensis Mansf.

Arbusto; 1770 - 2090 m; *E. Herrera* 206; *S. Cómbita* 83; *S. Cómbita* 98; *R. Medina* 280.

Cavendishia nitida (Kunth) A.C. Sm.

Arbusto; 2380 m; *R. Medina* 352.

Cavendishia sp.

Arbusto; 1750 m; *R. Medina* 146.

Gaultheria prostrata (Cav.) DC.

Arbusto; 2600 m; *S. Cómbita* 105.

Monotropa uniflora L. (Figura 3e)

Hierba; 1800 m; *R. Medina* 199; *R. Medina* 216.

Psammisia penduliflora (Dunal) Klotzsch (Figura 3f)

Arbusto; 1730 - 1800 m; *E. Herrera* 209; *R. López* 12737; *R. Medina* 117; *R. Medina* 197.

Satyria sp.

Arbusto; 1730 - 2380 m; *E. Herrera* 243; *R. López* 12756; *R. Medina* 161; *R. Medina* 356.

Nombre vernáculo: Camarero, Camaron.

Vaccinium sp.

Hierba; 2090 m; *S. Cómbita* 74.

ERYTHROXYLACEAE

(1 género, 1 especie)

Erythroxylum sp.

Árbol; 2000 m; *R. Medina* 496.

EUPHORBIACEAE

(8 géneros, 14 especies)

Acalypha macrostachya Jacq.

Árbol; 1900 - 2100 m; *R. Cortés-B.* 2390; *R. Medina* 249; *R. Medina* 295.

Adenophaedra megalophylla Müll. Arg.

Arbusto; 1720 m; *E. Herrera* 386.

Alchornea glandulosa Poepp.

Arbusto; 1750 - 2000 m; *E. Herrera* 240; *E. Herrera* 283; *E. Herrera* 312; *O. Chaparro* 8; *R. Medina* 145; *R. Medina* 247; *R. Medina* 508.

Nombre vernáculo: Algodón, Redondo.

Alchornea grandiflora Müll. Arg.

Arbusto; 1770 - 2130 m; *E. Herrera* 179; *E. Herrera* 353; *E. Herrera* 360; *O. Chaparro* 24; *R. Medina* 443; *R. Medina* 469.

Nombre vernáculo: Redondo.

Alchornea latifolia Sw.

Arbusto; 2100 m; *E. Herrera* 379.

Nombre vernáculo: Quina.

Conceveiba pleiostemonoides Donn. Sm.

Árbol; 1830 m; *O. Chaparro* 21; *O. Chaparro* 22.

Nombre vernáculo: Algodón.

Croton killipianus Croizat

Arbolito; 1770 m; *E. Herrera* 317.

Nombre vernáculo: Drago.

Croton smithianus Croizat

Arbolito; 1800 m; *C. Huertas* 122.

Croton sp.

Arbolito; 2300 m; *R. Medina* 529.

Hyeronima huilensis Cuatrec. (Figura 3g)

Arbolito; 1750 - 2130 m; *O. Chaparro* 5; *R. Medina* 435; *R. Medina* 436; *R. Medina* 481; *R. Medina* 485A.

Nombre vernáculo: Chuguaca.

Hyeronima moritziana (Müll. Arg.) Pax & Hoff.

Árbol; 1950 - 2000 m; *O. Chaparro* 31; *R. Medina* 483.

Nombre vernáculo: Chuguaca.

Hyeronima oblonga (Tul.) Müll. Arg.

Árbol; 1770 - 1810 m; E. Herrera 254; E. Herrera 328.

Nombre vernáculo: Arrayán, Cucharo.

Mabea sp.

Arbolito; 1800 m; C. Huertas 110.

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. & Endl.

Arbusto; 1750 - 1910 m; E. Herrera 203; E. Herrera 288; M. Jiménez 2; R. Medina 116; R. Medina 265; R. Medina 377; R. Medina 407.

FABACEAE

(7 géneros, 9 especies)

Andira taurotesticulata R.T. Penn.

Árbol; 1720 - 1900 m; E. Herrera 205; M. Reina 6; R. Medina 250.

Nombre vernáculo: Coco.

Dioeclea guianensis Benth.

Bejuco; 1720 m; M. Reina 7.

Inga capsellata Uribe

Arbolito; 1770 m; E. Herrera 321.

Nombre vernáculo: Guamo.

Inga cf. coragipsea Uribe

Arbolito; 2000 m; R. Medina 338.

Nombre vernáculo: Guamo chiniguo.

Inga aff. guamito Uribe

Arbolito; 1900 m; R. Medina 245.

Nombre vernáculo: Guamo.

Macrolobium colombianum (Britton & Killip) Killip ex L. Uribe Judd

Árbol; 1750 - 2100 m; E. Herrera 380; E. Herrera 388; E. Herrera 402.

Nombre vernáculo: Robla.

Mimosa pudica L.

Hierba; 1750 m; R. Medina 133.

Ormosia sp.

Árbol; 1770 m; E. Herrera 172.

Parkia sp.

Árbol; 1770 m; E. Herrera 285; E. Herrera 303.

Nombre vernáculo: Guamo.

FAGACEAE

(2 géneros, 2 especies)

Colombobalanus excelsa (Lozano et al.) Nixon & Crepet (Figura 3h)

Árbol; 1730 - 2100 m; E. Herrera 381; E. Herrera 396; R. López 12747; R. Medina 144.

Nombre vernáculo: Robla, Roble negro.

Quercus humboldtii Bonpl.

Árbol; 1810 - 1830 m; E. Herrera 250; O. Chaparro 10.

Nombre vernáculo: Roble.

GENTIANACEAE

(3 géneros, 3 especies)

Lehmanniella splendens (Hook.) Ewan

Hierba; 1800 - 1900 m; R. Medina 198; R. Medina 234; R. Medina 283.

Sympolanthus calygonus (Ruiz & Pav.) Griseb. ex Gilg (Figura 4a)

Hierba; 1730 - 2200 m; R. López 12761; R. Medina 193; R. Medina 237; R. Medina 325.

Voyria flavescens Griseb.

Hierba; 1770 m; R. Medina 178.

GESNERIACEAE

(6 géneros, 15 especies)

Alloplectus ichthyoderma Hanst.

Hierba; 1750 - 2480 m; R. Medina 148; R. Medina 162; R. Medina 163; R. Medina 238; R. Medina 369; R. Medina 514; S. Cómbita 102.

Alloplectus schultzei Mansf.

Hierba; 1780 m; E. Herrera 189.

Alloplectus tetragonus (Hanst.) Hanst. Hierba; 1730 m; R. López 12765.

Alloplectus sp.

Hierba; 1730 m; R. López 12743.

Besleria aggregata (Mart) Hanst.

Hierba; 2200 m; R. Medina 324.

Besleria fallax C.E. Gonzalez, L.E. Skog & Amaya

Hierba; 1750 m; E. Herrera 404.

Besleria solanoides Kunth

Hierba; 1880 m; R. Medina 373.

Columnea dimidiata (Benth.) Kuntze

Hierba; 1770 m; E. Herrera 181.

Columnea sanguinea (Pers.) Hanst.

Hierba; 1750 m; R. Medina 143.

Columnea sp.

Hierba; 2050 m; S. Cómbita 99; R. Medina 472.

Corytoplectus congestus (Linden ex Hanst.) Wiehler

Hierba; 1730 m; R. López 12743A.

Cremosperma congruens C.V. Morton

Hierba; 1900 m; R. Medina 296.

Cremosperma sp.

Hierba; 1730 m; R. López 12726.

***Resia ichthyoides* Leeuwenb.**

Hierba; 1910 m; *R. Medina* 430.

HYPERICACEAE

(1 género, 1 especie)

***Vismia baccifera* (L.) Triana & Planch.**

Arbolito; 1770 - 2200 m; *E. Herrera* 200A; *O. Chaparro* 14; *R. Medina* 188; *R. Medina* 317; *R. Medina* 332; *R. Medina* 381.

Nombre vernáculo: Punta de lanza, Manchador.

JUGLANDACEAE

(1 género, 1 especie)

***Alfaroa williamsii* Ant. Molina** (Figura 4b)

Árbol; 1730 - 1780 m; *E. Herrera* 183; *R. López* 12715; *R. López* 12767.

Nombre vernáculo: Tabano, Macanillo colorado.

LAMIACEAE

(1 género, 1 especie)

***Aegiphila hirsuta* Moldenke**

Arbusto; 2000 m; *R. Medina* 518.

LECYTHIDACEAE

(1 género, 1 especie)

***Eschweilera sessilis* A.C. Sm.**

Árbol; 1770 - 1910 m; *E. Herrera* 332; *R. Medina* 414.

LENTIBULARIACEAE

(1 género, 1 especie)

***Utricularia tricolor* A. St.-Hil.** (Figura 4c)

Hierba; 2100 m; *R. López* 12718; *R. Medina* 119.

LOGANIACEAE

(1 género, 1 especie)

***Spigelia* sp.**

Hierba; 1750 m; *E. Herrera* 412.

LORANTHACEAE

(2 géneros, 2 especies)

***Psittacanthus* sp.**

Arbusto; 1780 - 1950 m; *O. Chaparro* 27; *R. Medina* 121; *R. Medina* 236.

Loranthaceae

Arbusto; 2100 m; *R. Cortés-B.* 2393.

LYTHRACEAE

(2 géneros, 3 especies)

***Adenaria floribunda* Kunth**

Arbusto; 1750 m; *E. Herrera* 401.

***Cuphea hispidiflora* Koehne**

Hierba; 1900 - 2050 m; *S. Cóbita* 87; *R. Medina* 311.

***Cuphea* sp.**

Hierba; 1770 m; *R. Medina* 185.

MALPIGHIAEAE

(1 género, 2 especies)

***Byrsonima* sp. 1**

Árbol; 1830 - 2050 m; *E. Herrera* 336; *E. Herrera* 375; *R. Medina* 474.

Nombre vernáculo: Acerito

***Byrsonima* sp. 2**

Árbol; 1810 m; *E. Herrera* 245.

MALVACEAE

(2 géneros, 2 especies)

***Sida poeppigiana* DC.**

Hierba; 1900 m; *R. Medina* 308.

***Spirotheca codazziana* Romero**

Árbol; 1770 - 2400 m; *E. Herrera* 208A; *O. Chaparro* 18; *R. López* 12716; *R. Medina* 387.

Nombre vernáculo: Yuco.

MARCGRAVIACEAE

(2 géneros, 2 especies)

***Marcgraviastrum* aff. *gigantophyllum* (Gilg) Bedell ex S. Dressler** (Figura 4d)

Árbol; 2000 m; *R. Medina* 331.

***Sarcopera anomala* (Kunth) Bedell** (Figura 4e)

Árbol; 1780 - 1880 m; *S. Cóbita* 122; *R. Medina* 142A.

MELASTOMATACEAE

(10 géneros, 28 especies)

***Acisanthera unifolia* (Vahl) Gleason**

Hierba; 1900 m; *R. Medina* 243.

***Blakea cuatrecasii* Gleason**

Árbol; 1900 m; *R. Medina* 289.

***Blakea granatensis* Naudin**

Árbol; 1770 - 2200 m; *E. Herrera* 220; *R. Medina* 316; *R. Medina* 428.

***Blakea quadrangularis* Triana**

Árbol; 1720 - 1770 m; *E. Herrera* 207; *E. Herrera* 204A; *M. Reina* 12.

Nombre vernáculo: Tuno, Gaque.

***Blakea* sp. 1** (Figura 4f)

Árbol; 1750 - 2000 m; *O. Chaparro* 3; *R. Medina* 512.

***Blakea* sp. 2**

Árbol; 1830 - 1910 m; *E. Herrera* 350; *R. Medina* 417.

Nombre vernáculo: Macanillo.

***Centronia haemantha* (Pl. & Lind.) Triana** (Figura 4g)

Árbol; 1770 - 2130 m; *E. Herrera* 275A; *R. Medina* 286; *R. Medina* 446.

***Clidemia ciliata* D. Don**

Arbusto; 1730 - 1770 m; *R. López* 12724; *R. López* 12764B; *R. Medina* 168.

***Graffenrieda latifolia* (Naudin) Triana** Arbolito; 1720 - 1770 m; *E. Herrera* 298; *M. Reina* 8; *R. Medina* 139; *R. Medina* 182.

***Graffenrieda uribei* Wurdack**

Arbolito; 1900 m; *R. Medina* 307.

Nombre vernáculo: Hojarasco.

***Huilaea macrocarpa* L. Uribe**

Árbol; 1880 m; *R. Medina* 374A.

***Miconia aeruginosa* Naudin**

Arbolito; 1900 m; *R. Medina* 310.

***Miconia brachygyna* Gleason**

Arbolito; 1750 - 2090 m; *E. Herrera* 411; *S. Cómbita* 80; *R. Medina* 244; *R. Medina* 475.

***Miconia chamissois* Naudin**

Arbolito; 1730 m; *R. López* 12734.

***Miconia divergens* Triana**

Arbolito; 1770 m; *E. Herrera* 176.

***Miconia dodecandra* Cogn.**

Arbolito; 1750 m; *R. Medina* 115.

***Miconia dolicophoda* Naudin**

Arbolito; 1770 - 2000 m; *E. Herrera* 175; *O. Chapparre* 19; *R. Medina* 488.

Nombre vernáculo: Macanillo colorado.

***Miconia longifolia* (Aubl.) DC.**

Arbolito; 1730 - 1770 m; *E. Herrera* 292; *R. López* 12742.

Nombre vernáculo: Macanillo.

***Miconia macrotis* (Griseb.) Cogn.**

Arbolito; 1900 m; *R. Medina* 241.

***Miconia resima* Naudin**

Arbolito; 2200 m; *R. Medina* 450.

Nombre vernáculo: Macanillo.

***Miconia smaragdina* Naudin**

Arbolito; 1910 - 2050 m; *R. Medina* 405; *R. Medina* 470.

***Miconia theaezans* Cogn.**

Arbolito; 1880 - 1960 m; *M. Jiménez* 25; *R. Medina* 384; *R. Medina* 385.

***Miconia velutina* Triana**

Arbolito; 1730 - 1880 m; *C. Huertas* 123; *E. Herrera* 217; *R. López* 12771; *R. Medina* 140; *R. Medina* 194; *R. Medina* 372.

***Miconia* sp. 1**

Arbolito; 2100 m; *E. Herrera* 376.

Nombre vernáculo: Macanillo.

***Miconia* sp. 2**

Arbolito; 1730 - 1750 m; *R. López* 12755; *R. Medina* 113; *R. Medina* 134.

***Pterogastra divaricata* (Bonpl.) Naudin** (Figura 4h)

Hierba; 1750 - 1770 m; *R. Medina* 118; *R. Medina* 170.

***Pterolepis trichotoma* (Rottb.) Cogn.**

Hierba; 1770 m; *R. Medina* 171.

***Tibouchina lepidota* (Bonpl.) Baill.**

Arbolito; 1750 - 2000 m; *R. Medina* 159; *R. Medina* 511.

MELIACEAE

(4 géneros, 4 especies)

***Carapa guianensis* Aubl.**

Árbol; 1770 - 2300 m; *E. Herrera* 251; *R. Medina* 328; *R. Medina* 527.

Nombre vernáculo: Gimo.

***Guarea kunthiana* A. Juss.** (Figura 5a)

Árbol; 1998 - 2300 m; *R. Medina* 520; *R. Medina* 496A.

***Trichilia* sp.**

Árbol; 1750 - 2130 m; *M. Jiménez* 18; *R. Medina* 164; *R. Medina* 434; *R. Medina* 502.

Meliaceae

Árbol; 1800 m; *C. Huertas* 119.

MORACEAE

(2 géneros, 7 especies)

***Ficus andicola* Standl.**

Árbol; 1770 - 1900 m; *E. Herrera* 314; *R. Medina* 246.

Nombre vernáculo: Higuerón.

***Ficus cuatrecasasiana* Dugand**

Árbol; 2000 m; *S. Cómbita* 67.

***Ficus cf. mutisii* Dugand**

Árbol; 1800 - 1900 m; *C. Huertas* 108; *R. Medina* 268.

Nombre vernáculo: Lechero, Higuerón.

***Ficus subandina* Dugand**

Árbol; 2000 - 2130 m; *R. Medina* 374; *R. Medina* 444; *R. Medina* 486.

***Ficus trigona* L. f.**

Árbol; 2000 m; *R. Medina* 484.

***Ficus* sp.**

Árbol; 2000 m; *R. Cortés-B.* 2401.

***Helicostylis tovarensis* Pittier**

Árbol; 1910 m; *R. Medina* 397.

MYRICACEAE

(1 género, 1 especie)

***Morella pubescens* (Humb. & Bonpl. ex Willd.)**

Wilbur

Arbolito; 2000 m; *R. Medina* 341.

MYRSINACEAE (Primulaceae)

(4 géneros, 11 especie)

***Ardisia* cf. *dodgei* Standl.**

Arbusto; 1800 m; *E. Herrera* 113.

***Cybianthus iteoides* (Benth.) G. Agostini**

Arbolito; 1770 - 1910 m; *C. Huertas* 10; *C. Huertas* 117; *E. Herrera* 282; *E. Herrera* 291; *M. Jiménez* 3; *M. Jiménez* 4; *R. Medina* 401.

***Cybianthus occigranatensis* (Cuatrec.) G. Agostini**

Arbolito; 1770 m; *E. Herrera* 270; *E. Herrera* 329.
Nombre vernáculo: Cucharo.

***Cybianthus* cf. *pastensis* (Mez.) G. Agostini**

Arbolito; 1800 m; *R. Medina* 219.

***Cybianthus venezolanus* (Ruiz & Pav.) Spreng.**

Arbolito; 1770 m; *E. Herrera* 271; *E. Herrera* 330.

***Cybianthus* sp.**

Arbolito; 2200 m; *R. Medina* 460.

***Geissanthus bogotensis* Mez**

Arbolito; 1800 - 1810 m; *C. Huertas* 113; *E. Herrera* 235.

Nombre vernáculo: Cucharo.

***Geissanthus* sp.**

Arbolito; 1960 - 2130 m; *M. Jiménez* 23; *R. Medina* 442; *R. Medina* 401A.

Nombre vernáculo: Cucharo blanco

***Myrsine coriacea* (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.**

Arbolito; 1750 - 2300 m; *O. Chaparro* 43; *R. Medina* 131; *R. Medina* 519.

Nombre vernáculo: Cucharo blanco.

***Myrsine latifolia* (Ruiz & Pav.) Spreng.**

Arbolito; 1770 - 1830 m; *E. Herrera* 307; *O. Chaparro* 9; *O. Chaparro* 15.

Nombre vernáculo: Cucharo.

***Myrsine* sp.**

Arbolito; 2050 m; *R. Medina* 472A.

MYRTACEAE

(3 géneros, 9 especies)

***Eugenia* sp. 1**

Arbolito; 1770 - 1830 m; *E. Herrera* 324; *O. Chaparro* 13.

Nombre vernáculo: Arrayán.

***Eugenia* sp. 2**

Arbolito; 1980 - 2000 m; *O. Chaparro* 33; *R. Medina* 485.

Nombre vernáculo: Arrayán, Arrayán blanco.

***Eugenia* sp. 3**

Arbolito; 2130 m; *R. Medina* 441.

Nombre vernáculo: Arrayán.

***Myrcia lucida* Kiaersk.**

Arbolito; 2300 m; *R. Medina* 526.

Nombre vernáculo: Arrayán.

***Myrcia mollis* (Kunth) DC.**

Arbolito; 1830 - 1910 m; *O. Chaparro* 11; *R. Medina* 399; *R. Medina* 424.

Nombre vernáculo: Arrayán.

***Myrcia* sp.**

Arbolito; 1910 m; *R. Medina* 422.

***Myrcianthes* sp. 1**

Arbolito; 2090 m; *S. Cómbita* 72.

***Myrcianthes* sp. 2**

Arbolito; 1900 m; *R. Medina* 248.

***Myrcianthes* sp. 3**

Arbolito; 1730 - 1960 m; *E. Herrera* 290; *E. Herrera* 316; *M. Jiménez* 19; *R. López* 12758.

Nombre vernáculo: Arrayan de hoja grande, Arrayán

OCHNACEAE

(1 género, 1 especie)

***Sauvagesia erecta* L.**

Hierba; 1770 m; *R. Medina* 180.

ONAGRACEAE

(2 géneros, 2 especies)

***Epilobium* sp.**

Hierba; 1720 m; *E. Herrera* 383.

***Ludwigia peruviana* (L.) H. Hara** (Figura 5b)

Hierba; 1800 m; *R. Medina* 240.

OROBANCHACEAE

(1 género, 1 especie)

***Castilleja arvensis* Schldl. & Cham.**

Hierba; 1770 - 1900 m; *R. Medina* 177; *R. Medina* 263.

PENTAPHYLACACEAE

(1 género, 2 especies)

***Ternstroemia macrocarpa* Triana & Planch.**

Arbolito; 1910 m; *R. Medina* 398; *R. Medina* 411.

***Ternstroemia meridionalis* Mutis ex L.f.**

Arbolito; 2050 - 2480 m; *R. Medina* 364; *R. Medina* 455; *R. Medina* 476.

PHYLLANTHACEAE

(2 géneros, 2 especies)

***Phyllanthus niruri* L.**

Arbolito; 1880 m; *S. Cómbita* 124.

***Richeria grandis* Vahl**

Árbol; 1770 - 1950 m; *E. Herrera* 323; *O. Chaparro* 26.

Nombre vernáculo: Naranjo.

POLYGALACEAE

(1 género, 1 especie)

***Monnina phytolaccifolia* Kunth**

Arbusto; 1770 m; *R. Medina* 169.

POLYGONACEAE

(1 género, 1 especie)

***Polygonum punctatum* Elliott**

Hierba; 1770 m; *R. Medina* 184.

ROSACEAE

(1 género, 1 especie)

Rosaceae

Hierba; 1900 m; *R. Medina* 254.

RUBIACEAE

(18 géneros, 33 especies)

***Alibertia* sp. (Figura 5c)**

Árbol; 1730 - 2100 m; *E. Herrera* 185; *S. Cómbita* 101; *R. Cortés-B.* 2395; *R. López* 12738.

Nombre vernáculo: Clavo, Azuceno.

***Cinchona pubescens* Vahl**

Árbol; 2100 m; *E. Herrera* 3804.

Nombre vernáculo: Santa Maria.

***Coccocypselum hirsutum* Bartl. ex DC.**

Hierba; 1750 - 1880 m; *S. Cómbita* 119; *R. Medina* 114; *R. Medina* 125; *R. Medina* 175.

***Coccocypselum lanceolatum* (Ruíz & Pav.) Pers.**

(Figura 5d)

Hierba; 2100 m; *R. Cortés-B.* 2398.

***Coussarea macrocalyx* Standl.**

Arbusto; 2100 m; *R. Cortés-B.* 2396.

***Diodia* sp.**

Hierba; 1900 m; *R. Medina* 272.

***Elaeagia mariae* Wedd.**

Arbolito; 1910 m; *R. Medina* 409.

***Faramea flavicans* (Humb. & Bonpl. ex Roem.**

& Schult.) Standl.

Arbolito; 1910 - 2200 m; *O. Chaparro* 34; *O. Chaparro* 40; *R. Medina* 408; *R. Medina* 412; *R. Medina* 462.

***Guettarda crispiflora* Vahl**

Arbolito; 2000 m; *R. Medina* 482; *R. Medina* 490.

Nombre vernáculo: Quebracho.

***Ladenbergia macrocarpa* (Vahl) Klotzsch**

Árbol; 1750 - 2000 m; *E. Herrera* 365; *O. Chaparro* 4; *S. Cómbita* 61.

Nombre vernáculo: Clavo, Azuceno.

***Ladenbergia moritziana* Klotzsch**

Árbol; 1750 - 2000 m; *E. Herrera* 177; *E. Herrera* 286;

E. Herrera 356; *E. Herrera* 369; *O. Chaparro* 7; *R. Medina* 393; *R. Medina* 406.

Nombre vernáculo: Azuceno.

***Nertera granadensis* (L.f.) Druce**

Hierba; 2090 m; *S. Cómbita* 73.

***Notopleura epiphytica* (K.Krause) C.M. Taylor**

Hierba; 1770 - 1800 m; *R. Medina* 189; *R. Medina* 235.

***Notopleura pithecoobia* (Standl.) C.M.Taylor**

Hierba; 2380 m; *R. Medina* 355.

***Palicourea angustifolia* Kunth**

Arbusto; 1730 - 1800 m; *M. Jiménez* 9; *R. López* 12741; *R. Medina* 200.

***Palicourea demissa* Standl.**

Arbusto; 1900 - 2600 m; *S. Cómbita* 104; *S. Cómbita* 110; *R. Medina* 306.

***Palicourea aff. lasiorrhachis* Oerst.**

Arbusto; 2090 m; *S. Cómbita* 82.

Nombre vernáculo: Quebracho.

***Palicourea stellata* C.M.Taylor**

Arbolito; 1770 - 2480 m; *C. Huertas* 116; *E. Herrera* 227; *E. Herrera* 266; *R. Medina* 191; *R. Medina* 217; *R. Medina* 264; *R. Medina* 362.

Nombre vernáculo: Quebragacho.

***Palicourea* sp.**

Arbusto; 1830 - 2380 m; *E. Herrera* 366; *M. Jiménez* 17; *M. Jiménez* 34; *O. Chaparro* 25; *R. Medina* 359.

***Posoqueria coriacea* M. Martens & Galeotti**

Árbol; 2000 m; *R. Medina* 487.

***Psychotria aschersoniana* K. Schum. & K. Krause**

Arbusto; 1750 m; *R. Medina* 151.

***Psychotria Aubletiana* Steyermark**

Arbusto; 1750 - 2090 m; *E. Herrera* 392; *S. Cómbita* 81.

***Psychotria aff. brachiata* Sw.**

Arbusto; 1900 m; *R. Medina* 282; *R. Medina* 285.

***Psychotria cauligera* C.M.Taylor**

Arbolito; 1730 - 1900 m; *E. Herrera* 399; *R. López* 12766; *R. Medina* 291.

***Psychotria cuspidata* Bredem. ex Roem. & Schult.**

Hierba; 1800 - 2090 m; *S. Cómbita* 77; *S. Cómbita* 79; *R. Medina* 225; *R. Medina* 228.

***Psychotria erythrocephala* (K. Schum. & K. Krause) Standl.**

Arbusto; 1730 - 1800 m; *R. López* 12735; *R. Medina* 149; *R. Medina* 214.

***Psychotria goldmanii* Standl.**

Arbusto; 2600 m; *S. Cómbita* 111; *S. Cómbita* 112.

***Psychotria luxurians* Rusby**

Arbusto; 1880 m; *S. Cómbita* 120.

***Psychotria* sp.**

Arbusto; 1720 m; *E. Herrera* 385.

***Sabicea cana* Hook.f.**

Arbusto; 2100 m; *R. Cortés-B.* 2394.

***Schraderia blumii* Dwyer & M.V.Hayden**

Arbusto; 1750 - 1900 m; *R. Medina* 147; *R. Medina* 190; *R. Medina* 276.

***Tocoyena costanensis* Steyermark.** (Figura 5e)

Arbusto; 2300 m; *R. Medina* 522.

***Warszewiczia coccinea* (Vahl) Klotzsch**

(Figura 5f)

Arbolito; 1750 - 2300 m; *E. Herrera* 407; *R. Medina* 524.

SABIACEAE

(1 género, 2 especies)

***Meliosma cf. caucana* Cuatrec. & Idrobo**

Árbol; 1860 m; *M. Reina* 5.

***Meliosma glossophylla* Cuatrec.**

Árbol; 1910 - 2000 m; *E. Herrera* 357; *R. Medina* 419.

Nombre vernáculo: Jaboncillo.

SALICACEAE

(1 género, 1 especie)

***Casearia pitumba* Sleumer**

Arbolito; 1900 m; *R. Medina* 314.

SANTALACEAE

(1 género, 1 especie)

***Antidaphne viscoidea* Poepp. & Endl.**

Arbusto; 2000 m; *R. Medina* 333.

SAPINDACEAE

(5 géneros, 7 especies)

***Billia rosea* (Planch. & Linden) C. Ulloa & P. Jörg.**

Árbol; 1730 - 2200 m; *E. Herrera* 373; *E. Herrera* 397; *O. Chaparro* 28; *O. Chaparro* 41; *O. Chaparro* 45; *R. López* 12768; *R. Medina* 489.

Nombre vernáculo: Quino, Quina.

***Cupania americana* L.**

Árbol; 1910 m; *R. Medina* 427.

***Cupania scrobiculata* Rich.**

Árbol; 1720 - 1810 m; *E. Herrera* 244; *E. Herrera* 389; *R. López* 12744.

***Matayba cf. guianensis* Aubl.**

Árbol; 2300 m; *R. Medina* 530.

***Paullinia cf. pachycarpa* Benth.**

Árbol; 1720 m; *E. Herrera* 384.

***Paullinia serjanifolia* Triana & Planch.**

Bejuco; 1750 - 1800 m; *R. Medina* 158; *R. Medina* 220.

***Talisia cf. macrophylla* (Mart.) Radlk.**

Árbol; 1910 m; *R. Medina* 423.

SAPOTACEAE

(2 géneros, 4 especies)

***Micropholis crotoides* (Pierre) Pierre**

Árbol; 1770 - 2000 m; *E. Herrera* 289; *R. Medina* 491.

***Micropholis melinoniana* Pierre**

Árbol; 1770 m; *E. Herrera* 213.

***Pouteria baehniana* Monach.**

Árbol; 1770 - 1950 m; *E. Herrera* 218; *E. Herrera* 287; *E. Herrera* 320; *O. Chaparro* 12; *O. Chaparro* 29.

***Pouteria caitito* (Ruiz & Pav.) Radlk.**

Árbol; 1770 m; *E. Herrera* 272; *E. Herrera* 311; *E. Herrera* 315.

SCROPHULARIACEAE

(1 género, 1 especie)

Scrophulariaceae

Hierba; 2000 m; *R. Medina* 330.

SIPARUNACEAE

(1 género, 3 especies)

***Siparuna aspera* (Ruiz & Pav.) A.**

Arbusto; 2100 m; *R. Cortés-B.* 2389.

***Siparuna lozaniiana* S.S. Renner & Hausner**

Arbusto; 1800 m; *R. Medina* 230.

***Siparuna mutisii* (Kunth) A. DC.**

Arbusto; 1730 - 1820 m; *E. Herrera* 200; *R. López* 12725; *R. López* 12752.

SOLANACEAE

(2 géneros, 7 especies)

***Cestrum megalophyllum* Dunal**

Arbolito; 1770 m; *R. Medina* 172.

***Solanum aturense* Dunal**

Arbusto; 1880 - 2090 m; *S. Cómbita* 71; *S. Cóm-bita* 117.

Nombre vernáculo: Arrayán.

***Solanum nigrum* L.**

Hierba; 2600 m; *S. Cómbita* 114; *S. Cómbita* 114A.

***Solanum nudum* Dunal**

Arbusto; 2000 m; *R. Medina* 344.

***Solanum ovalifolium* Dunal**

Arbusto; 1900 - 2000 m; *R. Medina* 292; *R. Medina* 294; *R. Medina* 336.

***Solanum trachycyphum* Bitter**

Arbolito; 2380 m; *R. Medina* 358.

Nombre vernáculo: Moraluz.

***Solanum* sp.**

Arbusto; 1800 m; *R. Medina* 209.

STAPHYLEACEAE

(1 género, 1 especie)

***Turpinia heterophylla* (Ruiz & Pav.) Tul.**

(Figura 5g)

Arbolito; 2050 - 2090 m; *S. Cómbita* 70; *R. Medina* 469A.

STYRACACEAE

(1 género, 2 especies)

***Styrax cf. cordatus* (Ruiz & Pav.) A. DC.**

Árbol; 2000 m; *R. Medina* 506.

***Styrax peruvianus* Zahlbr.**

Árbol; 2000 m; *E. Herrera* 368.

THEACEAE

(1 género, 1 especie)

***Gordonia fruticosa* (Schrad.) H. Keng**

Arbolito; 2000 m; *R. Medina* 493.

Nombre vernáculo: Lizcano rojo.

URTICACEAE

(3 géneros, 3 especies)

***Pilea mutisiana* (Spreng.) Wedd.**

Hierba; 2090 - 2200 m; *S. Cómbita* 75; *R. Medina* 323.

***Urera baccifera* (L.) Gaudich. ex Wedd.**

(Figura 5h)

Hierba; 1770 m; *R. Medina* 326.

Nombre vernáculo: Ortigo.

Urticaceae

Hierba; 2050 m; *S. Cómbita* 96.

VERBENACEAE

(1 género, 1 especie)

***Lantana camara* L.**

Arbusto; 1900 m; *R. Medina* 258.

VITACEAE

(1 género, 1 especie)

***Cissus obliqua* Ruiz & Pav.**

Hierba; 1750 m; *E. Herrera* 418.




Figura 2 . a. ANNONACEAE. *Guatteria* cf. *laurifolia*. *i.* Frutos. *ii.* Flor. **b.** CHLORANTHACEAE. *Hedyosmum cuatrecasanum*. *i.* Rama. *ii.* Botones florales. **c.** LAURACEAE. *Ocotea* sp. *i.* Frutos. *ii.* Corte longitudinal y transversal del fruto. **d.** MONIMIACEAE. *Mollinedia* sp. Infrutescencia. **e.** MYRISTICACEAE. *Compsonera rigidifolia*. *i.* Frutos. *ii.* Detalle del tronco y exudado. **f.** PIPERACEAE. *Piper obliquum*. Hoja e infructescencia. **g.** ARALIACEAE. *Schefflera fontiana*. *i.* Rama fértil. *ii.* Inflorescencia. **h.** CLETHRACEAE. *Clethra fagifolia*. *i.* Ramas fértiles. *ii.* Flores.



Figura 3. a. CLUSIACEAE. *Chrysochlamys clusiifolia* Maguire. *i.* Hoja y frutos. *ii.* Detalle de los frutos. b. CLUSIACEAE. *Clusia schomburgkiana*. *i.* Rama fértil. *ii.* Detalle de la flor. *iii.* Detalle del fruto. c. CLUSIACEAE. *Chrysochlamys colombiana*. *i.* Flor. *ii.* Corte transversal del fruto. *iii.* Ramas fértiles. d. ERICACEAE. *Cavendishia compacta*. *i.* Rama fértil. *ii.* Detalle de las flores. e. ERICACEAE. *Monotropa uniflora*. *i.* Hábito. *ii.* Detalle de la flor. f. ERICACEAE. *Psammisia penduliflora*. *i.* Hábito. *ii.* Flores en botón. g. EUPHORBIACEAE. *Hieronima huilensis*. Rama fértil. h. FAGACEAE. *Colombobalanus excelsa*. *i.* Rama fértil. *ii.* Inflorescencia.




Figura 4 . a. GENTIANACEAE. *Symbolanthus calygonus*. Flor. **b.** JUGLANDACEAE. *Alfaroa williamsii*. Inflorescencias. **c.** LENTIBULARIACEAE. *Utricularia tricolor*. Hábito. **d.** MARCGRAVIACEAE. *Marcgraviastrum aff. gigantophyllum*. *i.* Rama fértil. *ii.* Corte longitudinal del fruto. *iii.* Corte transversal del fruto. **e.** MARCGRAVIACEAE. *Sarcopera anomala*. *i.* Detalle de inflorescencia. **f.** MELASTOMATACEAE. *Blakea* sp. Detalle de la flor. **g.** MELASTOMATACEAE. *Centronia haemantha*. Rama fértil. **h.** MELASTOMATACEAE. *Pterogastra divaricata*. Flores.




Figura 5. a. MELIACEAE. *Guarea kunthiana*. i. Rama fétil. ii. Flores. b. ONAGRACEAE. *Ludwigia peruviana*. Detalle de la flor. c. RUBIACEAE. *Alibertia* sp. i. Flor. ii. Botón floral. iii. Fruto. d. RUBIACEAE. *Coccocypselum lanceolatum*. Hábito. e. RUBIACEAE. *Tocoyena costanensis*. i. Flores. ii. Fruto. f. RUBIACEAE. *Warszewiczia coccinea*. Rama fétil. g. STAPHYLEACEAE. *Turpinia heterophylla*. i. Rama fétil. ii. Frutos. h. URTICACEAE. *Urera baccifera*. Frutos.

Créditos de las fotografías: R. Medina. Figuras 2. a. b. c. i. d. e. f. g., 3. a. i. b. i. iii. c. i. iii. d. e. g. h., 4. a. b. c. d. i. f. g., 5. a. c. i. iii., d. e. f. g. h. R. Cortés. Figuras 2. h., 3. f. 4. h. S. Cómbita. Figuras 2. c. ii. 3. a. ii. b. ii. c. ii., 4. d. ii. iii. e., 5. b. c. ii.

