



Revista Mexicana de Biodiversidad

ISSN: 1870-3453

falvarez@ib.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México
México

Durán-Ramírez, Carlos Alberto; Fonseca-Juárez, Rosa María; Ibarra-Manríquez, Guillermo
Estudio florístico de Ficus (Moraceae) en el estado de Guerrero, México
Revista Mexicana de Biodiversidad, vol. 81, núm. 2, 2010, pp. 239-262
Universidad Nacional Autónoma de México
Distrito Federal, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42516001003>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto



Estudio florístico de *Ficus* (Moraceae) en el estado de Guerrero, México

Floristic study of *Ficus* (Moraceae) in the state of Guerrero, Mexico

Carlos Alberto Durán-Ramírez^{1,2}, Rosa María Fonseca-Juárez¹ y Guillermo Ibarra-Manríquez^{3*}

¹Laboratorio de Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F., México.

²Dirección actual: Instituto de Ecología, A. C. Km. 2.5 antigua carretera a Coatepec 351, Colonia Congregación El Haya, 91070 Xalapa, Veracruz, México.

³Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México. Antigua carretera a Pátzcuaro 8701, Colonia Ex Hacienda San José de la Huerta, 58190, Morelia, Michoacán, México.

*Correspondencia: gibarra@oikos.unam.mx

Resumen. Con base en salidas al campo y la revisión de ejemplares de herbario, se registran 13 especies de *Ficus* (Moraceae) en el estado de Guerrero, 4 pertenecen al subgénero *Pharmacosycea* (*F. insipida*, *F. lapathifolia*, *F. maxima* y *F. yoponensis*) y 9 al subgénero *Urostigma* (*F. citrifolia*, *F. cotinifolia*, *F. crocata*, *F. membranacea*, *F. obtusifolia*, *F. pertusa*, *F. petiolaris*, *F. pringlei* y *F. velutina*), al cual se añade un posible registro de *F. aurea*. Se incluye una clave para su identificación y se proporcionan descripciones, mapas de distribución, datos del hábitat y fenología de las especies, y se ilustran 6 de éstas. El bosque de galería y el bosque tropical caducifolio destacan por su riqueza de especies (8). *Ficus lapathifolia* restringe su distribución al bosque mesófilo de montaña y *F. pringlei* al bosque tropical caducifolio. Chilpancingo de los Bravo y Atoyac de Álvarez fueron los municipios con mayor cantidad de especies, con 11 y 9 especies, respectivamente. Por primera vez se registran para el estado: *F. crocata*, *F. lapathifolia*, *F. membranacea*, *F. pringlei* y *F. yoponensis*.

Palabras clave: amates, higueras, *Ficus*, *Pharmacosycea*, sicono, *Urostigma*.

Abstract. Based on herbarium specimens and on field explorations, 14 native species of *Ficus* (Moraceae) were recognized for Guerrero, Mexico. Four species are included in subgenus *Pharmacosycea* (*Ficus insipida*, *F. lapathifolia*, *F. maxima* and *F. yoponensis*) and 9 in subgenus *Urostigma* (*F. citrifolia*, *F. cotinifolia*, *F. crocata*, *F. membranacea*, *F. obtusifolia*, *F. pertusa*, *F. petiolaris*, *F. pringlei* and *F. velutina*), including a possible record of *F. aurea*. A key, descriptions, distribution maps, and phenology data of species are provided, and 6 of them are illustrated. Riparian forest and tropical deciduous forest were the vegetation communities with the highest number of species (8). *Ficus lapathifolia* was restricted to cloud forest whereas *F. pringlei* shows the same condition in the tropical deciduous forest. The municipalities of Chilpancingo de los Bravo and Atoyac de Álvarez were the most diverse with 11 and 9 species, respectively. *Ficus crocata*, *F. lapathifolia*, *F. membranacea*, *F. pringlei* and *F. yoponensis* are recorded for the first time for the study area.

Key words: figs, *Ficus*, *Pharmacosycea*, syconium, *Urostigma*.

Introducción

Rzedowski (1991) propuso que la zona de mayor concentración de diversidad vegetal en México abarca los territorios de Chiapas y Oaxaca. El estado de Guerrero, cercano a estas entidades, también destaca por su riqueza florística. Villaseñor (2003) le asigna un total de 4 648 especies, cifra sólo inferior a la que este autor anotó para Chiapas (7 573), Oaxaca (7 399), Veracruz (6 869), Jalisco (5 105) y Michoacán (4 672). Una estrategia para mejorar el conocimiento de la flora de áreas altamente diversas como

la de Guerrero es enfocarse en el estudio de grupos con taxonomía compleja, con la idea de cuantificar de manera más confiable su riqueza y facilitar la determinación de sus especies.

En esta categoría puede incluirse sin duda el género *Ficus* (Moraceae), cuya diversidad mundial no se conoce con exactitud, aunque se calcula que incluye entre 700 y 750 especies (Corner, 1962; Berg, 1989). En América, se le encuentra desde Florida (Estados Unidos de América) hasta el norte de Argentina, en distintos tipos de vegetación y generalmente en regiones con altitudes menores de 2 500 m, donde no se registran heladas (Burger, 1977; Berg, 1989). El género es inconfundible por el higo o sicono, un

tipo de inflorescencia en la que las flores están aisladas casi por completo, ya que su único acceso desde el exterior es por medio de una apertura apical denominada ostíolo (Ibarra-Manríquez, 1991; Ibarra-Manríquez y Wendt, 1992). Esta inflorescencia, única entre las angiospermas, obliga a las miembros de *Ficus* a depender totalmente para su polinización de avispas de la familia Agaonidae, las que, a su vez, requieren necesariamente de las flores pistiladas para reproducirse; habitualmente, una especie de *Ficus* es polinizada por una de avispa (Berg, 1990, 2001; Gorelick, 2001; Weiblen, 2002; Cook y Rasplus, 2003, pero véase Machado et al., 2005). Por otra parte, una vez que maduran los siconos constituyen una importante fuente de alimento para una amplia gama de animales, en especial, aves y murciélagos (Ibarra-Manríquez, 1991; Berg, 2001; Shanahan et al., 2001).

En la República Mexicana se han estimado entre 21 y 34 especies nativas de *Ficus* (Standley 1917, 1922; Serrato et al., 2004; Villaseñor, 2004). De los trabajos florísticos pioneros destaca el de Standley (1917, 1922), donde se describen brevemente las especies del género para México y Centroamérica, con una clave para su identificación. Otros trabajos similares más recientes son el de Ibarra-Manríquez y Wendt (1992), restringido al estado de Veracruz, el de Quintana y Carvajal (2001) para Jalisco y de Piedra-Malagón et al. (2006) para Morelos; el de Pennington y Sarukhán (2005), no restringido a un solo estado de México, que incluye tres especies (*Ficus cotinifolia* Kunth, *F. petiolaris* Kunth y *F. tecolutensis* (Liebm.) Miq.), y el de Carvajal (2007) donde se describen 13 especies de la región del Bajío y zonas adyacentes.

Standley (1922) menciona explícita o implícitamente 7 especies de *Ficus* presentes en Guerrero (*F. cotinifolia*, *F. lapathifolia* (Liebm.) Miq., *F. involuta* (Liebm.) Miq., *F. padifolia* Kunth, *F. petiolaris*, *F. radulina* S. Watson y *F. segoviae* Miq.). Una revisión de los listados florísticos regionales publicados para el estado añade otras 15 (Fonseca y Lozada, 1993; Lozada, 1994; Diego-Pérez y Lozada-Pérez, 1994; Gual, 1995; Verduzco y Rodríguez, 1995; Gallardo, 1996; Vargas y Pérez, 1996; Diego-Pérez, 2000; Velázquez et al., 2003; Carreto y Almazán, 2005); *F. citrifolia* Mill., *F. costaricana* (Liebm.) Miq., *F. glabrata* Kunth, *F. glaucescens* (Liebm.) Miq., *F. hemsleyana* Standl., *F. inamoena* Standl., *F. insipida* Willd., *F. lentiginosa* Vahl, *F. maxima* Mill., *F. mexicana* (Miq.) Miq., *F. obtusifolia* Kunth, *F. pertusa* L.f., *F. radula* Willd., *F. tuerckheimii* Standl. y *F. velutina* Humb. et Bonpl. ex Willd.

Las inconsistencias en la riqueza e identidad de las especies de *Ficus* en Guerrero obedecen, entre otras causas, a que la taxonomía de las especies neotropicales, especialmente las del subgénero *Urostigma*, es compleja

(Berg y Simonins, 1981; Berg, 1989, 2007). Por ello, varios autores han reconocido algunas especies como complejos taxonómicos que despliegan un amplio margen de variabilidad (Berg y Simonins, 1981; Berg, 1989, 2007; Ibarra-Manríquez y Wendt, 1992; Piedra-Malagón et al., 2006), mientras que otros las separan en especies o categorías subespecíficas distintas (Burger, 1974; Carvajal, 1995, 2007; Carvajal y Peña-Pinela, 1997; Carvajal et al., 2001). Es por lo anterior que el propósito modular de esta contribución consiste en actualizar el conocimiento florístico del género *Ficus* en Guerrero, aportando una clave y descripciones que faciliten su determinación.

Materiales y métodos

Área de estudio. El estado de Guerrero se sitúa hacia el SE de la República Mexicana, entre los 16°18' y 18°48' N y los 98°03' y 102°12' O. Esta entidad colinda con Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y el océano Pacífico, con una extensión territorial de 63 794 km² y está subdividido en 75 municipios agrupados en cuatro grandes regiones fisiográficas (Figueroa de Cotín, 1980): Sierra de Taxco, Depresión del Balsas, Sierra Madre del Sur y Costa.

Geológicamente, Guerrero se encuentra dentro de 2 provincias morfotectónicas (Ferrusquía-Villafranca, 1998): i) Faja Volcánica Transmexicana, y ii) Sierra Madre del Sur. De acuerdo con este autor, la primera de estas provincias ocupa la parte occidental del estado y las formas dominantes del terreno fueron producidas por actividad volcánica del Cenozoico medio al tardío, con cuerpos sedimentarios clásticos del Cenozoico tardío. La provincia de la Sierra Madre del Sur presenta cuerpos de roca de edad precámbrica, paleozoica, mesozoica y cenozoica; los datos geológicos son escasos si se considera que es la de mayor complejidad en México, el territorio de Guerrero incluye 4 de las 13 subdivisiones que la componen.

En la entidad se presentan 10 unidades edafológicas y 3 tipos de suelo cubren cerca del 65% de su territorio (Meza y López, 1997): a) los regosoles, en la región norte (Tierra Caliente, cuenca del Balsas y sierra del Norte), en la sierra Madre del Sur y en algunas regiones de la Costa, b) los cambisoles, que se distribuyen principalmente en el noroeste y parte sureña de Guerrero, así como en la región de la montaña, Costa Grande, Tierra Caliente y Centro y, c) los litosoles, que se encuentran básicamente al centro-norte y centro-sureste, por ejemplo, en la sierra Madre del Sur, costa Chica y cañón del Zopilote. Otros tipos de suelo son andosoles, acrisoles, feozems, fluvisoles, luvisoles, rendzinas y vertisoles.

Meza y López (1997) presentan un mapa y describen

5 unidades mesoclimáticas en la entidad (muy cálida, cálida, semicálida, templada y semifría). Las 2 primeras están situadas desde el nivel del mar hasta 1 300 m de altitud y cada una tiene 3 variantes de humedad (húmeda, subhúmeda y semiseca), mientras que la unidad semicálida y la templada se ubican entre 1 300 y 2 800 m; la primera tiene 3 variantes de humedad (muy húmeda, húmeda y subhúmeda); la segunda tiene 2, una muy húmeda y otra subhúmeda. Finalmente, la unidad mesoclimática semifría se considera muy húmeda y se ubica por arriba de 2 800 m snm.

De acuerdo con la clasificación de Rzedowski (1978), las comunidades vegetales que se encontraron en el estado son: bosque de coníferas (bosque de *Abies*, bosque de *Juniperus* y bosque de *Pinus*), bosque de *Quercus*, bosque espinoso, bosque mesófilo de montaña, bosque tropical caducifolio, bosque tropical perennifolio, bosque tropical subcaducifolio, manglar, matorral xerófilo, palmar, pastizal y varios tipos de vegetación acuática y subacuática (e.g. bosque de galería). Meza y López (1997) presentan un mapa con la distribución de 10 coberturas vegetales que reconocen en Guerrero. Finalmente, Palacio-Prieto et al. (2000) identifican 11 tipos de vegetación y anotan la extensión y el porcentaje que ésta representa para el estado: bosque de encino (6 411 km²; 10.1%), bosque mesófilo de montaña (1 570 km²; 2.5%), bosque de pino-encino (12 275 km²; 19.3%), bosque de pino (1 271 km²; 2%), dunas (121 km²; 0.2%), manglar (95 km²; 0.1%), sabana (266 km²; 0.4%), selva baja caducifolia y subcaducifolia (18 222 km²; 28.7%), selva mediana caducifolia y subcaducifolia (1 509 km²; 2.4%), palmar (273 km²; 0.4%) y popal-tular (74 km²; 0.1%).

Método. Se llevó a cabo una revisión bibliográfica de listados florísticos, publicaciones taxonómicas y floras regionales para recopilar una lista de las especies nativas de *Ficus* en Guerrero, y se consultaron los ejemplares depositados en los herbarios CH, ENCB, F, FCME, HUAP, HUMO, IEB, INIF, MEXU, MO, UAMIZ y XAL. Con esta información y las observaciones en el campo, se elaboró una clave de identificación, se hicieron descripciones, mapas de distribución de las especies, así como ilustraciones para algunas de éstas. Debido a que el único ejemplar que se ha colectado de *F. yoponensis* Desv. en la zona de estudio carece de estructuras reproductivas, su descripción se complementó con base en material proveniente de entidades vecinas. En el trabajo también se incluye *F. aurea* Nutt., que hasta el momento no ha sido registrada para Guerrero, pero que sin duda debe encontrarse en sus bosques mesófilos; la descripción de esta especie también se basa en colectas efectuadas en estados colindantes.

Los tipos de vegetación donde se distribuyen las

especies fueron adaptados a la clasificación de Rzedowski (1978). Los nombres comunes y sinónimos que se citan para las especies son únicamente los que se han registrado para Guerrero. Para los sinónimos se tomaron en consideración los criterios de Ibarra-Manríquez y Wendt (1992), Berg y Villavicencio (2004) y Berg (2007). Las abreviaturas de los autores se basan en Villaseñor (2001).

Resultados

De las 22 especies nativas de *Ficus* que se citaban previamente para Guerrero, en el presente trabajo sólo se reconocen 13; de éstas, 4 pertenecen al subgénero *Pharmacosycea* (*F. insipida*, *F. lapathifolia*, *F. maxima* y *F. yoponensis*) y el resto al subgénero *Urostigma* (*F. citrifolia*, *F. cotinifolia*, *F. crocata* (Miq.) Miq., *F. membranacea* C. Wright, *F. obtusifolia*, *F. pertusa*, *F. petiolaris*, *F. pringlei* S. Watson y *F. velutina*). Se citan por primera vez como parte del contingente florístico guerreroense las siguientes especies: *F. crocata*, *F. lapathifolia*, *F. membranacea*, *F. pringlei* y *F. yoponensis*.

El intervalo altitudinal de distribución del género abarca desde el nivel del mar hasta los 2 100 m, de manera que la mayoría de sus especies se encuentran en los tipos de vegetación localizados a bajas altitudes (por ejemplo, bosque tropical caducifolio, bosque tropical subcaducifolio o bosque de galería) y son menos frecuentes en bosque de *Quercus* y bosque mesófilo de montaña. *Ficus lapathifolia* restringe su distribución a este último tipo de cobertura vegetal, en tanto que *F. pringlei* hace lo propio en el bosque tropical caducifolio. De las especies registradas en el área de estudio, 3 son endémicas de México (*F. lapathifolia*, *F. petiolaris* y *F. pringlei*), en tanto que el resto muestran una distribución más amplia, ya que alcanzan localidades ubicadas en distintos países de Centro y/o Sudamérica. Las especies del género más frecuentemente colectadas son: *F. cotinifolia* (140 ejemplares), *F. insipida* (73) y *F. crocata* (57). En 50 de los 75 municipios de Guerrero, se han colectado especies de *Ficus*, sobresaliendo Chilpancingo de los Bravo (90 registros y 11 especies) y Acapulco de Juárez (57 y 8, respectivamente). Cabe destacar que Atoyac de Álvarez, con sólo 21 registros, presenta 9 especies.

Descripciones

1. *Ficus aurea* Nutt. N. Amer. Sylv. 2(4): pl. 43. 1846. *F. tuerckheimii* Standl. Contr. U.S. Natl. Herb. 20(1): 13. 1917.

Árboles hemiepífitos o estranguladores, caducifolios o perennifolios, de (6) 20-45 m de alto, el tronco con una

Clave de identificación

- 1a.** Árboles de crecimiento independiente, enraizados en el suelo; siconos solitarios por nudo, amarillos, verde amarillos o verdes (subgénero *Pharmacosycea*).....2
- 1b.** Árboles estranguladores, rupícolas o enraizados en el suelo; siconos pareados por nudo, de color amarillo, naranja, negro rojo o verde (subgénero *Urostigma*).....5
- 2a.** Pecíolos con la epidermis lisa, glabra; siconos glabros.....3
- 2b.** Pecíolos con la epidermis que se desprende en pequeñas escamas, escaso pubescente; siconos pubescientes.....4
- 3a.** Hojas obovadas o elípticas, con venas secundarias tenues; siconos con flores blancas; árboles no restringidos a comunidades riparias.....*F. yoponensis*
- 3b.** Hojas elíptico lanceoladas, con venas secundarias conspicuas; siconos con flores rojizas; árboles generalmente riparios.....*F. insipida*
- 4a.** Pecíolo cuya epidermis se exfolia por medio de escamas, lámina escabrosa, de hasta 7.8 cm de ancho; siconos con flores rojizas.....*F. maxima*
- 4b.** Pecíolo no exfoliante, lámina no escabrosa, de hasta 15 cm de ancho; siconos con flores blancas.....*F. lapathifolia*
- 5a.** Árboles con la corteza amarilla; hojas cordiformes, con domacios de color blanco por el envés.....*F. petiolaris*
- 5b.** Árboles con la corteza no amarilla; hojas con formas variadas, pero nunca cordiformes y sin domacios.....6
- 6a.** Brácteas basales evidentes, cubriendo hasta tres cuartas partes del scono.....7
- 6b.** Brácteas basales no evidentes o sin sobrepasar una cuarta parte del scono.....8
- 7a.** Hojas elípticas u ovadas, con la base redondeada a ligeramente truncada; árboles del bosque mesófilo de montaña.....*F. aurea*
- 7b.** Hojas obovadas o elípticas, con la base cuneada o atenuada; árboles que se distribuyen en diversos tipos de vegetación.....*F. obtusifolia*
- 8a.** Plantas con siconos sésiles.....9
- 8b.** Plantas con siconos pedunculados.....10
- 9a.** Pecíolos casi tan largos como la lámina, el primer par de venas secundarias con una inclinación de 60-70°; yema foliar terminal glabra.....*F. membranacea*
- 9b.** Pecíolos con menor longitud que la de la lámina, el primer par de venas secundarias con una inclinación de 35-50°; yema foliar terminal pubescente.....*F. cotinifolia*
- 10a.** Lámina con ápice acuminado, pecíolos de 2.5-12 cm de largo y con exudado translúcido; siconos obpiriformes.....*F. citrifolia*
- 10b.** Lámina sin acumen en el ápice, pecíolos menores de 5 cm de largo y con exudado blanco; siconos esféricos, raramente piriformes.....11
- 11a.** Lámina foliar 0.8-1.2 veces más larga que ancha, pecíolos de 0.5-2 cm de largo; ostíolo del scono prominente, cónico; árboles del bosque tropical caducifolio.....*F. pringlei*
- 11b.** Lámina foliar 1.5-3.4 veces más larga que ancha, pecíolos de 1.5-4.3 cm de largo; ostíolo del siconos hundido, aplanoado o ligeramente prominente; árboles no restringidos al bosque tropical caducifolio.....12
- 12a.** Hojas con envés cubierto con tricomas rojizos o pardo amarillos, raramente glabro; siconos sin máculas evidentes, velutinos, raramente glabrescentes.....*F. velutina*
- 12b.** Hojas con envés glabro, a veces escaso pubescente, pero nunca con tricomas rojizos o pardo amarillos; siconos con máculas evidentes, glabros o pilósulos.....13
- 13a.** Lámina foliar de 1-1.6 cm de ancho; siconos glabros, de 0.8-1.3 cm de diámetro, con flores blancas, con el ostíolo hundido en una depresión anular.....*F. pertusa*
- 13b.** Lámina foliar de (2.6) 3.9-7.2 cm de ancho; siconos pilósulos, de 1.2-2.7 cm de diámetro, con el ostíolo aplanoado a ligeramente prominente.....*F. crocata*

forma irregular, frecuentemente con oquedades, corteza parda o pardo grisácea, con exudado blanco, copa amplia y redondeada, verde oscura. Yema foliar terminal de 3-13 mm de largo, 3-4 mm de ancho, parda o negra, glabra; entrenudos de 5-12 mm de largo, 4-6 mm de ancho, verdes, pardos o amarillo grisáceos, glabros. Pecíolo de 25-60 mm de largo, 2-3 mm de ancho, amarillo, pardo o pardo verde, ligeramente acanalado por el haz, glabro; lámina foliar de 6.5-11 cm de largo, 3.5-6.5 cm de ancho, 1.3-2.1 veces más larga que ancha, elíptica u ovada, verde grisácea a parda, membranácea o cartácea, base redondeada o ligeramente

truncada; ápice obtuso o ligeramente apiculado; haz verde pardo, verde amarillo o pardo, glabro; envés verde, verde opaco o ligeramente pardo, glabro, venas secundarias amarillas, 9 a 12 pares, con la vena central y las secundarias prominentes a ligeramente marcadas. Siconos de 8-12 mm de largo, 8-12 mm de diámetro, esféricos, de color naranja, negro rojo o verde en fresco, pardo a verde amarillo en material seco, con pequeñas máculas pardas, redondeadas, glabros; ostíolo de 1-1.5 mm de diámetro; brácteas basales pareadas, de 4-8 mm de largo, 3-7 mm de ancho, pardas o pardo verdosas, ápice redondeado a ligeramente agudo,

glabras; pedúnculo ausente o de hasta 10 mm de largo, verde o pardo, glabro.

Resumen taxonómico

Material examinado. OAXACA. Mpio. San Miguel Chimalapa: cerro Sabinal, 2 km al SO de cerro Guayabitos, 3 km en línea recta al NNO de Díaz Ordaz ($16^{\circ}44'00''N$, $94^{\circ}11'30''O$), T.L. Wendt et al. 4665 (MEXU, MO); San Miguel Suchixtepec: San Miguel Suchixtepec ($16^{\circ}12'00''N$, $95^{\circ}56'00''O$), P. Tenorio et al. 18387 (MO); Valle Nacional: cerro Mirador, 15 km al NNO de Valle Nacional ($17^{\circ}46'33''N$, $96^{\circ}18'12''O$), G. Ibarra et al. 3823 (MEXU, MO).

Comentarios taxonómicos

En otros estados de la República Mexicana se le localiza en bosques tropicales húmedos y mesófilos de montaña (Serrato et al., 2004), desde el nivel del mar hasta los 2 450 m de altitud. Debido a la importante área que ocupa el bosque mesófilo de montaña en Guerrero, es altamente probable que esta especie se encuentre en su territorio, además de que prácticamente se ha colectado en todos sus estados vecinos (Méjico, Michoacán, Puebla y Oaxaca; G. Ibarra-Manríquez, datos no publicados). La especie presenta hojas y frutos muy variables, lo que aunado a su amplia distribución (desde Estados Unidos de América a Sudamérica y Las Antillas) hace difícil establecer límites claros entre especies afines, las cuales conforman el complejo taxonómico *F. aurea* (Berg, 1989, 2007). Una ilustración de esta especie bajo el nombre de *F. tecolutensis* se encuentra en Pennington y Sarukhán (2005).

2. *Ficus citrifolia* Mill. Gard. Dict (ed.8)1768. *F. lentiginosa* Vahl. Enum. Pl. 2: 183. 1806. (Fig. 1A, 2).

Nombres comunes. Amate, amate prieto, amaiskitle, amezquite, capulincillo, palo liro.

Árboles hemiepífitos, estranguladores o rupícolas, caducifolios o perennifolios, de 4-15 m de alto, tallos monopódicos, fuste recto a sinuso, corteza parda o pardo grisácea, copa amplia y redondeada, verde oscuro. Yema foliar terminal de 10-24 mm de largo, 3-6 mm de ancho, parda en material seco, glabra; entrenudos de 17-35 mm de largo, 4-8 mm de ancho, amarillo grisáceo, estriados, glabros, con exudado translúcido. Pecíolo de 25-75 (120) mm de largo, 1.5-3 mm de ancho, amarillo, pardo o verde, estriado, frecuentemente acanalado por el haz, glabro; lámina foliar de (7.2) 12.5-16 (21.5) cm de largo, (4.5) 6.7-10.5 (13) cm de ancho, 1.6-1.7 veces más larga que ancha, elíptica a ovada, verde grisácea a parda, membranácea o

cartácea, base redondeada a ligeramente truncada; ápice con un acúmen de 6-10 mm de largo; haz verde pardo a verde amarillo o pardo, glabro, envés verde, verde opaco o ligeramente pardo, glabro, venas secundarias amarillas, 6 a 13 pares, opuestos en el primer par y los demás alternos, con la vena central y las secundarias más o menos prominentes. Siconos de 6-12 (16) mm de largo, 5-10 (14) mm de diámetro, obpiriformes, verdes a rojizos en fresco, pardos a verde amarillos cuando secan, con pequeñas máculas pardas, redondeadas, glabros; ostíolo de 1.5-4 mm de diámetro; brácteas basales pareadas, de 1-2 mm de largo, 1.5-3 mm de ancho, pardas, ápice redondeado a ligeramente agudo, glabras; pedúnculo de 3-7 (10) mm de largo, verde o pardo, glabro.

Resumen taxonómico

Material examinado. Mpio. Acapulco de Juárez: Acapulco and vicinity ($16^{\circ}51'47''N$, $98^{\circ}53'47''O$), E.A. Palmer 355 (F, MO); cerca de Puerto Marqués ($16^{\circ}53'53''N$, $99^{\circ}52'23''O$), F. Miranda 8420 (MEXU), Idem, L. Paray 2310 (MEXU); Cumbres de Llano Largo ($16^{\circ}53'53''N$, $99^{\circ}52'13''O$), J. Sánchez s. n. (ENCB). Mpio. Atoyac de Álvarez: 2 km adelante de Santiago de la Unión ($17^{\circ}12'39''N$, $100^{\circ}26'19''O$), R.M. Fonseca 722 (FCME, IEB, MEXU); 2 km al SO del ejido El Molote ($17^{\circ}25'39.08''N$, $100^{\circ}14'07.85''O$), S. Ollinger 5 (FCME, IEB, MEXU); 500 m de San Andrés a El Paraíso ($17^{\circ}15'25''N$, $100^{\circ}20'56''O$), G. Ibarra et al. 5941 (IEB). Mpio. Chilpancingo de los Bravo: 2 km al N de Agua de Obispo ($17^{\circ}18'50''N$, $99^{\circ}28'00''O$), R.M. Fonseca 1724 (FCME, IEB, MEXU); 3 km al N de El Ocotito sobre la carretera federal a Acapulco ($17^{\circ}17'38''N$, $99^{\circ}28'17''O$), C.A. Durán 129 (FCME, MEXU); Rincón Viejo ($17^{\circ}17'40''N$, $99^{\circ}30'00''O$), H. Kruse 1279 (FCME, MEXU), s. n. (MEXU); río Azinyehualco, al N de Zoyaltepec ($17^{\circ}20'45''N$, $99^{\circ}33'38''O$), L.C. Rodríguez 383 (IEB, MEXU); Rincón de la Vía, Barranca del Potrero ($17^{\circ}16'30''N$, $99^{\circ}28'55''O$), H. Kruse 1283 (FCME, MEXU). Mpio. Coahuayutla de José María Izazaga: La Vainilla, 2.8 km al N ($18^{\circ}11'29''N$, $101^{\circ}29'46''O$), J. Calónico 15161 (FCME, MEXU); San Cristobal, 2.8 km al NE ($18^{\circ}08'51''N$, $101^{\circ}31'04''O$), J. Calónico 13677 (FCME). Mpio. José Azueta: 1 km antes de la desviación a Ciudad Altamirano, por la carretera Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas ($17^{\circ}43'21''N$, $101^{\circ}55'57''O$), M. Gual 557 (FCME, MEXU); alrededores de El Zapote al N del poblado ($17^{\circ}58'46''N$, $101^{\circ}22'11''O$), R.M. Fonseca 1213 (FCME, MEXU); aproximadamente 230 m al NE del caserío La Vainilla, camino al Calabazalito ($17^{\circ}42'00''N$, $101^{\circ}31'30''O$), C. Gallardo 432 (FCME, MEXU); cerro situado al O del mirador del Parque Ecológico La

Vainilla ($17^{\circ}42'00''N$, $101^{\circ}31'30''O$), *C. Gallardo* 680 (FCME, MEXU). **Mpio. Mpio. Ometepec:** Ometepec ($16^{\circ}41'08''N$, $98^{\circ}24'19''O$), *L. García s. n.* (FCME). **Mpio. Quechultenango:** proximidades a Quechultenango ($17^{\circ}24'50''N$, $99^{\circ}14'27''O$), *C. Tejeda s. n.* (MEXU).

Comentarios taxonómicos

Árboles presentes en el bosque de galería, bosque de *Pinus*, bosque de *Quercus* y bosque tropical caducifolio, entre 15 y 1,750 m snm. Florece y fructifica durante todo el año, mayormente de enero a octubre. Esta especie se distribuye en México desde Nayarit hasta Chiapas, así como en la península de Yucatán; fuera del país se le encuentra desde Florida (Estados Unidos de América) hasta el sur de Paraguay y Las Antillas. Especie que despliega una alta variación en su morfología, por lo que Berg (1989, 2007) la incluye como parte de un complejo taxonómico denominado *F. citrifolia*, el cual incluye, entre otras especies, a *F. amazonica* (Miq.) Miq., *F. britonii* Bold., *F. dugandii* Standl., *F. guaranitica* Chodat y *F. subandina* Dugand.

3. *Ficus cotinifolia* Kunth. Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 2: 49.1817. (Fig. 1B, 3).

Nombres comunes. Amaiskitle, amaiskitl, amezquite, amezquite blanco, camichín, camuchín, camuchina, saiba blanca, zalte.

Árboles hemiepífitos, estranguladores o rupícolas, caducifolios, de 4-20 m de alto, con tallos monopódicos, con oquedades entre las raíces aéreas, a veces con contrafuertes, corteza lisa, pardo gris, parda oscura, con exudado blanco a ligeramente amarillo, abundante, copa amplia y redondeada, verde pálida. Yema foliar terminal de 5-17 mm de largo, 2.3-5.5 (7) mm de ancho, verde o verde amarilla en fresco, parda a negruzca en material seco, densamente pubescente, con tricomas blancos o amarillos, en ocasiones glabrescente; entrenudos de (4) 11-36 (42) mm de largo, (2) 3.5-7 mm de ancho, pardos o verde pardo, estriados, glabros o escasamente pubescentes. Pecíolo de (9) 16-35 (45) mm de largo, 0.9-2.1 mm de ancho, pardo, verde amarillo o grisáceo, con un canal somero por el haz, corrugado y escasamente pubescente, en ocasiones con una glándula negra al comienzo de la vena media, por el lado del envés; lámina foliar de 2.7-9 (12.5) cm de largo, (2.8) 4.7-7 cm de ancho, 1.3-1.5 veces más larga que ancha, lámina elíptica, obovada u ovada, parda o negruzca, coriácea, cartácea o raramente membranácea; base redondeada, truncada o cuneada; ápice redondeado u obtuso, raramente obtuso; haz verde pardo, ligeramente viloso o glabro; envés verde o verde opaco, glabro o ligera a densamente viloso siendo más abundantes los tricomas

en la vena central y en las venas secundarias, éstas últimas amarillas, 5 a 9 pares, el primero opuesto y los demás alternos. Siconos sésiles, de 4-6.5 mm de largo, 7-10.5 mm de diámetro, esféricos, verdes, verde amarillos, rojizos en fresco, verde amarillos o pardos en material seco, con máculas oscuras abundantes y de distintos tamaños, glabros a ligeramente pubescentes; ostíolo de 1-2 mm de diámetro; brácteas basales de 4-8 mm de largo, 2-6 mm de ancho, pardas o claras, con el ápice redondeado, no visibles o alcanzando hasta un tercio de la longitud del sícono, 2 a 4 partidas, densamente pubescentes por ambas caras.

Resumen taxonómico

Material examinado. **Mpio. Acapulco de Juárez:** 2 km al O de Puerto Marqués ($16^{\circ}53'53''N$, $99^{\circ}52'13''O$), *W. López* 1119 (ENCB, MEXU, XAL), 1232 (ENCB, MEXU, XAL); 2.5 km al O de Puerto Marqués ($16^{\circ}53'53''N$, $99^{\circ}52'23''O$), *W. López* 557, 712 (MEXU), 1127 (ENCB, MEXU, XAL), 1158 (ENCB, MEXU, MO), 1190 (MEXU, XAL); Isla de la Roqueta ($16^{\circ}53'53''N$, $99^{\circ}52'13''O$), *D. Ramírez* 12 (MEXU), *s. n.* (MEXU); Parque Nacional El Veladero INFONAVIT, parte posterior de la Col. Francisco Villa ($16^{\circ}55'54''N$, $99^{\circ}53'12''O$), *N. Noriega* 117 (ENCB, FCME, IEB, MEXU), 232 (IEB, MEXU); Puerto Marqués ($16^{\circ}41'25''N$, $99^{\circ}37'35''O$), *F. Chiang* 752 (ENCB, MEXU, MO); terminal de la Escénica Acapulco ($16^{\circ}51'47''N$, $98^{\circ}53'47''O$), *L. Boege* 1430 (MEXU); Viveros El Huayacán, La Poza ($16^{\circ}53'53''N$, $99^{\circ}52'13''O$), *W. López* 758 (MEXU). **Mpio. Ahuacuotzingo:** Ajuatetla ($17^{\circ}37'06''N$, $99^{\circ}07'33''O$), *J. Casarrubias* 122 (FCME, MEXU, XAL); *Idem*, *M.J. Sánchez* 47 (MEXU, XAL); *Idem*, *N. Diego* 7190 (FCME, MEXU). **Mpio. Alcozauca de Guerrero:** Alcozauca, Barranca del Agua Buena ($17^{\circ}27'48''N$, $98^{\circ}23'01''O$), *J.L. Viveros* 390 (MEXU, MO). **Mpio. Alpoyeca:** 1 km al NO de Tecoyo ($17^{\circ}36'10''N$, $98^{\circ}29'29''O$), *J. Calónico* 1576 (FCME); 1.5 km al E de Tecoyo, cañada Tecuane ($17^{\circ}35'20''N$, $99^{\circ}28'28''O$), *J. Calónico* 1654 (FCME, HUAP, MEXU); 1.5 km al S de Tecoyo ($17^{\circ}34'40''N$, $98^{\circ}29'29''O$), *J. Calónico* 2121 (FCME, HUAP); **Mpio. Apaxtla:** 2.2 km al SE de Tlatzala ($18^{\circ}03'56''N$, $99^{\circ}52'59''O$), *E. Chávez* 104 (FCME); 2.5 km al SE de Tlatzala ($18^{\circ}03'56''N$, $99^{\circ}52'59''O$), *E. Velasco* *s. n.* (FCME). **Mpio. Arcelia:** Los Limones, en la cañada el Naranjo, Campo Morado ($18^{\circ}12'27''N$, $100^{\circ}07'45''O$), *R. Cruz* 6516 (FCME). **Mpio. Atenango del Río:** 2 km al SO de Coahuixtla ($18^{\circ}21'22''N$, $99^{\circ}07'35''O$), *R.C. Bustamante* 342 (HUMO); 2.36 km al NO de Tuzantlan ($18^{\circ}12'52''N$, $99^{\circ}11'58''O$), *R. Cruz* 6996 (FCME, MEXU). **Mpio. Atlixtac:** 0.4 km al NO de Santa Isabel ($17^{\circ}35'26''N$, $99^{\circ}00'27''O$), *F. Guerrero* 108 (FCME); 11 km al NO de

Chiepetepec ($17^{\circ}29'00''N$, $98^{\circ}48'00''O$), *C.A. Durán* 68 (ENCB, FCME, IEB, MEXU). **Mpio. Benito Juárez:** cerro San Nicolás, Laguna de Mitla ($17^{\circ}12'31''N$, $100^{\circ}26'03''O$), *L. Lozada* 569 (ENCB, FCME, MEXU). **Mpio. Buenavista de Cuéllar:** 3 km al O de la posa del Burro ($18^{\circ}27'30''N$, $99^{\circ}24'26''O$), *F. Terán* 488 (FCME, MEXU); 6 km al N de Buenavista de Cuellar, carretera federal Cuernavaca-Iguala ($18^{\circ}37'52''N$, $99^{\circ}24'09''O$), *C. A. Durán* 93 (FCME, IEB, MEXU); Cieneguillas, 11 km al SO de Buenavista ($18^{\circ}24'36''N$, $99^{\circ}28'36''O$), *J.C. Soto* 8737 (IEB, MEXU); puente La Cañada, a orillas del río en el Cañón del Zopilote, 3 km al S de la desviación a Buenavista de Cuellar ($18^{\circ}37'32''N$, $99^{\circ}24'06''O$), *C.A. Durán* 97, 99 (FCME, MEXU). **Mpio. Chilpancingo de los Bravo:** 3 km al O de Chilpancingo ($17^{\circ}33'14''N$, $99^{\circ}29'59''O$), *M. Blanco* 104 (ENCB), 126 (ENCB, MEXU); 3 km al S de Acahuizotla ($17^{\circ}21'35''N$, $99^{\circ}27'43''O$), *F. Chiang* 719 (ENCB, MEXU, MO); 3 km NO de Chaucingo ($17^{\circ}34'25''N$, $99^{\circ}31'04''O$), *M. Luna* 66 (FCME); 7 km al E de Acahuizotla ($17^{\circ}22'59''N$, $99^{\circ}27'04''O$), *A. Núñez* 63 (FCME); 16 km al NO de Chilpancingo sobre la carretera que va a Chichihualco ($17^{\circ}35'32''N$, $99^{\circ}31'11''O$), *C.A. Durán* 126 (ENCB, IEB, MEXU); al O de Chilpancingo ($17^{\circ}33'14''N$, $99^{\circ}39'59''O$), *J. Chavelas* 6 (INIF, MEXU); camino a Chichihualco, a 4 mi de la conjunción con la carretera 95 cerca de Chilpancingo ($17^{\circ}33'14''N$, $99^{\circ}39'59''O$), *W.L. Graham* 1224 (MEXU); camino a la estación de microondas El Alquitrán ($17^{\circ}26'40''N$, $99^{\circ}29'01''O$), *L. Lozada* 2346 (FCME, IEB, MEXU); Joya de El Zapote, 6 km al O de la desviación a Chilchihualco, la desviación está a 1.5 km al N de Chilpancingo ($17^{\circ}33'14''N$, $99^{\circ}29'59''O$), *R. Torres* 1183 (MEXU); km 7 de la carretera Chilpancingo-Chihihualco ($17^{\circ}36'0''N$, $99^{\circ}32'50''O$), *H. Kruse* 1999 (FCME, MEXU, MO); Rincón de la Vía ($17^{\circ}17'15''N$, $99^{\circ}28'55''O$), *H. Kruse* 454 (ENCB, FCME, MEXU), 1284 (FCME, IEB, MEXU, MO), 1287b (IEB), 2037 (FCME, IEB, MEXU, MO), s. n. (IEB, MEXU); Mazatlán, sobre la carretera federal a Acapulco ($17^{\circ}26'06''N$, $99^{\circ}28'22''O$), *C.A. Durán* 124 (ENCB, FCME); Salto Valadéz ($17^{\circ}27'20''N$, $99^{\circ}28'10''O$), *H. Kruse* 1979 (FCME, MEXU), 2021 (FCME, IEB, MEXU, MO), 2719 (FCME, MEXU, MO); Tierras Prietas ($17^{\circ}36'03''N$, $99^{\circ}31'59''O$), *J. Maldonado* 1002 (FCME, MEXU). **Mpio. Coahuayutla de José María Izazaga:** Amatepec, 3.7 km al SE ($18^{\circ}14'31''N$, $101^{\circ}37'13''O$), *J. Calónico* 14372 (FCME, HUMO). **Mpio. Coyuca de Benítez:** 4 km al SE de Coyuca ($16^{\circ}54'15''N$, $99^{\circ}58'00''O$), *A. Aquino* 97 (FCME); El Camalote, Laguna de Mitla ($17^{\circ}03'16''N$, $100^{\circ}17'47''O$), *L. Lozada* 778 (FCME); isla La Pelona ($16^{\circ}57'00''N$, $100^{\circ}01'03''O$), *R.M. Fonseca* 296 (FCME); *Idem*, *J.G. Coello* 66 (FCME, IEB). **Mpio. Coyuca de**

Catalán: 2 km al O de Coyuca de Catalán ($18^{\circ}18'54''N$, $100^{\circ}42'16''O$), *L. Lozada* 1548 (FCME); río del Oro, a 8 km al SO de Coyuca de Catalán, sobre el camina a Ciudad Altamirano-Zihutanejo ($18^{\circ}19'30''N$, $100^{\circ}41'59''O$), *E.M. Martínez* 660 (MEXU). **Mpio. Cuautepéc:** 4 km antes de Cuautepéc ($16^{\circ}44'58''N$, $99^{\circ}00'15''O$), *N. Diego* 1983 (FCME, MEXU). **Mpio. Eduardo Neri:** 10 km al SE de Xochipala ($17^{\circ}48'39''N$, $99^{\circ}38'45''O$), *L. Soto* 215 (FCME); 14 km de Mezcalá, carretera México-Acapulco ($17^{\circ}50'08''N$, $99^{\circ}33'56''O$), *A.R. López* 33 (FCME); Amatitlán ($17^{\circ}51'55''N$, $99^{\circ}45'38''O$), *R. Cruz* 752 (FCME, MEXU); Ameyaltepec ($17^{\circ}57'57''N$, $99^{\circ}30'28''O$), *A. Villa* 802 (MEXU); barranca El Salado ($17^{\circ}49'09''N$, $99^{\circ}37'53''O$), *S. Peralta* 147 (FCME); cerro Huiziltepec, orilla de La Laguna ($17^{\circ}45'55''N$, $99^{\circ}28'29''O$), *B. Ludlow* 175 (FCME, IEB, MEXU); Mezcalá, 6.5 km al O ($17^{\circ}53'02''N$, $99^{\circ}37'22''O$), *M. Luna* 123 (FCME); puente Agustín Lorenzo, km 61 carretera Iguala-Chilpancingo, 100 m antes del puente ($17^{\circ}50'13''N$, $99^{\circ}4'8''O$), *N. González* 32 (IEB, MEXU); puerto de Los Tepetates, 2 km al N de Amatitlán ($17^{\circ}52'37''N$, $99^{\circ}45'39''O$), *R. Cruz* 707 (FCME, MEXU); Xochipala, 0.5 km al N ($17^{\circ}49'05''N$, $99^{\circ}38'17''O$), *M. Gual* 382 (FCME); Xochipala, 1 km al N ($17^{\circ}49'05''N$, $99^{\circ}38'17''O$), *M. Gual* 378 (FCME); Xochipala, 5.5 km al NE ($17^{\circ}50'48''N$, $99^{\circ}36'04''O$), *J.L. Contreras* 399 (FCME, MEXU); Zumpango del Río ($17^{\circ}39'15''N$, $99^{\circ}31'40''O$), *H. Kruse* 2451 (MEXU). **Mpio. General Heliodoro Castillo:** 0.9 km al O de Las Anonas ($17^{\circ}52'15''N$, $99^{\circ}53'15''O$), *J. Calónico* 13341 (FCME); 3.6 km al N de Chapultepec ($17^{\circ}50'50''N$, $99^{\circ}57'04''O$), *J. Calónico* 15498 b (FCME, IEB, MEXU); 9.3 km al SO de Tlacotepec ($17^{\circ}44'10''N$, $99^{\circ}30'00''O$), *J. Calónico* 11788 (FCME); Tlacotepec, rumbo a Puerto Amate ($17^{\circ}43'59''N$, $100^{\circ}02'14''O$), *J. Castrejón* 1231 (ENCB, FCME, IEB). **Mpio. Huamuxtitlán:** 6 km SO de Huamuxtitlán hacia Tlaquiltepec ($17^{\circ}48'08''N$, $98^{\circ}33'35''O$), *V. Aguilar* 71 (FCME). **Mpio. Huixtenco de los Figueroa:** 2 km del Reparo ($18^{\circ}23'41''N$, $99^{\circ}12'14''O$), *R.C. Bustamante* 504 (HUMO); 3.5 km al N de San Francisco Ozomatlán ($17^{\circ}55'34.62''N$, $99^{\circ}20'20.48''O$), *A. Vargas* 452 (FCME, MEXU). **Mpio. Iguala de la Independencia:** 1.5 km al O de La Joya ($18^{\circ}15'52''N$, $99^{\circ}31'57''O$), *F. Terán* 514 (FCME); 3 km al NE del poblado Platanillo ($18^{\circ}25'08''N$, $99^{\circ}29'24''O$), *S. Vázquez* 218 (ENCB, FCME, IEB); 10 km al N de Iguala. La Cumbre, desviación al horno de microondas ($18^{\circ}20'40''N$, $99^{\circ}32'20''O$), *J.M. Díaz* 240 (ENCB); 8 km al NO de Iguala, cerca de Mexicaltepec ($18^{\circ}20'42''N$, $99^{\circ}32'22''O$), *J.C. Soto* 3962 (MEXU); cañón de la Mano, entre los Amates y El Naranjo, 10 km al N de Iguala, por el Ferrocarril ($18^{\circ}20'40''N$, $99^{\circ}32'20''O$), *C. Catalán* 446 (IEB), 597 (IEB), 756 (MEXU); cerro con

la antena de microondas Tuxpan al N de Iguala ($18^{\circ}22'07''N$, $99^{\circ}30'06''O$), R.M. Fonseca 1747 (FCME); Iguala ($18^{\circ}20'40''N$, $99^{\circ}32'20''O$), J. Freeland 44 (MEXU); puente Campuzano ($18^{\circ}26'53''N$, $99^{\circ}35'08''O$), F. Miranda 3953 (MEXU). **Mpio. Ixcateopan de Cuauhtémoc:** 2.5 km al O de Ixcateopán ($18^{\circ}30'19''N$, $99^{\circ}47'35''O$), A.G. Monzon s. n. (FCME). **Mpio. José Azueta:** 0.5 km antes de Playa Linda ($17^{\circ}40'00''N$, $101^{\circ}39'00''O$), G. Castillo 6682 (CH, MEXU, XAL); carretera a Ciudad Altamirano, desviación a La Vainilla ($17^{\circ}43'36''N$, $101^{\circ}33'38''O$), M. Gual 469 (FCME); cerro Viejo, 2.5 km al N de Zihuatanejo ($17^{\circ}39'17''N$, $101^{\circ}32'48''O$), M. Gual 520 (FCME, IEB); punta Ixtapa ($17^{\circ}40'00''N$, $101^{\circ}39'00''O$), G. Castillo 6674 (XAL); Zihuatanejo ($17^{\circ}39'28''N$, $101^{\circ}35'37''O$), L. Boege 1652 (MEXU). **Mpio. Juan R. Escudero:** Tierra Colorada, carretera a la presa General Figueroa ($17^{\circ}07'40''N$, $99^{\circ}31'30''O$), H. Kruse s. n. (FCME, MEXU). **Mpio. La Unión de Isidoro Montes de Oca:** 2.5 km al SO de Lagunillas, por el camino a La Majahua ($17^{\circ}48'57''N$, $101^{\circ}43'13''O$), F.G. Lorea 4144 (ENCB, FCME, IEB, MEXU); 16 km al EN de Coyuquilla ($18^{\circ}08'32''N$, $102^{\circ}21'37''O$), J.C. Soto 12519 (MEXU); Los Pájaritos, orilla del poblado La Unión ($17^{\circ}58'54''N$, $101^{\circ}48'12''O$), E. Guizar 3059 (IEB, UAMIZ). **Mpio. Leonardo Bravo:** 2 km al SE de Xochipala ($17^{\circ}46'00''N$, $99^{\circ}37'00''O$), S. Peralta 55 (FCME); Atlixtac, 4 km al NO, hacia Chichihualco ($17^{\circ}38'15''N$, $99^{\circ}40'37''O$), F.G. Lorea s. n. (FCME). **Mpio. Ometepec:** 25 km al NO de Cuajinicuilapa, carretera Acapulco-Pinotepa Nacional ($17^{\circ}28'16''N$, $99^{\circ}22'14''O$), E.M. Martínez 122 (ENCB, MEXU, MO). **Mpio. Pilcaya:** 9.8 km NO de Tetipac ($18^{\circ}43'56''N$, $99^{\circ}40'55''O$), R. Cruz 2219 (IEB); Cacahuamilpa ($18^{\circ}40'57''N$, $99^{\circ}30'23''O$), F. Miranda 1484 (MEXU). **Mpio. Quechultenango:** 1 km después de Coatomatlán, dirección Colotlipa ($17^{\circ}23'52''N$, $99^{\circ}09'36''O$), A. Nuñez 90 (FCME, MEXU); 2 km al S de Quechultenango, camino de Herradura-Tlayolapa ($17^{\circ}23'50.76''N$, $99^{\circ}15'10.38''O$), A. Nuñez 1015 ((FCME, MEXU); proximidades a Quechultenango, 27 km al E de Chilpancingo ($17^{\circ}24'54''N$, $99^{\circ}14'30''O$), C. Tejeda s. n. (IEB), s. n. (IEB; MEXU). **Mpio. San Marcos:** 1 km del camino a Pesquería, Laguna de Tecomate ($16^{\circ}43'04''N$, $99^{\circ}24'03''O$), L. Lozada 1386 (ENCB, FCME, IEB, MEXU); Agua Zarca de la Peña ($16^{\circ}58'07''N$, $99^{\circ}36'12''O$), M.A. Gómez 194 (FCME, IEB); cañada al O de Agua Zarca ($16^{\circ}58'07''N$, $99^{\circ}36'12''O$), E. Velázquez 637 (FCME, IEB, MEXU). **Mpio. Tecpan de Galeana:** cerro Japón, 1 km al S de El Carrizal ($17^{\circ}11'26''N$, $100^{\circ}43'43''O$), F.G. Lorea 5158 (FCME, IEB, MEXU); El Pusulmiche, 3 km del entronque de la brecha a Corinto con la carretera Tecpan de Galeana-Zihuatanejo ($17^{\circ}18'46''N$, $100^{\circ}35'53''O$), P. Tenorio 1333

(ENCB, MEXU, MO). **Mpio. TepecoacUILCO de Trujano:** entre Oapan y Ameyaltepec ($17^{\circ}57'35''N$, $99^{\circ}28'29''O$), J. Amith 444 (FCME, IEB, MEXU). **Mpio. Tixtla de Guerrero:** cerro a la orilla de la laguna de Tixtla ($17^{\circ}37'30''N$, $99^{\circ}29'30''O$), B. Ludlow 217 (FCME, MEXU), 295 (FCME, IEB); Tixtla ($17^{\circ}34'28''N$, $99^{\circ}23'50''O$), B. Ludlow 106 (FCME, IEB), 115 (FCME, MEXU); Tixtla, cerro La Virgen de Guadalupe ($17^{\circ}27'00''N$, $100^{\circ}09'00''O$), B. Ludlow 140, 264 (FCME, MEXU), 153 (FCME, IEB, MEXU). **Mpio. Tlapa de Comonfort:** 500 m al N sobre una barranca del río Salado, 4 km al E de Tlapa ($17^{\circ}35'37''N$, $98^{\circ}31'36''O$), A. Garcia 7473 (MEXU); 1 km al N de San Miguel Axoxuca ($17^{\circ}32'00''N$, $98^{\circ}41'00''O$), C.A. Durán 67 (ENCB, FCME, IEB, MEXU); 8 km al SO de Tlapa de Comonfort ($17^{\circ}32'00''N$, $99^{\circ}39'00''O$), C.A. Durán 66 (ENCB, FCME, IEB, MEXU); 12 km de Tlapa hacia Chilapa ($17^{\circ}32'22''N$, $98^{\circ}39'02''O$), G. Campos 586 (FCME). **Mpio. Xalpatláhuac:** 7 km al NO de Atlamajalcingo del Monte ($17^{\circ}31'00''N$, $98^{\circ}36'00''O$), C.A. Durán 61 (ENCB, FCME, IEB, MEXU). **Mpio. Xochihuehuetlán:** cañada Tecopano, lado NE del cerro Xilotán ($17^{\circ}58'21''N$, $99^{\circ}28'18''O$), E. Moreno 1071 (FCME). **Mpio. Zirándaro:** 4 km antes de San Antonio, camino que va de El Timón a La Parota ($18^{\circ}26'6''N$, $101^{\circ}9'30''O$), R.E. González 271 (FCME, IEB, MEXU); camino a Zirándaro-Guayamea en El Capire, 28 km al SO de Zirándaro ($18^{\circ}27'12''N$, $101^{\circ}18'22''O$), J.C. Soto 4346 (ENCB, MEXU); La Piedra, 27 km al NE de Guayameo ($18^{\circ}16'00''N$, $101^{\circ}09'00''O$), J.C. Soto 688 (MEXU, XAL).

Comentarios taxonómicos

Especie ampliamente distribuida en Guerrero en el bosque tropical caducifolio, bosque de galería, bosque de *Quercus* y vegetación secundaria derivada de estos tipos de vegetación, desde el nivel del mar hasta 1 620 m snm. La floración y fructificación se presentan con mayor frecuencia de mayo a diciembre. Esta especie tiene frutos comestibles, se usa como árbol de sombra y aparentemente presenta propiedades desinflamatorias. En México es una especie con amplia distribución en la vertiente del Golfo desde Tamaulipas hasta la península de Yucatán; por el lado del Pacífico se le registra desde Sonora hasta Chiapas, además de Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas; fuera del país se localiza en Belice y Guatemala hasta Costa Rica.

Carvajal y Peña-Pinela (1997) señalan que la variación que exhiben los individuos de esta especie es alta y sugieren la posible existencia de 2 o más entidades, que requieren de un análisis más cuidadoso para su separación. Posteriormente, Carvajal et al. (2001) proponen 2

subespecies con fundamento en la forma de la base de la lámina, la longitud y tipo de pubescencia del pecíolo (subsp. *cotinifolia* y subsp. *myxaefolia* (Kunth) Carvajal). Sin embargo, el material de Guerrero presenta gran variación en estos caracteres aparentemente diagnósticos, lo que no permite separarlas con claridad; una situación similar ha sido encontrada en el estado de Morelos por Piedra-Malagón et al. (2006). Por lo anterior, no se reconocieron estas subespecies en el presente trabajo.

4. *Ficus crocata* (Miq.) Miq. Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavum 3: 297, 1867. *F. hemsleyana* Standl. Contr. U. S. Nat. Herb. 20(1): 29. 1917. (Fig. 1C, 4).

Nombres comunes. Amate, amate prieto, ceiba.

Árboles hemiepítitos o estranguladores, perennifolios, de 10-30 m de alto, tallos monopódicos, con oquedades entre las raíces aéreas y contrafuertes definidos, corteza grisácea, exudado blanco y abundante, blanco rosado al oxidarse, con copa amplia y redondeada, verde oscuro. Yema foliar terminal de 13-19 mm de largo, 4-7.5 mm de ancho, parda en material seco, ligeramente pubescente, con tricomas grisáceos o amarillos; entrenudos de (0.3) 0.8-2.5 (3.5) mm de largo, 4.5-12 mm de ancho, pardos o grisáceos, a veces estriados, glabros. Pecíolo de 19-35 (42) mm de largo, (16) 20-30 mm de ancho, pardo o pardo verde, estriados, ligeramente pubescentes, a veces acanalados por el haz; lámina foliar de (4) 7.2-10.3 (17.2) cm de largo, (2.6) 3.9-7.2 cm de ancho, 1.5-1.8 (2.3) veces más larga que ancha, elíptica, ovada u obovada, parda a grisáceo amarillenta, coriácea; base cuneada, truncada o redondeada, en ocasiones con 1 glándula negra en la inserción del pecíolo por el envés; ápice redondeado o ligeramente acumulado; haz verde pardo, glabro; envés verde pardo, glabro a ligeramente pubescente, venas secundarias amarillas a pardas, en ocasiones ligeramente pardo rojizas, 7 a 11 pares, el primero opuesto y los demás alternos. Siconos de 1.1-1.9 cm de largo, 1.2-2.7 cm de diámetro, esferoides o piriformes, verdes con máculas rojas o amarillas en material fresco, pardos con máculas oscuras en material seco, pilósulos, con las flores blanco rojizas; ostíolo de 3-4.5 mm de diámetro, rodeado por un anillo engrosado y oclusionado por 3 escamas pardas; brácteas basales de 3-7 mm de largo, 3-7 mm de ancho, verdes en fresco, pardo verdes en seco, con el ápice redondeado o agudo, 3 o 4 partidas, caedizas o raramente persistentes, glabras o pilosas por el haz y glabras por el envés; pedúnculo de 7-14.5 mm de largo, verde o pardo, glabro o piloso.

Resumen taxonómico

Material examinado. **Mpio. Acapulco de Juárez:** 2.5

km al O de puerto Marqués (16°53'53"N, 99°52'23"O), *W. López* 548 (MEXU); Acapulco (16°51'47"N, 98°53'47"O), *E.A. Palmer* 373 (F, MEXU); *Idem, W. López* 1095 (MEXU); Barra Vieja, camino a Pinotepa Nacional (16°41'38"N, 99°38'13"O), *L. Boege* 1867 (MEXU); viveros El Huayacán, La Poza (16°46'27"N, 99°36'06"O), *W. López* 810 (MEXU), 1096 (MEXU), 1360 (MEXU); isla Roqueta (16°53'53"N, 99°52'23"O), *J. Mancilla* 28 (FCME); La Poza, al SO de Viveros El Huayacán (16°51'00"N, 99°53'00"O), *W. López* 1092 (MEXU, XAL); parque recreativo Papagayo, avenida Miguel Alemán Acapulco (16°46'28"N, 99°36'05"O), *J.I. Calzada* 17709,17681 (MEXU); costera de Acapulco (16°51'47"N, 98°53'47"O), *W. López* 1094 (FCME, MEXU, UAMIZ). **Mpio. Ahuacuotzingo:** Ajuatetla, reserva campesina (17°37'06"N, 99°07'33"O), *N. Diego* 7349 (ENCB, FCME, IEB, MEXU). **Mpio. Alpoyeca:** 1 km al E de Tecoyo (17°35'20"N, 98°29'29"O), *J. Calónico* 517 (FCME). **Mpio. Atlixtac:** 0.4 km al S de Petatlán (17°34'36"N, 98°59'29"O), *R. Redonda* 191 (FCME); Petatlán, 0.5 km al S (17°34'30"N, 99°59'32"O), *L. Mendizabal* 61 (FCME). **Mpio. Atoyac de Álvarez:** Rincón de Las Parotas, 9 km al NE de Atoyac de Alvaréz, sobre el río La Parota (17°14'00"N, 100°24'00"O), *C.A. Durán* 115 (ENCB, FCME, IEB, MEXU). **Mpio. Buenavista de Cuéllar:** 6 km al N de Buenavista de Cuellar, carretera federal Cuernavaca-Iguala (18°37'52"N, 99°24'09"O), *C.A. Durán* 92 (ENCB, FCME, IEB, MEXU), 96 (FCME, IEB, MEXU). **Mpio. Chilpancingo de los Bravo:** 1 km al O de Balsas Norte (18°35'00"N, 99°46'10"O), *M. Blanco* 541 (ENCB, MEXU, XAL); 5 km antes de Agua de Obispo, carretera México-Acapulco (17°28'16"N, 99°22'14"O), *A.R. López* 83 (FCME, MEXU); 14 km al S de Chilpancingo (17°16'33"N, 99°29'24"O), *C.A. Durán* 121 (ENCB, FCME, IEB, MEXU); 21 km al O de Chilpancingo, camino a Omiltemi (17°33'14"N, 99°39'59"O), *E.M. Martínez* 207 (ENCB, MO); Agua de Obispo, Barranca del Cuarenta (17°18'50"N, 99°28'00"O), *H. Kruse* 1281 (FCME, IEB, MEXU); Rincón de la Vía (17°17'15"N, 99°28'55"O), *H. Kruse* 1282 (FCME, MEXU); Rincón Viejo (17°17'40"N, 99°30'00"O), *H. Kruse* 1073 (FCME, MEXU); río La Hamaca, al SE de Zoyaltepec (17°19'30"N, 99°32'44"O), *L.C. Rodríguez* 379 (FCME, IEB, MEXU); cerro "Culebreado" al O de Chilpancingo (17°33'14"N, 99°30'13"O), *J. Chavelas* 1789 (ENCB, INIF). **Mpio. Coahuayutla de José María Izazaga:** El Maguey, 0.87 km al S de Coahuayutla de Guerrero (18°24'28"N, 101°35'41"O), *J. Calónico* 14907 (FCME, HUMO). **Mpio. Coyuca de Benítez:** isla La Pelona (16°57'00"N, 100°01'03"O), *C. Verduzco* 291 (FCME). **Mpio. Coyuca de Catalán:** 2 km al SO de San Isidro (17°52'20"N, 101°06'41"O), *L. Meza s. n.* (FCME);

Palo Nuevo, 82 km al SO de Ciudad Altamirano, carretera a Zihuatanejo ($18^{\circ}01'39''N$, $101^{\circ}06'13''O$), J.C. Soto 4986 (HUMO, IEB, MEXU); Placeres del Oro ($18^{\circ}14'10''N$, $100^{\circ}54'3''O$), J.C. Soto 3888 (IEB, MEXU). **Mpio. Eduardo Neri:** 10 km al SO de Xochipala ($17^{\circ}48'40''N$, $99^{\circ}38'45''O$), J.C. Soto 8232 (IEB, MEXU); Amatitlán ($17^{\circ}51'55''N$, $99^{\circ}45'38''O$), R. Cruz 847 (FCME). **Mpio. Iguala de la Independencia:** 15 km al S de Iguala, sobre la carretera federal a Chilpancingo ($18^{\circ}11'38''N$, $99^{\circ}32'49''O$), N. González 30 (IEB). **Mpio. José Azueta:** El Sandial, 2.7 km al N ($17^{\circ}47'11''N$, $101^{\circ}38'25''O$), A. Díaz 185 (ENCB, FCME, IEB, MEXU); isla Ixtapa, Zihuatanejo ($17^{\circ}39'28''N$, $101^{\circ}35'37''O$), M. Pérez s. n. (MEXU); Las Higueritas, 28 km al NE de La Salitrera, carretera Zihuatanejo-Ciudad Altamirano ($17^{\circ}38'39''N$, $101^{\circ}33'03''O$), J.C. Soto 4513 (IEB, MEXU); punta Ixtapa ($17^{\circ}40'0''N$, $101^{\circ}39'0''O$), G. Castillo 6673 (XAL). **Mpio. Mochitlán:** sin localidad ($17^{\circ}18'50''N$, $99^{\circ}28'10''O$), H. Kruse s. n. (FCME, MEXU, MO). **Mpio. Ometepec:** arroyo Huacapa, camino a Igualapa ($16^{\circ}44'17''N$, $98^{\circ}28'38''O$), R.M. Fonseca 1124 (ENCB, FCME, IEB). **Mpio. Pilcaya:** Tetipac, 9.9 km al NO ($18^{\circ}43'56''N$, $99^{\circ}40'56''O$), R. Cruz 2217 (FCME, HUMO). **Mpio. Quechultenango:** proximidades de Quechultenango, 27 km al O de Chilpancingo ($17^{\circ}24'54''N$, $99^{\circ}14'30''O$), C. Tejeda s. n. (IEB, MEXU). **Mpio. Taxco de Alarcón:** cerca de Taxco Viejo y Tlapulco ($18^{\circ}29'03''N$, $99^{\circ}35'09''O$), R. Bonilla s. n. (ENCB); Piedras Negras, 12.9 km al SE ($18^{\circ}37'27''N$, $99^{\circ}31'56''O$), J. Calónico 10072 (FCME, HUMO); Tehuilotepec ($18^{\circ}33'07.30''N$, $99^{\circ}34'52''O$), M. Martínez s. n. (F). **Mpio. Teloloapan:** Las Ceibitas, km 96 carretera a Iguala ($18^{\circ}23'00''N$, $100^{\circ}05'00''O$), H.H. Iltis 28702 (ENCB, F, MEXU). **Mpio. Tixtla de Guerrero:** La Estacada ($17^{\circ}34'29''N$, $99^{\circ}23'50''O$), N. Diego 7051 (FCME, IEB, MEXU). **Mpio. Tlapa de Comonfort:** río Tlapaneco, rumbo a Chilapa de Álvarez ($17^{\circ}32'00''N$, $98^{\circ}38'00''O$), C.A. Durán 63 (FCME, IEB, MEXU). **Mpio. Xochihuehuetlán:** cañada Axiococa, lado NE del cerro Xilotzin ($17^{\circ}59'07''N$, $98^{\circ}29'29''O$), E. Moreno 897 (FCME), 973 (FCME), 1029 (FCME, HUAP). **Mpio. Zirándaro:** 2 km al N de Guayameo ($18^{\circ}18'00''N$, $101^{\circ}15'42''O$), J.C. Soto 4373 (IEB, MEXU). **Mpio. no determinado:** sierra Madre, E. Langlassé 1001 (MEXU).

Comentarios taxonómicos

Árboles que habitan principalmente en la vegetación de galería asociada al bosque tropical caducifolio y bosque tropical subcaducifolio, así como en el bosque de *Quercus* y vegetación secundaria derivada de estas comunidades vegetales, entre 350 y 1 660 m snm. La floración y

fructificación de *F. crocata* se produce durante todo el año. Esta especie se distribuye en nuestro país desde Sonora hasta Chiapas, además de Morelos, Puebla Veracruz y la península de Yucatán; fuera de México se encuentra en Centroamérica y hacia el sur hasta Brasil y Perú. Berg (1989) la consideró parte del complejo taxonómico de *F. trigonata* L., que incluye entre otras especies *F. goldmanii* Standl., *F. morazaniana* W.C. Burger y *F. gommelleira* Kunth et C.D. Bouché.

5. *Ficus insipida* Willd. Sp. Pl. (quarto ed.) 4: 1143. 1806. *F. glabrata* Kunth. Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 2: 47, 1817; *F. segoviae* Miq. Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavum 3: 300, 1867; *F. radulina* S. Watson. Proc. Am. Acad. 26: 151, 1891. (Fig. 1D).

Nombres comunes. Amate blanco, ceiba, ceiba colorada, saiba blanca.

Árboles perennifolios de 4-20 m de alto, tallos monopódicos, contrafuertes definidos, fuste recto, corteza lisa, grisácea, con exudado blanco, abundante, con una copa densa y redondeada, verde pálida. Yema foliar terminal de 21.5-65 mm de largo, 1.7-5 mm de ancho, parda o verde oscuro, glabra o pilosa en la base; entrenudos de (6) 13-52 mm de largo, 4-7.5 mm de ancho, pardos, amarillos o grises, lisos, glabros o raramente con tricomas blancos. Pecíolo de (5) 8-40 (69) mm de largo, 1.2-3.5 mm de ancho, pardo verde o verde amarillo, estriados, glabros; lámina foliar de (3.8) 5-22 cm de largo, (1.4) 1.7-5.5 (7.9) cm de ancho, 2.7-3.6 veces más larga que ancha, elíptico lanceolada, verde amarilla o verde opaca, coriácea; base atenuada a ligeramente truncada; ápice acuminado, en algunas ocasiones apiculado; haz verde, glabro o en raras ocasiones seríceo; envés verde amarillento, glabro o seríceo, venas secundarias amarillas o verde amarillas, prominentes, 13 a 21 pares, opuestos en el primer y segundo par, los demás alternos. Siconos rara vez geminados (*C.A. Durán* 122), de 15-30 mm de largo, 15-25 (31) mm de diámetro, esferoides, verdes o amarillos, con máculas circulares amarillas o blancas en material fresco, verdes o pardos con máculas amarillas o pardas en material seco, glabros, flores de color rojo en fresco; ostíolo de 1.7-3 mm de diámetro; brácteas basales de 1-2 mm de largo, 2.5-5 mm de ancho, pardas, con el ápice agudo, caducas, glabras; pedúnculo de 3-11 mm de largo, 1.7-5 mm de ancho, verde opaco o pardo, glabro a ligeramente piloso.

Resumen taxonómico

Material examinado. **Mpio. Acapulco de Juárez:** 2 km al O de Puerto Marqués ($16^{\circ}53'53''N$, $99^{\circ}52'13''O$), W. López 1118, 1155 (ENCB, MEXU, XAL); Acapulco, cerca del Puerto aéreo ($16^{\circ}51'47''N$, $98^{\circ}53'47''O$), L.

Boege 1888 (MEXU); ejido El Manolito, laguna de Tres Palos ($17^{\circ}20'45''N$, $99^{\circ}33'38''O$), *N. Diego* 3757 (FCME, MEXU); Parque Nacional El Veladero, Santa Cecilia ($16^{\circ}51'0''N$, $99^{\circ}50'00''O$), *N. Noriega* 83 (ENCB, FCME); Parque Nacional El Veladero ($16^{\circ}53'53''N$, $99^{\circ}52'13''O$), *N. Noriega* 758 (MEXU); parque recreativo Papagayo, sobre avenida Miguel Alemán-Acapulco ($16^{\circ}46'28''N$, $99^{\circ}36'05''O$), *J.I. Calzada* 17710 (MEXU); río de Sabana, a 1 km de Puerto Marqués ($16^{\circ}53'53''N$, $99^{\circ}52'13''O$), *R. Gutiérrez* 90 (FCME). **Mpio. Arcelia:** cañada Limón, 5.3 km al SO del campamento minero de Campo Morado ($18^{\circ}12'27''N$, $100^{\circ}07'45''O$), *R. Cruz* 6083 (FCME); Campo Morado and hills above town ($17^{\circ}34'00''N$, $100^{\circ}10'00''O$), *J.S. Miller* 2899 (MO). **Mpio. Atenango del Río:** 1 km al NE de Atlapa ($18^{\circ}14'27''N$, $99^{\circ}02'59''O$), *O. Delgado* 1194 (FCME). **Mpio. Atoyac de Álvarez:** 18 km al S de El Paraíso, carretera El Paraíso-Atoyac ($17^{\circ}33'82''N$, $100^{\circ}28'08''O$), *C.A. Durán* 113 (IEB, MEXU); El Salto, 3 km de Mexcatepec ($17^{\circ}16'09''N$, $100^{\circ}25'00''O$), *N. Turrubiente s. n.* (FCME); Rincón de Las Parotas, 9 km al NE de Atoyac de Alvaréz, sobre el río La Parota ($17^{\circ}14'00''N$, $100^{\circ}23'00''O$), *C.A. Durán* 116 (FCME, MEXU). **Mpio. Buenavista de Cuéllar:** Cieneguillas, 11 km al SO de Buenavista ($18^{\circ}24'36''N$, $99^{\circ}28'36''O$), *J.C. Soto* 8747 (IEB, MEXU). **Mpio. Chilpancingo de los Bravo:** 1 km al S de Zoyatepec, camino a Ocotito de los Bravos ($17^{\circ}19'29''N$, $99^{\circ}33'20''O$), *E.M. Martínez* 2610 (ENCB, MEXU); Barranca El Platanar ($17^{\circ}17'55''N$, $99^{\circ}33'40''O$), *C. Verduzco* 483 (FCME); Agua de Obispo ($17^{\circ}18'50''N$, $99^{\circ}28'00''O$), *W. López* 868 (MEXU); camino a la estación de microondas El Alquitrán ($17^{\circ}26'40''N$, $99^{\circ}29'04''O$), *L. Lozada* 2348 (FCME, MEXU); Mazatlán, sobre la carretera federal que va a Acapulco ($17^{\circ}26'06''N$, $99^{\circ}28'22''O$), *C.A. Durán* 122 (FCME, MEXU), 123 (ENCB, IEB); Rincón de la Vía ($17^{\circ}17'15''N$, $99^{\circ}28'55''O$), *H. Kruse* 442 (FCME, MEXU); río Apetlaca, Acahuizotla ($17^{\circ}22'59''N$, $99^{\circ}27'05''O$), *H. Flores* 169 (FCME, MEXU); río Azinuheualco, al N de Zoyaltepec ($17^{\circ}20'45''N$, $99^{\circ}33'38''O$), *L.C. Rodríguez* 382 (FCME, IEB); río La Hamaca, al SE de Zoyaltepec ($17^{\circ}01'30''N$, $100^{\circ}05'30''O$), *L.C. Rodríguez* 373 (IEB, MEXU); Tlacotepec, a 5 km al NE después de Chilpancingo ($17^{\circ}49'12''N$, $99^{\circ}56'18''O$), *R. Cruz* 3842 (FCME). **Mpio. Coahuayutla de José María Izazaga:** El Aguacate, 3.9 km al S ($18^{\circ}08'16''N$, $101^{\circ}27'32''O$), *J. Calónico* 15870 (FCME); La Vainilla, 2.8 km al N ($18^{\circ}11'29''N$, $101^{\circ}29'46''O$), *J. Calónico* 15165 (FCME, MEXU). **Mpio. Copalillo:** Tlalcozotitlán, Mezquitlán, Copalillo ($19^{\circ}86'00''N$, $99^{\circ}23'00''O$), *T. Rodriguez* 132 (HUMO). **Mpio. Coyuca de Benítez:** 8 km al SO de El Cundancito ($18^{\circ}01'22''N$, $101^{\circ}07'27''O$), *J.C. Soto* 8643 (MEXU); 100 m de la entrada campo de tiro ($16^{\circ}54'11''N$,

$99^{\circ}58'3''O$), *A. Aquino* 77 (FCME); arroyo El Zapote, laguna de Mitla ($17^{\circ}08'54''N$, $100^{\circ}40'33''O$), *L. Lozada* 553 (ENCB, FCME). **Mpio. Coyuca de Catalán:** 13 km al S de Placeres del Oro, carretera Ciudad Altamirano-Zihuatanejo ($18^{\circ}08'49''N$, $100^{\circ}54'38''O$), *J.C. Soto* 2325 (ENCB, MEXU). **Mpio. Eduardo Neri:** 6 km adelante de la desviación, por la brecha que va a Axoxohualco ($17^{\circ}40'49''N$, $99^{\circ}30'46''O$), *M. Blanco* 581 (ENCB, MEXU, XAL); Axaxacoalco, 8 km al S ($17^{\circ}45'50''N$, $99^{\circ}28'41''O$), *S. Valencia* 1214 (FCME, MEXU); El Platanal, 4 km al NE, desviación a Huitziltepec ($17^{\circ}42'13''N$, $99^{\circ}35'30''O$), *S. Valencia* 1031 (FCME). **Mpio. Florencio Villareal:** aproximadamente 2 km N de Chautengo ($16^{\circ}38'57''N$, $99^{\circ}05'28''O$), *R.M. Fonseca* 1639 (FCME, IEB, MEXU). **Mpio. Huamuxtitlán:** 4.5 km al N de Huamuxtitlán ($17^{\circ}48'08''N$, $98^{\circ}33'35''O$), *L. Meza s. n.* (FCME); ladera E de un cerro, 3.5 km al NE de Huamuxtitlán ($17^{\circ}48'08''N$, $98^{\circ}33'35''O$), *J.L. Contreras* 1035 (FCME). **Mpio. Iguala de la Independencia:** cañón de la Mano, entre los Amates y El Naranjo, 10 km al N de Iguala por el Ferrocarril ($18^{\circ}23'54''N$, $99^{\circ}32'06''O$), *C. Catalán* 213 (IEB, MEXU); *Idem*, *F. Terán* 30 (FCME, MO); Iguala de la Independencia, 5 km al N, carretera a Taxco ($18^{\circ}22'49''N$, $99^{\circ}31'45''O$), *J. Rzedowski* 31875 (ENCB); Iguala, SO de la Cabaña ($18^{\circ}20'40''N$, $99^{\circ}32'20''O$), *J. Freeland* 35 (MEXU). **Mpio. José Azueta:** 3 km al N de vallecitos de Zaragoza ($17^{\circ}55'33''N$, $101^{\circ}19'25''O$), *J.C. Soto* 12489 (MEXU); 38 km al NE de Zihuatenejo, por la carretera Zihuatenejo-Ciudad Altamirano ($17^{\circ}50'33''N$, $101^{\circ}49'25''O$), *P. Tenorio* 400 (ENCB, MEXU); Laguna Playa Blanca ($17^{\circ}32'06''N$, $101^{\circ}25'51''O$), *G. Segura* 39 (FCME); Paso de Vallecitos, 2 km al NO de Vallecitos de Zaragoza ($17^{\circ}55'18''N$, $101^{\circ}19'12''O$), *J.C. Soto* 11634 (IEB, MEXU); playa La Ropa a Zihuatanejo ($17^{\circ}40'00''N$, $101^{\circ}34'00''O$), *G. Castillo* 6540 (XAL). **Mpio. Juan R. Escudero:** along gravel road between Tierra Colorado and Xalpatlahuac, between Tierra Colorado and bridge over Rio Comitlan ($17^{\circ}08'32.18''N$, $99^{\circ}23'34.02''O$), *T.B. Croat* 45749 (MO); Tierra Colorada ($17^{\circ}09'56''N$, $99^{\circ}31'35''O$), *H. Kruse* 1285 (FCME, MEXU), *s. n.* (FCME, IEB, MEXU). **Mpio. La Unión de Isidoro Montes de Oca:** 17 km NE de El Balsamo ($18^{\circ}05'11''N$, $100^{\circ}55'33''O$), *T.P. Ramamoorthy* 4303 (MEXU); 57 km al NE de Vallecitos y 2.5 km al E de Palo Nuevo ($18^{\circ}2'44''N$, $101^{\circ}3'42''O$), *V.W. Steinmann* 4925 (MEXU); El Zapotillo, camino a la gruta, 2.5 km al E de La Unión ($17^{\circ}59'32''N$, $101^{\circ}47'09''O$), *E. Guízar* 3490 (CH); vallecitos de San Miguel ($17^{\circ}58'32''N$, $101^{\circ}36'2''O$), *G.B. Hinton* 10275 (ENCB). **Mpio. Leonardo Bravo:** 2 km al NO de Yextla ($17^{\circ}37'25''N$, $99^{\circ}56'42''O$), *J. Calónico* 8245 b (ENCB, FCME, IEB, MEXU); 9.7 km al NO de Tres Caminos ($17^{\circ}37'25''N$, $99^{\circ}56'35''O$), *B. González* 1807 (FCME, IEB, MEXU);

11.6 km al S de Tres Caminos ($17^{\circ}27'48''N$, $99^{\circ}52'6''O$), *J. Calónico* 8810 (ENCB, FCME, IEB). **Mpio. San Marcos:** río La Estancia, cerca de la carretera Acapulco-Pinotepa ($16^{\circ}46'49''N$, $99^{\circ}27'25''O$), *R.M. Fonseca* 1993 (FCME, IEB, MEXU); río El Cortéz, cerca de la carretera Acapulco-Pinotepa ($16^{\circ}46'46''N$, $99^{\circ}30'40''O$), *R.M. Fonseca* 1886 (ENCB, FCME, MEXU), 1890 (FCME). **Mpio. San Miguel Totolapan:** 2 km al SO de San Miguel Totolapan ($18^{\circ}09'34''N$, $100^{\circ}23'32''O$), *O. García* 80 (FCME). **Mpio. Taxco de Alarcón:** 13 km al S de Taxco ($18^{\circ}26'06''N$, $99^{\circ}36'11''O$), *J. Calónico* 9392 (FCME); South of Taxco ($18^{\circ}33'14''N$, $99^{\circ}36'17''O$), *O.M. Clark* 7102 (MO). **Mpio. Tecpan de Galeana:** El Pusulmiche, 3 km del entronque de la brecha a Corinto con la carretera Tecpan de Galeana-Zihuatanejo ($17^{\circ}18'31''N$, $100^{\circ}35'53''O$), *P. Tenorio* 1332 (ENCB, MEXU, MO, XAL). **Mpio. Teloloapan:** Las Ceibitas ($18^{\circ}23'00''N$, $100^{\circ}05'00''O$), *H.H. Iltis* 28703 (ENCB, F, MEXU). **Mpio. TepecoacUILCO de Trujano:** San Marcos Oacacingo ($17^{\circ}57'33''N$, $99^{\circ}27'40''O$), *J. Amith* 402 (IEB, MEXU). **Mpio. Tlapa de Comonfort:** 1 km al NO de Tlapa de Comonfort, sobre el río Tlapaneco ($17^{\circ}32'00''N$, $98^{\circ}38'00''O$), *C.A. Durán* 62 (ENCB, FCME, MEXU), 65 (ENCB, FCME, IEB). **Mpio. Xochihuehetlán:** 2 km NO de Xochihuehetlán ($17^{\circ}54'15''N$, $98^{\circ}29'17''O$), *J.I. Calzada* 16095 (FCME, MEXU, UAMIZ); cañada Tecopapano, lado NE del cerro Xilotzin ($17^{\circ}58'21''N$, $98^{\circ}28'18''O$), *E. Moreno* 1041 (FCME). **Mpio. No determinado:** brecha a Playa del Sol 5 km al NO de la Huacana, *E.M. Martínez* 478 (MEXU, UAMIZ); Temisco, barranca below one mille, *Y. Mejía* 8833 (F, MO).

Comentarios taxonómicos

Especie cuyos individuos habitan cerca de cuerpos de agua estacionales o permanentes asociados a distintas asociaciones vegetales como el bosque tropical caducifolio o subcaducifolio, vegetación secundaria derivada de estos coberturas vegetales o pastizales, desde el nivel del mar hasta 1 600 m snm. La floración y fructificación se presentan durante todo el año. La especie se distribuye desde Sonora hasta Chiapas y por el lado de la vertiente del golfo de México desde Tamaulipas hasta la península de Yucatán; en el centro del país se encuentra en Durango, Morelos, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí; fuera de México se localiza en Centroamérica y Sudamérica (hasta Argentina). Berg et al. (1984) y Carvajal (1995) proponen subespecies para *F. insipida* que se distinguen por ser glabras o pilosas en las ramillas de la estación y en esta última condición por el tipo de tricomas que presentan (subsp. *insipida*, subsp. *radulina* Carvajal, subsp. *scabra* Berg y subsp. *segoviae* Carvajal). Estas categorías no se usaron en el presente trabajo, pues los caracteres propuestos

no son consistentes para permitir una separación clara del material de Guerrero. Una ilustración de la especie se encuentra en Ibarra-Manríquez y Wendt (1992) y en Berg y Villavicencio (2004).

6. *Ficus lapathifolia* (Liebm.) Miq. Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavum 3: 297. 1867. (Fig. 1D).

Árboles perennifolios de 25-35 m de alto, con tallos rectos, con contrafuertes, corteza pardo grisácea y exudado blanco, pardo pálido al oxidarse, escaso en la corteza, pero abundante en madera y ramas juveniles, con una copa abierta o densa, redondeada, verde pálida a opaca. Yema foliar terminal de 40 mm de largo, 9 mm de ancho, verde, glabra; entrenudos de 10-20 mm de largo, 4-6 mm de ancho, pardo negruzcos, lisos, raramente escamosos o ligeramente estriados, glabrescentes. Pecíolo de 30-35 mm de largo, 3-4 mm de ancho, pardo verdoso, liso, ligeramente acanalado por el haz, glabrescente; lámina foliar de 22-24 cm de largo, 14-15 cm de ancho, 1.5-1.6 veces más larga que ancha, elíptica, verde opaco, coriácea; base anchamente redondeada u obtusa; ápice obtuso; haz pardo verdoso ligeramente escabroso al tacto, glabrescente; envés pardo verdoso, pubescente, ligeramente escabroso, venas secundarias 14 a 16 pares, el primer o segundo par opuestos, los demás alternos. Siconos de 2-2.5 cm de largo y ancho, esféricos, verdes en fresco, pardos en material seco, pubescentes, ligeramente escabrosos; ostíolo de 1-2 mm de largo y 1.5-2 mm de ancho; brácteas basales 2.5-3.5 mm de largo y ancho, pardas, prontamente caedizas, glabras; pedúnculo ausente o hasta de 2 mm de largo, pardo, glabro.

Resumen taxonómico

Material examinado. **Mpio. Atoyac de Álvarez:** 2 km al S de Nueva Dehlí por la brecha que va de Puerto del Gallo a El Paraíso ($17^{\circ}27'40''N$, $100^{\circ}31'22''O$), *C.A. Durán* 112 (ENCB, FCME, IEB, MEXU); El Ranchito, 11 km al NE de El Paraíso ($17^{\circ}20'41''N$, $100^{\circ}13'43''O$), *J.C. Soto* 12796 (MEXU).

Comentarios taxonómicos

Esta especie se distribuye en el bosque mesófilo de montaña, entre 790 y 1 100 m snm. Hasta el momento sólo se ha observado reproductiva durante el mes de mayo. *Ficus lapathifolia* es una especie endémica de México (Serrato et al., 2004) y se le encuentra también en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Un dibujo de la especie puede consultarse en Ibarra-Manríquez y Wendt (1992).

7. *Ficus maxima* Mill. Gard. Dict. (ed.8.), 1768. *F. glaucescens* (Liebm.) Miq. Ann. Mus. Bot. Lugduno-

Batavum 3: 300, 1867. *F. mexicana* (Miq.) Miq. Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavum 3: 299, 1867. *F. radula* Humb. & Bonpl. ex Willd. Sp. Pl. (ed. 4) 4(2): 1144, 1806. (Fig. 1D).

Árboles perennifolios de 7-18 m de alto, tallos monopódicos, sin contrafuertes definidos, fuste recto, corteza pardo grisácea, con exudado pardo pálido, escaso en la corteza, pero abundante en la madera y en ramas jóvenes, copa abierta a ligeramente densa, redondeada, verde opaca. Yema foliar terminal de 10-19 mm de largo, 3-5 mm de ancho; verde en material fresco, verde grisácea a ligeramente parda en material seco, pubescente; entrenudos de 1-4.5 (6.2) mm de largo, 4-5.5 mm de ancho, pardo rojizos, estriados, glabrescentes. Pecíolo de (9.5) 12-18 (25) mm de largo, 2-2.7 mm de ancho, pardo, acanalado por el haz, con la superficie exfoliante en escamas, rugoso, ligeramente pubescente; lámina foliar de (6.5) 10.1-11.7 (13.8) cm de largo, (2.2) 4.2-6.2 (7.8) cm de ancho, 1.8-2.9 veces más larga que ancha, elíptica a elíptica lanceolada, verde amarilla a verde grisácea, crustácea; base cuneada; ápice acumulado a redondeado; haz verde oscuro a verde grisáceo, glabro a ligeramente pubescente; envés verde a verde opaco, glabro, a ligeramente pubescente, con tricomas abundantes a lo largo de la vena central, que es muy prominente y con las venas secundarias más o menos tenues, éstas últimas en 9 a 11 pares, alternas, verde amarillas a amarillas. Siconos de (1.4) 1.9-2.6 cm de largo, (0.9) 1.8-2.3 cm de diámetro, esferoides, verde opacos en material fresco, pardo verdes en material seco, ligeramente pilosos o escabrosos; ostíolo de 0.8-1.7 mm de diámetro, aplano; brácteas basales de 1-1.5 mm de largo, 2-3.5 mm de ancho, pardas, ápice acumulado, fácilmente deciduas, densamente pubescentes; pedúnculo de 11-22 mm de largo, pardo grisáceo, pubescente.

Resumen taxonómico

Material examinado. **Mpio. Arcelia:** cañada El Naranjo, 3.2 km al S del campamento de Campo Morado ($18^{\circ}12'27''N$, $100^{\circ}07'45''O$), O. Alcántara 5813 (FCME); cañada Limón, 5.3 km al SO del campamento minero de Campo Morado ($18^{\circ}12'27''N$, $100^{\circ}07'45''O$), R. Cruz 6082 (FCME); al E de Achotla ($18^{\circ}08'25''N$, $100^{\circ}09'50''O$), V.W. Steinmann 4879 (MEXU). **Mpio. Atlixtac:** Petatlán ($17^{\circ}34'27''N$, $98^{\circ}59'15''O$), C. Granados s. n. (FCME). **Mpio. José Azueta:** SO del caserío La Vainilla, por la cañada ($17^{\circ}42'00''N$, $101^{\circ}31'30''O$), C. Gallardo 282 (ENCB, FCME, MEXU), 546 (ENCB, MEXU); aproximadamente 300 m al N de caserío La Vainilla, rumbo al Calabazalito ($17^{\circ}42'00''N$, $101^{\circ}31'30''O$), C. Gallardo 106 (ENCB, FCME, MEXU). **Mpio. Tecpan de Galeana:** 9 km al N de la Unión carretera a Coahuayutla ($18^{\circ}18'57''N$,

$101^{\circ}44'02''O$), J.C. Soto 5994 (ENCB, MEXU, MO).

Mpio. Tlacoachistlahuaca: 3 km de Tlacoachistlahuaca, rumbo a Ometepec ($16^{\circ}48'06''N$, $98^{\circ}18'24''O$), S. Torres 695 (FCME).

Comentarios taxonómicos

Ficus maxima se presenta en bosque tropical caducifolio, vegetación de galería y vegetación secundaria proveniente de estos tipos de vegetación, entre 240 y 1 800 m snm. La producción de higos se ha registrado de marzo a noviembre, aunque hay datos de que se reproduce durante todo el año (Ibarra-Manríquez y Wendt, 1992). Esta especie se distribuye en ambas vertientes de México (por el Pacífico desde Sonora hasta Oaxaca y por el Atlántico en Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán), así como en el Estado de México, Morelos, San Luis Potosí y Puebla; fuera de México se localiza desde Guatemala hasta Sudamérica y Las Antillas. Hay ilustraciones de *F. maxima* publicadas por Ibarra-Manríquez y Wendt (1992), así como en el estudio de Berg y Villavicencio (2004).

8. *Ficus membranacea* C. Wright. Anales Acad. Ci. Med. Habana 7: 514, 1870. (Fig. 1E).

Nombres comunes. Amate de fruto rojo, amate blanco, amate amarillo.

Árboles estranguladores o rupícolas, caducifolios o perennifolios, de 5-18 m de alto, con tallos monopódicos, sin contrafuertes, con oquedades y raíces aéreas, corteza lisa, grisácea, con exudado color crema, escaso y una copa redondeada, abierta, verde pálida. Yema foliar terminal de 9-17 mm de largo, 4-5.6 mm de ancho, verde, pardo grisácea, glabra; entrenudos de 5-8 (18) mm de largo por 5.7-6.2 (9) mm de ancho, verde pardos, verde amarillos o grisáceos, estriados, glabros. Pecíolo de 35.5-51 (73.5) mm de largo, 1.2-1.8 (2.7) mm de ancho, pardo, estriado, glabro; lámina foliar de (4.2) 7.2-18.3 (22) cm de largo, (3) 4.5-13.5 cm de ancho, 1.5 veces más larga que ancha, elíptica, redondeada u obovada, verde parda, verde amarilla o parda, coriácea; base truncada; ápice redondeado o mucronado, haz y envés verdes, glabros, venas secundarias amarillas o pardo verdes, 6 a 10 pares, el primero opuesto y los demás alternos. Siconos sésiles, de (7.3) 8.5-10.3 mm de largo, 7-12.5 mm de diámetro, esféricos, verdes con manchas amarillas o rojos al madurar en fresco, pardos y con manchas oscuras en material seco, ligeramente pubescentes; ostíolo de 1.1-2 mm de diámetro; brácteas basales de 4.8-6.9 mm de largo, 5-5.2 mm de ancho, escamosas o lisas, pubescentes en ambas superficies.

Resumen taxonómico

Material examinado. **Mpio. Atoyac de Álvarez:** al NE de El Quemado ($17^{\circ}11'36''N$, $100^{\circ}17'17''O$), *A. Franco s. n.* (FCME). **Mpio. Chilpancingo de los Bravo:** 12 km al NO de Coyatepec, por el camino a La Esperanza ($17^{\circ}23'18''N$, $99^{\circ}36'27''O$), *R.M. Fonseca 1525* (ENCB, FCME, MEXU); Agua de Obispo ($17^{\circ}18'50''N$, $99^{\circ}28'00''O$), *C. Gutiérrez s. n.* (FCME); *idem, R.M. Jiménez 4* (FCME); *idem, H. Kruse 1286* (FCME, MEXU); *idem, C. Sasangari 5* (FCME); río Azinyehualco, al N de Zoyaltepec ($17^{\circ}20'45''N$, $99^{\circ}33'38''O$), *L.C. Rodríguez 229* (IEB, MEXU); planta hidroeléctrica Acahuizotla ($17^{\circ}22'59''N$, $99^{\circ}27'05''O$), *R. de Santiago 620*; Rincón de la Vía ($17^{\circ}17'15''N$, $99^{\circ}28'55''O$), *H. Kruse 1280* (FCME, IEB, MEXU, MO), *1287* (FCME, IEB, MEXU), *1287 b* (FCME, MEXU); Rincón Viejo ($17^{\circ}17'40''N$, $99^{\circ}30'00''O$), *H. Kruse 1065* (FCME, IEB, MEXU, MO). **Mpio. Mochitlán:** cima del cerro El Fresno ($17^{\circ}15'20''N$, $99^{\circ}29'00''O$), *H. Kruse 2299* (FCME, MEXU, MO).

Comentarios taxonómicos

Especie que habita el bosque de galería colindante con el bosque tropical caducifolio y bosque tropical subcaducifolio, entre 800 y 1,150 m s.n.m. La floración y fructificación de *F. membranacea* se ha registrado de febrero a noviembre. El sícono de esta especie es comestible. Se distribuye en México (Jalisco, Michoacán y Morelos), Centroamérica, Sudamérica (Colombia, Ecuador, Perú) y Las Antillas.

9. *Ficus obtusifolia* Kunth. Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 2: 49, 1817. *F. involuta* (Liebm.) Miq. Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavum 3: 298, 1867. (Fig. 1F, 5).

Nombre común. Amate (Standley, 1922); higuera prieta. Árboles hemiepífitos, perennifolios, de 4-12 m de altura, tallos monopódicos, sin contrafuertes definidos, troncos huecos y raíces aéreas, corteza pardo grisácea, con exudado blanco, abundante en las ramas jóvenes, copa abierta, de formas variadas, verde oscura. Yema foliar terminal de 12.5-19 mm de largo, 3-10 mm de ancho, parda o verde negra, glabra; entrenudos de 1.5-20 mm de largo, 8-13.5 mm de ancho, pardos, estriados, glabros. Pecíolo de 10-32 mm de largo, 2.2-4.5 mm de ancho, pardo o verde amarillo, estriado, en ocasiones con un canal por el haz, glabro; lámina foliar de (6.1) 9.5-28.3 cm de largo, (2.7) 3.2-10.7 cm de ancho, 2.3-3 veces más larga que ancha, obovada, verde grisácea o verde pardo, coriácea, en algunas ocasiones cartácea; base cuneada o atenuada; ápice redondeado, en ocasiones ligeramente acuminado; haz pardo a verde grisáceo, glabro; envés verde amarillo,

verde pardo o pardo, glabro, venas secundarias amarillas o pardas, 8 a 12 pares, ocasionalmente el primer par es opuesto, ya que generalmente todos son alternos. Siconos de 11-19 mm de largo, 11-21 mm de diámetro, esferoides o elipsoides, grisáceos, pardo o verde negruzcos, con máculas oscuras, a veces pustulados, glabros o ligeramente pubescentes; ostíolo cónico, de 2.8-5 mm de diámetro; brácteas basales de 5-12 mm de largo, 8-10 mm de ancho, pardas, ápice redondeado o ligeramente agudo, pubescentes; pedúnculo ausente o de hasta 4.5 mm de largo, verde o pardo, glabro.

Resumen taxonómico

Material examinado. **Mpio. Acapulco de Juárez:** 2 km al O de Puerto Marqués ($16^{\circ}53'53''N$, $99^{\circ}52'13''O$), *W. López 1228* (MEXU, XAL); 2.5 km al O de Puerto Marqués ($16^{\circ}53'53''N$, $99^{\circ}52'23''O$), *W. López 487, 563* (MEXU); isla La Roqueta ($16^{\circ}53'53''N$, $99^{\circ}52'13''O$), *J. Mancilla s. n.* (FCME); La Quebrada ($16^{\circ}46'5''N$, $99^{\circ}40'2''O$), *J.C. Soto 6824* (MEXU, MO). **Mpio. Arcelia:** 3.5 km al SO del campamento minero de Campo Morado ($18^{\circ}12'26.66''N$, $100^{\circ}07'45.03''O$), *R. Cruz 6151* (FCME); cañada El Naranjo, 3.2 km al S del campamento de Campo Morado ($18^{\circ}12'26.66''N$, $100^{\circ}07'45.03''O$), *O. Alcántara 5808* (FCME). **Mpio. Atoyac de Álvarez:** camino de Nueva Deli al Ranchito ($17^{\circ}24'16''N$, $100^{\circ}11'28''O$), *G. Ibarra 5934 et al.* (IEB, MEXU); al NE de El Quemado ($17^{\circ}11'36''N$, $100^{\circ}17'17''O$), *A. Franco s. n.* (MEXU); El Ranchito, 13 km NE de El Paraíso ($17^{\circ}12'31''N$, $100^{\circ}26'3''O$), *J. Calónico 7894* (MEXU); Plan del Molino ($17^{\circ}23'59''N$, $100^{\circ}19'00''O$), *L. Lozada 1476* (FCME, IEB). **Mpio. Chilpancingo de los Bravo:** 1 km al NO de Mazatlán, en las faldas del cerro Alquitrán ($17^{\circ}26'21''N$, $99^{\circ}28'35''O$), *G. Ibarra 5954 et al.* (IEB, MEXU); 1 km al O de Acahuizotla, sobre el río ($17^{\circ}22'54''N$, $99^{\circ}26'50''O$), *E. Velázquez 1247* (FCME, IEB, MEXU); 3 km al N de El Ocotito, sobre la carretera federal a Acapulco de Juárez ($17^{\circ}17'38''N$, $99^{\circ}28'17''O$), *C.A. Durán 128* (FCME, MEXU); Agua de Obispo, a orilla de la carretera, km 305, arriba de Barranca del Cuarenta ($17^{\circ}18'50''N$, $99^{\circ}28'00''O$), *H. Kruse 1018* (FCME, IEB, MEXU, MO), *1018 b* (FCME, IEB); cañada a 1 km al SO de Agua de Obispo ($17^{\circ}18'48''N$, $99^{\circ}28'52''O$), *L.C. Rodríguez 91* (MEXU); Chilpancingo ($17^{\circ}33'05''N$, $99^{\circ}30'03''O$), *J. Chavelas s. n.* (FCME); Rincón de la Vía, km 31.4 de la Carretera México-Acapulco, 40 km al S de Chilpancingo ($17^{\circ}17'15''N$, $99^{\circ}28'55''O$), *H. Kruse 441* (FCME, MEXU), *s. n.* (MEXU); Rincón Viejo ($17^{\circ}17'40''N$, $99^{\circ}30'00''O$), *H. Kruse s. n.* (FCME, IEB, MEXU). **Mpio. José Azueta:** cerro el Rialito, base oeste entre punta Ixtapa y el Rialito ($17^{\circ}40'00''N$, $101^{\circ}39'00''O$), *G. Castillo 6630* (XAL);

isla Ixtapa ($17^{\circ}39'28''N$, $101^{\circ}35'37''O$), *M. Pérez s. n.* (MEXU); San Antonio, 9 km al NE de Vallecito Zaragoza ($17^{\circ}55'49''N$, $101^{\circ}19'14''O$), *J.C. Soto 12459* (MEXU); San Antonio, a 13 km al NE de Vallecito de Zaragoza ($17^{\circ}55'33''N$, $101^{\circ}19'25''O$), *J.C. Soto 12051* (MEXU). **Mpio. La Unión de Isidoro Montes De Oca:** Las Pilas de Rocha, 2 km río abajo de La Unión ($17^{\circ}58'54''N$, $101^{\circ}48'12''O$), *E. Guízar 3056* (IEB). **Mpio. Juan R. Escudero:** 40 km al S de Chilpancingo ($16^{\circ}46'05''N$, $99^{\circ}40'02''O$), *H. Kruse s. n.* (MEXU). **Mpio. Tecpan de Galeana:** Cordón Grande ($17^{\circ}35'35''N$, $100^{\circ}41'25''O$), *H. Adame 587* (IEB). **Mpio. Teloloapan:** Las Ceibitas, km 96 carretera Iguala-Arcelia, casi 20 km al O de Teloloapan ($18^{\circ}23'00''N$, $100^{\circ}05'00''O$), *H.H. Iltis 28704* (ENCB, F, MEXU). **Mpio. Xochistlahuaca:** 6 km de Xochistlahuaca, dirección a Ometepec ($16^{\circ}47'29''N$, $98^{\circ}14'44''O$), *G. Gaxiola 499* (FCME, IEB). **Mpio. Zirándaro:** 5 km al SE de Guayameo ($18^{\circ}18'0''N$, $101^{\circ}15'42''O$), *J.C. Soto 4944* (IEB, MEXU); 9 km después de Guayameo, por la terracería que va a Placeres del Oro ($18^{\circ}17'33''N$, $101^{\circ}13'32''O$), *S. Peralta 587* (FCME, IEB, MEXU); Los Parajes, 0.5 km al N ($18^{\circ}15'31''N$, $101^{\circ}11'14''O$), *J. Calónico 14853* (FCME, HUMO, MEXU). **Mpio. No determinado:** brecha a playa del Sol, a 5 km de la Huacana, *E.M. Martínez 468* (MEXU).

Comentarios taxonómicos

Especie presente en bosque tropical caducifolio, bosque tropical subcaducifolio, bosque de galería, bosque mesófilo de montaña o vegetación secundaria derivada de las coberturas de vegetación previamente mencionadas, entre (150) 810 a 1 550 m snm Los árboles florecen y fructifican prácticamente durante todo el año (febrero a noviembre). En México se encuentra en la vertiente del Pacífico desde Sinaloa hasta Chiapas y en la vertiente del Golfo, desde Tamaulipas hasta Tabasco, así como en la península de Yucatán y centro del país (Estado de México, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro); fuera del país se le encuentra en Centroamérica y en Sudamérica hasta Brasil y Perú. *Ficus obtusifolia* forma parte del complejo taxonómico del mismo nombre y que incluye entre otros miembros a *F. nymphaeifolia* Mill. (Berg, 1989).

10. *Ficus pertusa* L. f. Suppl. Pl. 442, 1781 [1782]. *F. padifolia* Kunth. Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 2: 47. 1817. (Fig. 1E).

Nombres comunes. Amezquite; camuchito o samatito (Standley, 1922, pero este último probablemente sea amatito).

Árboles hemiepífitos o rupícolas, perennifolios, de (1) 3.7-7 (10) m de alto, tallos monopódicos o en pocas ocasiones

simpódicos, cortos y huecos con raíces aéreas, corteza lisa, pardo grisácea o verde grisácea, con exudado blanco, escaso en la corteza pero abundante en las ramas juveniles, copa abierta y densa, verde pálida a oscura. Yema foliar terminal de 5.5-15 mm de largo, 3-5 mm de ancho, parda a parda verdosa, glabra a ligeramente pubescente; entrenudos de 4.5-8 (19.5) mm de largo, 2.3-4.2 (6) mm de ancho, pardo amarillos, glabros. Pecíolo de 10.2-30 (41) mm de largo, 0.8-1.3 mm de ancho, pardo, con un canal por el haz, glabro a ligeramente pubescente; lámina foliar de (3.1) 4.3-8.5 (12.5) cm de largo, 1-3.5 cm de ancho, 2.6-3.4 veces más larga que ancha, elíptica, elíptico ovada a lanceolada, coriácea a papirácea; base obtusa a obtuso aguda; ápice acuminado; haz verde amarillo a verde opaco, glabro; envés verde pardo o verde amarillo, glabro, venas secundarias amarillas, 8 a 10 pares, el primer par basal opuesto, los demás alternos. Siconos de (7.2) 8.5-13 (15.5) mm de largo, 8-13 mm de diámetro, globosos a esferoides, verdes, con máculas amarillas o rojas, las cuales son pardas al madurar, glabros; ostíolo de 2-3 mm de diámetro, hundido en una estructura anular; brácteas basales de 1.3-2.1 mm de largo, 2.1-3 mm de ancho, pardas o pardo amarillas, ápice redondeado, glabras; pedúnculo de 3-7.5 (9) mm de largo, pardo, glabro.

Resumen taxonómico

Material examinado. **Mpio. Acapulco de Juárez:** 2.5 km al O de Puerto Marqués ($16^{\circ}53'53''N$, $99^{\circ}52'23''O$), *W. López 700* (ENCB, MEXU, XAL); Acapulco ($16^{\circ}51'47''N$, $98^{\circ}53'47''O$), *E.A. Palmer 62* (F); cerro de Cacahuatepec, laguna de Tres Palos ($16^{\circ}41'38''N$, $99^{\circ}38'13''O$), *N. Diego 5030* (ENCB, IEB); hotel Copacabana Acapulco ($16^{\circ}46'25''N$, $99^{\circ}36'04''O$), *L. Boege 449* (MEXU); La Estación, orilla de la laguna de Tres Palos ($16^{\circ}41'37''N$, $99^{\circ}38'12''O$), *N. Diego 4415* (FCME), Parque Nacional El Veladero, cerro Caraval ($16^{\circ}55'54''N$, $99^{\circ}53'12''O$), *N. Noriega 335* (FCME). **Mpio. Atoyac de Álvarez:** cerro Prieto ($17^{\circ}12'31''N$, $100^{\circ}26'03''O$), *G. Espinosa 6* (FCME, MEXU); Rincón de La Parota, sobre el puente que cruza el río Parota ($17^{\circ}14'00''N$, $100^{\circ}23'00''O$), *C.A. Durán 117* (ENCB, FCME, IEB, MEXU). **Mpio. Bénito Juárez:** Llano Real, laguna de Mitla ($17^{\circ}04'41''N$, $100^{\circ}26'03''O$), *L. Lozada 889* (ENCB, FCME, IEB). **Mpio. Buenavista de Cuéllar:** 6 km al N de Buenavista de Cuellar, carretera federal Cuernavaca-Iguala ($18^{\circ}37'52''N$, $99^{\circ}24'09''O$), *C.A. Durán 95* (FCME, IEB, MEXU). **Mpio. Chilpancingo de los Bravo:** 2.5 km al SO de Soyaltepec por el camino al cerro El Toro ($17^{\circ}19'10''N$, $99^{\circ}33'14''O$), *L.C. Rodríguez 233* (IEB, MEXU); Mazatlán, falda E del cerro El Alquitrán ($17^{\circ}27'1''N$, $99^{\circ}27'54''O$), *H. Kruse 2347* (FCME, IEB, MEXU, MO); camino a El

Alquitrán ($17^{\circ}26'40''N$, $99^{\circ}29'04''O$), *L. Lozada* 2718 (ENCB, FCME, IEB, MEXU); estación de microondas El Alquitrán ($17^{\circ}26'40''N$, $99^{\circ}29'04''O$), *L. Lozada* 2347 (ENCB, FCME, IEB). **Mpio. Coyuca de Benítez:** El Carrizal, canal, 1 km NO, laguna de Mitla ($16^{\circ}57'45''N$, $100^{\circ}08'21''O$), *L. Lozada* 675 (ENCB, FCME); isla de Los Tamarindos, Laguna de Mitla ($17^{\circ}00'42''N$, $100^{\circ}01'06''O$), *L. Lozada* 854 (ENCB, FCME, IEB); arroyo El Zapote, laguna de Mitla ($17^{\circ}08'54''N$, $100^{\circ}40'33''O$), *L. Lozada* 542 (FCME, IEB); laguna de Mitla, 0.5 km al SE de El Zapote ($17^{\circ}00'20''N$, $100^{\circ}13'07''O$), *G. Díaz* 35 (FCME, IEB). **Mpio. Coyuca de Catalán:** San Antonio, Distrito Montes de Oca, *G.B. Hinton* 11509 (ENCB, F, HUMO, MEXU, MO). **Mpio. General Heliodoro Castillo:** Tlacotepec, 3.5 km al O camino a Huautla ($17^{\circ}47'36''N$, $100^{\circ}00'36''O$), *R. Cruz* 3977 (FCME, IEB, MEXU). **Mpio. Iguala de la Independencia:** Iguala ($18^{\circ}20'40''N$, $99^{\circ}32'20''O$), *J. Freeland* 59 (MEXU). **Mpio. José Azueta:** 9 km al N de Vallecitos de Zaragoza, sobre la carretera Zihuatanejo-Ciudad Altamirano ($17^{\circ}55'18''N$, $101^{\circ}19'12''O$), *J.C. Soto* 5034 (IEB, MEXU); alrededores del caserío “La Vainilla” ($17^{\circ}41'43''N$, $101^{\circ}31'23''O$), *C. Gallardo* 80 (FCME, MEXU); El Limoncito, a 4 km al N de Real de Guadalupe ($18^{\circ}01'24''N$, $101^{\circ}18'42''O$), *F. González* 6551 (IEB, MEXU); San Antonio, 11 km al N de Vallecitos de Zaragoza, sobre la carretera Zihuatanejo-Ciudad Altamirano ($17^{\circ}55'18''N$, $101^{\circ}19'12''O$), *J.C. Soto* 5053 (IEB, MEXU). **Mpio. Juan R. Escudero:** NO de El Tepeguaje, por la vereda a Omitlán ($17^{\circ}09'56''N$, $99^{\circ}31'35''O$), *R.M. Fonseca* 3141 (FCME, IEB); Tierra Colorada, en la falda de un cerro entre 2 grandes rocas de granito, cerca de la orilla del río Omitlán ($17^{\circ}9'56''N$, $99^{\circ}31'35''O$), *H. Kruse* 1070 (ENCB, FCME, IEB, MEXU). **Mpio. La Unión de Isidoro Montes de Oca:** El Cedral, a 19 km de la desviación a La Unión ($17^{\circ}57'42''N$, $101^{\circ}39'23''O$), *J.C. Soto* 9586 (MEXU). **Mpio. Ometepec:** 1 km de Piedra Boluda, dirección Las Iguanas ($16^{\circ}39'02''N$, $98^{\circ}26'59''O$), *G. Gaxiola* 434 (FCME, IEB, MEXU); Ometepec ($16^{\circ}41'08''N$, $98^{\circ}24'20''O$), *L. García s. n.* (FCME). **Mpio. Petatlán:** La Florida, 31 km al EN de Coyuquilla ($17^{\circ}32'10''N$, $101^{\circ}16'10''O$), *J.C. Soto* 12311 (MEXU, MO); microondas Las Rocas, lado S de la laguna de San Valentín ($17^{\circ}27'31''N$, $101^{\circ}15'57''O$), *N. Diego* 6549 (MEXU). **Mpio. San Luis Acatlán:** 6 km al SO de Jolotchan ($16^{\circ}48'26''N$, $98^{\circ}44'13''O$), *J. Mejía s. n.* (FCME). **Mpio. Taxco de Alarcón:** Atzala, 6.6 km al SE de Chichila ($18^{\circ}30'21''N$, $99^{\circ}39'23''O$), *J. Calónico* 8936 (IEB). **Mpio. Tixtla de Guerrero:** cerro La Virgen de Guadalupe ($17^{\circ}27'00''N$, $100^{\circ}09'00''O$), *B. Ludlow* 138 (IEB, MEXU); El Puente de El Ranchito, 5 km antes de Tixtla, sobre el río de la presa ($17^{\circ}34'29''N$, $99^{\circ}23'50''O$), *M. Huerta* 45 (ENCB, FCME, IEB,

MEXU); ladera N del cerro Jazmín, 5 km al SO de Tixtla ($17^{\circ}33'11''N$, $99^{\circ}26'06''O$), *A. Rodríguez* 39 (IEB). **Mpio. Tlacoachistlahuaca:** 4.5 km al S de San Isidro ($16^{\circ}53'22''N$, $98^{\circ}18'00''O$), *L. Lozada* 1542 (ENCB, FCME, IEB). **Mpio. no determinado:** Manchón, District Mina, *G.B. Hinton* 9618 (F, HUMO), 10083 (ENCB, HUMO, MO).

Comentarios taxonómicos

Especie que habita en el bosque tropical caducifolio, bosque de galería, bosque de *Quercus* y vegetación secundaria donde se encontraban estos tipos de vegetación, desde el nivel del mar hasta 1 550 m de altitud. La floración y fructificación se han registrado todo el año. *Ficus pertusa* presenta una amplia distribución en México, se encuentra desde Sonora hasta Chiapas y desde Tamaulipas hasta Campeche y la península de Yucatán, así como en varios estados del centro del país (Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla y San Luis Potosí); fuera de México se registra de Centroamérica, Sudamérica (hasta Brasil) y Las Antillas. *Ficus pertusa* forma parte del complejo taxonómico del mismo nombre, que incluye, entre otras especies, a *F. pallida*, *F. schumacheri* y *F. trachelosyce* (Berg, 1989, 2007).

11. *Ficus petiolaris* Kunth. Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 2: 49, 1817.

Nombres comunes. Amacoztic, amate corazón, texcaloma. De acuerdo con Standley (1922) se le conoce también como amate amarillo, tepeamatl y tepeamte (probablemente el nombre correcto sea tepeamate). (Fig. 1A, 6).

Árboles rupícolas, caducifolios, de 7-22 m de altura, tallos monopódicos o simpódicos, fuste regularmente delgado, contrafuertes raramente presentes, alcanzando excepcionalmente un diámetro de hasta 2 m, corteza amarilla, amarillo grisácea o amarillo verdosa, con exudado blanco, abundante, copa amplia y redondeada, verde pálida. Yema foliar terminal de (12) 19-74 mm de largo, 4.5-11 mm de ancho, parda o pardo amarilla, glabra o densamente pubescente, con tricomas blancos; entrenudos de 2-10 mm de largo, 6-12 mm de ancho, pardo amarillos, estriados, exfoliantes, glabros. Pecíolo de (3.7) 5.5-10.8 (14.7) mm de largo, 1.7-3.8 mm de ancho, pardo a verde rojizo, glabro o pubescente; lámina foliar de (3.7) 4.9-14.8 cm de largo, (3.2) 5.3-15.6 cm de ancho, 0.9-1.1 veces más larga que ancho, cordiforme, verde, verde amarilla o parda, coriácea o cartácea, base cordada; ápice redondeado a apiculado; haz verde oscuro o pardo, glabro; envés pardo amarillo o verde grisáceo, con domacios en la base de la lámina, venas secundarias amarillas, 6 a 11 pares, los

primeros 3 o 4 pares opuestos, los demás alternos. Siconos de 7-9 mm de largo, 6.5-10.5 mm de diámetro, esferoides a ligeramente piriformes, verde amarillos, rojizos o amarillos, con máculas rojas a oscuras en material fresco, pardos en material seco, glabros a densamente pubescentes; ostíolo de 1.9-3 mm de diámetro, ocasionalmente cónico; brácteas basales de 2 mm de largo, 3-3.2 mm de ancho, glabras o ligeramente pubescentes, verde oscuro, pardas, con el ápice redondeado, persistentes; pedúnculo de (6) 20-60 mm de largo, 1 mm de ancho, verde oscuro, glabro o ligeramente pubescente.

Resumen taxonómico

Material examinado. **Mpio. Acapulco de Juárez:** 2.5 km al O de Puerto Marqués ($16^{\circ}53'53''N$, $99^{\circ}52'23''O$), *W. López* 483, 543, 713 (MEXU), 1126 (ENCB, MEXU, XAL), 1157 (MEXU, MO). **Mpio. Buenavista de Cuéllar:** 6 km al N de Buenavista de Cuellar, carretera federal Cuernavaca-Iguala ($18^{\circ}37'52''N$, $99^{\circ}24'01''O$), *C.A. Durán* 94 (FCME, IEB). **Mpio. Chilpancingo de los Bravo:** 1 km al NO de Mazatlán, en las faldas del cerro Alquitrán ($17^{\circ}26'21''N$, $99^{\circ}28'35''O$), *G. Ibarra* 5932 et al., 5933 et al. (IEB, MEXU); 3 km al O de Chilpancingo ($17^{\circ}33'14''N$, $99^{\circ}29'59''O$), *M. Blanco* 120 (ENCB, MEXU); 16 km NO de Chilpancingo sobre la carretera que va a Chichihualco ($17^{\circ}35'32''N$, $99^{\circ}31'11''O$), *C.A. Durán* 127 (FCME, IEB); al O de Chilpancingo ($17^{\circ}33'14''N$, $99^{\circ}39'59''O$), *J. Chavelas* 18 (ENCB, INIF, MEXU); aproximadamente a 500 m del poblado Mazatlán hacia Chilpancingo, en la curva de la carretera ($17^{\circ}26'17''N$, $99^{\circ}28'33''O$), *N. González* 44 (IEB); cerro de los Bueyes al N de Chilpancingo ($17^{\circ}35'20''N$, $99^{\circ}30'41''O$), *J. Chavelas* 1785 (INIF); km 1 de la carretera Chichihualco-Chilpancingo ($17^{\circ}34'00''N$, $99^{\circ}30'31''O$), *H. Kruse* 2725 (FCME, MEXU); Mazatlán, falda E del cerro Alquitrán ($17^{\circ}26'01''N$, $99^{\circ}27'54''O$), *H. Kruse* 2090 (FCME, MEXU), 2727 (FCME, IEB, MEXU, MO). **Mpio. Cutzamala de Pinzón:** 4 km al SO de Cañas Viejas, 20 km al NO de Nuevo Galena ($18^{\circ}36'01''N$, $100^{\circ}40'34''O$), *F. González* 6100 (MEXU). **Mpio. Eduardo Neri:** puente Agustín Lorenzo, km 61 carretera Iguala-Chilpancingo, sobre el acantilado a la orilla del río ($17^{\circ}50'13''N$, $99^{\circ}04'08''O$), *N. González* 31 (IEB); Zumpango del Río, 5 km al S ($17^{\circ}36'30''N$, $99^{\circ}31'04''O$), *H. Kruse* 2714 (FCME, IEB, MEXU). **Mpio. Huitzoco de los Figueroa:** 4 km al N de San Francisco Ozomatlán ($17^{\circ}55'35''N$, $99^{\circ}20'21''O$), *A. Vargas* 323 (FCME). **Mpio. Iguala de la Independencia:** 15 km al S de Iguala, sobre la carretera federal a Chilpancingo ($18^{\circ}11'38''N$, $99^{\circ}32'49''O$), *N. González* 29 (IEB); cañón de la Mano, entre los Amates y El Naranjo, 10 km al N de Iguala, por el Ferrocarril ($18^{\circ}23'54''N$, $99^{\circ}32'06''O$),

C. Catalán 214 (IEB). **Mpio. Juan R. Escudero:** Tierra Colorada ($17^{\circ}09'56''N$, $99^{\circ}31'35''O$), *H. Kruse* 1060 (FCME, MEXU). **Mpio. La Unión de Isidoro Montes de Oca:** Cundancito, 15 km al NE Zihuatanejo-Ciudad Altamirano ($18^{\circ}1'22''N$, $101^{\circ}7'27''O$), *E.M. Martínez* 4291 (MEXU). **Mpio. Mochitlán:** Mazatlán, 3 km al N del Salto Valadéz ($17^{\circ}27'30''N$, $99^{\circ}28'10''O$), *H. Kruse* 2085, 2726 (FCME, IEB, MO), 2709 (FCME, IEB, MO), Palo Blanco, km 298 ($17^{\circ}24'00''N$, $99^{\circ}28'00''O$), *H. Kruse* 445 (ENCB, FCME, MEXU); Tepechicotlán, zona centro ($17^{\circ}29'00''N$, $99^{\circ}25'00''O$), *J.E. Elizondo* 85 (INIF). **Mpio. Taxco de Alarcón:** Cacahuamilpa, 3 km al O, rumbo a Piedras Negras ($18^{\circ}41'01''N$, $99^{\circ}31'47''O$), *J. Calónico* 8582 (FCME, HUMO); Taxco ($18^{\circ}33'15''N$, $99^{\circ}36'17''O$), *W.M.C. Leavenworth* 949 (F). **Mpio. Tixtla de Guerrero:** cerro a la orilla de la laguna de Huiziltepec ($17^{\circ}45'30''N$, $99^{\circ}27'30''O$), *B. Ludlow* 371 (FCME, IEB, MEXU); Tixtla, cerro La Virgen de Guadalupe ($17^{\circ}27'00''N$, $100^{\circ}09'00''O$), *B. Ludlow* 152 (ENCB, FCME, IEB, MEXU). **Mpio. Tlapa de Comonfort:** 7 km al O de Tlapa de Comonfort, frente a la gasolinería sobre la carretera federal ($17^{\circ}32'49''N$, $98^{\circ}36'4''O$), *C.A. Durán* 64 (FCME, IEB, MEXU).

Comentarios taxonómicos

Especie que prospera en el bosque tropical caducifolio, bosque de *Quercus* y vegetación secundaria que proviene de aquéllos, entre 620 y 1 600 m snm. La floración y fructificación se registró de marzo a noviembre. Esta especie se encuentra en las casas del área de estudio como árbol de sombra o para alimentar animales domésticos y tiene un gran potencial como planta ornamental, uso que actualmente se le da en Brasil (Carauta y Diaz, 2002); la corteza se utiliza para la elaboración de “papel amate”. Esta especie es endémica de México (Serrato et al., 2004) y se distribuye en la vertiente del Pacífico, desde Sonora hasta Oaxaca, así como en Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos y Puebla. *Ficus petiolaris* está estrechamente relacionada con *F. palmeri* S. Watson, por lo que Felger y Lowe (1970) proponen la existencia de 2 subespecies (*F. brandegeei* (Standl.) Felger y Lowe y *F. palmeri* (S. Watson) Felger et Lowe), mientras que Carvajal et al. (2001) adicionan la subsp. *jaliscana* (S. Watson) Carvajal y la subsp. *petiolaris*. Estos estudios se basaron principalmente en la presencia o ausencia de pubescencia en las ramillas de la estación, hojas y siconos, en el color de las nervaduras secundarias de las hojas y en determinar si los siconos tienen o carecen de máculas. Estas características no son consistentes con lo observado en el material botánico colectado en Guerrero, por lo que no fue posible usarlas de manera consistente para delimitarlo.

12. *Ficus pringlei* S. Watson. Proc. Am. Acad. 26: 150, 1891. (Fig. 1C).

Árboles rupícolas, caducifolios, de 6-12 (20) m de altura, tallos monopódicos, oquedades y raíces aéreas, sin contrafuertes, con exudado blanco y una copa de corta a amplia y generalmente redondeada, verde opaca. Yema foliar terminal de 6-12 mm de largo, 4-10 mm de ancho, parda a pardo grisácea, pubescente; entrenudos de 12.5-14 mm de largo, 2.8-5 mm de ancho, pardo rojizos, vilosos cuando son jóvenes, a veces glabrescentes, pardos a grisáceos. Pecíolo de 5-20 mm de largo, 1-1.8 mm de ancho, pardo, con un canal por el haz, pubescente; lámina foliar de (2.3) 5.2-7.5 cm de largo, (1.9) 5.8 mm de largo, 0.8-1.2 veces más larga que ancha, elíptica a ovada, verde amarilla o verde opaca, coriácea; base cordada; ápice redondeado o ligeramente acuminado; haz glabrescente; envés verde grisáceo, pubescente en las venas secundarias y terciarias, las primeras pardo amarillas, de 4 a 7 pares, el primer par opuesto, los demás alternos. Siconos de 5-8 mm de largo, 4-8 mm de diámetro, esferoides, pardo grisáceos, con máculas circulares y glabros o bien sin máculas circulares, pero pubescentes; ostíolo de 2.5 mm de diámetro, prominente, cónico; brácteas basales de 2.8-4.8 mm de largo por 4 mm de ancho, pardas, con el ápice redondeado, ligeramente pubescentes; pedúnculo de 2-3 mm de largo, verde o verde pardo, pubescente.

Resumen taxonómico

Material examinado. **Mpio. Cutzamala de Pinzón:** 8 km al NO de Cañas Viejas ($18^{\circ}36'21''N$, $100^{\circ}40'35''O$), F. González 6119, 6135 (MEXU). **Mpio. José Azueta:** 1.6 km SO del caserío La Vainilla, cerros que limitan La Mesa del Mango ($17^{\circ}42'00''N$, $101^{\circ}31'30''O$), C. Gallardo 720 (FCME, MEXU).

Comentarios taxonómicos

F. pringlei es una especie con distribución muy localizada en Guerrero, que habita exclusivamente en el bosque tropical caducifolio, a 410 m s.n.m. El periodo de floración y fructificación se ha registrado sólo en los meses de julio y diciembre, aunque es muy probable que ocurra durante la mayor parte del año. No se le adjudican usos en la zona de estudio. Es una especie endémica de México (Serrato et al., 2004), que se distribuye también en Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit.

13. *Ficus velutina* Humb. et Bonpl. ex Willd. Sp. Pl. (quarto ed.) (Fig. 1C, 7).

Nombre común. Amate.

Árboles hemiepífitos o estranguladores, caducifolios o

perennifolios, de 10-22 m de alto, con tallos monopódicos y con numerosas raíces aéreas anastomosadas, corteza lisa pardo gris o pardo rojiza, fisurada, con exudado blanco a ligeramente amarillo, abundante, copa amplia y densa, verde oscuro. Yema foliar terminal de 10-18 mm de largo, 4-11 mm de ancho, pardo ferruginea, densamente sericea; entrenudos de 1.5-2.3 (4) cm de largo, 4-7 mm de ancho, pardos, estriados, glabros o ligeramente pubescentes. Pecíolo de 15-30 mm de largo, 1.5-3 mm de ancho, verde negruzco o verde grisáceo, glabro a ligeramente piloso; lámina foliar de (8) 13-22.5 cm de (4.5) 5.5-8.7 (10.2) cm de ancho, 1.7-2.3 veces más larga que ancha, elíptica oblonga, pardo grisácea o amarillo verdosa, coriácea; base obtuso redondeada a ligeramente subcordada; ápice obtuso, redondeado a ligeramente agudo; haz verde grisáceo, verde pardo, glabro; envés verde opaco a verde rojizo, vena central y venas secundarias pubescentes, raramente glabras, 10 a 14 pares de venas secundarias, los 2 primeros pares opuestos, condición que a veces puede presentarse hasta el cuarto par, los demás alternos. Siconos de 11-18 (24) mm de largo, 13-18 mm de diámetro, esferoides, verdes en fresco, verrucosos, con tricomas rojizos, grises o pardos, glabrescentes en material seco; ostíolo de 3.1-6 mm de diámetro, con una cicatriz anular evidente, flores blanquecinas; brácteas basales de 2-3 mm de largo, 3-3.8 mm de ancho, pardo oscuro, ápice redondeado, cubiertas por una fina pubescencia ferruginea; pedúnculo de 2-4.5 mm de largo, verde a verde pardo, pubescente o raramente glabrescente.

Resumen taxonómico

Material examinado. **Mpio. Acapulco de Juárez:** 18 km al NE de El Paraíso, carretera a Atoyac ($16^{\circ}53'08''N$, $99^{\circ}47'33''O$), J.C. Soto 5229 (MEXU). **Mpio. Atoyac de Álvarez:** 44 km al NE de Atoyac, camino a El Paraíso ($17^{\circ}12'32''N$, $100^{\circ}26'03''O$), E.M. Martínez 3748 (IEB, MEXU, MO, UAMIZ); El Molote ($17^{\circ}25'0''N$, $100^{\circ}10'0''O$), L. Lozada 2659 (FCME, MEXU); El Ranchito, 11 km al EN de El Paraíso ($17^{\circ}20'41''N$, $100^{\circ}13'43''O$), J.C. Soto 5241, 12797 (MEXU). **Mpio. Chilpancingo de los Bravo:** cercanías de Tepozonalco, camino Chilpancingo-Omiltemi ($17^{\circ}33'22''N$, $99^{\circ}41'16''O$), F.G. Lorea 591 (FCME, MEXU); Jalapa, en el km 13.5 de la carretera a Chichihualco ($17^{\circ}37'40''N$, $99^{\circ}35'40''O$), H. Kruse 1662 (FCME, MEXU, MO), 2010 (FCME, IEB, MEXU); Jalapa, 15 km al NO de Chilpancingo ($17^{\circ}37'12''N$, $99^{\circ}37'19''O$), C.A. Durán 125 (FCME); O de Chilpancingo ($17^{\circ}20'45''N$, $99^{\circ}33'38''O$), A.J. Sharp 441443 (MEXU). **Mpio. Leonardo Bravo:** La Laguna, 18 km al SO de Xochipala, Chichihualco ($17^{\circ}48'43''N$, $99^{\circ}38'14''O$), J.C. Soto 5172 (MEXU).

Comentarios taxonómicos

Especie que habita en el bosque tropical caducifolio, bosque de *Pinus*, bosque de *Quercus* y bosque mesófilo de montaña, desde el nivel del mar hasta 2 100 m snm. La floración y fructificación se presentan de marzo hasta diciembre. Se usa como árbol de sombra para los cafetales en el bosque mesófilo de montaña. Se distribuye en la vertiente del Pacífico desde Sinaloa hasta Chiapas, así como en Estado de México, Morelos, Puebla y Veracruz; fuera del país se le encuentra desde Guatemala hasta Panamá.

14. *Ficus yoponensis* Desv. Ann. Sci. Nat. Bot. 2, 18: 310. T. 8, Fig. 1 (!) 1842. (Fig. 1F).

Árboles perennifolios de 10-35 m de alto, tallos monopódicos, contrafuertes definidos, fuste recto, corteza lisa, grisácea, con exudado blanco, abundante, con una copa densa y redondeada, verde pálida. Yema foliar terminal de 10-80 mm de largo, 2-4 mm de ancho, verde a verde amarilla en fresco, parda o verde en material seco, glabra o pilosa en la base; entrenudos de 5-10 mm de largo, 2-3.5 mm de ancho, pardos, amarillos o grises, lisos, glabros. Pecíolo de 12-30-mm de largo, 2-3 mm de ancho, pardo verde o verde oscuro, estriado, glabro; lámina foliar de 7-13.5 cm de largo, 3-6.5 cm de ancho, 2.3-3.2 veces más larga que ancha, oblanceolada a elíptica, verde amarilla o verde opaca, coriácea; base atenuada a ligeramente truncada; ápice acumulado o cortamente apiculado; haz verde, glabro o en raras ocasiones seríceo; envés verde amarillento, glabro o seríceo, venas secundarias amarillas, tenues, 14 a 19 pares, opuestos en el primer y segundo par, los demás subopuestos. Siconos de 8-18 mm de largo, 8-18 mm de diámetro, esferoides, verdes con máculas circulares u ovaladas, amarillas o blancas en material fresco, verdes o pardos, con máculas amarillas o pardos en material seco, glabros, flores blancas en fresco; ostíolo de 1-1.7 mm de diámetro; brácteas basales de 0.4-1.2 mm de largo, 1-1.8 mm de ancho, pardas, con el ápice agudo, glabras; pedúnculo de 6-9 mm de largo, 1-1.5 mm de ancho, verde opaco o pardo, glabro.

Resumen taxonómico

Material examinado. CHIAPAS: Mpio. Ocosingo. Zona arqueológica de Yaxchilán, (16°53'53"N, 100°12'12"O), A. Rincón 974 (F, MEXU, MO). GUERRERO. Mpio. Atoyac de Álvarez: 4 km al NE de El Paraíso (17°21'49"N, 90°57'52"O), G. Ibarra et al. 5940 (IEB, MEXU). OAXACA. Municipio Santa María Chimalapa: paso de la Cueva del río del Corte, cerca de 2-4 km al NE de Santa María (16°56'00"N, 94°40'00"O),

H. Hernández 2029 (MO).

Comentarios taxonómicos

La colecta de esta especie en el área de estudio fue realizada en vegetación ruderal con elementos remanentes de un bosque tropical perennifolio a 930 m snm. La floración y fructificación probablemente se presentan durante todo el año. La presencia de *F. yoponensis* en Puebla y Veracruz hasta Campeche y Chiapas, así como Oaxaca está documentada. No se había recolectado en Guerrero. Se distribuye en Centroamérica y en Sudamérica hasta Bolivia. En Ibarra-Manríquez y Wendt (1992), así como en Berg y Villavicencio (2004) se encuentran publicadas ilustraciones de esta especie.

Discusión

La diversidad de especies de *Ficus* en Veracruz, Chiapas y Oaxaca es de 20, 19 y 18 especies, respectivamente (Serrato et al., 2004). Los resultados obtenidos en este trabajo ubican a Guerrero como la cuarta entidad más diversa del género en México, con 13 especies, 5 de las cuales se registran por primera vez dentro de sus límites geopolíticos (*F. crocata*, *F. lapathifolia*, *F. membranacea*, *F. pringlei* y *F. yoponensis*). Con respecto al registro previo de *F. lapathifolia* por Standley (1922), es necesario aclarar que se trató de la identificación incorrecta de una especie del subgénero *Urostigma*. Burger (1977) indicó que bajo este epíteto específico se determinó material perteneciente a *F. morazaniana* W.C. Burger, un nombre que actualmente se considera sinónimo de *F. crocata* (Miq.) Miq. (Berg y Villavicencio, 2004). En Standley (1922) y en listados florísticos de distintas zonas del área de estudio se mencionan 22 especies de *Ficus*, 11 de las cuales están consideradas actualmente como sinónimos. Para el caso de *F. costaricana* y *F. inamoena* puede afirmarse que son taxones que no se encuentran en México y que su registro para el área de estudio es incorrecto.

De las 13 especies reconocidas para Guerrero, 8 se encontraron en la vegetación de galería y/o el bosque tropical caducifolio, lo que en parte se explica, porque este último es el tipo de vegetación más extendido en la entidad (28.7%), aunque la estimación de este porcentaje lo comparte con el bosque tropical subcaducifolio (Palacio-Prieto et al., 2000). Lo anterior confirma su importancia en México, donde se le ha propuesto dentro de las ecorregiones prioritarias para la conservación de la biodiversidad, tanto mundial (Olson y Dinerstein, 2002) como nacional (Ceballos y García, 1995; Cué-Bär et al., 2006). La recurrente presencia de las especies de *Ficus* con




Figura 1. Mapas de la distribución geográfica de las especies de *Ficus* en el estado de Guerrero. A) *Ficus citrifolia* (triángulo), *F. petiolaris* (círculo); B) *F. cotinifolia*; C) *F. crocata* (círculo), *F. pringlei* (cuadro), *F. velutina* (triángulo); D) *F. insipida* (círculo), *F. pathatifolia* (cuadro), *F. maxima* (triángulo); E) *F. membranacea* (triángulo), *F. pertusa* (círculo), y F) *F. obtusifolia* (círculo), *F. yoponensis* (triángulo).




Figura 2. *Ficus citrifolia* (Gual 557). A, rama con hojas y siconos; B, yema foliar; C, siconos; D, brácteas basales del sicono.




Figura 3. *Ficus cotinifolia* (Durán et al. 124). A, rama con hojas y siconos; B, yema foliar; C, venación de la lámina foliar; D, siconos.




Figura 4. *Ficus crocata* (Diego y Ludlow, 7349). A, rama con hojas y siconos; B, yema foliar; C, venación de la lámina foliar; D, brácteas basales y ostíolo de los siconos.




Figura 5. *Ficus obtusifolia* (Velázquez, 1247). A, rama con hojas y siconos; B, sicono; C y D, detalles de las brácteas basales y el ostíolo de los siconos.




Figura 6. *Ficus petiolaris* (Durán 94). A, rama con hojas y siconos; B, yema foliar; C, brácteas basales y ostíolo de los siconos.




Figura 7. *Ficus velutina* (Durán et al. 125). A, rama con hojas y siconos; B, yema foliar; C, venación de la lámina foliar; D, detalle de la venación; E, brácteas basales y ostíolo de los siconos.

la vegetación de galería en el estado (8 especies) confirma lo descrito por Rzedowski (1978).

La distribución altitudinal del género en Guerrero, desde el nivel del mar hasta los 2 100 m snm, coincide con los resultados de estudios previos efectuados en México (Ibarra-Manríquez y Wendt, 1992; Serrato et al., 2004; Piedra-Malagón et al., 2006; Carvajal, 2007). Se ha sugerido que en altitudes mayores la posibilidad de encontrar especies de *Ficus* decrece drásticamente, ya que el riesgo de que se presenten heladas se incrementa y esta clase de eventos acentúa la mortalidad de los polinizadores (Bronstein, 1989; Harrison, 2005).

De las especies endémicas de México presentes en Guerrero, *F. petiolaris* es la que tiene mayor distribución (13 municipios), lo que contrasta con *F. lapathifolia*, que hasta ahora únicamente se ha localizado en Atoyac de Álvarez. Entre las especies no endémicas, las más

frecuentes en las entidades municipales fueron *F. cotinifolia* (36) y *F. insipida* (26). Estos taxones también fueron catalogados por Serrato et al. (2004) entre los de amplia distribución nacional. *Ficus* se ha recolectado en 50 de los 75 municipios de la entidad, lo que representa el 66.6% del total; entre los que destacan por su mayor cantidad de especies están Chilpancingo de los Bravo (11 especies), Atoyac de Álvarez (9), Acapulco de Juárez (8) y José Azueta (8). A pesar de que lo anterior apunta que la prospección florística para el género podría considerarse satisfactoria, se sugiere continuar con las expediciones botánicas en áreas poco exploradas, ya que es posible que el territorio guerrerense depare todavía la presencia de nuevos registros, como aconteció con *F. yoponensis*, colectada apenas en noviembre del 2008 o el caso ya explicado de *F. aurea*.

Es interesante que el número de especies en el

municipio de Chilpancingo de los Bravo es el mismo que se contabilizó en la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, Veracruz, que fue el área protegida con mayor cantidad de elementos del género en México (Serrato et al., 2004). Dada la carencia de reservas en Guerrero, una estrategia inicial para seleccionar áreas de conservación podría tomar como punto de partida algunos de los resultados aquí presentados, por ejemplo, los municipios con mayor riqueza de especies o considerar las localidades de las especies endémicas o de las presentes en el bosque tropical caducifolio y en la vegetación de galería asociada a éste. Finalmente, la presente contribución se suma a evidencias previas que señalan el estado de Guerrero como uno de los territorios florísticamente más relevantes de México, que justifica plenamente incrementar esfuerzos que aseguren la conservación de sus tipos de vegetación, particularmente los bosques tropicales caducifolios y mesófilos de montaña.

Agradecimientos

A los curadores de los herbarios CH, ENCB, F, FCME, HUAP, HUMO, IEB, INIF, MEXU, MO, UAMIZ y XAL, así como a la Dra. Nelly Diego, encargada del laboratorio de Plantas Vasculares, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su apoyo para la revisión de los ejemplares incluidos en el presente estudio. El primer autor agradece la beca de licenciatura con la que fue distinguido por el Programa de Apoyo a Proyecto de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT, UNAM), dentro del proyecto “Diversidad y biogeografía del género *Ficus* (Moraceae) en México”, clave IN229107-3; este proyecto también apoyó la consulta de los herbarios y el trabajo de campo. Las ilustraciones de las especies fueron amablemente realizadas por Ramiro Cruz Durán, Bibiana González y Óscar Montiel Morales. Un reconocimiento para José de Jesús Fuentes Junco y Nahú González Castañeda, por la elaboración de la figura 1. Nahú González y Ma. Guadalupe Cornejo Tenorio ayudaron en la captura de registros de la base de datos, la revisión de los herbarios y en el trabajo de campo. Por otro lado, Alberto Valencia García conformó la base de datos para facilitar la citación de los ejemplares consultados. Finalmente, las correcciones y sugerencias de los árbitros anónimos ayudaron a mejorar el contenido del presente estudio.

Literatura citada

- Berg, C. C. 1989. Classification and distribution of *Ficus*. *Experientia* 45:605-611.
- Berg, C. C. 1990. Reproduction and evolution in *Ficus* (Moraceae): traits connected with the adequate rearing of pollinators. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 55:169-185.
- Berg, C. C. 2001. Moreae, Artocarpeae, and *Dorstenia* (Moraceae) with introductions to the family and *Ficus* and with additions and corrections to Flora Neotropica monograph 7. *Flora Neotropica Monograph* 83:1-346.
- Berg, C. C. 2007. Proposals for treating four species complexes in *Ficus* subgenus *Urostigma* section Americanae (Moraceae). *Blumea* 52:295-312.
- Berg, C. C. y J. F. Simomis. 1981. The *Ficus* flora of Venezuela: five species complexes discussed and two new species described. *Ernestia* 6:1-12.
- Berg, C. C., M. Vázquez y F. Kooy. 1984. *Ficus* species of Brazilian Amazonia and the Guianas. *Suplemento Acta Amazonica* 14:159-194.
- Berg, C. C. y X. Villavicencio. 2004. The species of *Ficus* in Bolivia. *Ilicifolia* 5:65-129.
- Bronstein, J. L., 1989. A mutualism at the edge of its range. *Experientia* 45:622-637.
- Burger, W. C. 1974. Ecological differentiation in some congeneric species of Costa Rica flowering plants. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 61:297-306.
- Burger, W. C. 1977. Moraceae. *Fieldiana Botany* 40:94-215.
- Carauta, P. P. J. y B. E. Diaz. 2002. *Figueiras no Brasil*. Editora Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 211 p.
- Carreto, B. y A. Almazán. 2005. Vegetación de la laguna de Tuxpan. *Estudios florísticos en Guerrero* 14. Prensas de Ciencias, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 32 p.
- Carvajal, S. 1995. Nuevas combinaciones en especies del género *Ficus* L. (Moraceae subgénero *Pharmacosycea*) de México. *Boletín del Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara* 1: 477-484.
- Carvajal, S. 2007. Moraceae. *Flora del Bajío y de regiones adyacentes* 147:1-57.
- Carvajal, S. y C. Peña-Pinela. 1997. *Ficus jacquelineae* (Moraceae, subgen. *Urostigma*) a new name for a Mexican fig. *Boletín del Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara* 4: 57-59.
- Carvajal, S., R. Rivera E. y H. Palacios J. 2001. Nuevas combinaciones en especies del género *Ficus* L. subgénero *Urostigma* (Moraceae) de México. *Boletín del Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara* 8:127-136.
- Ceballos, G. y A. García. 1995. Conserving Neotropical biodiversity: the role of dry forests in Western Mexico. *Conservation Biology* 9:1349-1356.
- Cook, J. M. y J. Y. Rasplus. 2003. Mutualists with attitude: coevolving fig wasps and figs. *Trends in Ecology and Evolution* 18:241-248.
- Corner, E. J. H. 1962. The classification of the Moraceae. *Gardens Bulletin of Singapore* 19:187-252.
- Cué-Bär, E. M., J. L. Villaseñor, J. J. Morrone y G. Ibarra-Manríquez. 2006. Identifying priority areas for conservation in Mexican tropical deciduous forest based on tree species. *Interciencia* 31:712-719.

- Diego-Pérez, N. 2000. lagunas Playa Blanca, El Potosí y Salinas del Cuajo y zonas circundantes. Estudios florísticos en Guerrero 10. Prensas de Ciencias, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 33 p.
- Diego-Pérez, N. y L. Lozada-Pérez. 1994. Laguna de Tres Palos. Estudios florísticos en Guerrero 3. Prensas de Ciencias, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 29 p.
- Felger, R. y C. Lowe. 1970. New combination for plant taxa in northwestern Mexico and southwestern of Unites States. Journal of the Arizona-Nevada Science 6:83.
- Ferrusquía-Villafranca, I. 1998. Geología de México: una sinopsis. In Diversidad biológica de México: orígenes y distribución, T. P. Ramamoorthy, R. Bye, A. Lot y J. Fa (eds.). Instituto de Biología. Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. p. 3-108.
- Figueredo de Cotín, E. 1980. Atlas geográfico e histórico del estado de Guerrero. FONOPAS. Gobierno del estado de Guerrero. 171 p.
- Fonseca, R. M. y L. Lozada P. 1993. Laguna de Coyuca. Estudios florísticos en Guerrero No. 1. Prensas de Ciencias, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 23 p.
- Gallardo, C. 1996. Parque Ecológico La Vainilla, Zihuatanejo, Guerrero. Estudios florísticos en Guerrero 8. Prensas de Ciencias, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 61 p.
- Gorelick, R. 2001. Did insect pollination cause increased seed plant diversity? Biological Journal of the Linnean Society 74:407-427.
- Gual, D. M. 1995. Cañón del Zopilote (Área Venta Vieja). Estudios florísticos en Guerrero 6. Las Prensas de Ciencias, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 39 p.
- Harrison, R. D. 2005. Figs and the diversity of tropical rainforests. BioScience 55:1053-1064.
- Ibarra-Manríquez, G. 1991. *Ficus* (Moraceae): un género interesante para estudios en ecología y sistemática tropical. Ciencia 42:283-293.
- Ibarra-Manríquez, G. y T. L. Wendt. 1992. El género *Ficus*, subgénero *Pharamacosycea* (Moraceae) en Veracruz, México. Boletín de la Sociedad Botánica de México 52:3-29.
- Lozada, L. 1994. Laguna de Mitla. Estudios florísticos en Guerrero 2. Prensas de Ciencias, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 44 p.
- Machado, C. A., N. Robbins, M. Thomas, P. Gilbert y E. A. Herre. 2005. Critical review of host specificity and its coevolutionary implications in the fig/fig wasp mutualism. Proceedings of the National Academy of Sciences 102:6558-6565.
- Meza, L. y J. López G. 1997. Vegetación y mesoclima de Guerrero. Número especial 1. Prensas de Ciencias, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 53 p.
- Olson, D.M. y E. Dinerstein. 2002. The Global 200: priority ecoregions for global conservation. Annals of the Missouri Botanical Garden 89:99-224.
- Palacio-Prieto, J. L., G. Bocco, A. Velázquez, J. F. Mas, F. Takaki-Takaki, A. Victoria, L. Luna-González, G. Gómez-Rodríguez, J. López-García, M. Palma, I. Trejo-Vázquez, A. Peralta, J. Prado-Molina, A. Rodríguez-Aguilar, R. Mayorga-Saucedo y F. González-Medrano. 2000. La condición actual de los recursos forestales en México: resultados del Inventario Forestal Nacional 2000. Investigaciones Geográficas, Boletín Instituto de Geografía UNAM 43:83-203.
- Pennington, T. D. y J. Sarukhán. 2005. Árboles tropicales de México. Manual para la identificación de las principales especies, tercera edición. Universidad Nacional Autónoma de México y Fondo de Cultura Económica, México, D. F. p. 142-145.
- Piedra-Malagón, E. M., Ramírez, R. y G. Ibarra-Manríquez. 2006. El género *Ficus* (Moraceae) en el estado de Morelos, México. Acta Botánica Mexicana 75:45-75.
- Quintana, C. R. y S. Carvajal. 2001. Las especies jaliscienses del género *Ficus* L. (Moraceae). Boletín del Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara 8:1-64.
- Rzedowski, J. 1978. Vegetación de México. Limusa, México, D. F. 432 p.
- Rzedowski, J. 1991. Diversidad y orígenes de la flora fanerogámica de México. Acta Botánica Mexicana 14:3-21.
- Serrato, A., G. Ibarra-Manríquez y K. Oyama. 2004. Biogeography and conservation of the genus *Ficus* (Moraceae) in Mexico. Journal of Biogeography 31:475-485.
- Shanahan, M., S. So, S. G. Compton y R. Corlett. 2001. Fig-eating by vertebrate frugivores: a global review. Biological Review 76:529-572.
- Standley, P. C. 1917. The Mexican and Central American species of *Ficus*. Contributions from the United States National Herbarium 20:1-35.
- Standley, P. C. 1922. Trees and shrubs of Mexico. Contribution of the United Sates National Herbarium 23:171-516.
- Vargas, A. y A. Pérez. 1996. Cerro Chilitépetl y alrededores (cuenca del Balsas). Estudios florísticos en Guerrero 7. Prensas de Ciencias, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 49 p.
- Velázquez, M. E., R. M. Fonseca y E. Domínguez. 2003. Bosque de *Quercus* en Tixtla de Guerrero. Estudios florísticos en Guerrero 16. Prensas de Ciencias, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F. 45 p.
- Verduzco, C. y L. C. Rodríguez. 1995. El Rincón de la Vía. Estudios florísticos en Guerrero 4. Prensas de Ciencias, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 43 p.
- Villaseñor, J. L. 2001. Catálogo de autores de plantas vasculares de México. Instituto de Biología, UNAM / Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México, D. F. 40 p.
- Villaseñor, J. L. 2003. Diversidad y distribución de las Magnoliophyta de México. Interciencia 28:160-184.
- Villaseñor, J. L. 2004. Los géneros de plantas vasculares de la flora de México. Boletín de la Sociedad Botánica de México 75:05-135.
- Weiblen, G.D., 2002. How to be a fig wasp. Annual Review of Entomology 47:299-330.