



Eclética Química

ISSN: 0100-4670

atadorno@iq.unesp.br

Universidade Estadual Paulista Júlio de

Mesquita Filho

Brasil

Santos, Larissa Macedo dos; Simões, Marcelo Luiz; Montes, Célia Regina; Melfi, Adolpho Jose;
Martin-Neto, Ladislau

VIABILIDADE DO EMPREGO DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% PARA A REMOÇÃO DE ÍONS
PARAMAGNÉTICOS EM AMOSTRAS DE SOLOS E SUAS RESPECTIVAS FRAÇÕES FÍSICAS

Eclética Química, vol. 35, núm. 3, 2010, pp. 55-60

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

Araraquara, Brasil

Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42915812004>

- ▶ Como citar este artigo
- ▶ Número completo
- ▶ Mais artigos
- ▶ Home da revista no Redalyc

redalyc.org

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal
Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto



centrações variáveis de compostos como, matéria orgânica, nutrientes (principalmente nitrogênio), sais (incluindo sais de sódio), demanda química de oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio e patógenos, dependendo da natureza do esgoto bruto e do tipo de tratamento empregado [2].

A matéria orgânica do solo é um componente importante dos agroecossistemas por interferir tanto na qualidade do solo, e, por conseguinte, na produtividade das culturas, como na sustentabilidade ambiental [3].

Em solos tropicais e subtropicais altamente intemperizados, a matéria orgânica tem grande importância no fornecimento de nutrientes às culturas, na retenção de cátions, na complexação de elementos tóxicos e de micronutrientes, na estabilidade da estrutura, na infiltração e retenção de água, na aeração e na atividade e diversidade microbiana, constituindo assim, um componente fundamental para a capacidade produtiva do solo [4].

Nos últimos anos, a aplicação de espectroscopias como: ressonância magnética nuclear, ressonância paramagnética eletrônica, fluorescência de luz UV-visível e fluorescência induzida por laser vêm demonstrando grande potencial para auxiliar no entendimento dos processos relacionados com a dinâmica da matéria orgânica [5-9]. Contudo, a composição mineralógica dos solos tropicais pode dificultar as análises por ressonância magnética nuclear de ^{13}C no estado sólido e por ressonância paramagnética eletrônica. Solos com altos teores de Fe^{3+} , como os latossolos e argissolos, são de grande ocorrência no Brasil. O íon Fe^{3+} dos óxidos interfere nos espectros da ressonância magnética nuclear de ^{13}C no estado sólido e da ressonância paramagnética eletrônica. O tratamento das amostras de solo com ácido fluorídrico é uma estratégia para remover esse íon da amostra [10] e, assim, permitir a utilização dessas espectroscopias.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área experimental

O campo experimental está localizado no município de Lins-SP em área anexa a estação de esgoto municipal.

Classificação do solo

O solo é classificado como Agissolo Vermelho distrófico latossólico de textura média argilosa [11].

EET

O EET foi obtido por meio do sistema de lagoa de estabilização (Estação de Tratamento de Esgoto Municipal, Lins-SP).

Tratamento

200: irrigação com EET e umidade do solo 100% acima da capacidade de campo.

Coleta das amostras de solo

As amostras foram coletadas em maio de 2007, um ano e dois meses após o plantio da cana de açúcar sob irrigação com EET.

Amostragem

As amostras de solo foram coletadas aleatoriamente nas camadas superficiais (0-10 e 10-20 cm) e subsuperficiais (20-40, 40-60, 60-80 e 80-100 cm) nas parcelas experimentais.




Figura 1. Espectros de ressonância paramagnética eletrônica obtidos para a fração argila antes e após as lavagens com solução de ácido fluorídrico 10%. Detalhe mostrando o sinal atribuído ao padrão Cr^{3+} , linha larga em $g \approx 2,2$ atribuído a interação dipolar Fe^{3+} e o sinal do radical livre orgânico (RLO).

O espectro obtido para a fração argila sem tratamento com ácido fluorídrico (Figura 1) é caracterizado por uma linha larga centrada em $g \approx 2,2$ oriunda da superposição de linhas decorrentes de interações dipolares entre materiais ferromagnéticos. Contudo, não se exclui também a possibilidade de alargamento espectral associado com o aumento da taxa de relaxação por interação dipolar [14]. O alargamento espectral observado inviabiliza a detecção do sinal do radical livre orgânico e, assim, obter informações sobre a matéria orgânica. No entanto, no espectro obtido para a fração argila após o tratamento com ácido fluorídrico (Figura 1) foi observada significativa diminuição do sinal característico de íons Fe^{3+} . Esses resultados comprovam a viabilidade do tratamento com solução de ácido fluorídrico 10% para a fração argila. Contudo, nos espectros obtidos para as amostras de solo e fração areia após as lavagens com ácido

fluorídrico (Figura 2 e 3) não foi observado alteração significativa do sinal característico de íons paramagnéticos Fe^{3+} . Tal comportamento deve-se, provavelmente, ao alto teor de areia ($\approx 80\%$) do solo estudado fato este que pode influenciar significativamente na dissolução de silicatos, visto que a fração areia é composta principalmente por quartzo, o qual é característico por apresentar uma alta resistência ao tratamento com ácido fluorídrico [10].

Na Figura 1 é mostrado o espectro obtido para o radical livre orgânico que apesar de pouco intenso, confirma a melhora espectral obtida após o tratamento com solução de ácido fluorídrico 10%.

CONCLUSÕES

Considerando os resultados obtidos, concluimos que é possível a utilização da ressonância paramagnética eletrônica para avaliar a dinâmica da matéria orgânica de solos, com altos teores de íons paramagnéticos Fe^{3+} , irrigados com EET, a partir do estudo da fração argila, onde geralmente, encontra-se o maior percentual de matéria orgânica dos solos. Visto que, os resultados evidenciam a melhora espectral para a fração argila após o tratamento com solução de ácido fluorídrico 10%.

AGRADECIMENTOS

À Embrapa Instrumentação Agropecuária pela infra-estrutura cedida. À FAPESP, CNPq e CAPES pelo auxílio concedido.

ABSTRACT: Treated sewage effluent utilization for irrigation represents an antique, popular and attractive alternative to the common disposal of effluent to watercourses and includes three main purposes: effluent complementary treatment, water and nutrient source to the soil-plant system. However, because in Brazil no experiences in wastewater recycling exists consequently few scientific studies were carried out despite the importance of the subject. The present study aimed to evaluate by chemical and spectroscopy techniques the soil organic matter from soils irrigated with treated sewage effluent. Five treatments were evaluated: TSI (control) - irrigation with potable water and addition of the nitrogen as mineral fertilizer; T100, T125, T150 and T200 - irrigation with treated sewage sludge effluent and addition of the nitrogen as mineral fertilizer. The results obtained shown changes in the carbon contend and humification degree for the soils irrigated with treated sewage sludge effluent due to the increase activity of the decomposition of organic matter, stimulated by the increase of water in the soil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] M. Edraki, H.B. So, E.A. Gardner. *Agricultural Water Management*, 67 (2004) 157.
- [2] A. Feigin, I. Ravina, J. Shalheveth. *Irrigation with treated sewage effluent: management for environmental protection*: Berlin, Springer-Verlag, 1991. 224 p.
- [3] J. Diekow, L. Martin-Neto, D.M.B.P. Milori, P.C. Conceição, C. Bayer, J. Mieliaczuk. *Sistemas de preparo do solo e características espectroscópicas da matéria orgânica em ambientes tropicais e subtropicais brasileiros*: São Carlos, Embrapa Instrumentação Agropecuária.-Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 2005. 16 p.
- [4] F.J. Stevenson. *Humus Chemistry: genesis, composition, reactions*: New York, John Wiley, 1994. 496 p.
- [5] A. Jouraiphy, S. Amir, M.E. Gharous, J-C. Revel, M. Hafidi. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 56 (2005) 101.
- [6] J. Pajaczkowska, A. Sulkowska, W.W. Sulkowski, M. Jedrzejczuk. *Journal of Molecular Structure*, 651-653 (2003) 141.
- [7] J. Polak, W.W. Sulkowski, W.P. Bartoszek. *Journal of Molecular Structure*, 744-747 (2005) 983.
- [8] M. González-Pérez, L. Martin-Neto, S.C. Saab, E.H. Novotny, D.M.B.P. Milori, V.S. Bagnato, L.A. Colnago, W.J. Melo, H. Knicker. *Geoderma*, 118 (2004) 181.
- [9] L.M. Santos, M.L. Simões, W.T.L. Silva, D.M.B.P. Milori, C.R. Montes, A.J. Melfi, L. Martin-Neto. *Eclética Química*, 34 (2009) 39.
- [10] C.N. Gonçalves, R.S.D. Dalmolin, D.P. Dick, H. Knicker, E. Klamt, I. Kögel-Knabner. *Geoderma*, 116 (2003) 373.
- [11] Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. *Sistema Brasileiro de Classificação de Solos*: Rio de Janeiro, 1999. 412 p.
- [12] C.B. Tanner, M.L. Jackson. *Soil Science Society Proceedings*, 60-65 (1947).
- [13] L. Martin-Neto, O.R. Nascimento, J. Talamoni, N.R. Poppi. *Soil Science*, 151 (1991) 369.
- [14] E.H. Novotny, L. Martin-Neto. *Geoderma*, 106 (2002) 305.