



Agronomía Mesoamericana
ISSN: 1021-7444
pccmca@cariari.ucr.ac.cr
Universidad de Costa Rica
Costa Rica

Rodríguez-Quiel, Emigdio; Montenegro-Alonso, Ana Priscilla; Ureta-Reyes, Jose Carlos; Pitty-Suira, Norberto; González-Guevara, Francisco; Muñoz-Fuentes, Jorge
COMBATE BIOLÓGICO DE LA MUSTIA HILACHOSA (*Thanatephorus cucumeris*) EN EL FRIJOL EN PANAMÁ
Agronomía Mesoamericana, vol. 23, núm. 1, enero-junio, 2012, pp. 13-20
Universidad de Costa Rica
Alajuela, Costa Rica

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43723963002>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

COMBATE BIOLÓGICO DE LA MUSTIA HILACHOSA (*Thanatephorus cucumeris*) EN EL FRIJOL EN PANAMÁ¹

Emigdio Rodríguez-Quiel², Ana Priscilla Montenegro-Alonso³, Jose Carlos Ureta-Reyes³, Norberto Pitty-Suira³, Francisco González-Guevara², Jorge Muñoz-Fuentes²

RESUMEN

Combate biológico de la mustia hilachosa (*Thanatephorus cucumeris*) en el frijol en Panamá. El objetivo del presente trabajo fue determinar la capacidad biocontroladora de hongos y bacteria endofíticos en *T. cucumeris* (Frank) Donk en condiciones de campo. Se evaluó la aplicación de *Trichoderma* sp. (Cepa 2-Finca Margarita), *Trichoderma* sp. (Cepa 1-Colombia) y *M. anisopliae* (Colombia) en concentración de 2×10^7 conidias/ml de agua; *B. subtilis* a razón de 0,335; 0,670; 1,005 y 1,340 g i.a./l agua + Clorotalonil 36 g i.a./ha; Benomil 50 WP en dosis de 250 g i.a./ha y el testigo absoluto. Hubo significancia ($P \leq 0,0003$) entre los tratamientos, la de menor severidad de *T. cucumeris* se dio con la adición de *M. anisopliae*, seguido de *B. subtilis* con 1340 g i.a./l agua + Clorotalonil 36 g i.a./ha con 11,87% y *Bacillus subtilis* a 0,335 g i.a./l agua + Clorotalonil 36 g i.a./ha con 15,0%. Los tratamientos donde hubo mayor severidad fueron *B. subtilis* 0,670 g i.a./l agua + Clorotalonil 36 g i.a./ha, *Trichoderma* sp. (Cepa 2-Finca Margarita) y el testigo absoluto con 26,2; 22,25% y 21,85% de severidad, respectivamente. La ecuación de regresión para el experimento $Y = 2502,91 - 13,021^*Sev$, fue significativa e indicó pérdidas de 13,02 kg por cada uno por ciento de incremento de la enfermedad. En el análisis marginal el tratamiento con mayor ganancia fue *M. anisopliae*, con un beneficio neto de 28,34%.

Palabras clave: *Trichoderma*, *Metarrhizium*, *Bacillus subtilis*.

ABSTRACT

The biological control of web blight (*Thanatephorus cucumeris*) in common bean in Panama. The objective of this work was to evaluate the capacity of *Trichoderma* sp., *Metarrhizium anisopliae* and endophytic bacteria of *T. cucumeris* (Frank) Donk under field conditions, for the biological control of web blight (*T. cucumeris*) in beans. Applications of *Bacillus subtilis*, *Trichoderma* sp. (Strain 2-Villa Margarita), *Trichoderma* sp. (Strain 1-Colombia) and *M. anisopliae* (Colombia) at concentration of 2×10^7 conidia/ml of water, *B. subtilis* at rates of 0.335, 0.670, 1.005 and 1.340 g ai / ml of water + 36 g ai Chlorothalonil /ha, benomyl 50 WP with doses of 250 g ai / ha and a control treatment were conducted. Results revealed high differences ($P \leq 0.0003$) between treatments; the treatment with lower severity was *M. anisopliae*, followed by *B. subtilis* with 1,340 g ai /ml of water + Chlorothalonil at 36 g ai/ha with 11.87% and *B. subtilis* to 0,335 g ai /l of water + Chlorothalonil at 36 g ai/ha, with 15.0%. The treatments affected to the greatest degree were *B. subtilis* with 0,670 g ai/l of water + Chlorothalonil with 36 g ai/ha, *Trichoderma* sp. (Strain 2-Villa Margarita) and the control treatment with 26.2%, 22.25% and 21.85% of severity, respectively. The regression equation for the experiment $Y = 2502.91 - 13.021^* Sev$, was significant and indicated losses of 13.02 kg for each percent increase of the disease. The marginal analysis revealed that the treatment with highest gain was *M. anisopliae*, recording a net profit of 28.34%.

Keywords: *Trichoderma*, *Metarrhizium*, *Bacillus subtilis*.



¹ Recibido: 14 de mayo, 2011. Aceptado: 12 marzo, 2012. Trabajo que forma parte del proyecto Utilización de bioproductos y tecnologías limpias para la producción del frijol poroto en Panamá. Financiado por SENACYT.

² Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). erodriguezq15@yahoo.es; pancho125710@yahoo.com; j_alberto56@yahoo.es

³ Facultad de Ciencias Agropecuarias de Panamá. ana_priscilla88@hotmail.com; juxc0413@hotmail.com; norbertopitty@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La mustia hilachosa cuyo agente causal es el hongo *Thanatephorus cucumeris* (Frank) Donk, es en el cultivo de frijol poroto (*Phaseolus vulgaris* L.), la limitante biótica de mayor importancia en el país (Lorenzo 2009). Se presenta en terrenos infectados con períodos prolongados de lluvias, temperatura promedio de 26°C y humedad relativa de 75% (Rodríguez *et al.* 1999).

Se considera a la mustia hilachosa como la enfermedad más destructiva del frijol, por la defoliación rápida y drástica que causa. Ataca follaje, tallos, ramas, granos y vainas de la planta de frijol en cualquiera de sus estados fenológicos. En condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, puede causar una destrucción rápida de las plantas atacadas en una o dos semanas y pérdidas en el rendimiento de hasta 50% (Rodríguez *et al.* 1997, Rodríguez *et al.* 1999).

El hongo sobrevive de una estación a otra por medio de esclerocios y micelio, en los residuos de cosecha, como saprófito de suelo o colonizando desechos de otros cultivos (Brenes 1996).

Para el manejo de este patógeno, Rodríguez y Lorenzo (2009) recomiendan el uso de fungicidas sintéticos, complementarios a la siembra de variedades de resistencia intermedia. Las prácticas agronómicas reducen el daño provocado por este patógeno, pero los fungicidas químicos afectan negativamente al medio ambiente y a la salud humana.

Una alternativa de gran potencial en el manejo de esta enfermedad, es el combate biológico, el cual se basa en la reducción de la densidad de inóculo o actividad infecciosa, por uno o más organismos antagonistas (Morales *et al.* 2007).

La cepa de *Trichoderma* spp. causó de 90 a 100 % de mortalidad del hongo que causa la mustia hilachosa en frijol poroto, cuando se aplicó a un plato Petri por pote (Rijal y Shrestha 2002). El aislamiento proveniente de esclerocios refrigerados de *R. solani* resultó ser el más agresivo. El *Trichoderma* spp. proveniente del valle de Kathmandu resultó ser el antagonista de menor crecimiento. Al igual se demostró en experimentos de campo que aplicaciones al suelo de 100 kg/ha y tratamientos de semilla con 100 millones de conidias/mlilitro/10 gramos de semilla lograron los más altos porcentajes de control de la mustia (89,47%), lo que demuestra que a altas concentraciones del hongo,

mejores pueden ser los resultados de control sobre la mustia hilachosa.

Plántulas de poroto inoculadas con *B. subtilis*, *B. cereus* o *B. pumilus*, provocaron una reducción en la incidencia de la enfermedad causada por *Sclerotium rolfsii* de 72%, 79% y 26% respectivamente; comparado con el control. Tanto en las plántulas de algodón como de poroto, estos endofíticos redujeron el índice de la enfermedad en más del 50%. Estos resultados indican que las bacterias endofíticas pueden sobrevivir dentro de las plántulas y son agentes eficientes para el control biológico bajo condiciones de invernadero (Pleban *et al.* 1995). Esto indica que *B. subtilis* es eficiente en el control de hongos en el cultivo del frijol.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad biocontroladora de hongos y bacteria endofíticos en *T. cucumeris* (Frank) Donk en condiciones de campo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La prueba experimental en campo se estableció en la localidad de Caisán Centro, provincia de Chiriquí, Panamá a 08° 46' 03,7'' de latitud norte y 82° 47' 29,9'' de longitud oeste; durante los meses de octubre a enero, época tradicional para la siembra del poroto, el cual coincide con la época de mayor presión del inóculo de la enfermedad conocida como mustia hilachosa.

La semilla que se utilizó fue de la variedad criolla de poroto “Rosado”, la cual posee un período vegetativo que varía entre 75 y 80 días, muestra bajos rendimientos y es susceptible a la mustia hilachosa.

El diseño experimental utilizado fue el de Bloques Completamente al Azar, nueve tratamientos con cuatro repeticiones. Las unidades experimentales constaban de 10 m² (2,0 x 5,0 m), con cuatro surcos de 5 m de largo y separados a 0,50 m.

Se evaluó la aplicación sobre las semillas del frijol poroto y luego la aspersión en el follaje de *Trichoderma* sp. (Cepa 2-Finca Margarita) en concentración de 2 x 10⁷ conidias/ ml de agua; *Trichoderma* sp. (Cepa 1-Colombia) a dosis de 1500 g P.C/ha; *Metarrhizium anisopliae* (Colombia) a razón de 1000 g P.C/ha; *Bacillus subtilis* a razón de 0,335, 0,670; 1,005 y 1,340 g i.a./l agua + Clorotalonil 36 g i.a./ha; Benomil 50 WP a dosis de 250 g i.a./ha y el testigo absoluto (sin aplicaciones). Las aplicaciones de *Trichoderma* sp. (Cepa 1-

Colombia y Cepa 2-Finca Margarita), *Trichoderma* sp. y *Metarrhizium anisopliae* (Colombia) se realizaron a los 10, 25 y 40 días después de la emergencia (dde). En cambio los otros tratamientos fueron aplicados a los 15, 30 y 45 dde.

La preparación de la cepa nativa de *Trichoderma* sp. (Cepa 2-Finca Margarita), *Trichoderma* sp. y *M. anisopliae* requirió de una suspensión de esporas. El hongo se incrementó en el medio nutritivo PDA (Papa Dextrosa Agar) durante 12-15 días a temperatura ambiente. Posteriormente se procedió a su extracción, adicionando agua destilada a los platos petri y raspando suavemente con un asa. Una vez desprendida la mayor cantidad de micelio y/o esporas, se procedió al conteo utilizando una cámara hematocitométrica de Neubauer, obteniendo suspensiones de estas cepas a la concentración deseada.

Durante el periodo de ejecución del ensayo se evaluaron las plantas emergidas, la severidad de la enfermedad a los 40 y 60 días después de la siembra (dds), plantas cosechadas y el rendimiento comercial a 14% de humedad.

Para la determinación de la severidad de la enfermedad se utilizó la escala de evaluación de Schoonhoven y Pastor (1987), la cual estima el porcentaje de infeción de cada planta para luego calcular el promedio para toda la parcela.

Las variables cuantitativas evaluadas fueron analizadas con el programa SAS (2000). Se obtuvieron análisis de varianza (ANOVA), regresión y correlación. Para la diferenciación de medias, se utilizó el procedimiento de Duncan y de Tukey.

Con el objetivo de evaluar el progreso de la enfermedad a través del tiempo se obtuvo el área bajo la curva de progreso de la enfermedad (ABCPE), y se estimó mediante la fórmula:

$$\text{ABCPE} = \sum_{i=1}^{n-1} [(\chi_i + \chi_{i+1}) / 2] (t_{i+1} - t_i)$$

donde, n es el número de evaluaciones, χ la proporción de la enfermedad y $(t_{i+1} - t_i)$ es el intervalo entre dos evaluaciones consecutivas (Campbell y Madden 1990).

La comparación del área bajo la curva de los diferentes tratamientos, se realizó con un análisis de varianza y la comparación de medias a través de la prueba de Duncan. Además se realizó un análisis

marginal, el cual es un procedimiento para calcular las tasas marginales de retorno entre tecnologías, iniciando con la de más bajo costo a la siguiente de mayor inversión, y comparando las tasas de retorno contra una de mínima aceptación (Evans 2005).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La primera variable evaluada en este ensayo fue la de plantas emergidas, la cual no presentó diferencias estadísticas. Esto indica que esta variable no tuvo influencia directa de los tratamientos y por lo tanto el ensayo inició con iguales condiciones para los nueve tratamientos evaluados.

La severidad fue evaluada mediante dos lecturas realizadas a los 40 y 60 días después de la siembra pero dicha información fue analizada estadísticamente en conjunto y no por separado; con la finalidad de determinar el efecto acumulativo que provoca esta enfermedad a lo largo del tiempo y así evaluar si hubo interacción entre ambos períodos de lectura.

Para realizar los análisis estadísticos de variables no paramétricas como la de severidad, se transformó la variable a raíz cuadrada $\sqrt{Y+1}$ con el propósito de normalizar los datos y homogenizar la varianza.

Los resultados para severidad evidencian que hubo significancia entre los tratamientos, los bloques, los períodos y en los tratamientos vs. los períodos de 40 y 60 días después de la siembra. En donde la probabilidad para tratamientos fue $\leq 0,0003$; para bloques $\leq 0,0001$; entre los períodos de $\leq 0,0001$ y para tratamientos vs. períodos de $\leq 0,0247$. El análisis mostró un coeficiente de variación de 12,29% lo que indica la confiabilidad de la información colectada.

Hubo diferencia significativa ($P \leq 0,0003$) entre los tratamientos.

Entre períodos también se presentó alta significancia, lo que demuestra que existió interacción de la severidad a los 40 y 60 días después de la siembra y que los valores en dichos períodos fueron acumulativos y progresivos, por lo que el aumento o disminución observada al final del periodo de evaluación fue consecuencia exclusiva del efecto de los diferentes tratamientos evaluados. Además, indica que los valores obtenidos durante ambos períodos de lectura fueron diferentes debido a las condiciones climáticas que se presentaron, las cuales fueron favorables para el desarrollo de la enfermedad.




Figura 1. Severidad de *T. cucumeris* a los 40 y 60 días después de la siembra de frijol en la variedad criolla Rosado bajo tratamiento con hongos y bacterias endofíticas. Caisán, Panamá. 2009-2010.

La interacción tratamientos vs. períodos fue significativa, lo que demuestra que la enfermedad tuvo un efecto acumulativo y que los tratamientos aplicados a los 40 y 60 dds tuvieron un efecto sobre esta, ya sea reduciéndola, manteniéndola o incrementándola, lo que permitió establecer cuál de todos los tratamientos logró el mejor control de la enfermedad.

En la mayoría de los tratamientos se dio un aumento de la severidad de la enfermedad a lo largo del ciclo fisiológico del cultivo con excepción del tratamiento químico (benomil) (Figura 1); mientras que el tratamiento biológico a base de *M. anisopliae* logró los menores valores de área foliar afectada (12,5% de severidad), el tratamiento a base de *Trichoderma* sp. (Cepa 1-Colombia) fue el que redujo el nivel de infección del patógeno en la planta y en la parcela. A pesar de que este tratamiento tuvo uno de los mayores porcentajes de severidad a los 40 dds fue de los mejores ya que redujo la infección, lo que sugiere que este tratamiento necesita aplicaciones más tempranas para un manejo de la enfermedad durante las fases iniciales de desarrollo de la misma.

Al igual que las plantas emergidas, los resultados del análisis de varianza para plantas cosechadas no fueron significativos ni entre tratamiento ni entre bloques. Esto indica que la severidad de la enfermedad no

influyó en el número de plantas presentes al final del experimento. En cuanto a la variable de rendimiento los resultados del análisis de varianza indican que no existió diferencia significativa entre los tratamientos.

Los mejores rendimientos lo presentaron los tratamientos de *M. anisopliae* y *Trichoderma* sp. (Cepa 2-Finca Margarita) (Figura 2). En cambio, el tratamiento químico fue el que obtuvo el menor rendimiento en comparación con los demás; lo cual indica una tendencia a que los productos biológicos a base de bacterias y hongos endofíticos obtuvieron una mayor cantidad de kilogramos/hectárea de grano y a la vez se vieron afectados en menor grado por la enfermedad.

Para estimar el efecto de la severidad en el rendimiento del frijol poroto, se realizaron análisis de regresión lineal, por el origen y cuadrática, permitiendo de esta manera estimar valores cuando la ecuación mejor se ajustara. Este análisis se realizó de manera general, es decir, evaluando el efecto que provoca en el rendimiento final la severidad en ambos períodos.

El resultado del análisis de regresión lineal llevado a cabo de manera general indica que hubo significancia y que el modelo de regresión resultante fue $Y = 2502,91 - 13,021 * \text{Sev}$. Esto nos indica que por cada grado de incremento de la severidad durante todo el desarrollo fisiológico del cultivo, se produjo




Figura 2. Rendimiento en kg/ha al 14% de humedad en frijol variedad criolla Rosado, bajo protección contra *T. cucumeris*, con base en hongos y bacterias endofíticas. Caisán, Panamá. 2009-2010.

una reducción en el rendimiento de 13,02 kilogramos (Figura 3).

El análisis de regresión efectuado a los 40 dds muestra que con la adición de *B. subtilis* 1,005 g i.a./ha + Clorotalonil 36 g i.a./ha, *M. anisopliae* y *Trichoderma* sp. (Cepa 2-Finca Margarita) se obtuvo la menor reducción en el rendimiento, lo que significa que estos tratamientos controlaron en mayor grado al patógeno a los 40 días dds. En cambio, a los 60 dds los mayores rendimientos se obtuvieron con: *M. anisopliae*, *B.*

subtilis 1,005 g i.a./ha + clorotalonil 36 g i.a./ha y *Trichoderma* sp. (Cepa 1- Colombia); lo que demuestra que hubo una menor afección por parte del patógeno y por lo tanto pueden considerarse como los tratamientos más adecuados para el manejo de la enfermedad.

Al realizar el análisis de varianza del área bajo la curva de progreso de la enfermedad no se logró diferencia significativa entre los tratamientos.

La máxima severidad que se logró a los cuarenta días, en el tratamiento de *Trichoderma* sp. (Cepa 1-Colombia) y *B. subtilis* 0,335 g i.a./ha + clorotalonil 36 g i.a./ha, mientras que la menor fue en el de *B. subtilis* 1,005 g i.a./ha + clorotalonil 36 g i.a./ha. En cambio a los 60 dds la mayor afección se dio con el mismo tratamiento que en la primera lectura, el cual fue *B. subtilis* 0,335 g i.a./ha + clorotalonil 36 g i.a./ha, mientras que el menor porcentaje de daño se dio en el tratamiento de *M. anisopliae* (Figura 4).

En el periodo de veinte días que pasó entre la primera y segunda lectura hubo aumento en el porcentaje del área foliar afectada en todos los tratamiento con excepción del *Trichoderma* sp. (Cepa 1-Colombia), el cual redujo de 21,25% a 16,25% y el benomil se mantuvo en 15,0%, lo que indica que solo el tratamiento a base de *Trichoderma* sp. es el que logra reducir el % de severidad del patógeno y así disminuir el daño producido a lo largo del ciclo fisiológico del cultivo.




Figura 3. Modelo de regresión lineal resultante para el rendimiento vs. severidad de la mustia hilachosa a los 40 y 60 días después de la siembra, en la variedad Rosado de frijol criollo. Caisán, Panamá. 2009-2010.




Figura 4. Área Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad causada por la mustia hilachosa bajo tratamientos de combate biológico con hongos y bacteria evaluados a los 40 y 60 días después de la siembra, en la variedad Rosado de frijol criollo. Caisán, Panamá. 2009-2010.

El tratamiento evaluado que resultó superior a los demás fue el de hongo endofítico *M. anisopliae* (Cepa 1 – Colombia), sin embargo es necesario considerar el costo y beneficio neto en comparación con otros tratamientos que no fueron superiores en cuanto al control de la enfermedad pero que resulten más rentables para los productores.

Debido a esto se efectuó un análisis marginal para obtener las tasas marginales de retorno (TMR), poder comparar los tratamientos y establecer cuál de ellos es el más conveniente para los productores de frijol poroto.

El *Trichoderma* sp. Cepa 1 y *M. anisopliae* constituyen cepas comerciales vendidas por una empresa comercial, mientras que *Trichoderma* sp. Cepa 2 es una cepa nativa colectada en Finca Margarita ubicada en Alánje y conservada en la estación del IDIAP (Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá) en Cerro Punta, Chiriquí (Cuadro 1).

En el análisis que se le realizó a todos los tratamientos evaluados, se excluyeron seis tratamientos (tratamientos dominados) porque implicaban mayores gastos y menores ganancias en comparación con otros tratamientos por lo cual ningún productor consideraría

Cuadro 1. Costo de los productos biológicos y químicos para el manejo de *Thanatephorus cucumeris* en frijol. Caisán, Panamá. 2009-2010.

Tratamientos	Cantidad	Precio/Unidad (\$ U.S.)
<i>Bacillus subtilis</i>	1 l	11,70
Clorotalonil	1 l	10,90
Benomil 50 WP	1 kg	16,00
<i>Trichoderma</i> sp. (Cepa 1 - Colombia)	1 kg ($2,5 \times 10^{10}$ esporas/gramo)	21,00
<i>Trichoderma</i> sp. (Cepa 2 - Finca Margarita)	$2,0 \times 10^7$ conidios/ml de agua	0,15
<i>Metarrhizium anisopliae</i>	1 kg ($2,5 \times 10^{10}$ esporas/gramo)	21,00

utilizarlos. Los tres mejores fueron: testigo absoluto, *Trichoderma* sp. (Cepa 2-Finca Margarita) y *M. anisopliae*.

La tasa de retorno marginal de comparar testigo absoluto con *Trichoderma* sp. (Cepa 2-Finca Margarita) es de 2295% y la de comparar *Trichoderma* sp. (Cepa 2-Finca Margarita) con *M. anisopliae* es de 10% (Figura 5). La mayor tasa de retorno marginal




Figura 5. Curva de Beneficios Netos para todos los tratamientos de combate biológico de la mustia hilachosa en frijol criollo variedad Rosado. Caisán, Panamá. 2009-2010.

no indica que dicho tratamiento es el mejor, para esto es necesario comparar dichos valores con la tasa de retorno mínima aceptable para el agricultor, la cual se estableció que es de 50% ya que estos productos biológicos solo representan un ajuste de la práctica actual del agricultor y además es necesario calcular el residuo que resulta de sustraer el retorno requerido del beneficio neto.

El residuo para el testigo absoluto fue \$2262, para *Trichoderma sp.* (Cepa 2-Finca Margarita) fue de \$2790 y para *M. anisopliae* fue de \$2781, esto indica que el mejor tratamiento resultaría ser el de mayor residuo, sin embargo los dos tratamientos biológicos poseen poca diferencia entre los residuos y entre los beneficios netos por lo cual fueron prácticamente iguales en cuanto a rentabilidad.

El comportamiento general de los tratamientos para el manejo biológico de *T. cucumeris* indica que los productos utilizados ejercieron control del patógeno sin afectar la producción. La severidad de la enfermedad durante todo el ciclo fisiológico del cultivo tuvo un efecto significativo en la reducción del rendimiento final, en una relación 1:13.02. No hubo significancia para los parámetros evaluados de plantas emergidas, cosechadas y rendimiento comercial al 14% de humedad. El efecto de todos los tratamientos aplicados fue significativo en ambos períodos para la variable de severidad, lo que demuestra que la enfermedad tuvo un efecto acumulativo a lo largo del tiempo y que los tratamientos aplicados tuvieron

efecto en el patógeno. El tratamiento más eficiente en la protección de la planta fue el del hongo endofítico *M. anisopliae* (Cepa 1-Colombia).

El alto porcentaje de severidad en la primera lectura después de la siembra en el tratamiento de *Trichoderma sp.* (Cepa 1-Colombia) y su posterior reducción en la segunda evaluación, indica que este hongo tuvo un efecto tardío en el control del patógeno.

LITERATURA CITADA

- Brenes, BM. 1996. Epidemiología y manejo de la mustia hilachosa del frijol común causada por *Rhizoctonia solani* (en línea). San José, CR. Consultado 24 oct. 2009. Disponible en http://www.mag.go.cr/congreso_agronomico_X/a50-2388-II_031.pdf
- Lorenzo, E. 2009. Manejo integrado de la mustia hilachosa en el cultivo de frijol poroto (*Phaseolus vulgaris* L.). s.e. IDIAP. 16 p.
- Campbell, CL; Madden, LV. 1990. Introduction to plant disease epidemiology. s.e. New York, US. Wiley & Sons. 532 p.
- Evans, EA. 2005. Análisis marginal: un procedimiento económico para seleccionar tecnologías o prácticas alternativas (en línea). Florida, US. Consultado 9 abr. 2010. Disponible en <http://edis.ifas.ufl.edu/fe573>.
- Morales, RA; Ríos, D; Muñoz, J; Concepción, R. 2007. Desarrollo y uso de bioproductos para el control de nematodos y sigatoka negra en plantaciones de plátano

- y banano: reporte final Proyecto IDIAP – FONTAGRO. s.e. 20 p.
- Rodríguez, EQ; Lorenzo, E; De Gracia, R; González, GD; González, F. 1997. Manual técnico del manejo integrado del frijol común o poroto (*Phaseolus vulgaris L.*) en el sistema de mínima labranza. s.e. Panamá, PA. IDIAP. 75 p.
- Rodríguez, E; Lorenzo, E; Acosta, M; González, F; Mora, B; Godoy, G. 1999. Manejo de la mustia hilachosa (*Thanatephorus cucumeris* (Frank)) en el cultivo del frijol común (*Phaseolus vulgaris L.*) (en línea). Agronomía Mesoamericana 10(1):99-108.
- Rodríguez, EQ; Lorenzo, E. 2009. Manual técnico: tecnologías para el manejo integrado del cultivo de frijol poroto (*Phaseolus vulgaris L.*) en Panamá. s.e. Panamá, PA. IDIAP. 32 p.
- Schoonhoven, A. Van; Pastor, M. 1987. Sistema estándar para evaluación de germoplasma de frijol (en línea). Cali, CO. Consultado 31 oct. 2009. Disponible en http://books.google.com/books?id=mpgIE_jDedMC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=CIAT+escalas+severidad+frijol+1987&source=bl&ots=CJobIWDC0M&sig=L_kigE4Lj3HhidRZX6WjpHdOpc&hl=es&ei=Dq7nSsSLMMPe8Qbb7qWHBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CDcQ6AEwCDgK#v=onepage&q=&f=false.