



Semina: Ciências Agrárias

ISSN: 1676-546X

semina.agrarias@uel.br

Universidade Estadual de Londrina

Brasil

Santos Barros de Moraes, Camila; Guimarães de Almeida, Lilian; Barros dos Santos, Marcus; Vieira Rossetto, Claudia Antonia

Resposta de plantas ao condicionamento osmótico de sementes de girassol

Semina: Ciências Agrárias, vol. 35, núm. 5, septiembre-octubre, 2014, pp. 2261-2274

Universidade Estadual de Londrina

Londrina, Brasil

Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=445744144002>

- ▶ Como citar este artigo
- ▶ Número completo
- ▶ Mais artigos
- ▶ Home da revista no Redalyc

redalyc.org

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal
Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

Resposta de plantas ao condicionamento osmótico de sementes de girassol

Plant response to sunflower seeds to osmotic conditioning

Camila Santos Barros de Moraes^{1*}; Lilian Guimarães de Almeida²;
Marcus Barros dos Santos²; Claudia Antonia Vieira Rossetto³

Resumo

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do condicionamento osmótico de sementes na emergência de plântulas e no desempenho de plantas de girassol. Sementes de três lotes de girassol da cultivar Catissol foram submetidas ao condicionamento osmótico com solução de polietilenoglicol a -2,0 MPa em sistema aerado, sob 15 °C por 8 horas e, posteriormente avaliadas pelos testes de germinação e de vigor. Em condições de campo, realizaram-se as avaliações de emergência de plântulas, de desenvolvimento das plantas, de produtividade e qualidade das sementes produzidas, bem como o acúmulo de macronutrientes nas sementes produzidas. O condicionamento osmótico favorece a sobrevivência das plantas, o acúmulo de massa de matéria seca da parte aérea de plantas a partir de 60 dias após a semeadura e o teor de óleo, em plantas provenientes de lotes de sementes de qualidade inferior. O condicionamento osmótico não aumenta a produtividade de sementes, mas favorece o vigor das sementes produzidas, independente da qualidade de sementes do lote utilizado na semeadura.

Palavras-chave: *Helianthus annuus* L., crescimento, produtividade, qualidade fisiológica

Abstract

The aim of this study was to evaluate the effect of seeds osmotic conditioning in seedlings emergence and plants performance of sunflower. Three lots of seeds sunflower (Catissol), was submitted to osmotic conditioning with polyethylene glycol solution, -2,0 MPa in aerated system, under 15 °C for 8 hour and then was evaluated for germination tests and vigour. Under filed conditions was conducted emergency evaluations of seedling, plants development as well as the productivity and seeds quality, and the accumulation of nutrients in the seeds. The osmotic conditioning improve the survival of seedling, the dry matter mass to aerial part of plants from 60 days after sowing and oil content, in lots with low seeds physiological quality. The osmotic conditioning not increase the seeds yield but promotes the vigour of seeds produced, regardless of the lot used for sowing seeds.

Key words: *Helianthus annuus* L., growth, productivity, quality

¹ Eng^a Agr^a, Discente do Curso de Doutorado em Fitotecnia, Dept^o de Fitotecnia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, Seropédica, RJ. E-mail: sbcamila@yahoo.com.br

² Discentes do Curso de Agronomia, UFRRJ, Seropédica, RJ. E-mail:liliangalmeida@yahoo.com.br; marcusagronomo@yahoo.com.br

³ Eng^a Agr^a, Prof^a Associada IV, Dept^o de Fitotecnia, UFRRJ, Seropédica, RJ. E-mail: cavrosse@ufrj.br

* Autor para correspondência

Introdução

O girassol vem ganhando destaque entre as culturas, por se adaptar a diferentes áreas de cultivo e apresentar 45% de óleo em suas sementes, além de ser uma excelente opção de segunda safra aos produtores, sendo utilizada como rotação, sucessão. De acordo com a CONAB (2013) houve aumento na produção entre os anos de 2012 e 2013. No entanto para adequada produção desta espécie, tem-se como obstáculo a falta de sincronismo da germinação, que proporciona desuniformidade no estabelecimento das plantas em campo (MWALE; HAMUSIMBI; MWANSA, 2003).

Na tentativa de diminuir o período entre a semeadura e a emergência de plântulas, existem diferentes tratamentos pré semeadura, os quais vêm sendo estudados para diversas espécies, entre eles, o condicionamento osmótico. Este consiste na hidratação das sementes em soluções de baixo potencial osmótico por determinado período, visando desencadear os eventos metabólicos iniciais da germinação sem a ocorrência da emissão da raiz primária (HEYDECKER; HIGGINS; TURNER, 1975).

Para Marcos Filho (2005) o controle da embebição via osmocondicionamento possibilita que as sementes menos vigorosas tenham tempo suficiente para reparação e, ou, reorganização das membranas, visando alcançar o estádio de atividade metabólica semelhante às mais vigorosas. Além disso, esta técnica tem-se mostrado eficiente principalmente sob condições de estresse, tais como, alta temperatura do ar e restrição hídrica do substrato durante a germinação (SANCHEZ; ORTA; MUÑOZ, 2001). Os resultados favoráveis podem estar relacionados ao estímulo e a síntese de enzimas antioxidantes (KIMBINZA et al., 2011), assim como a ativação de componentes energéticos para a síntese de novos RNA e proteínas, disponibilizando as sementes substâncias precursoras para produção das macromoléculas (WAHID et al., 2008).

Em girassol, o condicionamento com solução

de polietilenoglicol (PEG) 6000 a -2 MPa e de KNO_3 a $-0,3$ MPa proporcionou valores elevados de germinação e vigor das sementes, quando este foi avaliado pelo teste de envelhecimento acelerado (BARROS; ROSSETTO, 2009). Em condições de campo, Mwale, Hamusimbi e Mwansa (2003) verificaram que o condicionamento com PEG 8000 a $-0,6$ MPa, promoveu maior sincronismo de germinação e emergência de plântulas desta espécie.

Em outras oleaginosas, também foi constatado o favorecimento do crescimento das culturas pelo emprego do condicionamento osmótico. Plantas de canola provenientes de sementes submetidas ao condicionamento com PEG 10.000 por 8 horas apresentaram maior índice de área foliar e maior acúmulo de massa de matéria seca (BASRA et al., 2003). Já quanto ao efeito desta técnica na produção os autores constataram aumento da produção de sementes de canola (kg ha^{-1}), quando as sementes utilizadas tinham sido condicionadas. Além disso, em plantas de soja provenientes de sementes condicionadas com PEG 8.000 sob $-1,1$ MPa por 6 horas, Arif et al. (2008) verificaram elevada produção de sementes por hectare.

O objetivo foi avaliar o efeito do condicionamento osmótico de sementes na emergência de plântulas e no desempenho das plantas de girassol. Estudos referentes aos efeitos do condicionamento fisiológico sobre o comportamento de plantas à campo ainda não foram totalmente elucidados, sendo que a maioria dos trabalhos somente vão até a fase de plântulas. Além disto, a observação do comportamento pós fase de plântula é de grande importância, pelo fato do condicionamento fisiológico favorecer o sincronismo de germinação, diminuindo o tempo de exposição a estresses ambientais, proporcionando maior chance de crescimento das plantas e uma maturação mais uniforme das sementes produzidas.

Material e Métodos

O trabalho foi realizado nos anos de 2009 (em laboratório) e 2010 (em campo), com três lotes

de sementes com pericarpo (aquênios) de girassol (*Helianthus annuus* L.) da cultivar Catissol 01, provenientes da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Após o recebimento das sementes, estas ficaram armazenadas em câmara a 19 °C e 46% umidade relativa do ar por três meses até a avaliação inicial da qualidade fisiológica. Os delineamentos utilizados foram o inteiramente casualizado em esquema fatorial (3 lotes x 2 tratamentos), com quatro repetições, para condições de laboratório e o de blocos ao acaso em parcelas subsubdivididas, com quatro repetições, para condições de campo (massa de matéria seca e índice de área foliar), por época de avaliação. Neste, a parcela foi representada pelos três lotes de sementes; a subparcela, pelos tratamentos (sementes submetidas ou não ao condicionamento osmótico) e, a subsubparcela por sete épocas de avaliação (15, 30, 45, 60, 75, 90 e 97 dias após a semeadura –DAS).

Tratamento de sementes

Em condição de laboratório, as sementes de cada lote foram ou não submetidas ao condicionamento osmótico com solução de polietilenoglicol (PEG 6000) a -2,0 MPa em sistema aerado, sob 15 °C por 8 horas (BARROS; ROSSETTO, 2009). Posteriormente, estas sementes foram submetidas aos testes de germinação e de vigor (primeira contagem, envelhecimento acelerado e condutividade elétrica). O teste de germinação foi conduzido com quatro subamostras de 50 sementes (BRASIL, 2009). Em conjunto ao teste de germinação foi avaliado o teste de primeira contagem (NAKAGAWA, 1999). O teste de envelhecimento acelerado foi realizado com 250 sementes, pelo método da solução saturada de NaCl (BRAZ et al., 2008). O teste de condutividade elétrica foi conduzido com quatro subamostras de 50 sementes (sem o pericarpo) em 75 mL por 24 horas (BRAZ et al., 2008).

Experimento em condições de campo

A semeadura do girassol foi realizada por subparcela, a qual continha 3 linhas de 2 m espaçadas entre si a 0,7 m. As sementes de cada lote e tratamento foram semeadas em solo classificado como Argissolo, cujo resultado da análise química apresentava: pH(água) 6,0; Ca 3,25 cmol_c.dm⁻³; Mg 1,35 cmol_c.dm⁻³; P 3,38 (ppm) mg L⁻¹; K 2,38 (ppm) mg L⁻¹; H+Al 1,74 cmol_c dm⁻³ e de V% 73.

Foi empregada a densidade de 45.000 sementes ha⁻¹, com base em Braz e Rossetto (2009), ou seja, foram distribuídas 4 sementes por metro linear, após considerar o teste de germinação. Para a adubação na semeadura, com base no resultado da análise de solo e em Raij et al. (1997), foram aplicados 10 kg ha⁻¹ de N na forma de sulfato de amônio, 70 kg ha⁻¹ de P₂O₅ na forma de fosfato super simples e 60 kg ha⁻¹ de K₂O na forma de cloreto de potássio. Já, na adubação de cobertura, aos 30 DAS, foram aplicados 40 kg ha⁻¹ de N na forma de sulfato de amônio (RAIJ et al., 1997), e aplicação de 0,23 kg ha⁻¹ de boro na forma de bórax.

Durante a condução do experimento, os dados médios diários de temperatura e precipitação pluvial foram adquiridos junto à estação experimental da PESAGRO-RIO. As capinas manuais foram realizadas até 60 DAS.

Em cada época de avaliação, as plantas contínuas em um metro linear foram cortadas manualmente ao nível do solo e analisadas quanto à altura, diâmetro do caule, diâmetro do capítulo e número de folhas, sendo os dados expressos por planta. Em seguida, as folhas foram separadas e submetidas à determinação da área foliar através do integrador, modelo LI 3100c Área Meter, que fornece leitura direta em cm², sendo os dados transformados em m². Também foi realizada a determinação da massa de matéria seca da parte área total das plantas, após secagem em estufa de circulação de ar a 65 °C até atingir massa constante, e os dados expressos em g m⁻². A avaliação da população inicial e final foi realizada aos 20 e 97 DAS, através da contagem do número de plantas em um metro linear.

Produção de sementes

Também aos 97 DAS, foi realizada a avaliação dos componentes de produção. As plantas contínuas em um metro linear foram cortadas manualmente ao nível do solo. As sementes foram contadas e pesadas para a avaliação do número de sementes bem formadas (com cor, tamanho e forma característica da espécie) por capítulo, da produção de sementes por planta e da massa de 1.000 sementes. Além disso, foi realizada a avaliação da produtividade de sementes por área, considerando 3 linhas de um metro, espaçadas entre si a 0,7cm (2,1 m²). Os dados foram mantidos a 7% de água, com base em Silva et al. (2009) e expressos em kg ha⁻¹. Também foi realizado o cálculo do índice de colheita da cultura, através da razão entre massa seca das sementes e a massa seca da parte aérea total (KVET et al., 1971).

Qualidade fisiológica das sementes produzidas

Após o beneficiamento manual, as sementes foram acondicionadas em embalagem de sacos de papel e armazenadas a 20,5 °C de temperatura média e 51% de umidade relativa do ar por três meses. Posteriormente as sementes dos três lotes provenientes de plantas oriundas de sementes condicionadas e não condicionadas por ocasião da semeadura, foram submetidas ao teste de retenção em peneira de crivo circular com 5,56 mm de diâmetro e ao teste de grau de umidade pelo método da estufa a 105 °C ± 3 °C por 24 horas (BRASIL, 2009). A avaliação da qualidade fisiológica foi realizada pelo teste de germinação e vigor, seguindo a mesma metodologia utilizada por ocasião da avaliação inicial. Também realizou-se o teste de emergência de plântulas em areia e em campo, utilizando quatro subamostras de 50 sementes e avaliação durante 21 DAS (NAKAGAWA, 1999), cujos resultados foram expressos em porcentagem e velocidade de emergência das plântulas.

Análise de macronutrientes nas sementes

Na análise do acúmulo de nutrientes nas sementes, as amostras por lote e tratamento, previamente secas, foram moídas em moinho do tipo Willey, e em seguida, submetidas à digestão sulfúrica. As determinações de nitrogênio foram realizadas pelo procedimento Kjeldhal, as de fósforo, potássio, bem como as de cálcio e magnésio, foram realizadas por fotocolorimetria, fotômetro de chama e absorção atômica, respectivamente. Além disto, as sementes foram submetidas à determinação de óleo pelo método de Sohxlet.

Análise estatística

Na análise estatística foram realizados os testes de normalidade e homogeneidade das variâncias dos erros e, os dados foram submetidos aos testes de Lilliefors e de Cochran & Bartley, respectivamente. Com os pressupostos atendidos, posteriormente, foram realizadas as análises de variância. Quando o teste F foi significativo para as fontes de variação qualitativa, foram comparadas as médias dos tratamentos pelo teste de Tukey (p=0,05). Já, para a fonte de variação quantitativa, foi efetuada a análise de regressão, considerando a significância, o maior coeficiente de determinação e a expectativa biológica para o melhor ajuste da equação. No caso das interações significativas, foram realizados os desdobramentos necessários.

Resultados e Discussão

Tratamento de sementes

Houve efeito significativo da interação entre lotes e tratamentos somente para o vigor das sementes (Tabela 1). Assim, a germinação das sementes de girassol dos lotes 1 e 3 foi superior a das do lote 2, independente das sementes terem ou não sido submetidas ao condicionamento osmótico (Tabela 1). Além disto, na avaliação do vigor, ao comparar os lotes, quando as sementes foram

condicionadas (C/C) ou não condicionadas (S/C), foi constatado pelos testes de primeira contagem e de condutividade elétrica, a classificação dos lotes 1 e 3 como de vigor superior ao do lote 2. E, apenas pelo teste de envelhecimento acelerado, houve separação dos lotes em três distintos níveis, indicando o lote 3 como de vigor intermediário, quando as sementes não foram condicionadas e como de nível superior, quando as sementes foram condicionadas (Tabela 1). Estes resultados do lote 3 podem estar relacionados à tolerância do lote 3 ao estresse térmico imposto pelo teste de envelhecimento acelerado (LIMA; MARCOS FILHO, 2011), principalmente após a ativação de componentes energéticos para a síntese de novos RNA e proteínas visando a produção das macromoléculas (WAHID et al., 2008), promovido pelo condicionamento osmótico. Já, comparando-se os tratamentos, foi verificado que para o lote 1, o condicionamento osmótico favoreceu o vigor avaliado pelo teste de primeira contagem; para o lote 2, pelo teste de condutividade elétrica e, para o lote 3, pelos testes de primeira contagem, envelhecimento acelerado e condutividade elétrica (Tabela 1). Desta forma, os resultados indicam que o efeito do condicionamento osmótico é dependente da qualidade fisiológica inicial das sementes. De acordo com Marcos Filho (2005), sementes de lotes altamente vigorosos não respondem à esta técnica pois não necessitam de reparo metabólico, assim como também lotes que apresentam elevada proporção de sementes em estádio avançado de deterioração demandam intenso reparo, não sendo observado o sucesso esperado. Comparando os resultados, em girassol, o condicionamento com solução de polietilenoglicol (PEG) 6000 a -2 MPa e com solução de KNO_3 a -0,3 MPa proporcionou valores elevados de germinação e vigor das sementes, quando este foi avaliado pelo teste de envelhecimento acelerado (BARROS; ROSSETTO, 2009).

Experimento em condições de campo

Houve efeito individual significativo de lotes para população de plantas (Tabela 1) e efeito significativo da interação entre lotes e tratamentos para sobrevivência de plantas (Tabela 2), bem como efeito individual significativo de tratamentos para diâmetro do caule (Tabela 2). Além disto, houve efeito significativo da interação entre lotes e tratamentos, por época na avaliação da massa de matéria seca e índice de área foliar (Tabelas 3 e 4). Assim, foi verificado que houve menor população (inicial e final) das plantas provenientes das sementes do lote 2, independente do tratamento (Tabela 1). E, independente do lote utilizado na semeadura, também não houve efeito de tratamentos para população de plantas. O condicionamento osmótico proporciona benefícios ao desenvolvimento das plantas de girassol, por promover maior desvio das reservas cotiledonares para a fase de crescimento das plântulas, crucial ao rápido estabelecimento da planta a campo, para que possa iniciar a atividade fotossintética, favorecendo ao crescimento mais vigoroso (WAHID et al., 2008). E, este efeito é mais notado em condições climáticas desfavoráveis (COSTA; VILELLA, 2006). Durante o cultivo, foram observados 5,48 mm de precipitação pluvial e 28 °C de temperatura média do ar, que de acordo com Leite, Brighenti e Castro (2005), são condições favoráveis para o estabelecimento das plantas desta espécie. Além disto, na Tabela 1, ao comparar os lotes dentro de cada tratamento, foi constatado para os lotes 1 e 2 que o condicionamento osmótico favoreceu a sobrevivência das plantas. E, comparando-se os tratamentos, foi verificado apenas quando as sementes foram condicionadas, menor sobrevivência das plantas provenientes do lote 3 (Tabela 1). Estes resultados podem estar relacionados com o fato do efeito favorável desta técnica ocorrer preferencialmente em condições desfavoráveis e com lotes de qualidade fisiológica intermediaria. Este lote após o condicionamento apresentou vigor superior em condições de estresse térmico (Tabela 1).

Tabela 1. Dados médios de germinação (%), de plântulas normais na primeira contagem de germinação (%), de envelhecimento acelerado com solução saturada (%) e de condutividade elétrica (mS/cm/g), de população inicial (%), de população final (%) e de sobrevivência (%), obtidos de três lotes (L1, L2 e L3) de sementes de girassol submetidas (C/C) ou não(S/C) ao condicionamento osmótico.

Tratamentos	Germinação	Em laboratório				Condutividade elétrica	
		Primeira contagem	Envelhecimento acelerado	População inicial	População final		
		S/C	C/C	S/C	C/C	S/C	C/C
L1	86a*	61Ba	70Aa	56Aa	60Ab	20,55Ab	19,51Ab
L2	81b	46Ab	48Ab	36Ac	39Ac	39,90Aa	36,50Ba
L3	86a	59Ba	75Aa	49Bb	74Aa	23,31Ab	18,70Bb
S/C	82A	-	-	-	-	-	-
C/C	88A	-	-	-	-	-	-
C.V.	2,82	7,25		6,36		5,82	
Em campo							
Tratamentos	População inicial		População final		Sobrevivência		
					S/C		
L1	3,75a		3,09a		71Ba		90Aa
L2	3,0b		2,63b		83Ba		100Aa
L3	3,75a		2,88a		80Aa		72Ab
S/C	3,50A		2,67a		-		-
C/C	3,50A		3,00A		-		-
C.V.	9,52		7,65		8,46		

* Médias seguidas da mesma letra (maiúscula para tratamentos e minúscula para lotes), não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Fonte: Elaboração dos autores.

Também na Tabela 2, durante o desenvolvimento da cultura, foi verificado que o condicionamento osmótico aumentou o diâmetro do caule das plantas, independente do lote utilizado na semeadura. Além disto, este promoveu o maior índice de área foliar das plantas do lote 2 a partir de 60 DAS e, das do lote 3, a partir de 75 DAS (Tabela 3), bem como a maior massa de matéria seca de parte aérea das plantas provenientes dos lotes 2 e 3, a partir de 60 DAS. Em sementes de canola, Basra et al. (2003) verificaram que plantas, oriundas de sementes condicionadas com PEG 10000, apresentaram maior índice de área foliar e acúmulo de massa de matéria seca quando comparado com plantas oriundas de sementes que não foram submetidas ao condicionamento. Plantas que apresentaram maior índice de área foliar conseguem interceptar maior quantidade de radiação solar e converter esta em fotoassimilados, acumulando maior quantidade de massa seca (PEIXOTO; CRUZ; PEIXOTO, 2011).

Na Tabela 4 foi observado aumento linear, com valores máximos aos 97 DAS para massa de matéria seca de parte aérea para todos lotes e tratamentos. Este valor principalmente do lote 2, após as sementes terem sido condicionadas foi superior aos observados por Spettar e Trecenti (2011), que encontraram 6310 kg ha⁻¹ para o acúmulo de massa de matéria seca, com a cultivar Catissol no município de Planaltina (DF). Também a partir de 60 DAS ocorreu decréscimo nos valores de índice de área foliar para todos os lotes e tratamentos (Tabela 4). Esta redução do índice de área foliar está relacionada às perdas de folhas, oriunda da senescência natural da espécie e à maturação de sementes. Para Schneiter e Miller (1981), a partir deste período (60 DAS) inicia-se a fase de acúmulo de reservas nas sementes de girassol, para que a planta inicie o investimento nas partes reprodutivas em detrimento das partes vegetativas.

Tabela 2. Dados médios de altura de planta, de número folhas, de diâmetro do caule (mm), de diâmetro do capítulo (cm), de massa de 1000 sementes (g), de produção de sementes (g.planta⁻¹), de produtividade de sementes (kg.ha⁻¹), de índice de colheita, e de número de sementes bem formadas por capítulo, obtidos de plantas provenientes de três lotes (L1, L2 e L3) de sementes de girassol, submetidas (C/C) ou não (S/C) ao condicionamento osmótico.

Variáveis	Lote 1	Lote 2	Lote 3	S/C	C/C	C.V. ¹	C.V. ²
Altura	77,70a*	85,86a	80,24a	78,91A	83,63A	21,15	16,43
Número de folhas	12a	14a	13a	13A	13A	25,73	13,90
Diâmetro do caule	10,72a	12,62a	11,14a	10,96B	12,04A	20,42	11,96
Diâmetro do capítulo	12,26a	13,06a	12,67a	12,57A	13,81A	20,72	15,56
Massa de 1000	57,88a	57,78a	58,60a	57,69A	58,47A	3,71	2,97
Produção de sementes	42,19b	52,45a	40,97b	45,00A	45,66A	8,83	8,38
Produtividade de sementes	1662,34a	1949,08a	1657,56a	1668,63A	1797,35A	11,49	11,32
Índice de colheita	0,43a	0,40a	0,41a	0,41A	0,38A	22,64	17,01
Número de sementes bem formadas	S/C	749Ab	893Aa	666Bb	-	-	10,14
	C/C	707Ab	930Aa	815Aab	-	-	7,76

* Médias seguidas da mesma letra (maiúscula para tratamentos e minúscula para lotes), não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. ¹ coeficiente de variação da parcela (lotes) e ² coeficiente de variação da subparcela (tratamento de condicionamento).

Fonte: Elaboração dos autores.

Tabela 3. Dados médios de massa de matéria seca da parte aérea total (g.m⁻²) e de índice de área foliar (m² m⁻²), obtidos de plantas provenientes de três lotes (L1, L2 e L3) de sementes de girassol, submetidas (C/C) ou não (S/C) ao condicionamento osmótico. Avaliação aos 15, 30, 45, 60, 75, 90 e 97 DAS.

Tratamentos		Índice de área foliar	Massa de matéria seca da parte aérea total
15 DAS	L1	0,024a	1,16a*
	L2	0,025a	1,19a
	L3	0,020a	0,99a
	S/C	0,022A	1,01A
	C/C	0,024A	1,21A
30 DAS	L1	0,279c	15,02a
	L2	0,503a	26,18a
	L3	0,405b	24,51a
	S/C	0,399A	21,57A
	C/C	0,393A	22,23A
45 DAS	L1	0,820b	69,87a
	L2	1,170a	92,48a
	L3	0,859b	59,82a
	S/C	0,860B	65,86A
	C/C	1,039A	79,00A

continua

continuação

60 DAS	L1	S/C	0,767Bb	159,38Bb
		C/C	1,253Ab	248,70Ab
	L2	S/C	1,365Ba	258,16Ba
		C/C	1,692Aa	312,18Aa
	L3	S/C	0,990Ab	192,74Bb
		C/C	1,142Ac	234,49Ab
	75 DAS	S/C	0,640Ab	316,33Bb
		C/C	0,727Ac	395,67Ab
	L2	S/C	0,720Bab	407,12Ba
		C/C	0,926Aa	483,34Aa
	L3	S/C	0,744Ba	314,00Bb
		C/C	0,825Ab	362,28Ab
90 DAS	L1	S/C	0,601Aa	434,89Ab
		C/C	0,612Ab	461,08Ac
	L2	S/C	0,537Bab	605,16Ba
		C/C	0,705Aa	715,40Aa
	L3	S/C	0,465Bb	448,02Bb
		C/C	0,672Aab	623,78Ab
	97 DAS	S/C	-	497,58Ab
		C/C	-	512,84Ac
	L2	S/C	-	655,26Ba
		C/C	-	726,63Aa
	L3	S/C	-	482,46Bb
		C/C	-	635,04Ab
C.V.(%) parcela			12,73	10,52
C.V.(%)subparcela			20,12	11,88
C.V.(%) subsubparcela			12,41	14,83

* Médias seguidas da mesma letra (maiúscula para tratamentos e minúscula para lotes), não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Fonte: Elaboração dos autores.

Tabela 4. Equações de regressão estimadas^{1 e 2}, do número de folhas por planta, da altura das plantas (cm), do diâmetro do caule (mm), do diâmetro do capítulo (cm), massa de matéria seca da parte aérea total (g.m⁻²) e de índice de área foliar (m².m⁻²), obtidos de plantas provenientes de três lotes de sementes (L1, L2 e L3) de girassol, submetidos (C/C) ou não (S/C) ao condicionamento osmótico, por época de avaliação.

Tratamentos	Parâmetros			
	A	B	C	R ²
Número de folhas				
1, 214*	0,716**	-0,006**		0,88
-5,054**	1,467**	-		0,89
2,96**	0,144**	-		0,89
-1,173 ^{ns}	0,179**	-		0,95
Altura das plantas (cm)				
L1-S/C	-170,520**	6,491**	-	0,94
L1-C/C	-163,708**	6,927**	-	0,95
L2-S/C	-216,169**	8,630**	-	0,95
L2-C/C	-247,188**	9,929**	-	0,95
L3-S/C	-161,865**	6,425**	-	0,94
L3-C/C	-223,259**	8,526**	-	0,92
Diâmetro do caule (mm)				
Diâmetro do capítulo (cm)				
Massa de matéria seca da parte aérea total (g m ⁻²)				
L1-S/C	-0,518**	0,037**	-0,0003**	0,92
L1-C/C	-0,914**	0,064**	-0,0005**	0,84
L2-S/C	-1,016**	0,076**	-0,0006**	0,88
L2-C/C	-1,249**	0,088**	-0,0007**	0,89
L3-S/C	-0,741**	0,054**	-0,0004**	0,96
L3-C/C	-0,824**	0,060**	-0,0004**	0,93
Índice de área foliar (m ² m ⁻²)				

¹ y=A + Bx(DAS) e ² y=A + Bx(DAS) + Cx(DAS)²

^{ns} não significativo, *significativo a 5%, ** significativo a 1% probabilidade pelo teste t.

Fonte: Elaboração dos autores.

Produção de sementes

Houve efeito significativo da interação entre lotes e tratamentos para número de sementes bem formadas por capítulo (Tabela 2) e para teor de óleo (Tabela 5), bem como efeito individual de lotes para produção de sementes (g planta⁻¹) (Tabela 2). Assim, comparando-se os tratamentos, para o lote 3, o condicionamento osmótico aumentou o número de sementes bem formadas por capítulo por planta (Tabela 2) e o teor de óleo das sementes (Tabela 5) e, para o lote 2, apenas o teor de óleo (Tabela 5). Estes resultados são semelhantes aos observados em relação ao efeito favorável do condicionamento osmótico no acúmulo de massa de matéria seca e no índice de área foliar, para estes lotes 2 e 3 (Tabela 3),

indicando que plantas mais vigorosas, ou seja, com maior acúmulo de massa de matéria seca, apresentam maior capacidade de enchimento dos capítulos, característica favorável a planta de girassol, já que a parte econômica desta são as sementes. Hussain et al. (2006), também observaram que o condicionamento osmótico favoreceu o número de sementes de girassol por capítulo, já para o teor de óleo esses autores verificaram menor teor de óleo em sementes condicionadas, indicando que isto aconteceu pois foi observado elevada concentração de proteína nas sementes de girassol. Além disto, comparando-se os lotes empregados na semeadura, quando foram ou não condicionados, o lote 2 apresentou maior número de sementes bem formadas, embora

este valor não tenha diferido do apresentado pelo lote 3 quando condicionado. Quanto a produção de sementes por planta, esta foi maior quando foram usadas sementes do lote 2, independente do tratamento. Este resultado pode estar relacionado a menor população de plantas, já que estas plantas provenientes do lote 2 estavam em menor número na área, independente do tratamento por apresentarem menor vigor (Tabela 1). De acordo Marcos Filho (2005), quando é obtida baixa população de plantas por unidade de área em decorrência da utilização de sementes de menor vigor, a produção pode ser prejudicada, porém as plantas possuem capacidade de adaptação ao espaço mais amplo para o seu desenvolvimento, exibindo com isso, a elevação da produção individual ($g\ planta^{-1}$). Também na Tabela 2, não houve efeito significativo da interação entre

lotes e tratamentos, bem como de efeitos individuais de tratamentos e lotes na produtividade de sementes (Tabela 2). Assim, a produtividade de sementes não variou entre os lotes, mesmo quando as plantas do lote 2 produziram maior quantidade de sementes ($g\ planta^{-1}$) (Tabela 2). Além disso, estes valores de rendimento de sementes de girassol estão acima da média Brasileira que é de $1.445\ kg\ ha^{-1}$, para a safra de 2012/2013 (CONAB, 2013), favorecidos provavelmente pela ocorrência de precipitação pluvial superior a $8\ mm\ dia^{-1}$ no período da floração e acúmulo de reserva das sementes, que ocorre de acordo com Schneiter e Miller (1981) dos 45 aos 60 DAS. No entanto, em canola e soja, respectivamente, Basra et al. (2003) e Arif et al. (2008) verificaram que o condicionamento osmótico favoreceu a produção de sementes por hectare.

Tabela 5. Dados médios de sementes retidas na peneira de crivo circular de diâmetro de 5,56 mm (%), de grau de umidade (%), de germinação (%), de porcentagem de plântulas normais na primeira contagem do teste de germinação, de envelhecimento acelerado com solução saturada (%), de condutividade elétrica (mS/cm/g), de emergência de plântulas em areia e campo (%), de índice de velocidade de emergência de plântulas em areia e campo (IVE) e de teor de óleo, obtidos de sementes de girassol colhidas de plantas provenientes de três lotes de sementes (L1, L2 e L3), submetidas (C/C) ou não (S/C) ao condicionamento osmótico. Avaliação após três meses da colheita.

Variáveis				S/C	C/C	C.V. (%)
	Lote 1	Lote 2	Lote 3			
Grau de umidade	6,69	6,34	6,49	6,66	6,36	-
Sementes retidas	93,66a*	95,17a	97,37a	94,96A	95,83A	2,40
Germinação	82b	77b	90a	83A	83A	5,87
Primeira contagem	69b	64b	80a	70A	71A	10,30
Emergência de plântulas em areia	96a	97a	96a	96A	98A	2,36
IVE em areia	15,62a	15,50a	15,25a	14,50B	16,51A	5,76
Envelhecimento acelerado	65b	65b	77a	71A	68A	13,04
Condutividade elétrica	46,93b	54,66a	40,04c	46,00A	48,42A	8,63
Emergência de plântulas em campo	93a	95a	94a	91B	97A	6,18
IVE em campo	14,65a	14,20a	14,21a	12,99B	15,70A	7,21
Teor de óleo	S/C 42,51Aa	38,00Ba	38,85Ba	-	-	5,98
	C/C 41,00Aa	43,29Aa	44,75Aa	-	-	

* Médias seguidas da mesma letra (maiúscula para tratamentos e minúscula para lotes), não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Fonte: Elaboração dos autores.

Ao avaliar o índice de colheita, não houve efeito significativo da interação entre lotes e tratamentos, bem como houve efeito individual de lotes e tratamentos para esta variável (Tabela 2). No entanto, estes valores de índice de colheita estão acima dos valores encontrados por Hussain et al. (2006), que foi de 0,32. Monteiro (2001) indica o girassol como cultura com baixa eficiência na partição dos fotoassimilados. As espécies oleaginosas como o girassol, as quais são ricas em lipídios, necessitam de maior quantidade de glicose e minerais para a produção de 1 grama de biomassa de semente, pois a via metabólica dos lipídios consome maior quantidade de esqueletos de carbono do que a via metabólica do amido, com base em Munier-Jolain e Salon (2005).

Qualidade fisiológica das sementes produzidas

Houve apenas efeito significativo de tratamentos para o vigor das sementes avaliado pelos testes conduzidos em areia e solo (Tabela 5) e, efeito significativo de lotes para germinação e vigor (primeira contagem, condutividade elétrica e envelhecimento acelerado). Assim o condicionamento osmótico favoreceu o vigor das sementes produzidas, quando avaliado pelos testes de IVE em areia e em campo e emergência de plântulas em campo (Tabela 5), independente do lote de sementes utilizado na semeadura. Além disto, independente do tratamento, as sementes produzidas de plantas provenientes do lote 3 (Tabela 5) apresentaram maior germinação e vigor, quando avaliado pelos testes de primeira contagem, envelhecimento acelerado e condutividade elétrica (Tabela 5). Estes resultados são semelhantes aos observados em relação ao efeito favorável do condicionamento osmótico para o lote 3, no acúmulo de massa de matéria seca e no índice de área foliar (Tabela 3). Para Carvalho e Nakagawa (2000), sementes com maior acúmulo de massa seca apresentam maior vigor.

Avaliação de macronutrientes nas sementes

Houve efeito significativo da interação entre lotes e tratamentos somente para acúmulo de potássio, efeito individual de tratamentos para acúmulo de cálcio e de nitrogênio e efeito individual de lotes para acúmulo de nitrogênio e fósforo (Tabela 6). Assim, para o lote 1, o condicionamento favoreceu o acúmulo de potássio e, na comparação entre lotes, quando as sementes foram ou não condicionadas, as do lote 2 apresentaram maior acúmulo deste nutriente. O maior acúmulo de potássio nas sementes está relacionado com a elevada mobilidade deste macronutriente das partes mais velhas da planta para as partes mais novas, durante o processo de senescência natural (LEITE; BRIGHENTI; CASTRO, 2005). Além disto, o lote 2 apresentou maior acúmulo de nitrogênio e fósforo, independente do tratamento (Tabela 6). Plantas do lote 2 apresentaram maior índice de área foliar (Tabela 3), com isso conseguiram interceptar maior quantidade de radiação solar e converter esta em fotoassimilados, acumulando maior quantidade de nitrogênio em suas folhas, pois o nitrogênio é constituinte de moléculas de clorofila e ácidos nucléicos (BOTELHO; PEREZ, 2001). E, independente do lote de sementes utilizado na semeadura, o condicionamento osmótico favoreceu o acúmulo de nitrogênio das sementes e reduziu o de cálcio (Tabela 6). Este resultado de maior conteúdo de nitrogênio das sementes submetidas ao condicionamento pode ter favorecido o vigor das sementes produzidas avaliado principalmente pela velocidade de emergência (Tabela 5). Para Botelho e Perez (2001), o nitrogênio, dentre outras funções, é constituinte das moléculas de poliamina, as quais possuem função na síntese e atividade de macromoléculas, na permeabilidade das membranas e processos parciais de mitose e meiose. Em relação aos dados de redução de cálcio, Raven et al. (1990) relatam que na adubação de semeadura como fonte de nitrogênio quando usa-se nitrato, as plantas absorvem mais cátions e quando se usa amônia, que foi utilizado neste cultivo, as plantas absorvem mais

anions e consequentemente diminuem a absorção de cátions. Comparando os valores com os da literatura, estes estão de acordo com os encontrados nas sementes de girassol por Braz e Rossetto (2010) observaram 88, 30, 30 e 16 kg ha⁻¹ de N, P, K e Ca respectivamente em sementes de girassol da cultivar Embrapa 122 V2000.

Desta forma pode-se considerar que, o condicionamento osmótico promove mudanças metabólicas no crescimento e desenvolvimento da planta, sendo estas específicas de acordo com o nível de vigor das sementes utilizadas na semeadura.

Tabela 6. Dados médios de acúmulo de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio (kg ha⁻¹) nas sementes, obtidos de plantas provenientes de três lotes (L1, L2 e L3) de sementes de girassol, submetidas (C/C) ou não (S/C) ao condicionamento osmótico.

Variáveis	Lote 1	Lote 2	Lote 3	S/C	C/C	C.V. ¹	C.V. ²
Nitrogênio	110,40b*	155,45a	108,18b	116,80B	132,55A	12,56	10,24
Fósforo	23,24b	28,73a	26,18b	27,72A	24,39A	10,92	13,99
Cálcio	11,97a	12,09a	12,15a	12,47A	11,68B	7,37	6,74
Magnésio	5,17a	4,37a	5,14a	4,97A	4,82A	21,17	21,80
Potássio	S/C 22,81Ab	27,31Aa	22,25Ab	-	-	6,60	7,38
	C/C 19,21Bb	29,95Aa	20,37Ab	-	-		

* Médias seguidas da mesma letra (maiúscula para tratamentos e minúscula para lotes), não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. ¹ coeficiente de variação da parcela (lotes) e ² coeficiente de variação da subparcela (tratamento de condicionamento).

Fonte: Elaboração dos autores.

Conclusão

O condicionamento osmótico favorece a sobrevivência das plantas, o acúmulo de massa de matéria seca da parte aérea de plantas a partir de 60 dias após a semeadura e o teor de óleo, em plantas provenientes de lotes de sementes de qualidade inferior.

O condicionamento osmótico não aumenta a produtividade de sementes, mas favorece o vigor das sementes produzidas, independente da qualidade de sementes do lote utilizado na semeadura.

Agradecimentos

Os autores agradecem a CAPES e ao CNPq pelas bolsas de pesquisa e a FAPERJ pelo auxílio financeiro.

Referências

- ARIF, M.; JAN, M. T.; MARWAT, K. B.; KHAN, M. A. Seed priming improves emergence and yield of soybean. *Pakistan Journal of Botany*, Karachi, v. 40, n. 3, p. 1169-1177, 2008.
- BARROS, C. S.; ROSSETTO, C. A. V. Condicionamento fisiológico de sementes de girassol. *Ciência Rural*, Santa Maria, v. 39, n. 6, p. 1667-1675, 2009.
- BASRA, M. A. S.; ULLAH, E.; WARRAICH, E. A.; CHEEMA, M. A.; AZFAL, I. Effect of Storage on growth and yield of primed canola (*Brassica napus*) seeds. *International journal of agriculture and biology*. Faisalabad, v. 5, n. 2, p. 117-120, 2003.
- BOTELHO, B. A.; PEREZ, S. C. J. G. A. Estresse hídrico e reguladores de crescimento na germinação de sementes de *Canafistula*. *Scientia Agrícola*, Piracicaba, v. 58, n. 1, p. 43-49, 2001.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. *Regras para análise de sementes*. Brasília: SNDA/DNDV/CLAV, 2009. 398 p.

- BRAZ, M. R. S.; BARROS, C. S.; CASTRO, F. P.; ROSSETTO, C. A. V. Testes de envelhecimento acelerado e deterioração controlada na avaliação do vigor de aquênios de girassol. *Ciência Rural*, Santa Maria, v. 38, n. 7, p. 1857-1863, 2008.
- BRAZ, M. R. S.; ROSSETTO, C. A. V. Crescimento de plantas de girassol em função do vigor de aquênios e da densidade de semeadura. *Ciência Rural*, Santa Maria, v. 39, n. 7, p. 1762-1771, 2009.
- _____. Acúmulo de nutrientes e rendimento de óleo em plantas de girassol influenciados pelo vigor dos aquênios e pela densidade de semeadura. *Semina: Ciências Agrárias*, Londrina, v. 31, p. 1193-1204, 2010. Suplemento 1.
- CARVALHO, N. M.; NAKAGAWA, J. *Sementes: ciência, tecnologia e produção*. 4. ed. Jaboticabal: Funep, 2000. 588 p.
- COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. *Acompanhamento de safra brasileira: grãos, sexto levantamento, março 2013*. Companhia Nacional de Abastecimento. Brasília: Conab, 2013. 26 p.
- COSTA, C. J.; VILLELA, F. A. Condicionamento osmótico de sementes de beterraba. *Revista Brasileira de Sementes*, Brasília, v. 28, n. 1, p. 21-29, 2006.
- HEYDECKER, W.; HIGGINS, J.; TURNER, Y. J. Invigoration of seeds? *Seed Science and Technology*, Zurich, v. 5, n. 2, p. 881-888, 1975.
- HUSSAIN, M.; FAROOQ, M.; BASRA, S. M. A.; AHMAD, N. Influence of seed priming techniques on the seedling establishment, yield and quality of hybrid sunflower. *International Journal of Agriculture and Biology*, Faisalabad, v. 8, n. 1, p. 14-18, 2006.
- KIMBINZA, S.; BAZIN, J.; BAILLY, C.; FARRANT, J. M.; CORBINEAU, F.; BOUTEAU, H. M. Catalase is a key enzyme in seed recovery from ageing during priming. *Plant Science*, Limerick, v. 181, n. 3, p. 309-315, 2011.
- KVET, J.; ONDOK, J. P.; NECAS, J.; JARVIS, P. G. Methods of growth analysis. In: SESTÁK, Z.; CATSKY, J.; JARVIS, P. G. (Ed.). *Plant photosynthetic production-manual of methods*. The Hague: W Junk N.V. Publishers, 1971. p. 343-391.
- LEITE, R. M. V. B. C.; BRIGHENTI, A. M.; CASTRO, C. (Ed.). *Girassol no Brasil*. Londrina: Embrapa Soja, 2005. 612 p.
- LIMA, L. B.; MARCOS FILHO, J. Procedimentos para condução de testes de vigor baseados na tolerância ao estresse térmico em sementes de pepino. *Revista Brasileira de Sementes*, Brasília, v. 33, n. 1, p. 45-53, 2011.
- MARCOS FILHO, J. Condicionamento fisiológico de sementes. In: _____. (Ed.). *Fisiologia de sementes de plantas cultivadas*. Piracicaba: Fealq, 2005. cap. XI, p. 383-427.
- MONTEIRO, C. de A. *Análise de crescimento e produtividade agrícola de girassol conduzido na safinha em cinco densidades de plantas*. 2001. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba.
- MUNIER-JOLAIN, N.; SALON, C. Are the carbon costs of seed production related to the quantitative and qualitative performance? An appraisal for legumes and other crops. *Plant, Cell and Environment*, Oxford, v. 28, n. 11, p. 1388-1395, 2005.
- MWALE, S. S.; HAMUSIMBI, C.; MWANSA, K. Germination, emergence and growth of sunflower (*Helianthus annuus* L.) in response to osmotic seed priming. *Seed Science and Technology*, Zurich, v. 31, n. 1, p. 199-206, 2003.
- NAKAGAWA, J. Testes de vigor baseados no desempenho das plântulas. In: KRZYZANOWSKI, F. C.; VIEIRA, R. D.; FRANÇA NETO, J. B. (Ed.). *Vigor de sementes: conceitos e testes*. Londrina: ABRATES, 1999. cap. II, p. 1-24.
- PEIXOTO, C. P.; CRUZ, T. V.; PEIXOTO, M. de F. da S. P. Análise quantitativa do crescimento de plantas: conceitos e prática. *Encyclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer*, Goiânia, v. 7, n. 13, p. 51-79, 2011.
- RAIJ, B. V.; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J. A.; FURLANI, A. M. C. *Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo*. 2. ed. Campinas: Instituto Agronômico/Fundação IAC, 1997. 198 p.
- RAVEN, J. A.; FRANCO, A. A.; JESUS, E. L.; JACOB NETO, J. H⁺ extrusion and organic-acid synthesis in N₂ fixing symbioses involving vascular plants. *New Phytologist*, New York, v. 114, n. 3, p. 369-389, 1990.
- SANCHEZ, J. A.; ORTA, R.; MUÑOZ, B. C. Tratamientos pregerminativos de hidratacion-deshidratacion de las semillas y sus efectos en plantas de interes agrícola. *Agronomía Costarricense*, San José, v. 25, n. 1, p. 67-92, 2001.
- SCHNEITER, A. A.; MILLER, J. F. Description of sunflower growth stages. *Crop Science*, Madison, v. 21, n. 1, p. 901-903, 1981.
- SILVA, H. P.; BRANDÃO JUNIOR, D. S.; SAMPAIO, R. A.; DUARTE, R. F.; NEVES, J. M. G.; AQUINO, C. F. Momento ideal para a colheita do girassol em função da coloração do dorso dos capítulos. *Agrarian*, Dourados, v. 2, n. 4, p. 41-48, 2009.

SPETTAR, C. R.; TRECENI, R. Desempenho agronômico de espécies tradicionais e inovadoras da agricultura em semeadura de sucessão e entresafra no cerrado do planalto central brasileiro. *Bioscience Journal*, Uberlândia, v. 27, n. 1, p. 102-111, 2011.

WAHID, A.; NOREEN, A.; BASRA, S. M. A.; GELANI, S.; FAROOQ, M. Priming-induce metabolic changes in sunflower (*Helianthus annuus* L) achene improve germination and seedling growth. *Botanical Studies*, Taiwan, v. 49, n. 2, p. 343-350, 2008.