



Revista de Matemática: Teoría y  
Aplicaciones  
ISSN: 1409-2433  
[mta.cimpa@ucr.ac.cr](mailto:mta.cimpa@ucr.ac.cr)  
Universidad de Costa Rica  
Costa Rica

ACUÑA ORTEGA, OSVALDO  
OBJETOS K - FINITOS Y DECIDIBILIDAD  
Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, vol. 21, núm. 1, enero, 2014, pp. 1-10  
Universidad de Costa Rica  
San José, Costa Rica

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45331281001>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

## OBJETOS K-FINITOS Y DECIDIBILIDAD

## K-FINITE OBJECTS AND DECIDABILITY

OSVALDO ACUÑA ORTEGA\*

*Received: 06/Aug/2013; Revised: 25/Oct/2013;  
Accepted: 30/Oct/2013*

---

---

\*CIMPA & Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

### Abstract

We study the k-finite and decidable objects in an elementary topos. We prove some results concerning k-finite and decidable objects.

**Keywords:** Topoi, k-finite objects, decidability.

### Resumen

Se estudian los conceptos de objetos k-finitos y el concepto de objeto decidable en un topos elemental. Se prueban algunos resultados sobre objetos k-finitos y objetos decidibles.

**Palabras clave:** Topos, objetos k-finitos, decidibilidad.

**Mathematics Subject Classification:** 03G30, 18B25.

## 1 Introducción

En este trabajo se establecen algunos resultados sobre los conceptos de objetos K-finitos y objetos decidibles en un topos elemental arbitrario. También se considera que un objeto es finito en un topos elemental si es a la vez k-finito y decidable, y se demuestra que este concepto resulta adecuado para definir el concepto de finitud en un topos elemental. De esta forma extendemos los resultados estudiados en [3] y [4]. La teoría que fundamenta estos estudios se puede consultar en [1], [2] y [5].

## 2 Resultado Principal

Sea  $\varepsilon$  un topos elemental y  $X \in |\varepsilon|$ , se dice que  $X$  es k-finito si  $\lceil X \rceil : 1 \rightarrow \Omega^X$  se factoriza a través de  $k(X)$ , donde  $k(X)$  es el subobjeto más pequeño de  $\Omega^X$  cerrado bajo uniones binarias que contiene a  $\{\} : X \rightarrow \Omega^X$  y  $\lceil \phi \rceil : 1 \rightarrow \Omega^X$ . Observe que  $\lceil X \rceil : 1 \rightarrow \Omega^X$  corresponde a flecha  $id_X : X \rightarrow X$ ,  $\{\} : X \rightarrow \Omega^X$  corresponde a  $\Delta_X : X \rightarrow X \times X$  tal que  $pr_i \circ \Delta_X = id_X$  y  $\lceil \phi \rceil : 1 \rightarrow \Omega^X$  corresponde a la flecha  $\phi \rightarrow X$  donde  $\phi$  es el objeto vacío de  $\varepsilon$ .

**Teorema 1** *Sea  $X \in |\varepsilon|$ ,  $X$  es k-finito si y solo si  $2^X \subseteq k(X)$ .*

**Demostración.** ( $\Leftarrow$ ) Como  $X$  está completamentado en  $X$ ,  $\lceil X \rceil : 1 \rightarrow \Omega^X$  se factoriza a través de  $2^X$  y entonces se factoriza a través de  $k(X)$ .

( $\Rightarrow$ ) Antes de probar esta parte repasemos algunas definiciones . Defina  $2^{(-)} : \Omega^X \rightarrow \Omega^{\Omega^X}$  por  $\models 2^x = \{\bar{y} \in \Omega^X / \exists_{y \in \Omega^X} (y \cup \bar{y} = x \wedge y \cap \bar{y} = \emptyset)\}$  donde

$\cup, \cap$  son la unión y la intersección binaria de la álgebra de Heyting  $\Omega^X$ . Define  $k : \Omega^X \rightarrow \Omega^{k(X)} \rightarrow \Omega^{\Omega^X}$  como  $\models k(X) = \{y \in k(X) / y \subseteq x\}$ . Como la noción de k-finitos es absoluta,  $k(X)$  representa el conjunto de subconjuntos finitos de  $x$ , donde  $x$  es una variable de tipo  $\Omega^X$ .

Defina el objeto  $Q_X$  como  $\{x \in \Omega^X / 2^x \subseteq k(X)\} \rightarrow \Omega^x$ . Si probamos que  $k(X) \subseteq Q_X$  entonces tenemos que  $2^{\Gamma X^\neg} \subseteq k(\Gamma X^\neg)$  y entonces  $2^X \subseteq k(X)$ .

(i)  $\Gamma \phi^\neg : 1 \rightarrow \Omega^X$  se factoriza a través de  $Q_X$ .

Claramente  $\models 2^{\Gamma \phi^\neg} = \{\phi\}$ , como  $\phi$  es k-finito,

$$\Gamma \phi^\neg \in k(\Gamma X^\neg), \phi \subseteq \Gamma \phi^\neg$$

por lo tanto  $\Gamma \phi^\neg \in Q_X$ .

(ii)  $\{\}_X : X \rightarrow \Omega^X$  se factoriza a través de  $Q_X$ .

Sabemos que

$$\models 2^{\{x\}} = \{\bar{y} \in \Omega^X / \exists_y (y \cup \bar{y} = \{x\} \wedge y \cap \bar{y} = \phi)\}.$$

Por otro lado tenemos que

$$\begin{aligned} &\models y \cap \bar{y} = \phi \wedge y \cup \bar{y} = \{x\} \\ &\Rightarrow (x \in y \vee x \in \bar{y}) \vee (y \subseteq \{x\} \wedge \bar{y} \subseteq \{x\}) \wedge y \cap \bar{y} = \phi \\ &\Rightarrow (\{x\} \subseteq y \vee \{x\} \subseteq \bar{y}) \wedge (y \subseteq \{x\} \wedge \bar{y} \subseteq \{x\}) \wedge y \cap \bar{y} = \phi \\ &\Rightarrow (y = \{x\} \wedge \bar{y} \subseteq \{x\} \wedge \bar{y} \cap \{x\} = \phi) \vee \\ &\quad (\bar{y} = \{x\} \wedge y \subseteq \{x\} \wedge y \cap \{x\} = \phi) \\ &\Rightarrow (\{x\} = y \wedge \bar{y} = \phi) \vee (\{x\} = \bar{y} \wedge y = \phi) \\ &\Rightarrow \{x\} = y \vee y = \phi. \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\models \exists_{\bar{y}} (y \cup \bar{y} = \{x\} \wedge y \cap \bar{y} = \phi) \Leftrightarrow \{x\} = y \vee y = \phi,$$

el recíproco es trivial y entonces

$$\models 2^{\{x\}} = \{y \in \Omega^X / y = \{x\} \vee y = \phi\}$$

pero

$$\models \{y \in \Omega^X / y = \{x\} \vee y = \phi\} \subseteq k(\{x\})$$

y

$$\models 2^{\{x\}} \subseteq k(\{x\}).$$

Por lo tanto  $\{\}_X$  se factoriza a través de  $Q_X$ .

(iii)  $Q_X$  es cerrado bajo uniones binarias.

$$\begin{aligned}
 & \models x \in Q_X \wedge \bar{x} \in Q_X \wedge y \in 2^{x \cup \bar{x}} \\
 \Rightarrow & \exists_z (y \cup z = x \cup \bar{x} \wedge y \cap z = \phi) \wedge x \in Q_X \wedge \bar{x} \in Q_X \\
 \Rightarrow & \exists_z (x \subseteq y \cup z \wedge y \cap z = \phi \wedge \bar{x} \subseteq y \cup z) \wedge \\
 & x \in Q_X \wedge \bar{x} \in Q_X \wedge y = (y \cap \bar{x}) \cup (y \cap x) \\
 \Rightarrow & \exists_z (x = (y \cap x) \cup (x \cap z) \wedge y \cap z = \phi \wedge \bar{x} = (y \cap \bar{x}) \cup (z \cap \bar{x})) \wedge \\
 & x \in Q_X \wedge \bar{x} \in Q_X \wedge y = (y \cap x) \cup (y \cap \bar{x}) \\
 \Rightarrow & \exists_z (x = (y \cap x) \cup (z \cap x) \wedge (y \cap x) \cap (z \cap x) = \phi) \wedge x \in Q_X \wedge \\
 & y = (y \cap x) \cup (y \cap \bar{x}) \\
 \wedge \exists_z (\bar{x} = (y \cap \bar{x}) \cup (z \cap \bar{x}) \wedge (y \cap \bar{x}) \cap (z \cap \bar{x})) = \phi \wedge \bar{x} \in Q_X \\
 \Rightarrow & y \cap x \in 2^x \wedge y \cap \bar{x} \in 2^{\bar{x}} \wedge x \in Q_X \wedge \bar{x} \in Q_X \wedge \\
 & y = (y \cap x) \cup (y \cap \bar{x}) \\
 \Rightarrow & y \cap x \in 2^x \wedge y \cap \bar{x} \in 2^{\bar{x}} \wedge 2^x \in k(X) \wedge 2^{\bar{x}} \in k(\bar{x}) \wedge \\
 & y = (y \cap x) \cup (y \cap \bar{x}) \\
 \Rightarrow & y \cap x \in k(X) \wedge y \cap \bar{x} \in k(\bar{x}) \wedge y = (y \cap x) \cup (y \cap \bar{x}) \\
 \Rightarrow & y \cap x \in k(X) \wedge y \cap \bar{x} \in k(X) \wedge y = (y \cap x) \cup (y \cap \bar{x}) \\
 \Rightarrow & y \in k(X) \wedge y \subseteq x \cup \bar{x} \\
 \Rightarrow & y \in k(x \cup \bar{x}).
 \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\models x \in Q_X \wedge \bar{x} \in Q_X \wedge y \in 2^{x \cup \bar{x}} \Rightarrow y \in k(x \cup \bar{x})$$

si y solo si

$$\models x \in Q_X \wedge \bar{x} \in Q_X \Rightarrow (y \in 2^{x \cup \bar{x}} \Rightarrow y \in k(x \cup \bar{x}))$$

y esto implica

$$\models x \in Q_X \wedge \bar{x} \in Q_X \Rightarrow \forall y (y \in 2^{x \cup \bar{x}} \Rightarrow y \in k(x \cup \bar{x})).$$

Por lo tanto

$$\models x \in Q_X \wedge \bar{x} \in Q_X \Rightarrow x \cup \bar{x} \in Q_X.$$

Entonces  $Q_X$  es cerrado bajo uniones binarias, y entonces (i),(ii), (iii) implican  $k(X) \subseteq Q_X$ , como  $X$  es  $k$ -finito se tiene que  $\lceil X \rceil \in k(X)$  lo que implica que  $\lceil X \rceil \in Q_X$  y entonces  $2^X \subseteq k(X)$ , probándose el teorema. ■

**Corolario 2** Si  $X'$  es un subobjeto complementado de un objeto  $k$ -finito  $X$ , entonces  $X'$  es  $k$ -finito.

**Demostración.**  $\lceil X \rceil$  se factoriza a través de  $2^X$  y  $2^X \subseteq k(X)$ . ■

### 3 Consecuencias

**Proposición 3** Para  $X \in |E|$ , el álgebra booleana  $2^X$  actúa en  $k(X)$  a través de la restricción de  $\cap$  en  $k(X) \times 2^X$ .

**Demostración.** Queremos probar que  $k(X) \times 2^X \rightarrowtail \Omega^X \times \Omega^X \xrightarrow{\sqcap} \Omega^X$  se factoriza a través de  $k(X)$ :

$$\begin{aligned} & \models r \in k(X) \wedge y \in 2^X \\ & \Rightarrow \exists_y(z \cup y = X \wedge z \cap y = \phi) \wedge r \in k(X) \\ & \Rightarrow \exists_y(r = (r \cap z) \cup (r \cap y)) \wedge (r \cap z) \cap (r \cap y) = \phi \wedge r \in k(X) \\ & \Rightarrow r \cap y \in 2^r \wedge r \in k(X) \\ & \Rightarrow r \cap y \in 2^r \wedge 2^r \subseteq k(r), \text{ como } k(X) \subseteq Q_X, \\ & \Rightarrow r \cap y \in k(r) \\ & \Rightarrow r \cap y \in k(X). \end{aligned}$$

Sea  $k^+(X)$  el más pequeño subobjeto de  $\Omega^X$  cerrado bajo uniones binarias y que contiene a  $\{\cdot\}_X$ . Observe que  $k^+(X) \subseteq k(X)$ , denote esta inclusión por (i). ■

**Proposición 4** Para cualquier  $X \in |E|$ ,  $(i, \phi) : k^+(X) + 1 \rightarrow k(X)$  es un isomorfismo.

**Demostración.** Para  $X \in |E|$  denote  $w_X : X \rightarrow 1$  el único morfismo existente que va de  $X$  a 1. Defina  $P$  como el producto fibrado siguiente:

$$\begin{array}{ccc} \Omega^X & \xrightarrow{\exists_{\omega_X}} & \Omega \\ \uparrow & & \uparrow t \\ P & \xrightarrow{\omega_P} & 1 \end{array}$$

$P$  contiene a  $\{\cdot\}_X$  dado que es una transformación natural, entonces  $\{\cdot\} \circ \exists_{\omega_X} = \omega_X \circ t$ ,

$$\begin{array}{ccc} \Omega^X & \xrightarrow{\exists_{\omega_X}} & \Omega \\ \uparrow & & t \uparrow \\ P \times P & \xrightarrow{\omega_P} & 1 \end{array}$$

commuta. Como  $t \vee t = t$  y  $\exists_{\omega_X}$  preserva uniones binarias  $P$  es cerrado bajo uniones binarias. Por definición de  $k^+(X)$ ,  $k^+(X) \subseteq P$  ya que  $P$  es un monoide

que contiene a  $\{\cdot\}$ . Claramente  $\lceil \phi \rceil \cap P = \phi$  por lo tanto  $k^+(X) \cap \phi = \phi$  y entonces  $(i, \phi) : k^+(X) + 1 \rightarrow k(X)$  es mónica y entonces  $k^+(X) + 1 \subseteq k(X)$ .

Por otro lado  $k^+(X) + 1$  es cerrado bajo uniones binarias:

$$\begin{aligned} & \models (x \in k^+(X) \vee x = \phi) \wedge (y \in k^+(X) \vee y = \phi) \\ & \Rightarrow x \cup y \in k^+(X) \vee x \cup y = x \vee x \cup y = y \vee x \cup y = \phi \\ & \Rightarrow x \cup y \in k^+(X) \vee x \cup y \in k^+(X) \vee x \cup y \in k^+(X) \vee x \cup y = \phi \\ & \Rightarrow x \cup y \in k^+(X) \vee x \cup y = \phi. \end{aligned}$$

$k^+(X) + 1$  contiene  $\{\cdot\}_X$  y  $\phi$ , por lo tanto  $k(X) = k^+(X) + 1$ . ■

**Teorema 5** *Para cualquier objeto  $X \in |E|$  las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *El subobjeto diagonal  $\Delta_X : X \rightarrow X \times X$  tiene complemento.*
2.  $\models \forall x, y \in X \times X \Rightarrow x = y \vee \neg(x = y)$ .
3. *La flecha de clasificadora  $X_{\Delta_X}$  se factoriza a través de  $(t, f) : 2 \rightarrow \Omega$ .*
4. *La flecha  $\{\cdot\}_X : X \rightarrow \Omega_X$  se factoria a través de  $2^X$ .*
5.  $k(X) \subseteq 2^X$ .
6. *El gráfico  $\Gamma_f : Y \rightarrow Y \times X$  para cada  $f : Y \rightarrow X$  es un subobjeto complementado de  $Y \times X$ .*
7. *Gráfico :  $X^Y \rightarrow \Omega^{Y \times X}$  se factoriza a través de  $(t, f)^Y : 2^Y \rightarrow \Omega^{Y \times X}$  para todo  $Y$ .*

### Demostración.

- (1)  $\Rightarrow$  (2) Como  $\llbracket x = y \rrbracket = \Delta_X$  y el complemento de  $\Delta_X$  es  $\neg \Delta_X$ .
- Para ver que (2)  $\Rightarrow$  (1), observe que  $\llbracket x = y \rrbracket \cup \llbracket \neg(x = y) \rrbracket = X \times X$ , pero  $\llbracket x = y \rrbracket \cap \llbracket \neg(x = y) \rrbracket = \phi$ , entonces  $\Delta_X$  es complementado.
- (1)  $\Leftrightarrow$  (3)  $(t, f) : 2 \rightarrow \Omega$  clasifica subobjetos complementados.
- (3)  $\Leftrightarrow$  (4)  $X_{\Delta_X}$  se factoriza a través de  $2$  y por lo tanto su adjunto exponencial  $\{\cdot\}_X$  se factoriza a través de  $(t, t)^X : 2^X \rightarrow \Omega^X$  y reciprocamente.
- (4)  $\Rightarrow$  (5)  $2^X$  es un subretículo de  $\Omega^X$  y entonces  $0 \rightarrow 1$  está complementado y entonces  $\lceil \phi \rceil : 1 \rightarrow \Omega^X$  se factoriza a través de  $(t, f)^X : 2^X \rightarrow \Omega^X$  y por (4)  $\{\cdot\}_X$  está contenido en  $2^X$  y así  $k(X) \subseteq 2^X$ .

- (5)  $\Rightarrow$  (4) Si  $k(X) \subseteq 2^X$  entonces  $\{\cdot\}_X$  se factoriza a través de  $2^X$ .
- (6)  $\Rightarrow$  (1) El gráfico de  $id_X : X \rightarrow X$  es la diagonal de  $X$ .
- (1)  $\Rightarrow$  (6) El gráfico de cualquier flecha  $f : Y \rightarrow X$  está definida por el siguiente producto fibrado.

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & X \\ \Gamma_f \downarrow & & \downarrow \Delta_X \\ X \times Y & \xrightarrow[X \times f]{} & X \times X \end{array}$$

Como  $\Delta_X$  está completamente en  $X \times X$ , también  $\Gamma_f$  está completamente en  $X \times Y$ .

- Antes de probar  $(7) \Leftrightarrow (4)$ , probaremos la siguiente situación general: si  $X, Y$  son objetos arbitrarios de  $|E|$  entonces

$$\begin{array}{ccc} X^Y & \xrightarrow{\text{Graf}} & \Omega^{Y \times X} \\ \{\cdot\}_X^Y \downarrow & & \downarrow \varphi \\ (\Omega^X)^Y & \xrightarrow{id} & (\Omega^X)^Y \end{array}$$

commuta, donde  $\varphi$  es dado por  $\models \varphi(g) = \{(y, x) / x \in g(y)\} :$

$$\begin{aligned} \models (\varphi \circ \{\cdot\}_X^Y)(f)(y) &= \varphi(\{f\}_X(y)) \\ &= \varphi(\{f(y)\}_X) \\ &= \{(y, x) / x \in \{f(y)\}_X\} \\ &= \{(y, x) / x = f(y)\}. \end{aligned}$$

Entonces  $\models (\varphi \circ \{\cdot\}_X^Y)(f) = \text{Graf}(f)$  y entonces  $\varphi \circ \{\cdot\}_X^Y = \text{Graf}$ .

- (7)  $\Rightarrow$  (4)  $\text{Graf} : X^1 \rightarrow \Omega^{1 \times X}$  se factoriza a través  $2^X \rightarrow \Omega^X$ , entonces  $\{\cdot\}_X^1 = \{\cdot\}_X$  se factoriza a través de  $2^X$ .
- (4)  $\Rightarrow$  (7)  $\{\cdot\}_X$  se factoriza a través de  $2^X$  entonces  $\{\cdot\}_X^Y$  se factoriza a través  $2^{Y \times X}$ , como  $\text{Graf} = \varphi \circ \{\cdot\}_X^Y$  entonces  $\text{Graf}$  se factoriza a través de  $2^{Y \times X}$ . ■

Decimos que  $X$  es decidable si satisface alguna de las condiciones equivalentes del teorema anterior.

**Corolario 6** Si  $E$  es un topos elemental con el objeto de los números naturales  $\mathbb{N}$  entonces

- (i)  $K(\mathbb{N}) \subseteq 2^{\mathbb{N}}$ .
- (ii)  $\forall p, p : 1 \rightarrow \mathbb{N} [p]$  tiene complemento.
- (iii)  $K[p] \subseteq 2^{[p]}$ .

**Demostración.**

- (i)  $\mathbb{N}$  es decidible.
- (ii)  $[p]$  es un subobjeto k-finito de  $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \cong \mathbb{N}$  entonces  $[p]$  es decidible y por lo tanto  $[p] : 1 \rightarrow \Omega^{\mathbb{N} \times \mathbb{N}}$  se factoriza a través de  $2^{\mathbb{N} \times \mathbb{N}}$ .
- (iii) Cualquier subobjeto de un objeto decidible es decidible,  $[p] \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  y entonces  $K[p] \subseteq 2^{[p]}$ . ■

**Corolario 7** Si  $X \in |E|$ ,  $X$  es K-finito y decidible si y solo si  $K(X) = 2^X$ .

**Demostración.** Aplique el teorema 5 y el teorema 1. ■

**Proposición 8** Si  $X$  es decidible entonces  $k(X)$  es un subanillo booleano de  $2^X$ . Más aun  $k(X)$  es un ideal.

**Demostración.**  $\neg_X$  se restringe a  $2^X$  como el complemento. Defina

$$\models x - y = x \cap \neg_X(y),$$

entonces  $k(X)$  es cerrado bajo  $- : k(X) \times 2^X \rightarrow k(X)$ . Si  $X$  es decidible entonces  $k(X) \subseteq 2^X$ , por lo tanto  $\cap, -$  se pueden restringir a  $k(X) \times k(X)$ . Esto implica que  $k(X)$  es cerrado bajo intercección y complemento relativo.  $k(X)$  es cerrado bajo uniones binarias y tiene un elemento cero  $\lceil \phi \rceil : 1 \rightarrow k(X)$

Por otro lado

$$\begin{aligned} \models x - y = \lceil \phi \rceil &\Leftrightarrow x \cap \neg y = \lceil \phi \rceil \\ &\Leftrightarrow \lceil \phi \rceil \cup (x \cap y) = x \\ &\Leftrightarrow x \subseteq y. \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\models y \Delta x \equiv (y - x) \cup (x - y) = \lceil \phi \rceil \Leftrightarrow x = y.$$

Por lo tanto  $\Delta$  se combierte en la suma,  $\cap$  en el producto de  $k(X)$  y  $\lceil \phi \rceil$  el elemento neutro. La proposición 3 nos dice que  $k(X)$  es un ideal de  $2^X$ . ■

**Proposición 9** Si  $X \in |E|$ ,  $X$  decidible si y solo si  $k(X)$  es decidible.

**Demostración.** ( $\Rightarrow$ ) Por la proposición 8 sabemos que el siguiente diagrama es un producto fibrado

$$\begin{array}{ccc} k(X) & \longrightarrow & 1 \\ \Delta_{k(X)} \downarrow & & \downarrow \lceil \phi \rceil \\ k(X) \times k(X) & \xrightarrow{\Delta} & k(X) \end{array}$$

donde  $\Delta$  es diferencia simétrica, y como

$$k(X) = k^+(X) + 1,$$

entonces

$$\Delta_{k(X)} + \Delta^{-1}(k^+(X)) = k(X) \times k(X)$$

y así se tiene que  $k(X)$  es decidible.

( $\Leftarrow$ )  $\{\cdot\}_X : X \rightarrow k(X)$  es mónica y así todo subobjeto de  $k(X)$  es decidible y entonces  $X$  es decidible. ■

**Corolario 10**  $X$  es K-finito decidible si y solo si  $2^X$  es k-finito decidible.

**Demostración.** Por corolario 7,  $X$  es k-finito decidible si y solo si  $k(X) = 2^X$ , por proposición 9,  $2^X$  es decidible y por (3)  $k(X)$  es k-finito y entonces  $2^X$  es k-finito decidible. ■

## Referencias

- [1] Acuña–Ortega, O. (1977) *Finiteness in Topoi*. Ph. D. Dissertation, Wesleyan University, Middletown, CT.
- [2] Acuña–Ortega, O.; Linton, F.E.J. (1979) “Finiteness and decidability I”, in: *Applications of Sheaves*, Lecture Notes in Mathematics 753, Springer-Verlag, New York: 80–100.
- [3] Acuña–Ortega, O. (2011) “Una nota sobre objetos k-finitos en un topos Booleano con el objeto de los números naturales”, *Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones* **19**(2): 239–245.
- [4] Acuña–Ortega, O. (2013) “Sobre una construcción de un monoide libre con identidad sobre un topos  $E$  con el objeto de los números naturales”, *Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones* **20**(1): 79–94.

- [5] Kock, A.; Lecouturier, P.; Mikkelsen, Ch.J. (1975) “Some topos theoretic concepts of finiteness”, in: *Model Theory and Topoi*, Lecture Notes in Mathematics 445, Springer-Verlag, New York: 209–283.