



Revista de Biología Marina y
Oceanografía
ISSN: 0717-3326
revbiolmar@gmail.com
Universidad de Valparaíso
Chile

Vega, J.M. Alonso; Asorey, Cynthia M.; Piaget, Nicole
Asociación Scurria-Lessonia, indicador de integridad ecológica en praderas explotadas de
huiro negro Lessonia berteroana (ex L. nigrescens) en el norte de Chile
Revista de Biología Marina y Oceanografía, vol. 51, núm. 2, agosto, 2016, pp. 337-345
Universidad de Valparaíso
Viña del Mar, Chile

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47946774011>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

ARTÍCULO

Asociación *Scurria-Lessonia*, indicador de integridad ecológica en praderas explotadas de huilo negro *Lessonia berteroana* (ex *L. nigrescens*) en el norte de Chile

Scurria-Lessonia association as an indicator of ecological integrity in exploited kelp beds of *Lessonia berteroana* (ex *L. nigrescens*) in northern Chile

J.M. Alonso Vega^{1,2*}, Cynthia M. Asorey^{1,2} y Nicole Piaget¹

¹Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Casilla 117, Coquimbo, Chile

²Programa de Doctorado en Biología y Ecología Aplicada, Universidad Católica del Norte, Casilla 117, Coquimbo, Chile. *avega@ucn.cl

Abstract. *Scurria scurra* is a patelogastrópodo inhabiting the stipes and holdfasts cavities of *Lessonia nigrescens* complex species forming a herbivore-kelp association highly specialized. It has been proposed that the exploitation of kelp beds of *Lessonia berteroana* in northern Chile is a disturbance that affects *Scurria-Lessonia* association such as ENSO (El Niño-Southern Oscillation) events. Considering the above, and the important ecological role that have kelps as foundation species, this study proposes the use of *Scurria-Lessonia* association as an ecological indicator to monitor the integrity of kelp beds of *L. berteroana*. To achieve this, the abundance and size structure of *S. scurra* in plants of *L. berteroana* was evaluated under 3 different types of conservation strategies of fishing resources: open access areas and management areas (with harvest), and marine protected areas (without harvest) in the Region of Atacama and Region of Coquimbo, Chile. In addition, we monitored the time of recovery post-harvest of *Scurria-Lessonia* association in an experimental site (Lagunillas, 30°S). The results show that *S. scurra* population in open access areas is dominated by juveniles in low abundances, a situation not detected in management areas and marine protected areas. Furthermore, the recovery of *S. scurra* post-harvest of *Lessonia* at the experimental site took more than 2 years (30 months). An indicator was proposed to validate the actions of management plan of brown algae for open access areas to fisheries. This ecological indicator is easy to observe, evaluate and disseminate among users of the productive chain of Chilean kelp resource.

Key words: Kelp fisheries, ecological indicators, marine conservation, northern Chile

Resumen. *Scurria scurra* es un patelogastrópodo que habita los estipes y cavidades de discos adhesivos del complejo de especies *Lessonia nigrescens* formando una asociación herbívoro-alga altamente especializada. En el norte de Chile, se ha propuesto que la explotación de praderas de *Lessonia berteroana* es una perturbación que afecta la asociación *Scurria-Lessonia* de manera similar que los eventos ENOS (El Niño-Oscilación del Sur). Considerando lo anterior, y el importante rol ecológico que cumplen las algas pardas como especies fundamentales, este estudio propone el uso de la asociación *Scurria-Lessonia* como un indicador ecológico para monitorear la integridad de praderas explotadas de *L. berteroana*. Se evaluó la abundancia y estructura de talla de *S. scurra* en plantas de *L. berteroana* bajo 3 distintos tipos de estrategias de conservación de recursos pesqueros: áreas de libre acceso y áreas de manejo (con cosecha), y áreas marinas protegidas (sin cosecha) en Atacama y Coquimbo (26-32°S). Además, se monitoreó el tiempo de recuperación post cosecha de la asociación *Scurria-Lessonia* en un sitio experimental (Lagunillas, 30°S). Los resultados muestran que en áreas de libre acceso la población de *Scurria* está dominada por juveniles en bajas abundancias, situación no detectada en áreas de manejo y áreas marinas protegidas. Más aún, la recuperación de *S. scurra* post cosecha de *Lessonia* en el sitio experimental demoró más de 2 años (30 meses). Se propone un indicador para validar las acciones del plan de manejo de algas pardas para áreas de libre acceso a la pesquería. Este indicador ecológico es fácil de observar, evaluar y difundir entre los usuarios de la cadena productiva del recurso huilo negro.

Palabras clave: Pesquería algas pardas, indicadores ecológicos, conservación marina, norte de Chile

INTRODUCCIÓN

La integridad ecológica es una manera práctica para establecer si un plan de manejo, permite la explotación sustentable de un recurso natural sin afectar la salud del ecosistema (Carignan & Villard 2002). Esto se logra evaluando la efectividad de las

acciones de manejo a través de indicadores ecológicos comprensibles y comunicables a la sociedad (Niemi & McDonald 2001). Los indicadores ecológicos proporcionan una medida de la respuesta del ecosistema a la perturbación

antrópica (*e.g.*, cosecha), cuantificando la desviación respecto a la integridad ecológica de algún atributo medible del ecosistema (Isasi-Catalá 2011). En este contexto, uno de los atributos comúnmente utilizado como indicadores ecológicos son las especies de macroflora o macrofauna (Ellison *et al.* 2005). Entre las principales razones para usar las especies como indicadores ecológicos destaca la facilidad para identificarlas y medirlas, y el número relativamente amplio de especies con respuestas conocidas a las perturbaciones; pero también es importante el interés público que la especie puede alcanzar y el costo relativamente bajo que se requiere para implementar su monitoreo (Niemi & McDonald 2004).

Una especie indicadora es un término general para referirse a los enfoques que usan algunas especies para indicar una condición o respuesta al estrés y que puede aplicarse a otras con requerimientos ecológicos similares (Carignan & Villard 2002). Esta definición incluye a las especies paraguas, especies claves, especies emblemáticas, gremios, entre otras (Isasi-Catalá 2011).

Especies fuertemente asociadas con algunas características particulares del hábitat también puede ser usadas como indicadores (Niemi & McDonald 2001), como sucede con *Scurria scurra* (Lesson, 1830) (Patellogastropoda, Lottidae) y el huirro negro: *Lessonia berteroana* Montagne y *Lessonia spicata* (Suhr) Santelices (*ex L. nigrescens*) (Laminariales, Phaeophyceae) (Santelices *et al.* 1980, Muñoz & Santelices 1989, Meynard 2014) (Fig. 1).

En el norte de Chile, *S. scurra* es un molusco herbívoro que habita exclusivamente sobre los estípes y/o en cavidades dentro de discos adhesivos de *L. berteroana*. En el centro y sur de Chile, en cambio, *S. scurra* está asociada a *L. spicata* (Suhr) Santelices, una especie críptica de *L. berteroana* (Tellier *et al.* 2011, Meynard 2014) (Fig. 1). Este patelogastrópodo también habita en discos adhesivos de *Durvillaea antarctica* y *L. trabeculata*, y rara vez en otros sustratos biogénicos (*e.g.*, *Perumytilus purpuratus*) o sobre roca (Vásquez *et al.* 2001). La distribución latitudinal de *S. scurra* abarca la costa de Chile entre los 24°S y 42°S, siempre en presencia del huiral que forma




Figura 1. A) Área de estudio, destacada en el rectángulo con línea punteada; B) Asociación *Scurria-Lessonia*; C) *Scurria scurra* sobre estípes de *Lessonia berteroana* (*ex L. nigrescens*) en el área marina protegida de Isla Choros, D) en el área de libre acceso de Totoral Bajo; y E) sobre un estípe de *Lessonia spicata* (*ex L. nigrescens*) en la costa de Concepción / A) The study area highlighted in rectangle with dotted line; B) *Scurria-Lessonia* association; C) *Scurria scurra* on stipes of *Lessonia berteroana* (*ex L. nigrescens*) in marine protected areas of Isla Choros, D) in open access area of Totoral Bajo; and E) on a stipe of *L. spicata* in Concepción coast

el complejo de especies *L. nigrescens* en la zona intermareal baja (Espoz *et al.* 2004); constituido por *L. berteroana* al norte de los 30°S y *L. spicata* hacia el sur de esta latitud, respectivamente (González *et al.* 2012). Los individuos más grandes de *S. scurra* habitan las partes proximales de los estípites en cavidades que horadan al alimentarse progresivamente del tejido de *Lessonia* spp. (Muñoz & Santelices 1989, Camus *et al.* 2013) (Fig. 1), mientras que los individuos juveniles se refugian en las cavidades internas de los discos de adhesión (Cancino & Santelices 1984, Vásquez & Santelices 1984). Esta particular asociación entre *Scurria* y *Lessonia* ha sido explicada por la especialización que tiene *S. scurra* al hábitat y los recursos alimenticios que ofrece *Lessonia* (Muñoz & Santelices 1989, Camus 1994, Meynard 2014).

Históricamente, eventos ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) producen procesos de extinción local y recolonización de las praderas de *L. berteroana* en el norte de Chile afectando significativamente la asociación *Scurria-Lessonia* (Camus 1994, Espoz *et al.* 2004). El efecto neto de esta perturbación natural resulta en cambios de los patrones de distribución a nivel local y regional y en la abundancia de *S. scurra*, debido a la lenta tasa de renovación de las praderas de *L. berteroana* después del evento (Camus 1994), incluso se ha detectado una compresión del rango de distribución de la especie hacia el sur (Espoz *et al.* 2004).

Se ha postulado que la pesquería de algas pardas, una perturbación de origen antrópico, también amenaza la asociación *Scurria-Lessonia* (Espoz *et al.* 2004), y la biota que estas especies fundacionales sostienen (Camus 1994, Vega *et al.* 2014). Considerando lo anterior, y que *S. scurra* es un Patelogastrópodo representativo de las comunidades asociadas a praderas del complejo de especies *L. nigrescens* (Cancino & Santelices 1984, Vásquez & Santelices 1984, Camus 1994, Vásquez *et al.* 2001) (Fig. 1), este estudio propone el uso de la asociación *Scurria-Lessonia* como un indicador ecológico para monitorear la integridad de las praderas explotadas de huilo negro *L. berteroana* (ex *L. nigrescens*) en el norte de Chile. Para lograr este objetivo, se comparó la abundancia y estructura de tallas de *S. scurra* en los estípites de plantas ubicadas en praderas afectas a 3 distintas estrategias de conservación (Vega *et al.* 2014). Complementariamente, se determinó el tiempo de recuperación de *S. scurra* en los estípites de plantas de *L. berteroana* después de una cosecha experimental (denudación). Con los resultados de ambos experimentos, se construyó un indicador ecológico para monitorear la integridad de praderas explotadas del recurso huilo negro *Lessonia* spp., particularmente en áreas de libre acceso a la pesquería de algas pardas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evalúo la abundancia y la estructura de tallas de individuos de *S. scurra* en estípites de plantas de *L. berteroana* ubicadas en áreas de libre acceso (ALA), áreas de manejo (AMERB) y áreas marinas protegidas (AMP) en la Región de Atacama y Región de Coquimbo, entre noviembre y diciembre del 2013 (Fig. 1). Las localidades muestreadas fueron: Totoral Bajo (27,757°S-71,064°W), Caleta Angosta (28,250°S-71,163°W), Lagunillas (30,103°S-71,383°W) y Talquilla (30,864°S-71,683°W), donde hay áreas de manejo y áreas de libre acceso adyacentes (Vega *et al.* 2014). En ALA, cualquier pescador que tenga inscrito el recurso huilo negro (*Lessonia* spp.) puede realizar cosecha, en cambio en AMERB, sólo realizan cosecha aquellos pescadores que forman parte de un gremio. Además, se muestrearon individuos de *S. scurra* en plantas de *L. berteroana* en AMP Isla Grande de Atacama (27,248°S-70,974°W) e Isla Choros (29,259°S-71,535°W), donde la cosecha de *Lessonia* está prohibida (Vega *et al.* 2014).

La frecuencia de ocurrencia de *S. scurra* por planta se estimó detectando la presencia o ausencia de Patelogastrópodos en plantas de *Lessonia* ubicadas dentro de 9 cuadrantes de 1 m² (Vega *et al.* 2014). La frecuencia de ocurrencia de *S. scurra* en estípites se evalúo muestreando aleatoriamente 20 plantas adultas de *Lessonia* (≥ 20 cm diámetro del disco de adhesión; Vásquez *et al.* 2012). El tamaño de los individuos de *S. scurra* fue obtenido *in situ* midiendo la base de la concha cónica con un vernier digital.

La abundancia de *S. scurra* en plantas de *L. berteroana* fue monitoreada temporalmente en un sitio experimental de denudación en Lagunillas (Oróstica *et al.* 2014, Rodríguez *et al.* 2014). La población de *S. scurra* fue muestreada al inicio, en marzo 2011, cuando se efectuó la cosecha de plantas en el transecto experimental (control), y posteriormente a 8, 20 y 30 meses después de la cosecha. En cada muestreo, se evaluó el número de *S. scurra* en estípites de 20 plantas; y en cada observación, se midió *in situ* el diámetro de la concha del individuo y el correspondiente diámetro del estípite de *Lessonia* con un vernier digital.

La frecuencia de ocurrencia y abundancia de *S. scurra* en estípites y plantas de *Lessonia* fue comparada entre las distintas estrategias de conservación (ALA, AMERB y AMP) usando análisis de varianza (ANDEVA), considerando a la pradera de *L. berteroana* como un factor anidado (Tabla 1). La frecuencia de ocurrencia y abundancia de *S. scurra* en estípites y plantas de *Lessonia* en el sitio experimental fue comparada entre muestreos (0, 8, 20 y 30 meses) utilizando ANDEVA de un factor. El incremento del tamaño de la concha de *S. scurra* y el

Tabla 1. ANDEVA usando la estrategia de conservación como factor principal (Tipo) y pradera de *Lessonia berteroana* (Sitio) como factor anidado para evaluar la hipótesis que la asociación *Scurria-Lessonia* es modificada en áreas de libre acceso (ALA: Área de Libre Acceso, AMERB: Área de Manejo, AMP: Área Marina Protegida) / ANOVA using the conservation strategy as main factor (Type) and *Lessonia berteroana* bed (Site) as nested factor to evaluate the hypothesis that *Scurria-Lessonia* association is modified in open access areas (ALA: Open Access Area, AMERB: Management Area, AMP: Marine Protected Area)

<i>S. scurra</i>	Factor	GL	CM	Valor F	Valor P	Prueba de Tukey
en % por plantas en la pradera	Tipo	2	1,656	66,1	0,0001	AMP>AMERB>ALA
	Sitio (Tipo)	7	0,009	0,356	0,925	
	Error	80	0,025			
en n° de individuos por planta	Tipo	2	950,4	55,8	0,0001	AMP>AMERB>ALA
	Sitio (Tipo)	7	7,602	0,446	0,872	
	Error	190	17,029			
en % por estipe	Tipo	2	0,133	52,2	0,0001	AMP>AMERB>ALA
	Sitio (Tipo)	7	0,002	0,882	0,521	
	Error	190	0,003			

Tabla 2. Indicadores ecológicos basados en la asociación *Scurria-Lessonia* para monitorear la integridad de praderas explotadas de *Lessonia berteroana* (DS: desviación estándar; Ø: diámetro de la concha de *Scurria scurra*) / Ecological Indicators based in *Scurria-Lessonia* association to monitor the integrity of exploited kelp beds of *Lessonia berteroana* (DS: standard deviation; Ø: shell diameter of *Scurria scurra*)

Asociación <i>Scurria-Lessonia</i>	Pradera no explotada	Pradera explotada	
		Cosecha sustentable	Alta presión de cosecha
Frecuencia de ocurrencia por planta	Muy frecuente (>70%)	Frecuente (30-70%)	Poco Frecuente (<30%)
Frecuencia de ocurrencia por estipes	Muy frecuente (>25%)	Frecuente (15-25%)	Poco Frecuente (<15%)
Tamaño promedio (media ± DS; n=250)	Optimo (2,2 ± 0,76)	Normal (1,8 ± 0,58)	Bajo Talla (1,5 ± 0,57)
Individuos pequeños <td>Poco frecuente<br (<20%)<="" td=""/><td>Frecuente (20-30%)</td><td>Muy Frecuente<br (>30%)<="" td=""/></td></td>	Poco frecuente <td>Frecuente (20-30%)</td> <td>Muy Frecuente<br (>30%)<="" td=""/></td>	Frecuente (20-30%)	Muy Frecuente
Individuos grandes <td>Muy frecuente<br (>15%)<="" td=""/><td>Frecuente (5-15%)</td><td>Poco Frecuente<br (<5%)<="" td=""/></td></td>	Muy frecuente <td>Frecuente (5-15%)</td> <td>Poco Frecuente<br (<5%)<="" td=""/></td>	Frecuente (5-15%)	Poco Frecuente
Plan de Manejo (PM)	Pradera Referencial	Acciones del PM son adecuadas	Acciones del PM deben ser revisadas y corregidas o modificadas

diámetro del estipe de *L. berteroana* en el tiempo (0, 8, 20 y 30 meses) fue evaluado a través de análisis de covarianza (ANCOVA). La distribución normal y homocedasticidad de la varianza fue verificada con la prueba de Barlett y prueba de Lilliefors, mientras que los datos porcentuales fueron transformados al arcoseno de la raíz cuadrada antes de realizar los análisis estadísticos. Cuando el ANDEVA o ANCOVA presentó diferencias significativas se aplicó la prueba *a posteriori* de Tukey (Quinn & Keough 2002).

RESULTADOS

La frecuencia de ocurrencia y abundancia de *S. scurra* en los estipes y plantas de *L. berteroana* depende del tipo de estrategia de conservación al que está sometida la pradera (Fig. 2, Tabla 1). *Scurria scurra* fue significativamente más frecuente en los estipes de plantas ubicadas en praderas de AMP que de AMERB o ALA (Tabla 1), pero es en praderas de ALA donde la disminución de *S. scurra* en las plantas de *L. berteroana* fue

significativamente más notoria (Figs. 2A y B, Tabla 1). En general, la población de *S. scurra* de ALA estuvo dominada por juveniles, mientras que en AMERB y AMP fueron más frecuentes las clases de tallas superiores (Fig. 2C). Los individuos de mayor tamaño de *S. scurra* se detectaron en las plantas ubicadas en AMP (Fig. 2C).

En el sitio experimental de cosecha, el reclutamiento de *S. scurra* sobre estípites aumentó a medida que el tamaño del alga es mayor (ANDEVA $F_{(3,46)}$: 16,502, $P < 0,01$; Fig. 3). Luego de 30 meses de realizada la cosecha experimental (2,5 años), la densidad promedio de *S. scurra* por planta alcanzó niveles semejantes al encontrado al inicio del experimento (Fig. 3A). El incremento del tamaño de *S. scurra* en el tiempo covaría significativamente con el diámetro de los estípites de las plantas de *L. berteroana* (ANCOVA $F_{(3,298)}$: 7,3211, $P < 0,01$; Fig. 3B). Así, la progresión temporal de la estructura de tallas de la población de *S. scurra* ocurre a medida que las plantas de *L. berteroana* crecen y renuevan la pradera (Fig. 3C). Sin embargo, sólo el 20% de la población de *S. scurra* logra tamaños en las clases superiores de la estructura de tallas semejante al observado al inicio del experimento.

La frecuencia de ocurrencia, la abundancia y el tamaño de *S. scurra* son atributos demográficos útiles para construir los indicadores ecológicos basados en la asociación *Scurria-Lessonia* (Tabla 2). El punto de referencia objetivo del indicador *Scurria-Lessonia*, que representa el estado de conservación deseado del recurso huiro negro *L. berteroana*, está dado por los valores de los descriptores demográficos de *S. scurra* encontrados en AMP; mientras que el punto de referencia límite del indicador está dado por los valores de los descriptores demográficos de *S. scurria* detectados en AMERB. Así, cuando los valores están por sobre el punto de referencia límite, la explotación del recurso huiro negro *L. berteroana* es sustentable, y las acciones del plan de manejo son adecuadas (*e.g.*, AMERB); pero cuando los valores están por debajo del punto de referencia límite, por ejemplo en ALA, se constituye un estado de conservación no deseado, y las acciones del plan de manejo implementadas para el recurso deben ser revisadas, corregidas o modificadas (Tabla 2).




Figura 2. A) Frecuencia de ocurrencia de *Scurria scurra* en estípites; B) en plantas de *Lessonia berteroana*; y (C) estructura de tallas de la población de *Scurria scurra* en praderas de *Lessonia* con distintas estrategias de conservación (AMP: Área Marina Protegida; AMERB: Área de Manejo; ALA: Área de Libre Acceso) / A) Frequency of occurrence of *Scurria scurra* in stipes; B) plants of *Lessonia berteroana*; and (C) population's size structure of *Scurria scurra* in kelp beds of *Lessonia* with different conservation strategies (AMP: Marine Protected Area; AMERB: Management Area; ALA: Open Access Area)




Figura 3. A) Variación temporal de la abundancia de *Scurria scurra* en plantas de *Lessonia berteroana*; B) relación entre el tamaño de *Scurria scurra* y el diámetro del estipe de *Lessonia berteroana*; y C) estructura de tallas de la población de *Scurria scurra* en la pradera de *Lessonia* en el sitio experimental / A) Temporal variation of *Scurria scurra* in plants of *Lessonia berteroana*; B) relationship between the size of *Scurria scurra* and stipe diameter of *Lessonia berteroana*; and C) size structure of *Scurria scurra* population in kelp beds of *Lessonia* at experimental site

DISCUSIÓN

La explotación de *L. berteroana* en el norte de Chile tiene un efecto negativo en la asociación *Scurria-Lessonia*, particularmente en áreas de libre acceso a la pesquería de algas pardas. La alta presión de cosecha ejercida en praderas de *Lessonia* sujetas a este tipo de estrategia de conservación (Vega *et al.* 2014), se ve reflejada en una baja abundancia de individuos de *S. scurra* en los estípes de las plantas y una estructura de tallas dominada por juveniles. Dentro de áreas marinas protegidas, donde no se explota *Lessonia*, los individuos adultos de este patelogastrópodo son frecuentes y abundantes sobre las plantas, tal como fue descrito antes del comienzo de la explotación intensiva del recurso huilo negro en el 2000 (Santelices *et al.* 1980, Muñoz & Santelices 1989, Camus 1994). En áreas de manejo donde la explotación de recursos bentónicos es realizada a través de co-manejo (Quiñones & Aliaga 2004), la asociación *Scurria-Lessonia* persiste, porque las acciones de manejo propendan a buenas prácticas de cosecha (Vásquez *et al.* 2012), manteniendo la integridad ecológica de las poblaciones de *L. berteroana*. En

este contexto, las áreas de manejo contribuyen a la conservación de funciones y servicios ecosistémicos que proveen las praderas de *Lessonia*, que en áreas de libre acceso a la pesquería de algas pardas están en riesgo permanente (ver ejemplos en Almanza *et al.* 2012, Almanza & Buschmann 2013 para *Macrocystis pyrifera*; Molina *et al.* 2014 para *Lessonia trabeculata*).

En el extremo norte de Chile (18°S a 23°S), el evento ENOS es una perturbación que ocasiona procesos de extinción y recolonización local de *Lessonia* y *S. scurra* correlacionados con la latitud (Camus 1994, Espoz *et al.* 2004). Sin embargo, la recolonización de *S. scurra* no está necesariamente acoplada con *Lessonia* (Meynard 2014). Esta pérdida temporal del patelogastrópodo asociado en algunas praderas contribuye a la dinámica geográfica de las poblaciones de *Lessonia* (Camus 1994). Más aún, también hay una pérdida potencial de funciones, como por ejemplo, el rol compensatorio que cumple *S. scurra* en las poblaciones de *Lessonia* spp. (Aguilera 2011), al reducir el riesgo de desprendimiento y aumentar la expectativa

de vida a través de la ‘poda’ de los estípes más viejos de las plantas adultas (Santelices *et al.* 1980, Muñoz & Santelices 1989). La extracción activa del recurso huilo negro *L. berteroana* es una perturbación con efectos ecológicos potencialmente equivalentes a los producidos por un evento ENOS, a escala local. Sin embargo, en una perspectiva pesquera dichos efectos pueden ser identificados en el plan de manejo y mitigados con acciones dirigidas a conservar el recurso huilo negro y la integridad ecológica de las praderas de *Lessonia* (Camus 1994, Vásquez *et al.* 2012, Vega *et al.* 2014).

La capacidad reproductiva y la diversidad genética son atributos de *S. scurra* que deben ser resguardados en las praderas explotadas de *Lessonia*. Tanto *Lessonia* como *S. scurra* tienen un bajo potencial de dispersión, poblaciones genéticamente estructuradas y quiebres filogeográficos entre los 27°S y 30°S (Tellier *et al.* 2011, Haye *et al.* 2014, Meynard 2014). Estos antecedentes sugieren una historia biogeográfica común en el norte de Chile, y sustentan la idea que *S. scurra* es un herbívoro altamente especializado (Meynard 2014), muy sensible a la explotación de las praderas de *Lessonia* (Camus 1994, Espoz *et al.* 2004). A pesar de esto, se conoce muy poco sobre el ciclo de vida de *S. scurra*. En otras especies de patelogastrópodos (*e.g.*, *Patella ferruginea*, *P. granularis*), la fecundidad e índice gonadosomático se correlaciona con el tamaño, de manera que hembras más grandes contribuyen más al pool larval (Espinosa *et al.* 2006, Vat 2000), y es esperable que esto también suceda en *S. scurra* (Meynard 2014). A diferencia de lo que ocurre en California donde la explotación de *Lottia gigantea* no afecta la diversidad genética porque las poblaciones no están genéticamente estructuradas (Fenberg *et al.* 2010), *S. scurra* presenta poblaciones genéticamente estructuradas con un flujo génico limitado hacia ambos lados del quiebre filogeográfico reportado en la literatura (30°S en Haye *et al.* 2014; 27°S en Meynard 2014). Así, la abundancia y el tamaño de *S. scurra* además de ser un indicador útil para monitorear la integridad ecológica de praderas explotadas de *Lessonia*, también puede ser usada como una estrategia para la preservación de este herbívoro clave del intermareal rocoso chileno (Espoz *et al.* 2004).

La abundancia y el tamaño de *S. scurra* en los estípes de las plantas pueden ser utilizados como un indicador de integridad ecológica en las praderas explotadas de *L. berteroana*, y como un insumo o factor de decisión al evaluar las acciones establecidas en el plan de manejo para el recurso huilo negro (Tabla 2). Así, cuando los patelogastrópodos en los estípes de las plantas de *Lessonia* son en su mayoría pequeños (juveniles), poco frecuentes, y tienen una baja abundancia, entonces la pradera está sometida a una alta presión de cosecha (Vega *et al.* 2014), lo cual fue observado en áreas de libre acceso. En

este escenario, hay un riesgo potencial de pérdida de funciones y servicios ecosistémicos en la pradera de *Lessonia*, por lo que la cosecha debe ser detenida y las acciones de manejo deben ser revisadas y corregidas o modificadas. En cambio, cuando los individuos de *S. scurra* son grandes (adultos), frecuentes y abundantes en los estípes de las plantas, se reconoce una pradera de *Lessonia* poco intervenida, natural e integra. En el contexto del manejo de recursos lo anterior puede ser una meta a lograr (Niemi & MacDonald 2004, Carignan & Villard 2002). No obstante, también existen situaciones intermedias como las detectadas en las áreas de manejo, donde el estado de la población de *S. scurra* sugiere una explotación sustentable que involucran acciones de manejo que propenden a la conservación de las praderas de *Lessonia*. Finalmente, se debe destacar que las áreas marinas protegidas contienen praderas de *Lessonia* referenciales que permiten discriminar efectos generados por otro tipo de perturbaciones (*e.g.*, evento ENOS; Vásquez *et al.* 2001) que pueden interactuar con la pesquería de algas pardas (Camus 1994, Vega *et al.* 2014), y requerir de acciones complementarias al plan de manejo implementado para el recurso.

La asociación *Scurria-Lessonia* es un indicador útil para monitorear la integridad ecológica de praderas explotadas de *L. berteroana* porque: (a) la morfología de la concha de *S. scurra* es fácil de reconocer y de medir en terreno; (b) algunas respuestas demográficas (*e.g.*, densidad, estructura de tallas) a las perturbaciones son relativamente conocidas (Muñoz & Santelices 1989, Camus 1994, Espoz 2004, Meynard 2014); y (c) es una especie clave en la persistencia de las poblaciones de *Lessonia* (Aguilera 2011, Isasi-Catalá 2011). No obstante, todavía se requiere investigar diversos aspectos de la biología y ecología de este patelogastrópodo que podrían potenciar al indicador ecológico. Adicionalmente, la implementación de este indicador requiere de un presupuesto mínimo, y el seguimiento puede ser ejecutado por los propios pescadores ó por cualquier persona interesada en realizar el monitoreo, después de un breve entrenamiento básico.

Lessonia berteroana es una de las especies crípticas que conforman el complejo *L. nigrescens*, la otra es *L. spicata* (González *et al.* 2012). Aunque difieren en distintos rasgos ecofisiológicos (Tellier *et al.* 2011), la asociación *Scurria-Lessonia* ocurre en las dos especies debido a la alta similitud morfológica de las plantas (Meynard 2014) (Fig. 1). Así, los indicadores ecológicos propuesto para *L. berteroana* también pueden ser usado para establecer la integridad ecológica de praderas explotadas de *L. spicata* en la zona centro-sur de Chile (*e.g.*, Talquilla, al sur de los 30°S). No obstante, se requieren estudios comparativos de la asociación *Scurria-Lessonia* entre ambas especies crípticas de *Lessonia*.

En conclusión, la asociación *Scurria-Lessonia* puede ser usada como un indicador para monitorear el efecto de las acciones del plan de manejo en la integridad ecológica de las praderas explotadas del huilo negro *L. berteroana* (ex *L. nigrescens*). Además, este indicador ecológico es fácil de observar, evaluar y difundir y/o aplicar por los propios usuarios de la cadena productiva de este recurso pesquero bentónico.

AGRADECIMIENTOS

JMAV y CMA agradecen a la Universidad Católica del Norte (UCN) y a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT, Beca N° 21110630 y N° 21120351, respectivamente), la beca de estudio en el Programa de Doctorado en Biología y Ecología Aplicada, UCN (Coquimbo, Chile). JMAV agradece el financiamiento de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Proyectos: ID N° 4728-132-LE13, ID N° 4728-133-LE13) y a los equipos de trabajo de ECOS y Centro de Estudios de Sistemas Sociales-CESSO. Se agradece a E. Macaya la fotografía de la asociación *Scurria-Lessonia* en Concepción. También se agradecen los comentarios y correcciones al manuscrito de tres evaluadores anónimos.

LITERATURA CITADA

- Aguilera MA.** 2011. The functional roles of herbivores in the rocky intertidal systems in Chile: A review of food preferences and consumptive effects. Revista Chilena de Historia Natural 84: 241-261.
- Almanza V & AH Buschmann.** 2013. The ecological importance of *Macrocystis pyrifera* (Phaeophyta) forests towards a sustainable management and exploitation of Chilean coastal benthic co-management areas. International Journal of Environment and Sustainable Development 12(4): 341-360.
- Almanza V, AH Buschmann, MC Hernández-González & LA Henríquez.** 2012. Can giant kelp (*Macrocystis pyrifera*) forests enhance invertebrate recruitment in southern Chile? Marine Biology Research 8(9): 855-864.
- Camus PA.** 1994. Dinámica geográfica en las poblaciones de *Lessonia nigrescens* Bory (Pheophyta) en el norte de Chile: importancia de la extinción local durante eventos El Niño de gran intensidad. Revista de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Serie Ciencias del Mar, Chile 3: 58-70.
- Camus PA, PA Arancibia & I Ávila-Thieme.** 2013. Una caracterización trófica de los consumidores intermareales en las costas rocosas de Chile. Revista de Biología Marina y Oceanografía 48(3): 431-450.
- Cancino J & B Santelices.** 1984. Importancia ecológica de los discos adhesivos de *Lessonia nigrescens* Bory (Phaeophyta) en Chile central. Revista Chilena de Historia Natural 57: 23-33.
- Carignan V & MA Villard.** 2002. Selecting indicators species to monitor ecological integrity: a review. Environmental Monitoring and Assessment 78: 45-61.
- Ellison AM, MS Bank, BD Clinton, EA Colburn, K Elliott, CR Ford, DR Foster, BD Kloepel, JD Knoepp, GM Lovett, J Mohan, DA Orwig, NL Rodenshouse, WV Sobczak, KA Stinson, JK Stone, CM Swan, J Thompson, B Von Holle & JR Webster.** 2005. Loss of foundation species: consequences for the structure and dynamics of forested ecosystems. Frontiers in Ecology and the Environment 3: 479-486.
- Espinosa F, JM Guerra-García, D Fa & JC García-Gómez.** 2006. Aspects of reproduction and their implications for the conservation of the endangered limpet, *Patella ferruginea*. Invertebrate Reproduction and Development 49(1-2): 85-92.
- Espoz C, DR Lindberg, JC Castilla & WB Simison.** 2004. Los patelogastrópodos intermareales de Chile y Perú. Revista Chilena de Historia Natural 77(2): 257-283.
- Fenberg PB, ME Hellberg, L Mullen & K Roy.** 2010. Genetic diversity and population structure of the sizeselectively harvested owl limpet, *Lottia gigantea*. Marine Ecology 31(4): 574-583.
- González A, J Beltrán, L Hiriart-Bertrand, V Flores, B de Reviers, JA Correa & B Santelices.** 2012. Identification of cryptic species in the *Lessonia nigrescens* complex (Phaeophyceae, Laminariales). Journal of Phycology 48(5): 1153-1165.
- Haye PA, NI Segovia, NC Muñoz-Herrera, FE Gálvez, A Martínez, A Meynard, MC Pardo-Gandarillas, E Poulin & S Faugeron.** 2014. Phylogeographic structure in benthic marine invertebrates of the southeast Pacific coast of Chile with differing dispersal potential. PloS One 9(2), e88613.
- Isasi-Catalá E.** 2011. Los conceptos de especies indicadoras, paraguas, banderas y claves: su uso y abuso en ecología de la conservación. Interciencia 36(1): 31-38.
- Meynard A.** 2014. Grado de especialización ecológica y filogeografía comparada entre el herbívoro especialista *Scurria scurra* y sus dos algas hospederos en la costa chilena. Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 135 pp.
- Molina P, FP Ojeda, M Aldana, VM Pulgar, MR García-Huidobro & J Pulgar.** 2014. Spatial and temporal variability in subtidal macroinvertebrates diversity patterns in a management and exploitation area for benthic resources (MEABRs). Ocean and Coastal Management 93: 121-128.
- Muñoz M & B Santelices.** 1989. Determination of the distribution and abundance of the limpet *Scurria scurra* on the stipes of the kelp *Lessonia nigrescens* in central Chile. Marine Ecology Progress Series 54: 277-285.
- Niemi GJ & ME McDonald.** 2004. Application of ecological indicators. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 35: 89-111.

- Oróstica MH, MA Aguilera, GA Donoso, JA Vásquez & BR Broitman.** 2014. Effect of grazing on distribution and recovery of harvested stands of *Lessonia berteroana* kelp in northern Chile. *Marine Ecology Progress Series* 511: 71-82.
- Quinn GP & MJ Keough.** 2002. Experimental design and data analysis for biologists, 537 pp. Cambridge University Press, Cambridge.
- Quiñones RA & B Aliaga.** 2004. Conceptos fundamentales de administración pesquera. En: Werlinger C (ed). Biología marina y oceanografía: Conceptos y procesos, pp. 595-618. Trama Impresores, Concepción.
- Rodríguez D, MH Oróstica & JA Vásquez.** 2014. Coalescence in wild organisms of the intertidal population of *Lessonia berteroana* in northern Chile: management and sustainability effects. *Journal of Applied Phycology* 26(2): 1115-1122.
- Santelices B, JC Castilla, J Cancino & P Schmiede.** 1980. Comparative ecology of *Lessonia nigrescens* and *Durvillaea antarctica* (Phaeophyta) in central Chile. *Marine Biology* 59(2): 119-132.
- Tellier F, JMA Vega, BR Broitman, JA Vasquez, M Valero & S Faugeron.** 2011. The importance of having two species instead of one in kelp management: the *Lessonia nigrescens* species complex. *Cahiers de Biologie Marine* 52(4): 455-465.
- Vásquez JA & B Santelices.** 1984. Comunidades de macroinvertebrados en discos adhesivos de *Lessonia nigrescens* Bory (Phaeophyta) en Chile central. *Revista Chilena de Historia Natural* 57: 131-154.
- Vásquez JA, D Veliz & LM Pardo.** 2001. Biodiversidad de macroinvertebrados bajo las grandes algas. En: Alveal K & T Antezana (eds). Sustentabilidad de la biodiversidad. Un problema actual: Bases científico técnicas, teorizaciones y proyecciones, pp. 293-308. Universidad de Concepción, Concepción.
- Vat LS.** 2000. The growth and reproduction of *Patella granularis* (Mollusca: Patellogastropoda) on the south-east coast of South Africa. Thesis Doctoral, Faculty of Science, Rhodes University, Grahamstown, 247 pp.
- Vega JMA, BR Broitman & JA Vásquez.** 2014. Monitoring the sustainability of *Lessonia nigrescens* (Laminariales, Phaeophyceae) in northern Chile under strong harvest pressure. *Journal of Applied Phycology* 26(2): 791-801.

Recibido 25 de febrero de 2015 y aceptado el 4 de abril de 2016

Editor: Claudia Bustos D.